

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

01.11.2024

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
БРИЛЛИАНТОВЫЕ ГЛАЗА® капли глазные

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-10.17-3885№ПВР-3-7.6/01804

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: БРИЛЛИАНТОВЫЕ ГЛАЗА® капли глазные (Eye drops diamond eyes).

Международные непатентованные наименования действующих веществ: хлоргексидин, таурин, янтарная кислота.

2. Лекарственная форма: капли глазные.

Лекарственный препарат в качестве действующих веществ в 1 мл содержит хлоргексидина биглюконат – 0,15 мг, таурин – 20 мг и янтарную кислоту – 1 мг, а также вспомогательное вещество: воду для инъекций.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-голубого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства; после первого вскрытия упаковки – 28 суток при температуре не выше 8 °С. Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 10 и 20 мл в полимерные флаконы-капельницы, укупоренные навинчиваемыми полимерными крышками с контролем первого вскрытия; по 10 мл в стеклянные флаконы, герметично укупоренные резиновыми пробками, обкатанными алюминиевыми колпачками. Флаконы-капельницы и флаконы индивидуально упаковывают в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25°С.

6. Лекарственный препарат хранят в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. БРИЛЛИАНТОВЫЕ ГЛАЗА® капли глазные относятся к фармакотерапевтической группе: офтальмологические средства в комбинациях.

10. Лекарственный препарат обладает местным бактерицидным, противовоспалительным и противоотёчным действием.

Хлоргексидин оказывает быстро проявляющееся бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии, дерматофиты и липофильные вирусы. Механизм его действия заключается в связывании катионов, образующихся в результате диссоциации солей хлоргексидина, стенками бактериальных клеток, нарушении осмотического равновесия и мембранной функции клеток, что приводит к снижению уровня клеточной АТФ и гибели микроорганизма.

Таурин и янтарная кислота нормализуют окислительно-восстановительные процессы, оказывают репаративное действие, замедляют развитие катаракты и профилактируют дегенеративные и дистрофические нарушения в сетчатке и хрусталике.

БРИЛЛИАНТОВЫЕ ГЛАЗА® капли глазные по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. Лекарственный препарат назначают собакам и кошкам для повседневной гигиенической обработки глаз (удаления засохшего экссудата в углах глаз); уменьшения зуда, раздражения и избыточного слезотечения при воспалении слизистой оболочки и гиперемии сосудов глазного яблока (синдром «красного глаза»); с лечебной и профилактической целью при острых и хронических катаральных и серозно-катаральных конъюнктивитах; для профилактики инфекционных заболеваний глаз после травм и попадания инородных тел; в целях профилактики катаракты и возрастных дегенеративных и дистрофических изменений сетчатки и роговицы.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. При работе с препаратом БРИЛЛИАНТОВЫЕ ГЛАЗА® капли глазные следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо немедленно промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с препаратом БРИЛЛИАНТОВЫЕ ГЛАЗА® капли глазные. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Возможность применения лекарственного препарата животным в период беременности и лактации определяет лечащий врач на основании оценки соответствия пользы к возможному риску его применения.

15. Для повседневного туалета глаз и при конъюнктивитах легкой степени смоченным препаратом стерильным марлевым тампоном удаляют из внутреннего угла глаза экссудат и корочки, после чего сразу же закапывают в конъюнктивальную полость кошкам и собакам массой до 10 кг по 1 капле, собакам массой более 10 кг - по 2 капли лекарственного препарата. Обработку проводят 1-3 раза в день по мере необходимости с 5-10-дневными интервалами:

– при обработке глаз 1 раз в день препарат применяют не более 45 дней, после чего делают 10-дневный перерыв;

– при обработке глаз 2 раза в день препарат применяют не более 20 дней, после чего делают 7-дневный перерыв;

– при обработке глаз 3 раза в день препарат применяют не более 14 дней, после чего делают 5-дневный перерыв.

При избыточном слезотечении, синдроме «красного глаза», травмах, попадании инородных предметов или раздражающих веществ препарат закапывают по 1-2 капли 3 раза в день в течение 5-14 дней.

С целью профилактики катаракты и возрастных дегенеративных изменений сетчатки и роговицы глаза лекарственный препарат применяют по 1-2 капли 2 раза в день курсами по 20 дней с 10-дневным интервалом.

16. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и проявлении аллергических реакций (продолжается или нарастает конъюнктивальная гиперемия) использование препарата прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

17. Симптомы передозировки препарата не выявлены.

18. При совместном использовании других офтальмологических лекарственных препаратов интервал между их введением должен составлять не менее 5 минут. Сведения о несовместимости препарата с лекарственными средствами других фармакологических групп, кормами и кормовыми добавками отсутствуют.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска одной или нескольких доз применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:


ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11.

Телефон круглосуточной «Горячей линии»: 8-800-700-19-93. Информация о лекарственном препарате размещена на сайте www.avzvet.ru

Генеральный директор



С.В. Енгашев