

13 MAR 2025

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Диаркан

(Организация-разработчик: Сева Санте Анималь, 10 авеню де ла Балластьер, 33500, Либурн, Франция/ Ceva Sante Animale, 10 avenue de la Ballastiere, 33500, Libourne, France.)

Номер регистрационного удостоверения: 250-1-1.15-2527№ПВР-3-5.9/02473

I. Общие сведения.

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: торговое наименование: Диаркан (Diarkan); международные непатентованные наименования действующих веществ: сульфатуанидин, бензонафтол.
2. Лекарственная форма: таблетки жевательные.
Диаркан в качестве действующих веществ в одной таблетке содержит: сульфатуанидин - 300 мг, бензонафтол - 100 мг, а в качестве вспомогательных веществ экстракт корня ратании - 280 мг и сахарозу до 8 г.
3. По внешнему виду Диаркан представляет собой жевательную таблетку (в виде сахарного кубика), с разделяющей бороздкой посередине, от розовато-коричневого до коричневого цвета, на поверхности кубика допускается разнотонность.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня производства. Лекарственный препарат не подлежит длительному хранению после вскрытия первичной упаковки. Лекарственный препарат запрещено применять по истечении срока годности.
4. Выпускают Диаркан расфасованным по 8 таблеток в полимерные блистеры, индивидуально упакованные в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.
5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.
6. Диаркан следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается по рецепту ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства.

9. Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата для ветеринарного применения: сульфаниламиды в комбинациях.

10. Сульфагуанидин, входящий в состав лекарственного препарата, обладает антибактериальной активностью в отношении кишечной палочки и сальмонелл, как и другие сульфаниламиды, является конкурентным антагонистом парааминобензойной кислоты, препятствует образованию тетрагидрофолиевой кислоты, что в свою очередь нарушает образование пуриновых и пиримидиновых оснований.

При пероральном применении сульфагуанидин практически не всасывается, создавая высокие бактериостатические концентрации. Выводится из организма в основном в неизменном виде с фекалиями.

Бензонафтол распадается в кишечнике на бензойную кислоту и β -нафтол, которые оказывают антисептическое действие, выводится с мочой и калом.

Диаркан по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения.

11. Диаркан применяют собакам и кошкам для лечения энтеритов бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к сульфагуанидину и бензонафтолу.

12. Диаркан противопоказан к применению при выраженных нарушениях функции почек и печени, мочекаменной болезни, повышенной чувствительности к сульфаниламидным препаратам.

13. При работе с Диарканом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для ветеринарного применения.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Диарканом. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Упаковку из-под использованного препарата помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

14. Лекарственный препарат не предназначен для применения самкам во время беременности, а также щенкам и котят в подсосный период и массой менее 1 кг.

15. Диаркан назначают животному перорально 2 раза в сутки с интервалом 12 часов, в тяжелых случаях заболевания – 3 раза в сутки с интервалом 8 часов в течение 3-5 дней в следующих дозах:

кошкам и карликовым собакам (1-5 кг)	0,5 таблетки
маленьким собакам (5-15 кг)	1,0 таблетка
средним собакам (15-30 кг)	1,5 таблетки
большим собакам (30 кг и больше)	2,0 таблетки

Лекарственный препарат добавляют в корм или питьевую воду, собакам скармливают с руки хозяина.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У некоторых животных возможны кристаллурия, рвота, аллергические реакции в виде крапивницы или дерматитов. В этом случае применение препарата прекращают и

животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. При передозировке препарата могут наблюдаться симптомы нарушения функции желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея). В этом случае рекомендуется промывание желудка и симптоматическое лечение.

18. Не рекомендуется совместное применение Диаркана с препаратами, повышающими кислотность мочи (аскорбиновая кислота, гексаметиленetetрамин) из-за высокой вероятности развития кристаллурии, с препаратами с высокой степенью связывания с белками сыворотки крови (НПВС, кумариновые антикоагулянты, дефинин, производные сульфонилмочевины), в связи с возможным усилением их токсичности.

19. Для предупреждения кристаллурии в период применения лекарственного препарата рекомендуется обильное поение, для этого животному следует обеспечить свободный доступ к воде.


20. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

21. Диаркан не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.	ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1
---	---

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.	ООО «Сева Санте Анималь», 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, тел.: (495) 729-59-90.
---	--

Представитель компании
«Сева Санте Анималь»



Н.Н. Сомова