СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

12.12.2025

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению МУЛЬТИКАН-LR

(организация-разработчик – ООО «Ветбиохим», 109316, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, пр-кт Волгоградский, д. 42, этаж 12, ком. 12)

Номер регистрационного удостоверения: 77-1-26.25-5410№ПВР-1-26.25/04155

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование – МУЛЬТИКАН-LR

Международное непатентованное наименование – Вакцина против лептоспироза и бешенства собак инактивированная

2. Лекарственная форма: суспензия для инъекций (инактивированная вакцина), изготовлена из инактивированного штамма вируса бешенства «ERA-CB20M» и производственных инактивированных штаммов лептоспир серологических групп *Icterohaemorrhagiae, Canicola* и *Grippotyphosa*, с добавлением гелевого адъюванта (не более 0,5 мг\мл).

3. По внешнему виду вакцина представляет собой прозрачную или слегка опалесцирующую жидкость, цвет которой может варьировать от светло-желтого до розового, с осадком на дне флакона разной интенсивности, разбивающимся при взбалтывании в гомогенную суспензию. Срок годности вакцины – 18 месяцев от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна. Вакцину необходимо использовать в течение 15 мин после вскрытия флакона.

4. Вакцина расфасована по 1 мл (1 доза) в стеклянные флаконы вместимостью 3 мл. Флаконы укупорены резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками. Флаконы с вакциной упакованы в пластиковые коробки или блистеры - по 10 флаконов в каждом. В коробку (блистер) с вакциной вложена инструкция по ее применению.

5. Вакцину хранят и транспортируют при температуре от 2 до 8 °С.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Вакцину во флаконах без маркировки, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, измененным внешним видом, не использованную в течение 15 мин после вскрытия флакона, обезвреживают путем кипячения в течение 30 минут и утилизируют. Утилизация обезвреженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцина отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. МУЛЬТИКАН-LR относится к фармакотерапевтической группе «Вакцины, сыворотки, фаги и анатоксины».

10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у собак к возбудителям лептоспироза указанных серогрупп через 21 день после двукратной иммунизации продолжительностью до 1 года и к возбудителю бешенства через 21 день после однократной иммунизации продолжительностью до 3-х лет.

Одна иммунизирующая доза вакцины содержит не менее:

- лептоспиры серогрупп

Icterohaemorrhagiae, Canicola, Grippotyphosa	3 x10^8 микробных клеток;
- вирус бешенства	1 МЕ.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

Ш. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Вакцина предназначена для профилактики лептоспироза, вызванного лептоспирами серогрупп *Icterohaemorrhagiae, Canicola, Grippotyphosa* и бешенства собак.

12. Запрещено вакцинировать клинически больных и/или ослабленных животных.

13. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

14. Не подлежат вакцинации собаки в последний месяц беременности и щенки до 8-недельного возраста.

15. Вакцинации подлежат клинически здоровые собаки с 8-недельного возраста, животным вакцину вводят двукратно с интервалом 21-28 суток.

В регионах с благополучной эпизоотической ситуацией по бешенству и\или при условии контроля уровня поствакцинальных антирабических антител методом FAVN щенкам с 12-недельного возраста и ранее невакцинированным взрослым животным, допускается однократное введение вакцины МУЛЬТИКАН-LR за 21-28 суток до или через 21-28 суток после введения вакцины МУЛЬТИКАН-L.

Для профилактики лептоспироза ревакцинацию собак вакциной МУЛЬТИКАН-LR проводят ежегодно.

Для профилактики бешенства ревакцинацию собак вакциной МУЛЬТИКАН-LR проводят ежегодно для регионов с неблагополучной эпизоотической ситуацией по бешенству и\или для животных с высоким риском контакта с вирусом бешенства и 1 раз в 3 года в регионах с благополучной эпизоотической ситуацией по бешенству и\или при условии контроля уровня поствакцинальных антирабических антител методом FAVN.

Перед применением вакцину МУЛЬТИКАН-LR тщательно взбалтывают.

Вакцину вводят внутримышечно в область бедра или подкожно в область шеи в дозе 1 мл.

Вакцина МУЛЬТИКАН-LR может являться частью более полного курса иммунизации. Применимы следующие схемы вакцинации:

Ранняя вакцинация щенков против чумы плотоядных и парвовирусного энтерита собак, уровень колостральных антител неизвестен	
Схема 1	
Возраст 6-7 недель	МУЛЬТИКАН-DP
Возраст 9-10 недель	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L
Возраст 12-13 недель	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L и РАБИКС или с МУЛЬТИКАН-LR
Возраст 15-16 недель, для регионов с неблагополучной эпизоотической ситуацией по бешенству и\или для животных с высоким риском контакта с вирусом бешенства	РАБИКС
Схема 2	
Возраст 6-7 недель	МУЛЬТИКАН-DP
Возраст 9-10 недель	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L и РАБИКС или с МУЛЬТИКАН-LR

Возраст 12-13 недель	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L
Возраст 12-13 недель, для регионов с неблагополучной эпизоотической ситуацией по бешенству и\или для животных с высоким риском контакта с вирусом бешенства	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L и РАБИКС или с МУЛЬТИКАН-LR
Вакцинация щенков с 8-недельного возраста	
Схема 1	
Возраст 8-10 недель	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L
Возраст 12-13 недель	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L и РАБИКС или с МУЛЬТИКАН-LR
Возраст 15-16 недель, для регионов с неблагополучной эпизоотической ситуацией по бешенству и\или для животных с высоким риском контакта с вирусом бешенства	РАБИКС
Схема 2	
Возраст 8-10 недель	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L и РАБИКС или с МУЛЬТИКАН-LR
Возраст 12-13 недель	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L
Возраст 12-13 недель, для регионов с неблагополучной эпизоотической ситуацией по бешенству и\или для животных с высоким риском контакта с вирусом бешенства	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L и РАБИКС или с МУЛЬТИКАН-LR
Вакцинация ранее невакцинированных животных старше 12-недельного возраста	
1-я вакцинация	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L и РАБИКС или с МУЛЬТИКАН-LR
2-я вакцинация (интервал 21-28 дней)	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L
2-я вакцинация (интервал 21-28 дней), для регионов с неблагополучной эпизоотической ситуацией по бешенству и\или для животных с высоким риском контакта с вирусом бешенства	МУЛЬТИКАН-DHP совместно с МУЛЬТИКАН-L и РАБИКС или с МУЛЬТИКАН-LR
Ревакцинация от чумы плотоядных, аденовирусных инфекций и парвовирусного энтерита собак	
Ежегодная. В дальнейшем, допускается снижение кратности ревакцинации до одного раза в 3 года у животных, получивших курс из 2-х первичных инъекций вакцины и ревакцинированных через 1 год.	
Ревакцинация от лептоспироза	
Ежегодная	
Ревакцинация от бешенства	
Ежегодная, для регионов с неблагополучной эпизоотической ситуацией по бешенству и\или для животных с высоким риском контакта с вирусом бешенства	

Раз в 3 года в регионах с благополучной эпизоотической ситуацией по бешенству и\или при условии контроля уровня поствакцинальных антирабических антител методом FAVN

16. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. На месте инъекции возможно появление быстро исчезающей припухлости. В случае проявления у отдельных животных аллергических реакций на введение вакцины назначают симптоматическое лечение.

17. Патологических признаков при передозировке вакцины не выявлено.

18. Допускается применение вакцины МУЛЬТИКАН-LR в качестве растворителя для вакцины МУЛЬТИКАН-DHP и лиофилизированного компонента вакцины МУЛЬТИКАН-DP (вакцины против чумы собак).

Вакцину не применяют в одном шприце с другими биопрепаратами и лекарственными средствами.

19. Особенностей поствакцинальной реакции при первичной и повторной вакцинации не установлено.

20. Следует избегать нарушений схемы вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики лептоспироза и бешенства. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

21. Сроки возможного использования продукции животного происхождения после введения вакцины МУЛЬТИКАН-LR не устанавливаются.

Наименование и адрес производственной площадки производителя вакцины против лептоспироза и бешенства собак инактивированной: ООО «Ветбиохим», 109316, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, пр-кт Волгоградский, д. 42, корп. 5.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «Ветбиохим», 109316, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, пр-кт Волгоградский, д. 42, этаж 12, ком. 12.

И.о. генерального директора ООО «Ветбиохим» А.В. Базыкин