

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

1 0. 02. 2026

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Селафорт®
(организация-разработчик АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка
цеста 6, 8501, Ново место, Словения / «KRKA, d.d., Novo mesto», Šmarješka cesta
6, 8501 Novo mesto, Slovenija)

Номер регистрационного удостоверения: 705-3-4.21-4739 №ПВИ-3-4.21/05770

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Селафорт®
(Selafort®).

Международное непатентованное наименование: селамектин.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Селафорт® в форме 6% и 12% раствора в качестве действующего вещества
содержит селамектин соответственно 60 мг/мл и 120 мг/мл и вспомогательные
вещества: изопропиловый спирт, бутилгидрокситолуол, диметилсульфоксид.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор от
бесцветного до желтого или до коричневого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий
хранения - 3 года с даты производства. Не применять по истечении срока
годности.

4. Селафорт® выпускают расфасованным в полимерные пипетки разного
объема с колпачками различного цвета - Селафорт® 6% раствор по: 0,25 мл
(розовый колпачок), 0,75 мл (бирюзовый колпачок), 1 мл (серо-коричневый
колпачок); Селафорт® 12% раствор по: 0,25 мл (фиолетовый колпачок), 0,5 мл
(оранжевый колпачок), 1 мл (красный колпачок), 2 мл (зеленый колпачок), 3,0 мл
(темно-синий колпачок). Пипетки упаковывают по 1 штуке в трехслойные
пакетики из алюминиевой фольги, которые помещают вместе с инструкцией по
применению в картонные коробки. Цвет коробки и колпачков пипеток в этой
коробке одинаковы.

5. Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых
солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, вдали от
нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0 °С до 25 °С.
Хранить пипетки в оригинальной упаковке до использования.

6. Хранить в недоступном для детей месте.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускают без рецепта.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Селафорт® относится к противопаразитарным лекарственным препаратам группы макроциклических лактонов.

10. Действующее вещество препарата - селамектин обладает широким спектром системного нематодоцидного, инсектицидного и акарицидного действия, активен против нематод, насекомых и саркоптоидных клещей, паразитирующих у собак и кошек; обладая ларвицидными и овоцидными свойствами, прерывает цикл развития насекомых.

Фармакокинетические свойства препарата обеспечивают хорошее всасывание селамектина с места нанесения, длительное поддержание терапевтических концентраций в органах и тканях животного, что обеспечивает уничтожение паразитов и защиту животных от реинвазии в течение месяца. Механизм действия селамектина заключается в его способности связываться с рецепторами клеток (мышечной и нервной ткани) паразитов, повышать проницаемость мембран для ионов хлора, что вызывает блокаду проводимости нервных и мышечных клеток у нематод, насекомых, клещей и приводит к параличу и гибели паразитов. Учитывая, что у млекопитающих рецепторы, чувствительные к селамектину, локализованы только в центральной нервной системе, а селамектин не проникает через гематоэнцефалический барьер, отравление собак и кошек маловероятно.

Селафорт® по степени воздействия на организм относится к мало опасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не обладает местно-раздражающим, резорбтивно-токсическим и сенсibiliзирующим действием, хорошо переносится кошками и собаками разных пород, включая колли и родственные породы собак. Препарат токсичен для пчел, а также для рыб и других гидробионтов.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Селафорт® назначают собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при энтомозах, вызванных блохами, вшами и власоедами, отодектозе, саркоптозе, демодекозе, нотоэдрозе, анкилостомозе и токсокарозе, а также для профилактики дирофиляриоза.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том

числе и в анамнезе). Селафорт® не следует наносить на влажную и/или поврежденную кожу.

13. При работе с препаратом Селафорт® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

Не следует подпускать животное к маленьким детям, а также гладить место обработки в течение 2 часов после нанесения препарата.

При случайном попадании лекарственного препарата на кожу и слизистые оболочки его следует тотчас удалить тампоном и затем смыть большим количеством проточной воды.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Селафорт®. В случае проявления аллергической реакции или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

14. Беременным и лактирующим самкам при необходимости Селафорт® применяют после консультации с ветеринарным врачом. Селафорт® не следует применять щенкам и котятм моложе 6-недельного возраста.

15. Селафорт® применяют собакам и кошкам путем однократного нанесения на сухую неповрежденную кожу, используя пипетки различной фасовки. Перед применением препарата пипетку вынимают из пакета, кончик пипетки прокалывают перевернутым колпачком и, раздвинув шерсть между лопатками у основания шеи, выдавливают содержимое пипетки непосредственно на кожу животного. Дозу препарата (объем пипетки) выбирают, учитывая вид и массу животного:

	Цвет колпачка пипетки	Селамектин (мг)	Концентрация (мг/мл)	Объем пипетки (мл)
Кошки (кг)				
≤2,5	розовый	15	60	0,25
2,6-7,5	бирюзовый	45	60	0,75
7,6-10,0	серо-коричневый	60	60	1,0
>10	/	комбинация пипеток подходящего объема*	/	комбинация пипеток подходящего объема*
Собаки (кг)				
≤2,5	розовый	15	60	0,25
2,6-5,0	фиолетовый	30	120	0,25

5,1-10,0	оранжевый	60	120	0,5
10,1-20,0	красный	120	120	1,0
20,1-40,0	зеленый	240	120	2,0
40,1-60,0	темно-синий	360	120	3,0
>60	/	комбинация пипеток подходящего объема**	/	комбинация пипеток подходящего объема**

* например, для кошки массой от 10,1 до 12,5 кг применяют одновременно 2 пипетки с 6% раствором: одну с розовым (0,25 мл) и одну с серо-коричневым (1,0 мл) колпачками.

** например, для собак массой от 60,1 до 70 кг применяют одновременно 2 пипетки с 12 % раствором: одну с фиолетовым (0,25 мл) и одну с темно-синим (3,0 мл) колпачками.

Для уничтожения блох (*Ctenocephalides spp.*) Селафорт® применяют собакам и кошкам однократно, для предупреждения повторной инвазии - один раз в месяц на протяжении всего сезона наибольшей активности насекомых.

Для профилактики дирофиляриоза в регионах, где регистрируют *Dirofilaria immitis*, Селафорт® применяют животным ежемесячно, начиная за месяц до начала лета переносчиков возбудителя - комаров и москитов, и заканчивают не ранее, чем через месяц после завершения их лета. Селафорт® не уничтожает половозрелых *D. immitis*, но снижает количество циркулирующих микрофилярий и личинок дирофилярий, и может применяться даже инвазированным животным.

При замене химиотерапевтических средств в программе профилактики дирофиляриоза, интервал между применением препарата Селафорт® и ранее используемым лекарственным средством должен составить не менее одного месяца.

Для лечения собак и кошек при отодектозе (ушной чесотке), вызванном *O. cynotis*, Селафорт® применяют однократно. В период лечения рекомендуется проводить очистку слухового прохода от экссудата и струпуев, а в случаях осложнения отодектоза бактериальным отитом назначать противомикробные и противовоспалительные средства. При необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц.

Для лечения собак при саркоптозе, вызванном *Sarcoptes scabiei var. canis*, нотоэдрозе кошек, вызванном *Notoedres cati*, демодекозе собак, вызванном *Demodex canis*, Селафорт® применяют двукратно с интервалом 1 месяц; в целях профилактики возможной инвазии препарат рекомендуется применять 1 раз в месяц.

Для дегельминтизации собак и кошек при токсокарозе, вызванном *Toxocara cati*, *Toxocara canis*, анкилостомозе, вызванном *Ancylostoma tubaeformae*, препарат применяют с лечебной целью однократно, с целью профилактики - ежемесячно.

Время, необходимое для полного всасывания препарата Селафорт®, составляет около тридцати минут. По истечении двух часов в случае необходимости животное можно мыть даже с применением шампуня, эффективность лекарственного препарата при этом не снижается.

16. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. В редких случаях у кошек в месте нанесения препарата возможно появление алопеции, которая обычно довольно быстро исчезает без применения лечебных средств.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством, животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

18. Селафорт® не следует применять одновременно с другими противопаразитарными препаратами группы макроциклических лактонов в связи с возможным взаимным усилением их токсичности.

19. Особенности действия при первом применении и отмене препарата не выявлено.

20. При обработке животных следует придерживаться рекомендуемых инструкцией интервалов. В случае пропуска очередной обработки применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе по той же схеме.

21. Селафорт® не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного препарата
для ветеринарного применения

Держатель РУ/Выпускающий
контроль качества:
АО «КРКА, д.д., Ново место»,
Шмарьешка цеста 6,
8501 Ново место, Словения

Производитель:
АО «КРКА, д.д., Ново место»,
Повхова улица 5,
8000 Ново место, Словения

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата
для ветеринарного применения на
принятие претензий от потребителя.

ООО «КРКА-РУС»,
125212, г. Москва, Головинское
шоссе, дом 5, корпус 1
тел.: +7 (495) 981-10-95
факс: +7 (495) 981-10-91

Представитель АО «КРКА, д.д., Ново место»



Н.А. Дехтярева