

1

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

14.07.2025

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Марфлоксин® таблетки

(организация-разработчик: АО «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6,  
8501 Ново место, Словения / «KRKA, d.d., Novo mesto»,  
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia)

Номер регистрационного удостоверения: 705-3-10.19-4505№ПВИ-3-4.14/04275

**I. Общие сведения**

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Марфлоксин® таблетки (Marfloxin® tablets).

Международное непатентованное наименование: марбофлоксацин.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Марфлоксин® таблетки выпускают массой 70 мг, 280 мг и 1120 мг. В качестве действующего вещества в одной таблетке содержится марбофлоксацин 5 мг, 20 мг или 80 мг, соответственно, и вспомогательные вещества: моногидрат лактозы, повидон, кросповидон, стеарат магния, мясной ароматизатор, гидрогенизированное касторовое масло, дрожжевой порошок, кремний коллоидный безводный.

3. Марфлоксин® таблетки в дозировке 5 мг и 20 мг представляет собой круглые, двояковыпуклые, мраморные таблетки светло-коричневато-желтого цвета, со скошенными краями, с возможными темными и белыми вкраплениями, с риской на одной стороне. Марфлоксин® таблетки в дозировке 80 мг представляет собой капсуловидные, двояковыпуклые, мраморные таблетки светло-коричневато-желтого цвета, с возможными темными и белыми вкраплениями, с риской на обеих сторонах. Таблетки можно разделить на половинки.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства.

Не применять по истечении срока годности.

4. Марфлоксин® таблетки выпускают расфасованными в блистеры по 6 таблеток (для дозировки 80 мг/табл.) или по 10 таблеток (для дозировок 5 мг/табл. и 20 мг/табл.). Блистеры упаковывают поштучно (дозировки 5 мг/табл. и 20 мг/табл.) или по 2 штуки (дозировка 80 мг/табл.) в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранить в упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускают по рецепту.

## II. Фармакологические свойства

9. Марфлоксин<sup>®</sup> таблетки относится к антибактериальным препаратам группы фторхинолонов.

10. Препарат обладает широким спектром бактерицидного действия, основанного на подавлении бактериальных ферментов ДНК-гиразы и топоизомеразы IV, участвующих в репликации ДНК микроорганизмов.

Марбофлоксацин – действующее вещество лекарственного препарата Марфлоксин<sup>®</sup> таблетки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т.ч. *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium*, *Citrobacter freundii*, *Enterobacter cloacae*, *Serratia marcescens*, *Morganella morganii*, *Proteus spp*, *Klebsiella spp*, *Shigella spp*, *Pasteurella spp*, *Haemophilus spp*, *Moraxella spp*, *Pseudomonas spp*, *Brucella canis*, *Staphylococci*, *Streptococci*, а также *Mycoplasma spp*.

После перорального введения препарата марбофлоксацин хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает во все органы и ткани организма. Биодоступность марбофлоксацина после перорального введения составляет почти 100%. Максимальная концентрация в крови достигается через 2 часа, период полувыведения составляет у собак 14 часов, у кошек 10 часов. Выделяется марбофлоксацин из организма животных в основном в неизмененном виде с мочой и желчью.

Марфлоксин<sup>®</sup> таблетки по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. Марфлоксин<sup>®</sup> таблетки применяют для лечения собак и кошек при заболеваниях органов дыхания, мочеполовой системы, инфекций кожи, мягких тканей, инфицированных ран и других заболеваний бактериальной и микоплазменной этиологии, возбудители которых чувствительны к марбофлоксацину.

12. Противопоказанием к применению препарата Марфлоксин<sup>®</sup> таблетки является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата. Запрещается применять препарат животным при существенных нарушениях развития хрящевой ткани, при поражениях нервной системы, сопровождающихся судорогами, при выделении у животного микроорганизмов, устойчивых к фторхинолонам.

13. При работе с лекарственным препаратом Марфлоксин® таблетки необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людам с гиперчувствительностью к фторхинолонам следует избегать прямого контакта с препаратом. Пустую упаковку из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо тотчас смыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Запрещается применять Марфлоксин® таблетки беременным и лактирующим самкам, а также котят моложе 4 месяцев, щенкам моложе 12 месяцев (щенкам крупных пород – моложе 18 месяцев).

15. Лекарственный препарат применяют животным один раз в сутки, индивидуально в раздробленном виде с кормом или вводят принудительно на корень языка в суточной дозе 2 мг марбофлоксацина на 1 кг массы животного.

Продолжительность лечения собак составляет от 7 до 14 дней, кошек – от 3 до 10 дней, в зависимости от течения заболевания.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможно учащение дефекации и размягчение стула, указанные симптомы самопроизвольно исчезают и не требуют отмены препарата.

В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические препараты.

17. При передозировке у животных могут наблюдаться нарушения деятельности нервной системы. Лечение симптоматическое.

18. Не рекомендуется применять Марфлоксин® таблетки одновременно с катионными препаратами (препаратами железа, кальция, магния, алюминия) из-за возможного уменьшения всасывания в желудочно-кишечном тракте, а также с хлорамфениколом, макролидными антибиотиками и тетрациклином.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Марфлоксин® таблетки не предназначен для лечения продуктивных животных.

Наименования и адреса  
производственных площадок  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения\*

Держатель РУ/Выпускающий  
контроль качества:  
АО «КРКА, д.д., Ново место»,  
Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место,  
Словения

Производитель:  
«КРКА-ФАРМА д.о.о.», В. Хольевца  
20/Е, 10450 г. Ястребарско, Хорватия

или

Держатель РУ:  
АО «КРКА, д.д., Ново место»,  
Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место,  
Словения

Производитель:  
«КРКА-ФАРМА д.о.о.», В. Хольевца  
20/Е, 10450 г. Ястребарско, Хорватия

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем или  
владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения на принятие претензий  
от потребителя

ООО «КРКА-РУС»,  
125212, г. Москва, Головинское шоссе,  
дом 5, корпус 1  
тел.: + 7 (495) 981-10-95  
факс: + 7 (495) 981-10-91

\* фактические производственные площадки указаны на вторичной упаковке

Представитель АО «КРКА, д.д., Ново место»



М.С. Иванова