

1

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

---

22.09.2025

---

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата

**РЕПАРИН-ХЕЛПЕР®**

(организация-разработчик ООО «Т-Хелпер Клеточные Технологии»,  
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, к. 11, стр. 1)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-2.22-4861 №ПВР-3-16.16/03315

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: Репарин-Хелпер®

международное непатентованное наименование: не присвоено.

2. Лекарственная форма: раствор для местного и наружного применения.

Репарин-Хелпер® содержит в качестве действующего вещества комплекс белков, продуцируемый мезенхимальными стромальными клетками D-SCR05 с общим содержанием белка  $0,5 \pm 0,05$  мг/мл и содержанием цитокинов VEGF и GRO-KC не менее 100 пг/мл, а в качестве вспомогательных веществ: бензалкония хлорид и воду очищенную.

3. По внешнему виду Репарин-Хелпер® представляет собой жидкость без запаха от желтоватого до розоватого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 18 месяцев с даты производства. После первого вскрытия препарат должен быть использован в течение 15 суток.

Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

4. Репарин-Хелпер® выпускается расфасованным в полимерные флаконы с насадками-распылителями по 10, 20 или 50 мл, с насадками-капельницами по 5, 10 или 20 мл.

Флаконы с препаратом помещают в индивидуальную потребительскую упаковку из картона и снабжают инструкцией по применению.

1

5. Репарин-Хелпер® следует хранить в защищенном от света месте при температуре от 2°C до 8°C. Допускается транспортировка в течение 14 суток при температуре до 25°C.

6. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## **II. Фармакологические (биологические) свойства**

9. Репарин-Хелпер® относится к группе регенеранты и репаратанты.

10. Действующее вещество лекарственного препарата Репарин-Хелпер® представляет собой комплекс регуляторных белков, включающий в себя цитокины, продуцируемые мезенхимальными клетками. Препарат не содержит клеток.

При нанесении на поврежденные участки кожи, мышечную ткань, серозные и слизистые оболочки животных, Репарин-Хелпер® стимулирует регенерацию, регулирует воспалительную реакцию и оказывает иммуномодулирующее действие.

Репарин-Хелпер® по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Репарин-Хелпер® не обладает мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным, местно-раздражающим, сенсибилизирующим действием или кумулятивным эффектом.

## **III. Порядок применения**

11. Репарин-Хелпер® применяют собакам и кошкам, а также крупному рогатому скоту, лошадям и свиньям наружно или местно для стимулирования регенерации при лечении повреждений и воспалительных процессов кожи, серозных и слизистых оболочек различной этиологии, включая:

- заболевания глаз (в том числе кератит, конъюнктивит, увеит);
- заболевания полости рта и носа (в том числе стоматит, гингивит, пародонтит, ринит, синусит);
- раны, ожоги, язвы, укусы, раздражения, трещины, обморожения, пролежни;
- послеоперационные хирургические раны.

Применение Репарин-Хелпер® повышает эффективность и сокращает сроки лечения, а также предотвращает развитие осложнений.

12. Противопоказанием к применению Репарин-Хелпер® является повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

13. Специальных мер предосторожности при применении препарата не требуется. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Репарин-Хелпер® следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления

2

аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Отсутствуют ограничения в применении для беременных животных, животных в период лактации и потомства животных.

15. Для достижения эффекта необходимо обеспечить контакт между препаратом и пораженной тканью. Перед применением препарата Репарин-Хелпер® рекомендуется очистить область повреждения, так как струп, гной, раневой экссудат, омертвевшие ткани могут препятствовать проникновению препарата.

Доза препарата зависит от вида животного и площади пораженной поверхности.

### Рекомендации по применению

<b>Лечение заболеваний глаз</b>	Репарин-Хелпер® закапывают в пораженный глаз по 1-4 капли (в зависимости от вида животного), 3-4 раза в сутки в течение 3-14 дней до клинического выздоровления животного.
<b>Лечение заболеваний полости рта и/или носа</b>	Репарин-Хелпер® наносят на поврежденные дёсны или закапывают в нос 1-3 раза в сутки по 3-6 капель или путем 1-3 кратного нажатия на распылительную головку (орошения) в течение 3-14 дней.  Для лечения стоматита, гингивита или пародонтита препаратом Репарин-Хелпер® орошают пораженные дёсны 1-3 раза в сутки по 5-20 капель или путем 3-10 кратного нажатия на распылительную головку в течение 7-30 дней.
<b>Лечение повреждений кожи и ран различной этиологии</b>	Репарин-Хелпер® применяют 2-4 раза в сутки в течение 3-14 дней. Рекомендуется 0,15-0,3 мл (3-6 капель / 1-3 кратное нажатие на распылительную головку) на каждые 1-2 см <sup>2</sup> пораженной поверхности.  Репарин-Хелпер® также применяют в виде наложения стерильной салфетки, смоченной препаратом.  При абсцессах, флегмонах, свищах препарат вводят с помощью дренажа.

16. Побочных явлений, осложнений или аллергических реакций при применении препарата Репарин-Хелпер® в соответствии с настоящей инструкцией не отмечено. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости проводят десенсибилизирующую терапию.

17. Симптомы передозировки при применении препарата Репарин-Хелпер® не выявлены.

18. Репарин-Хелпер® можно применять в качестве регенерирующего компонента совместно с другими лекарственными препаратами, в том числе с антибиотиками. Не рекомендуется использовать Репарин-Хелпер® одновременно с антисептиками, так как это может привести к денатурации белков препарата. Интервал между применением антисептика и препарата Репарин-Хелпер® должен составлять не менее 5 минут.

19. Особенности действия при первом применении препарата или при его отмене не установлено.

20. Рекомендуется избегать пропусков в курсе лечения лекарственным препаратом Репарин-Хелпер®. При пропуске одной или нескольких доз Репарин-Хелпер® лечение следует возобновить в предусмотренных дозах и схеме применения.

21. Продукцию животноводства в период и после применения препарата Репарин-Хелпер® используют без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «Т-Хелпер Клеточные Технологии»  
105318, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 28.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Т-Хелпер Клеточные Технологии»  
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, к. 11, стр. 1.

Генеральный директор  
ООО «Т-Хелпер Клеточные Технологии»



Довгий А.И.



4