ЛП-№(000603)-(РГ-RU) от 14.05.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9450
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Акримиколь, 20 мг/г, крем для наружного применения

Действующее вещество: сертаконазола нитрат

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Акримиколь, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Акримиколь.

3. Применение препарата Акримиколь.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Акримиколь.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Акримиколь, и для чего его применяют

Препарат Акримиколь содержит действующее вещество сертаконазола нитрат, относящееся к группе «противогрибковые средства, применяемые в дерматологии; противогрибковые средства для местного применения; производные имидазола и триазола».

Показания к применению

Лечение поверхностных микозов (грибковое инфекционное заболевание) кожи: дерматомикозов (грибковое заболевание кожи), *Tinea pedis* («стопа атлета»), *Tinea cruris* (дерматомикоз паховый), *Tinea corporis (микоз гладкой кожи)*, *Tinea barbae* (микоз бороды), *Tinea manus* (дерматофития кистей), кандидоз *(Monolisiasis)*, а также *Pityriasis versicolor (Pityrosporum orbiculare)* (отрубевидный (разноцветный лишай).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 14 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Акримиколь

Противопоказания

Не применяйте препарат Акримиколь:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9450
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

- если у Вас аллергия на сертаконазол или другие противогрибковые средства (производные имидазола) или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Акримиколь проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат Акримиколь не применяют для лечения грибковых заболеваний глаз. Избегайте попадания крема в глаза!

При использовании препарата Акримиколь не рекомендуется применение кислотных моющих средств (в кислой среде усиливается размножение грибов типа кандида).

Дети и подростки

Данных о применении препарата у детей нет.

Другие препараты и препарат Акримиколь

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Если у Вас наступила беременность на фоне применения препарата Акримиколь, как можно быстрее сообщите об этом лечащему врачу. Ваш врач оценит соотношение предполагаемой пользы для Вас с потенциальным риском для плода.

Если Вы кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом о возможности продолжения грудного вскармливания при использовании препарата Акримиколь. В период кормления грудью крем нельзя наносить на молочные железы.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Акримиколь не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Акримиколь содержит метилпарагидроксибензоат (Е218)

Метилпарагидроксибензоат (Е218) может вызывать аллергические реакции (возможно, отсроченные).

Препарат Акримиколь содержит сорбиновую кислоту

Препарат содержит сорбиновую кислоту, которая может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

3. Применение препарата Акримиколь

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Наносите крем на пораженные участки кожи равномерным тонким слоем дважды в день (утром и вечером), захватывая примерно 1 см поверхности здоровой кожи.

Путь и (или) способ введения

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9450
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Наружно.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения зависит от вида (этиологии) возбудителя и локализации инфекции. Как правило, симптомы заболевания исчезают через 2–4 недели. Рекомендуемая длительность лечения – 4 недели.

Если Вы применили препарата Акримиколь больше, чем следовало

Учитывая наружный способ применения, передозировка препаратом Акримиколь маловероятна.

При случайном приеме препарата внутрь обратитесь к врачу.

Если Вы забыли применить препарат Акримиколь

Не наносите двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Если Вы прекратили применение препарата Акримиколь

Не прекращайте применение препарата, даже если Вы чувствуете себя лучше, без консультации с врачом. Для предотвращения рецидива требуется полное устранение инфекции.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Нежелательные реакции, которые наблюдались при применении препарата:

- контактный дерматит (воспаление кожи, вызванное непосредственным контактом с раздражающими веществами),

- покраснение кожи (эритематозные реакции).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь»

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9450
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Адрес: 220037, Минск, Товарищеский пер. 2а

Телефон/факс: +375 (17) 242 00 29

Электронная почта: rceth@rceth.by

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.rceth.by

5. Хранение препарата Акримиколь

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и тубе.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Акримиколь содержит

Действующим веществом является сертаконазола нитрат.

Каждый грамм крема содержит 20 мг сертаконазола нитрата.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: глицерил моноизостеарат, парафин жидкий, этиленгликоль и полиэтиленгликоль пальмитостеарат, полигликозированные насыщенные глицериды, метилпарагидроксибензоат (Е218), сорбиновая кислота, вода очищенная.

Препарат Акримиколь содержит метилпарагидроксибензоат (Е218), сорбиновую кислоту (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Акримиколь и содержимое упаковки

Крем для наружного применения.

Крем от белого до белого с желтоватым или сероватым оттенком цвета, допускается наличие слабого специфического запаха.

По 15 или 30 г в тубу алюминиевую с бушоном из полимерных материалов.

Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9450
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0010)

Производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация, Республика Беларусь

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03 (Российская Федерация), +375 29 895 15 88 (Республика Беларусь)

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru, adversereaction@drugsafety.ru

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.