ЛП-№(006143)-(РГ-RU) от 25.09.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.06.2026 № 11364
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Клиндовит, 1 %, гель для наружного применения

Действующее вещество: клиндамицин.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат, является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Клиндовит, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Клиндовит.

3. Применение препарата Клиндовит.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Клиндовит.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Клиндовит, и для чего его применяют

Препарат Клиндовит представляет собой гель для наружного применения, который содержит действующее вещество антибиотик клиндамицин. Клиндовит относится к группе препаратов для лечения угревой сыпи; препаратам для лечения угревой сыпи для наружного применения; противомикробным средствам для лечения угревой сыпи.

Показания к применению

Препарат Клиндовит применяется у взрослых и подростков в возрасте от 12 до 18 лет для лечения вульгарных угрей.

Способ действия препарата Клиндовит

Действие препарата Клиндовит обусловлено действующим веществом клиндамицин. Клиндамицин является антибиотиком, который останавливает размножение бактерий, приводящих к воспалению при акне. В высоких концентрациях он может вызывать гибель некоторых бактерий. Кроме того, клиндамицин оказывает противовоспалительное действие и способствует снижению образования мелких бугорков белого или черного цвета (комедонов).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.06.2026 № 11364
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

2. О чем следует знать перед применением препарата Клиндовит

Противопоказания

Не применяйте препарат Клиндовит:

- если у Вас аллергия на клиндамицин или линкомицин, или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас имеется поражение кишечника, обычно вызванное длительным приемом антибиотиков (псевдомембранозный колит).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Клиндовит проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При применении избегайте контакта препарата с глазами и полостью рта. После нанесения геля тщательно вымойте руки. При случайном попадании препарата в глаза, ссадины или на слизистые оболочки необходимо промыть их большим количеством холодной воды.

В случае возникновения выраженной или продолжительной диареи необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу. При возникновении диареи в течение нескольких недель после завершения использования препарата, необходимо также обратиться к врачу.

В случае возникновения диареи не используйте препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта (например, дифеноксилат с атропином), в связи с тем, что они могут ухудшить течение данного осложнения.

Дети

Не применяйте препарат у детей в возрасте от 0 до 12 лет, поскольку эффективность и безопасность в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Клиндовит

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Не применяйте препарат Клиндовит вместе с препаратами линкомицина (антибиотик), поскольку это антибиотики одной группы и существует перекрестная устойчивость (резистентность) микроорганизмов между клиндамицином и линкомицином.

Не применяйте препарат Клиндовит вместе с препаратами эритромицина (антибиотик), поскольку их совместное применение может повлиять на эффективность данных препаратов.

Применяйте препарат Клиндовит вместе с миорелаксантами с осторожностью (средства для расслабления скелетных мышц), поскольку их совместное применение может усиливать действие миорелаксантов.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

<u>Беременность</u>

В клинических исследованиях при системном введении препарата женщинам в период второго и третьего триместра беременности не отмечали увеличения частоты врожденных аномалий плода. Исследований применения препарата у женщин в период первого триместра беременности не проводили. Препарат следует применять при беременности только в том случае, если ожидаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.06.2026 № 11364
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

Грудное вскармливание

Неизвестно, выделяется ли клиндамицин в грудное молоко после наружного применения. Клиндамицин обнаружен в грудном молоке в концентрации <0,5–3,8 мкг/мл после системного применения.

Клиндамицин обладает потенциальной способностью вызывать нежелательное влияние на микрофлору желудочно-кишечного тракта у младенцев, находящихся на грудном вскармливании, что проявляется развитием таких нежелательных реакций как диарея, кровь в кале, либо сыпь. Если кормящей матери требуется применение клиндамицина, это не является причиной для прекращения грудного вскармливания, но можно отдать предпочтение альтернативному лекарственному препарату. Следует учитывать пользу грудного вскармливания для развития и здоровья ребенка, а также клиническую необходимость применения клиндамицина у матери и любые потенциальные нежелательные эффекты, связанные с клиндамицином или основным заболеванием матери, для ребенка, находящегося на грудном вскармливании.

Фертильность

В исследованиях на животных при введении клиндамицина подкожно или внутрь ухудшения фертильности, а также каких-либо отрицательных влияний на плод не обнаружено, за исключением случаев приема препарата в дозах, токсичных для матери. Результаты исследований на животных не всегда можно экстраполировать на человека.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Нет оснований полагать, что применение препарата Клиндовит может оказывать влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Клиндовит содержит метилпарагидроксибензоат

Метилпарагидроксибензоат может вызывать аллергические реакции (возможно, отсроченные).

Препарат Клиндовит содержит пропиленгликоль

Данный лекарственный препарат содержит 100 мг пропиленгликоля в каждом грамме геля. Пропиленгликоль может вызывать раздражение кожи.

3. Применение препарата Клиндовит

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Наносите гель 2 раза в сутки. Наружно. Тонкий слой геля нанесите на пораженную область чистой сухой кожи. Для получения удовлетворительных результатов лечение следует продолжать в течение 6–8 недель, а при необходимости можно продолжить до 6 месяцев. Продолжительность лечения определит Ваш лечащий врач.

Применение у детей и подростков

Режим дозирования препарата Клиндовит для подростков в возрасте от 12 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.06.2026 № 11364
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

Прекратите применение препарата Клиндовит **и немедленно обратитесь за медицинской помощью** в случае возникновения одного из следующих симптомов **серьезных нежелательных реакций:**

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- зуд, покраснение кожи с появлением пузырей и волдырей (крапивница).

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- диарея (жидкий стул 3 и более раз в сутки, возможна примесь крови и слизи), боль в животе по типу спазмов, повышение температуры тела – признаки воспаления кишечника вследствие приема антибиотика (псевдомембранозный колит).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Клиндовит:

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- раздражение кожи;
- сухость кожи.

Часто (не более чем у 1 человека из 10):

- нарушение пищеварения;
- воспаление кожи, связанное с повышенной активностью сальных желез (себорея).

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- воспаление волосяной луковицы (фолликулит);
- боль в глазах;
- боль в животе;
- воспаление кожи, вызванное непосредственным контактом с раздражающими веществами (контактный дерматит).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

5. Хранение препарата Клиндовит

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.06.2026 № 11364
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и тубе.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре от 15 до 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Клиндовит содержит

Действующим веществом является клиндамицин.

Каждый грамм геля содержит 10 мг клиндамицина (в виде клиндамицина фосфата).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются метилпарагидроксибензоат (нипагин), аллантоин, пропиленгликоль, макрогол-400 (полиэтиленоксид-400), карбомер сополимер, карбомер интерполимер, натрия гидроксид, вода очищенная.

Препарат Клиндовит содержит метилпарагидроксибензоат, пропиленгликоль (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Клиндовит и содержимое упаковки

Гель для наружного применения.

Бесцветный, почти прозрачный гель со специфическим запахом. Допускается наличие опалесценции.

По 30 г в тубу алюминиевую с бушонами из полимерных материалов. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

За любой информацией о препарате следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 08.06.2026 № 11364
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0008)

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru/ (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC/).