ЛП-№(005389)-(РГ-RU) от 27.10.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.10.2026 № 20073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Глимекомб, 40 мг + 500 мг, таблетки

Действующие вещества: гликлазид + метформин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Глимекомб, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Глимекомб.
3. Прием препарата Глимекомб.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Глимекомб.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Глимекомб, и для чего его применяют

Препарат Глимекомб содержит действующие вещества гликлазид и метформин; относится к группе «средства для лечения сахарного диабета; гипогликемические средства, кроме инсулинов; комбинации пероральных гипогликемических средств».

Показания к применению

Препарат Глимекомб применяется у взрослых в возрасте от 18 лет:

- для лечения сахарного диабета 2 типа при недостаточной эффективности диетотерапии, физических упражнений и предшествующей терапии метформином или гликлазидом;
- для замещения предшествующей терапии двумя препаратами (метформином и гликлазидом) у больных сахарным диабетом 2 типа со стабильным и хорошо контролируемым уровнем глюкозы крови.

Способ действия препарата Глимекомб

Ваш организм использует поступившую с пищей глюкозу для выработки энергии или накапливает ее для будущих потребностей. Если Вы страдаете сахарным диабетом, это означает, что либо поджелудочная железа у Вас производит инсулин в недостаточном количестве, либо Ваш организм не способен надлежащим образом использовать тот инсулин, который она производит. Это приводит к повышению концентрации глюкозы в крови.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.10.2026 № 20073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Гликлазид, входящий в состав препарата Глимекомб, воздействует на поджелудочную железу, стимулируя выработку собственного инсулина. Это помогает организму эффективнее использовать глюкозу из пищи. Гликлазид снижает риск тромбозов мелких сосудов.

Метформин, входящий в состав препарата Глимекомб, способствует снижению содержания глюкозы в крови до уровня, максимально приближенного к норме. Он уменьшает выработку глюкозы в печени, способствует ее использованию тканями организма и уменьшает всасывание глюкозы из пищи. Кроме того, у пациентов с повышенным содержанием жиров (липидов) в крови метформин оказывает благоприятный эффект: снижает концентрацию в крови «плохого» холестерина (общего холестерина, липопротеинов низкой плотности) и триглицеридов (жиров, которые в большом количестве могут приводить к поражению сосудистой стенки, называемому атеросклерозом).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Глимекомб

Противопоказания

Не принимайте препарат Глимекомб:

- если у Вас аллергия на метформин, гликлазид или другие производные сульфонилмочевины, сульфаниламиды или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас сахарный диабет 1 типа (инсулин-зависимый);
- если у Вас выявляются кетоновые тела и сахар (глюкоза) в моче (это может означать, что у Вас диабетический кетоацидоз), диабетическая прекома или кома;
- если у Вас почечная недостаточность или нарушение функции почек (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин);
- если у Вас имеются острые состояния, протекающие с риском развития нарушения функции почек: обезвоживание организма (дегидратация) (при диарее, рвоте), тяжелые инфекционные заболевания, шок (остро развивающееся, угрожающее жизни критическое состояние);
- если у Вас имеются клинически выраженные проявления острых или хронических заболеваний, которые могут приводить к развитию недостатка кислорода в тканях (тканевой гипоксии), в том числе острая сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность с нестабильными показателями гемодинамики (состояние, при котором сердце не может поддерживать стабильное кровообращение), дыхательная недостаточность (состояние, при котором нарушена нормальная работа органов дыхания), острый инфаркт миокарда (сердечный приступ);
- если у Вас печеночная недостаточность (нарушение функции печени);
- если Вы применяете миконазол (препарат для лечения грибковых инфекций);
- если Вам предстоит обширная хирургическая операция или у Вас имеются травмы, когда показано проведение инсулинотерапии;
- если у Вас хронический алкоголизм, острое отравление алкоголем;
- если у Вас имеется или ранее наблюдалось стойкое повышение уровня молочной кислоты в крови (лактатацидоз) (см. подраздел «Особые указания и меры предосторожности» раздела 2 листка-вкладыша);
- если Вам назначено проведение радиоизотопных или рентгенологических исследований с введением контрастного вещества, содержащего йод, исключите прием

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.10.2026 № 20073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

препарата Глимекомб в течение не менее 48 часов до и в течение 48 часов после исследований (см. подраздел «Другие препараты и препарат Глимекомб» раздела 2 листка-вкладыша);

- если Вы соблюдаете низкокалорийную диету (менее 1000 ккал/сутки);
- если Вы беременны или кормите грудью;
- если Вам меньше 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Глимекомб проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Вам следует соблюдать режим лечения, назначенный врачом, чтобы достичь соответствующего уровня сахара (глюкозы) в крови. Это означает, что помимо регулярного приема препарата Глимекомб необходимо соблюдать режим питания, выполнять физические упражнения и, при необходимости, снижать вес.

Если что-то из нижеперечисленного относится к Вам, сообщите лечащему врачу до начала приема препарата Глимекомб, так как в этих случаях лекарственный препарат следует принимать с осторожностью:

- Вы относитесь к пациентам пожилого возраста;
- Вы не соблюдаете режим питания (нерегулярное и/или несбалансированное питание);
- у Вас есть дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (наследственный дефицит фермента, вследствие которого эритроциты могут легче разрушаться);
- у Вас имеются тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;
- у Вас гипотиреоз — состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов, что может вызвать усталость или увеличение веса (снижение функции щитовидной железы);
- у Вас отмечается гипофизарная и/или надпочечниковая недостаточность — состояние, при котором гипофиз и/или надпочечники не вырабатывают достаточное количество гормонов;
- у Вас почечная недостаточность легкой или средней степени;
- Вы длительно получаете лечение глюкокортикостероидными препаратами (гормональные противовоспалительные препараты).

Гипогликемия

В первые несколько недель лечения может быть повышен риск избыточного снижения уровня сахара (глюкозы) в крови (гипогликемии). Поэтому необходимо особенно тщательное медицинское наблюдение.

Гипогликемия может возникнуть:

- если Вы питаетесь нерегулярно, пропускаете прием пищи, голодаете или изменяете режим питания;
- если Вы недоедаете;
- если Ваша пища содержит недостаточно углеводов;
- если Вы увеличиваете физическую активность, но при этом не увеличиваете пропорционально потребление углеводов;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.10.2026 № 20073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- если Вы употребляете алкоголь, особенно в сочетании с пропущенными приемами пищи;
- если Вы приняли слишком большую дозу препарата Глимекомб;
- если у Вас имеются определенные гормональные нарушения (нарушения функции щитовидной железы, гипофиза или коры надпочечников);
- если у Вас имеется значительное снижение функции почек или печени;
- если Вы принимаете одновременно другие препараты или средства природного происхождения (смотрите подраздел «Другие препараты и препарат Глимекомб»).

При гипогликемии могут наблюдаться следующие симптомы: головная боль, ощущение сильного голода, тошнота, рвота, повышенная утомляемость, нарушение сна, возбуждение, агрессивность, снижение концентрации внимания, замедленная реакция, депрессия, спутанность сознания, нарушение зрения и речи, дрожь в руках или других частях тела (тремор), слабость или ограничение движений в отдельных мышцах (парез), нарушения чувствительности (сенсорные расстройства), головокружение и ощущение беспомощности.

К другим признакам гипогликемии относятся повышенное потоотделение, «липкая» кожа, тревожность, быстрое или нерегулярное сердцебиение, повышение артериального давления, внезапная сильная боль в груди, которая может распространяться на соседние части тела (стенокардия).

Если уровень глюкозы в крови продолжает падать, могут возникнуть спутанность сознания, бред, судороги, потеря самоконтроля, поверхностное дыхание, замедленное сердцебиение, сонливость и потеря сознания с возможным развитием комы.

В большинстве случаев симптомы гипогликемии исчезают очень быстро после приема сахара (глюкозы) в какой-либо форме (например, в виде таблеток глюкозы, кусочков сахара, сладкого сока или подслащенного чая).

Поэтому всегда имейте при себе таблетки глюкозы или кусочки сахара. Заменители сахара при гипогликемии неэффективны. Если прием сахара не помогает или симптомы повторяются, обратитесь к лечащему врачу или за неотложной медицинской помощью.

В ряде случаев симптомы, связанные с низким уровнем сахара (глюкозы) в крови, могут отсутствовать, быть менее очевидными или развиваться очень медленно, или Вы можете не понять вовремя, что уровень сахара (глюкозы) в крови упал.

Расскажите членам Вашей семьи о признаках снижения уровня глюкозы в крови и о том, какие меры необходимо принять при их возникновении.

В некоторых случаях снижение уровня глюкозы в крови может быть тяжелым и продолжительным и потребовать госпитализации и введения раствора глюкозы в вену в течение нескольких дней.

При нарушении функции печени или тяжелом нарушении функции почек снижение уровня глюкозы в крови может быть продолжительным. В таком случае необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Недостаточный контроль уровня глюкозы в крови

Уровень глюкозы в крови может повыситься, если препарат Глимекомб действует недостаточно эффективно или Вы не соблюдаете назначенный режим лечения. После продолжительного периода лечения эффективность препарата Глимекомб может снизиться. Это также возможно при применении некоторых лекарственных препаратов, например, препаратов зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum*) (см. подраздел «Другие препараты и препарат Глимекомб»), при лихорадке, травмах, инфекционных заболеваниях или

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.10.2026 № 20073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

хирургических вмешательствах. В таких случаях Ваш лечащий врач может временно перевести Вас на инсулинотерапию.

Симптомы повышенного уровня сахара (глюкозы) в крови (гипергликемии) могут включать жажду, частое мочеиспускание, сухость во рту, сухую зудящую кожу, кожные инфекции и снижение работоспособности. При возникновении данных симптомов обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Изменения уровня глюкозы в крови (пониженный или повышенный уровень сахара в крови) могут возникать при совместном применении препарата Глимекомб и антибиотиков из группы фторхинолонов, особенно у пациентов пожилого возраста. В таких случаях необходимо тщательно контролировать уровень глюкозы в крови.

Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

У пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (наследственный дефицит фермента, при котором эритроциты могут легче разрушаться) при применении гликлазида возможно снижение уровня гемоглобина и разрушение эритроцитов (гемолитическая анемия). Обратитесь к лечащему врачу до применения препарата Глимекомб.

Порфирия

Были описаны случаи обострения порфирии при применении ряда других препаратов сульфонилмочевины у пациентов с порфирией (наследственное заболевание, при котором организм не может правильно производить гем — важный компонент гемоглобина, который переносит кислород в крови).

Лактатацидоз

Прием метформина, который входит в состав препарата Глимекомб, может вызывать очень редкую, но очень серьезную нежелательную реакцию, связанную с повышением уровня молочной кислоты в крови, называемую лактатацидозом, в особенности у лиц с нарушением функции почек. Риск развития лактатацидоза также повышен у лиц с недостаточно контролируемым сахарным диабетом, кетозом, при серьезных инфекционных заболеваниях, длительном голодании, чрезмерном употреблении алкоголя, обезвоживании, заболеваниях печени, а также при любых состояниях, при которых часть организма недостаточно снабжается кислородом, и при одновременном применении лекарственных препаратов, которые могут вызывать лактатацидоз (см. подраздел «Другие препараты и препарат Глимекомб»).

Пациентам, принимающим препарат Глимекомб, следует с осторожностью применять препараты, которые могут существенно ухудшить функцию почек (такие как гипотензивные препараты, диуретики и нестероидные противовоспалительные препараты).

Прекратите прием препарата Глимекомб на непродолжительное время при наличии состояний, которые могут быть связаны с обезвоживанием (значительные потери жидкости организмом), — таких как тяжелая рвота, понос, лихорадка или если Вы потребляете меньше жидкости, чем обычно. Обратитесь за консультацией к врачу.

Прекратите прием препарата Глимекомб и немедленно обратитесь к врачу или в ближайшую больницу при появлении симптомов лактатацидоза, так как это состояние может привести к коме. К симптомам лактатацидоза относятся:

- боль в животе;
- мышечные судороги;
- нарушение общего самочувствия, сопровождающееся сильной усталостью;
- затрудненное дыхание;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.10.2026 № 20073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- снижение температуры тела.

При лактатацидозе требуется неотложная медицинская помощь в условиях стационара.

Митохондриальные заболевания

Если у Вас выявлено митохондриальное заболевание, такое как митохондриальная энцефалопатия с лактатацидозом и инсультоподобными эпизодами (MELAS-синдром) или наследственный диабет и глухота по материнской линии (MIDD), применение метформина, входящего в состав препарата Глимекомб, не рекомендуется из-за риска обострения лактатацидоза и неврологических осложнений, которые могут привести к ухудшению течения заболевания.

Если после приема препарата Глимекомб у Вас появились признаки и симптомы, указывающие на MELAS-синдром или MIDD, немедленно прекратите прием препарата Глимекомб и как можно скорее обратитесь к врачу для проведения обследования.

Функция почек

Если врач установит, что у Вас возникло состояние, которое может ухудшить функцию почек, он порекомендует временно прекратить прием препарата Глимекомб.

Функция сердца

Если у Вас имеется сердечная недостаточность, то риск развития гипоксии и почечной недостаточности у Вас более высокий. В случае подтверждения у Вас хронической сердечной недостаточности врач должен регулярно проводить проверку сердечной функции и функции почек во время приема препарата Глимекомб.

Прием препарата Глимекомб при острой сердечной недостаточности или хронической сердечной недостаточности с нестабильными показателями гемодинамики (когда сердце не может поддерживать стабильное кровообращение) противопоказан.

Применение йодсодержащих контрастных веществ

Внутрисосудистое введение йодсодержащих рентгеноконтрастных средств может привести к развитию почечной недостаточности, которая в свою очередь приводит к накоплению метформина и повышению риска развития лактатацидоза. Прием препарата Глимекомб необходимо отменить в зависимости от функции почек за 48 часов до или во время рентгенологического исследования и не возобновлять прием в течение 48 часов после него, при условии, что в ходе обследования функция почек была признана нормальной.

Хирургические операции

Если Вам предстоит хирургическая операция под общей, спинальной или эпидуральной анестезией, то применение препарата Глимекомб должно быть прекращено во время проведения такой операции. Прием препарата Глимекомб можно продолжить не ранее, чем через 48 часов после хирургической операции или возобновления приема пищи при условии, что функция почек была повторно обследована и признана стабильной.

Другие меры предосторожности

Вам рекомендуется продолжать соблюдать диету с равномерным потреблением углеводов в течение дня. Если у Вас избыточная масса тела, Вам рекомендуется продолжать соблюдать низкокалорийную диету.

Метформин, входящий в состав препарата Глимекомб, может снижать уровень витамина B12 в крови. Риск снижения уровня витамина B12 возрастает при увеличении дозы метформина, продолжительности лечения и/или при наличии факторов риска развития дефицита витамина B12. При выявлении дефицита витамина B12 врач назначит соответствующее лечение.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.10.2026 № 20073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Лабораторные тесты

Во время лечения препаратом Глимекомб врач будет назначать необходимые обследования и анализы для контроля эффективности и безопасности лечения. В частности, врач будет регулярно контролировать уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) или уровень глюкозы в венозной крови натощак. Вам также рекомендуется регулярно самостоятельно контролировать уровень глюкозы в крови.

Перед началом лечения препаратом Глимекомб и регулярно во время лечения врач также будет проверять функцию Ваших почек.

Если у Вас имеются признаки дефицита витамина B12, например, анемия или поражение нервов (невропатия), врач может назначить анализ крови для определения уровня витамина B12. Если у Вас повышен риск развития дефицита витамина B12, может потребоваться регулярный контроль его уровня в крови.

Дети

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Глимекомб

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Следующие лекарственные препараты могут усилить сахароснижающее действие препарата Глимекомб и повысить риск развития гипогликемии:

- миконазол (противогрибковый препарат), применяемый внутрь, в виде инъекций или в форме геля для слизистой оболочки полости рта. Его применение совместно с препаратом Глимекомб противопоказано (см. подраздел «Противопоказания»);
- фенилбутазон (противовоспалительный препарат), применяемый внутрь или в виде инъекций. Его совместное применение с препаратом Глимекомб не рекомендуется;
- другие препараты, снижающие уровень сахара (глюкозы) в крови, такие как инсулин, акарбоза, препараты, содержащие метформин, тиазолидиндионы, ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4), агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1);
- гипотензивные препараты (для снижения повышенного артериального давления), в том числе бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), такие как каптоприл или эналаприл;
- флуконазол (противогрибковый препарат);
- блокаторы H2-гистаминовых рецепторов (препараты для лечения язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки);
- ингибиторы моноаминооксидазы (препараты для лечения депрессии);
- сульфаниламиды (антибактериальные препараты);
- кларитромицин (антибактериальный препарат);
- нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) (препараты для уменьшения боли и воспаления);
- салицилаты (препараты для лечения боли и воспаления).

Следующие лекарственные препараты могут ослабить сахароснижающее действие препарата Глимекомб и повысить уровень глюкозы в крови:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.10.2026 № 20073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- даназол (препарат, применяемый при некоторых гормонозависимых заболеваниях). Его совместное применение с препаратом Глимекомб не рекомендуется;
- производные фенотиазина (препараты для лечения некоторых психических заболеваний), в том числе хлорпромазин. При применении хлорпромазина в высоких дозах (более 100 мг в сутки) риск повышения уровня глюкозы в крови увеличивается;
- глюкокортикостероиды (гормональные противовоспалительные препараты, принимаемые внутрь, вводимые в виде инъекций или применяемые местно — в сустав, на кожу или ректально);
- тетракозактид (препарат, применяемый для оценки функции надпочечников);
- бета2-адреномиметики, вводимые в виде инъекций, в том числе ритодрин, сальбутамол и тербуталин (препараты для лечения астмы или используемые во время родов);
- препараты зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum*) (применяются для лечения легких депрессивных состояний);
- глюкагон (препарат для лечения низкого уровня глюкозы в крови);
- эстрогены (женские половые гормоны);
- пероральные контрацептивы (противозачаточные средства в виде таблеток);
- фенитоин (препарат для лечения эпилепсии);
- симпатомиметики (препараты, применяемые, например, при заложенности носа, некоторых заболеваниях дыхательных путей или пониженном артериальном давлении);
- никотиновая кислота (витамин B3, применяемый, в том числе, при нарушениях жирового обмена);
- изониазид (препарат для лечения туберкулеза);
- блокаторы «медленных» кальциевых каналов (препараты, применяемые для лечения некоторых заболеваний сердца);
- гормоны щитовидной железы.

Следующие лекарственные препараты могут вызывать как снижение, так и повышение уровня глюкозы в крови:

- фторхинолоны (антибиотики).

При совместном применении препарата Глимекомб с некоторыми из перечисленных выше лекарственных препаратов может потребоваться более частый контроль уровня глюкозы в крови (в отдельных случаях — также в моче) и коррекция дозы препарата Глимекомб во время совместного применения и после отмены другого препарата.

Препарат Глимекомб может усиливать действие антикоагулянтов (препаратов, снижающих свертываемость крови), например, варфарина. При необходимости врач скорректирует дозу антикоагулянта.

Следующие лекарственные препараты могут повышать риск развития лактатацидоза:

- йодсодержащие рентгеноконтрастные средства. Если Вам предстоит рентгенологическое исследование с их применением, прием препарата Глимекомб необходимо временно прекратить (см. подраздел «Особые указания и меры предосторожности»);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.10.2026 № 20073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- «петлевые» диуретики (мочегонные препараты), поскольку они могут ухудшать функцию почек.
- лекарственные препараты, содержащие этанол.

Следующие лекарственные препараты могут взаимодействовать с препаратом Глимекомб, поэтому при их одновременном применении необходимо соблюдать осторожность:

- верапамил, нифедипин (препараты, применяемые для лечения некоторых заболеваний сердца);
- амилорид, триамтерен (мочегонные препараты);
- дигоксин (препарат для лечения заболеваний сердца);
- морфин (сильное обезболивающее средство);
- прокаинамид, хинидин (препараты для лечения нарушений сердечного ритма);
- хинин (препарат для лечения малярии);
- ранитидин (препарат для лечения заболеваний желудка, связанных с повышенной кислотностью);
- триметоприм, ванкомицин (антибактериальные препараты);
- рифампицин (препарат для лечения туберкулеза);
- циметидин (препарат, применяемый для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта);
- долутегравир (препарат, применяемый для лечения ВИЧ-инфекции);
- ранолазин (препарат, применяемый для лечения стенокардии);
- даклатасвир (препарат, применяемый для лечения гепатита С);
- кризотиниб, вандетаниб, олапариб (препараты, применяемые для лечения некоторых видов рака).

Препарат Глимекомб с алкоголем

Избегайте употребления алкоголя во время приема препарата Глимекомб, поскольку алкоголь может непредсказуемым образом влиять на уровень глюкозы в крови и повышать риск развития лактатацидоза (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

В период беременности применение препарата Глимекомб противопоказано. При планировании беременности, а также в случае наступления беременности в период приема препарата Глимекомб, препарат должен быть отменен и назначена инсулинотерапия.

Высокий уровень сахара крови во время беременности связан с повышенным риском нарушений развития плода и осложнений течения беременности, поэтому необходимо поддерживать уровень сахара в плазме крови на уровне, наиболее близком к нормальному.

Грудное вскармливание

Глимекомб противопоказан при грудном вскармливании.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.10.2026 № 20073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Глимекомб не оказывает или оказывает несущественное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. При применении препарата возможно снижение уровня сахара в крови (гипогликемия), которое может нарушать концентрацию внимания и скорость реакции (см. раздел 2, подраздел «Особые указания и меры предосторожности», и раздел 4).

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, особенно в начале терапии.

Препарат Глимекомб содержит сорбитол

Данный лекарственный препарат содержит 40,3 мг сорбитола в каждой таблетке.

Препарат Глимекомб содержит натрий

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на 1 таблетку, то есть, по сути, «не содержит натрия».

3. Прием препарата Глимекомб

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза:

Доза препарата определяется врачом индивидуально для каждого пациента в зависимости от уровня глюкозы крови.

Обычно начальная доза составляет 1–3 таблетки в сутки с постепенным подбором дозы до достижения стойкой компенсации заболевания.

Обычно препарат принимают 2 раза в сутки (утром и вечером). Максимальная суточная доза составляет 5 таблеток.

Путь и (или) способ введения

Препарат принимают внутрь, во время или сразу после еды.

Если, несмотря на прием препарата в соответствии с рекомендациями врача, у Вас отмечается высокий уровень сахара в крови, Вам следует обратиться к лечащему врачу.

Линия разлома (риска) не предназначена для разделения таблетки.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения препаратом Глимекомб определит Ваш лечащий врач, придерживайтесь его рекомендаций.

Если Вы приняли препарата Глимекомб больше, чем следовало

Если Вы приняли больше таблеток препарата Глимекомб, чем следовало, немедленно обратитесь к лечащему врачу, в медицинское учреждение или службу скорой медицинской помощи.

Если Вы приняли препарата Глимекомб больше, чем предусмотрено, может развиться лактатацидоз, так как в состав препарата входит метформин. К симптомам лактатацидоза относятся рвота, боль в животе, мышечные спазмы, общее плохое самочувствие с сильной усталостью, затрудненное дыхание и снижение температуры тела. Если Вы испытываете некоторые из перечисленных симптомов, Вам следует немедленно обратиться к врачу, так как лактатацидоз может привести к коме (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.10.2026 № 20073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Если Вы приняли препарата Глимекомб больше, чем следовало, существует опасность развития гипогликемии, так как в состав препарата входит гликлазид (см. раздел 2, подраздел «Особые указания и меры предосторожности»). Симптомы можно облегчить, если сразу принять сахар или напитки, содержащие сахар, после чего следует принять пищу. Если пациент без сознания, необходимо немедленно сообщить об этом врачу и вызвать скорую помощь. Пациентам без сознания нельзя давать пищу или напитки. Следует убедиться, что всегда есть заранее проинформированный человек, который может вызвать врача в случае экстренной ситуации.

Если Вы забыли принять препарат Глимекомб

Важно принимать препарат каждый день, так как регулярное лечение более эффективно. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Примите препарат со следующим приемом пищи.

Если Вы прекратили прием препарата Глимекомб

Поскольку, как правило, лечение диабета проводится постоянно, не прекращайте принимать препарат Глимекомб без предварительного обсуждения с лечащим врачом. Прекращение приема препарата может стать причиной повышенного уровня глюкозы в крови (гипергликемии) и увеличить риск развития осложнений, связанных с диабетом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

На фоне приема препарата Глимекомб возможно развитие гипогликемии, симптомы которой могут включать головную боль, ощущение сильного голода, тошноту, рвоту, повышенную утомляемость, нарушение сна, возбуждение, агрессивность, снижение концентрации внимания, замедленную реакцию, спутанность сознания, нарушение зрения и речи, тремор, нарушения чувствительности, головокружение, повышенное потоотделение, тревожность, быстрое или нерегулярное сердцебиение. При дальнейшем снижении уровня глюкозы в крови могут возникнуть бред, судороги, потеря самоконтроля, поверхностное дыхание, замедленное сердцебиение, сонливость и потеря сознания с возможным развитием комы (см. раздел 2, подраздел «Особые указания и меры предосторожности»).

Тяжелая гипогликемия может быть опасной для жизни.

При появлении симптомов гипогликемии примите сахар (глюкозу). Если прием сахара не помогает или симптомы повторяются, **обратитесь к лечащему врачу или за неотложной медицинской помощью.**

Если эпизод пониженного уровня сахара в крови тяжелый или продолжительный, даже если он временно компенсируется употреблением сахара, Вам следует **немедленно обратиться за медицинской помощью**.

Прекратите прием препарата Глимекомб **и немедленно обратитесь за медицинской помощью** в случае возникновения одного из следующих симптомов **серьезных нежелательных реакций:**

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- рвота, боль в животе, мышечные судороги, нарушение общего самочувствия, сопровождающееся сильной усталостью, затрудненное дыхание, снижение температуры тела, так как это могут быть симптомы лактатацидоза. Лактатацидоз может привести к коме. Подробная информация приведена в разделе 2 (подраздел «Особые указания и меры предосторожности»);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.10.2026 № 20073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- потеря аппетита, желтуха (пожелтение кожи), потемнение мочи, зуд или болезненность в области живота (признаки гепатита (воспаления печени), холестатической желтухи).

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- отек лица (губы, веки, щеки) и слизистой рта, может распространяться на гортань, вызывая затруднение дыхания, охриплость голоса и лающий кашель (ангионевротический отек или отек Квинке);
- лихорадка и общее плохое самочувствие («недомогание»), затем распространенная сыпь на коже и слизистых оболочках в виде пятен, пузырей, мокнущих эрозий, корок; отслойка участков кожи (буллезные реакции, такие как синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и аутоиммунные буллезные нарушения);
- симптомы, напоминающие грипп, и сыпь на лице, затем — распространенная сыпь с высокой температурой (лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами — DRESS-синдром).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Глимекомб:

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- тошнота;
- рвота;
- диарея;
- боли в животе;
- отсутствие аппетита.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- нарушение вкуса;
- недостаточность витамина B12.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- снижение количества клеток крови (анемия, лейкопения, тромбоцитопения, гранулоцитопения), которое может проявляться бледностью, увеличением времени кровотечения, кровоизлияниями, болью в горле и лихорадкой.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- нарушение показателей функции печени, в том числе повышение активности печеночных ферментов;
- покраснение кожи (эритема);
- зуд;
- кожная сыпь.

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- кратковременные нарушения зрения, особенно в начале лечения, связанные с изменением уровня глюкозы в крови;
- расстройство желудка (диспепсия);
- запор;
- крапивница;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.10.2026 № 20073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- пятнистая сыпь с небольшими возвышающимися над поверхностью кожи элементами (макулопапулезная сыпь).

Одним из действующих веществ препарата Глимекомб является гликлазид, который относится к группе препаратов, называемых производными сульфонилмочевины. На фоне приема других производных сульфонилмочевины наблюдались следующие нежелательные реакции:

- снижение количества эритроцитов в крови (эритроцитопения);
- значительное снижение количества гранулоцитов в крови (агранулоцитоз);
- разрушение эритроцитов с развитием анемии (гемолитическая анемия);
- одновременное снижение количества эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в крови (панцитопения);
- аллергическое воспаление стенок кровеносных сосудов (аллергический васкулит);
- снижение уровня натрия в крови (гипонатриемия);
- повышение активности печеночных ферментов;
- нарушения функции печени, включая нарушение оттока желчи (холестаз), пожелтение кожи и белков глаз (желтуха) и воспаление печени (гепатит).

В большинстве случаев эти нарушения исчезали после прекращения приема препаратов сульфонилмочевины. Однако в отдельных случаях нарушение функции печени могло быть опасным для жизни.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Глимекомб

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе после «Годен до» и картонной пачке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.10.2026 № 20073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Глимекомб содержит

Действующими веществами являются гликлазид + метформин.

Каждая таблетка содержит 500 мг метформина гидрохлорида (в пересчете на 100 % вещество), 40 мг гликлазида (в пересчете на 100 % вещество).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: сорбитол, повидон (тип К25), кроскармеллоза натрия, магния стеарат.

Препарат Глимекомб содержит сорбитол, натрий (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Глимекомб и содержимое упаковки

Таблетки.

Круглые плоскоцилиндрические таблетки от белого до белого с кремоватым или желтоватым оттенком цвета, с фаской и риской. Допускается наличие «мраморности».

Линия разлома (риска) не предназначена для разделения таблетки.

По 30, 60 или 120 таблеток во флакон из полиэтилена низкого давления, укупоренный крышкой навинчиваемой из полипропилена со встроенным влагопоглотителем и контролем первого вскрытия. На флакон наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся.

Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.10.2026 № 20073
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).