ЛП-№(001970)-(РГ-RU) от 22.05.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.05.2026 № 9976
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Капотен, 25 мг, таблетки

Действующее вещество: каптоприл

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или медицинской сестре.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Капотен, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Капотен.

3. Прием препарата Капотен.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Капотен.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Капотен, и для чего его применяют

Препарат Капотен содержит действующее вещество каптоприл и относится к фармакотерапевтической группе средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему; ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).

Показания к применению

Препарат Капотен применяется у взрослых в возрасте от 18 лет:

- при повышении артериального давления (артериальной гипертензии), в том числе из-за сужения кровеносных сосудов почек (реноваскулярной артериальной гипертензии), включая резкое повышение артериального давления (неосложненный гипертонический криз);
- при хронической сердечной недостаточности в сочетании с другими лекарствами (в составе комбинированной терапии);
- при сердечном приступе (остром инфаркте миокарда) в течение первых 24 часов с момента инфаркта при клинически стабильном состоянии;
- при нарушении работы (дисфункции) левого желудочка сердца (фракция выброса левого желудочка $\leq$ 40 %) после перенесенного инфаркта миокарда при клинически стабильном состоянии для снижения частоты возникновения клинически выраженной сердечной недостаточности, увеличения выживаемости и снижения частоты госпитализаций по поводу хронической сердечной недостаточности;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.05.2026 № 9976
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- при поражении почек из-за диабета (диабетической нефропатии) на фоне сахарного диабета типа I при появлении белка альбумина в моче (альбуминурии) более 30 мг/сут.

Способ действия препарата Капотен

Каптоприл препятствует сужению кровеносных сосудов, что приводит к снижению артериального давления и нагрузки на сердце, увеличению почечного кровотока.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Капотен

Противопоказания

Не принимайте препарат Капотен:

- если у Вас аллергия на каптоприл, другие ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас когда-либо была аллергическая реакция с отеком лица, языка, шеи, рук (ангионевротический отек, отек Квинке и наследственный/идиопатический (возникший по неизвестной причине) ангионевротический отек) при приеме ингибиторов АПФ или по неизвестной причине;
- если у Вас тяжелые нарушения функции печени и/или почек;
- если у Вас стойко повышенный уровень калия в крови (рефрактерная гиперкалиемия);
- если у Вас сужение кровеносных сосудов обеих почек или единственной почки с ухудшением их работы (двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки с прогрессирующей азотемией);
- если Вам недавно проведена пересадка (трансплантация) почки;
- при нарушении оттока крови из сердца (стеноз устья аорты и аналогичные изменения, затрудняющие отток крови из левого желудочка);
- если у Вас сахарный диабет и/или нарушения работы почек и Вы получаете лечение алискиреном (для понижения артериального давления);
- если у Вас сахарный диабет и/или нарушения работы почек и Вы одновременно получаете лечение антагонистами рецепторов ангиотензина II (для понижения артериального давления);
- если Вы одновременно получаете лечение ингибиторами нейтральной эндопептидазы (например, с препаратами, содержащими сакубитрил) в связи с высоким риском развития ангионевротического отека;
- при беременности;
- если Вы кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Капотен проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Сообщите Вашему врачу перед приемом препарата, если что-то из перечисленного ниже относится к Вам, так как потребуется осторожность при приеме каптоприла:

- снижение артериального давления ниже нормальных значений (артериальная гипотензия);
- хроническая сердечная недостаточность;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.05.2026 № 9976
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- заболевание, связанное с нарушением кровоснабжения сердечной мышцы (ишемическая болезнь сердца);
- болезни, связанные с кровообращением мозга (цереброваскулярные заболевания);
- сужение просвета митрального или аортального клапана сердца;
- увеличение массы сердечной мышцы, вызывающее нарушение нормального кровотока внутри сердца (гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия);
- гормональные заболевания (например, первичный гиперальдостеронизм, сахарный диабет);
- нарушения работы печени;
- заболевания соединительной ткани (например, системная красная волчанка, склеродермия), угнетение костномозгового кроветворения, применение снижающей иммунный ответ (иммуносупрессивной) терапии, применение аллопуринола (для лечения подагры) или прокаинамида (для лечения нарушения ритма сердца), или комбинация указанных осложняющих факторов;
- нарушения работы почек (включая повышение артериального давления из-за поражения кровеносных сосудов почек, пересадку (трансплантацию) почки);
- необходимость в аппаратной очистке крови (гемодиализ);
- повышение уровня калия выше нормальных значений по анализу крови (гиперкалиемия), прием препаратов или продуктов, способствующих накоплению калия (некоторые мочегонные, например спиронолактон, заменители пищевой соли);
- приступы аллергии или серьезные аллергические реакции с отеком лица, губ, рта, языка, горла, которые могли сопровождаться затруднением глотания или дыхания, (ангионевротический отек) в прошлом;
- одновременное проведение снижения чувствительности (десенсибилизации) к веществам, вызывающим аллергию (аллергенам), из яда перепончатокрылых (таких как пчелы или осы);
- одновременное проведение процедуры аппаратного удаления холестерина из крови (афереза липопротеинов низкой плотности) с использованием декстран-сульфата;
- состояния, сопровождающиеся снижением объема циркулирующей крови (в том числе при терапии мочегонными, соблюдении диеты с ограничением поваренной соли, диарее или рвоте);
- запланированная или проведенная недавно хирургическая операция или общая анестезия;
- одновременное применение с препаратами лития;
- принадлежность к негроидной расе;
- пожилой возраст (старше 65 лет).

Дети и подростки

Не давайте препарат детям и подросткам в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Капотен

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Обязательно сообщите Вашему врачу перед приемом каптоприла, если принимаете или недавно проходили лечение с применением каких-либо из следующих лекарственных

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.05.2026 № 9976
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

препаратов, поскольку может потребоваться изменение рекомендуемой дозы или особое наблюдение:

- препараты для снижения артериального давления (например, антагонисты рецепторов ангиотензина, бета-блокаторы, алискирен, мочегонные);
- мочегонные препараты с эффектом «сбережения калия», препараты калия, калийсодержащие заменители пищевой соли и другие препараты и продукты, которые могут способствовать накоплению калия в организме при одновременном приеме с каптоприлом;
- сосудорасширяющие (вазодилататоры);
- препараты для лечения критических состояний, таких как шок, остановка сердца или нарушение проходимости дыхательных путей, такие как эпинефрин (адреналин), изопротеренол, добутамин, допамин;
- тканевые активаторы плазминогена (для растворения сгустков крови, например при инфаркте миокарда);
- препараты для лечения психических нарушений (препараты лития, антидепрессанты и нейролептики);
- нестероидные противовоспалительные препараты (такие как ибупрофен, диклофенак и другие);
- сахароснижающие лекарственные средства и другие лекарства для лечения сахарного диабета, например ингибиторы дипептидилпептидазы IV типа (глиптины), такие как ситаглиптин, саксаглиптин, вилдаглиптин, линаглиптин;
- аллопуринол (для лечения подагры), прокаинамид (для лечения нарушений ритма сердца);
- препараты, снижающие иммуный ответ, например глюкокортикостероиды (при системном применении), иммунодепрессанты;
- препараты, нарушающие процессы роста, развития и механизмы деления всех клеток организма (цитостатики);
- препараты для лечения онкологических заболеваний (ингибиторы mTOR, например темсиролимус, сиролимус, эверолимус);
- эстрамустин (противоопухолевый химиотерапевтический лекарственный препарат);
- ингибиторы нейтральной эндопептидазы (используются в сочетании с другими препаратами при лечении сердечной недостаточности).

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Не принимайте препарат Капотен во время беременности. Капотен не следует принимать в первые три месяца (I триместр) беременности. Применение Капотена или других ингибиторов АПФ во II и III триместрах беременности может нанести серьезный вред Вашему ребенку. При беременности для снижения артериального давления применяются лекарственные препараты из других групп. Если Вы принимали препарат Капотен во время беременности, проконсультируйтесь с лечащим врачом, так как для Вашего ребенка потребуется дополнительное обследование.

Грудное вскармливание

Не принимайте препарат Капотен, если Вы кормите грудью. В связи с риском развития серьезных нежелательных реакций у ребенка следует прекратить грудное вскармливание или прекратить терапию препаратом Капотен у матери на период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Капотен оказывает умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.05.2026 № 9976
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

В период лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, т. к. возможно головокружение, особенно после приема начальной дозы.

Препарат Капотен содержит лактозу

Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

3. Прием препарата Капотен

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Артериальная гипертензия

Начальная доза составляет 12,5 мг 2 раза в сутки. Постепенно (каждые 2–4 недели) дозу увеличивают. Каптоприл можно назначать отдельно или в сочетании с другими препаратами.

Максимальная доза при мягкой и умеренной артериальной гипертензии составляет 50 мг 2 раза в сутки, при тяжелой артериальной гипертензии допускается повышение дозы до 50 мг 3 раза в сутки. Поддерживающая доза будет определена Вашим врачом.

При неосложненном гипертоническом кризе возможно назначение препарата Капотен под язык. Начальная доза каптоприла составляет 25 мг (1 таблетка). Таблетку следует поместить под язык и держать там до полного растворения, не проглатывая и не запивая водой. После приема препарата необходимо тщательно контролировать показатели артериального давления и частоту сердечных сокращений. В случае отсутствия снижения показателей артериального давления в течение 30 минут после приема препарата можно повторно принять 25 мг (1 таблетку) Капотена под язык. Максимальная доза составляет 50 мг (2 таблетки).

Хроническая сердечная недостаточность

Лечение каптоприлом должно проводиться под длительным наблюдением Вашего врача. При сердечной недостаточности каптоприл назначается в сочетании с другими лекарствами. Начальная доза каптоприла составляет 6,25–12,5 мг 3 раза в сутки. Постепенно дозу увеличивают (не чаще чем один раз в две недели). Средняя поддерживающая доза каптоприла составляет 25 мг 2–3 раза в сутки. Максимальная доза каптоприла – 150 мг в сутки (в 2–3 приема). Поддерживающая доза будет определена Вашим врачом.

Острый инфаркт миокарда (в течение первых 24 часов с момента инфаркта при клинически стабильном состоянии)

При остром инфаркте миокарда лечение препаратом Капотен назначается как можно быстрее при клинически стабильном состоянии пациента. Препарат назначается в тестовой дозе 6,25 мг, через 2 часа при отсутствии нарушений гемодинамики препарат назначается в дозе 12,5 мг, через 12 часов препарат назначается в дозе 25 мг. Начиная со следующего дня препарат Капотен назначается в дозе 100 мг в сутки (за 2 приема) на срок 4 недели. По истечении 4 недель следует вновь оценить состояние пациента и назначенное лечение.

Дисфункция левого желудочка (фракция выброса левого желудочка ≤ 40 %) после перенесенного инфаркта миокарда при клинически стабильном состоянии

У пациентов, находящихся в клинически стабильном состоянии, применение каптоприла можно начинать уже через 3 дня после инфаркта миокарда. Первая доза каптоприла составляет 6,25 мг 1 раз в сутки. Затем дозу каптоприла увеличивают до 12,5 мг 3 раза в сутки. В дальнейшем дозу каптоприла постепенно, в течение нескольких дней–нескольких недель (в

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.05.2026 № 9976
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

зависимости от переносимости), увеличивают до 75 мг в сутки (в 2–3 приема) вплоть до максимальной суточной дозы 150 мг (50 мг 3 раза в сутки). Увеличение дозы каптоприла до 75 мг в сутки рекомендуется осуществлять в условиях стационара под пристальным врачебным наблюдением.

Диабетическая нефропатия на фоне сахарного диабета I типа (при альбуминурии более 30 мг/сутки)

Каптоприл назначают в суточной дозе 75–100 мг, разделенной на 2–3 приема.

У пациентов с сахарным диабетом I типа, нормальным артериальным давлением и выделением белков-альбуминов с мочой (микроальбуминурией) рекомендуемая доза каптоприла составляет 50 мг 2 раза в сутки. У пациентов с сахарным диабетом I типа, нормальным артериальным давлением и обильным выделением белков с мочой (выраженной протеинурией) рекомендуемая доза каптоприла составляет 25 мг 3 раза в сутки.

Если нарушение функции почек является тяжелым, врач скорректирует дозу и будет чаще наблюдать Вас.

Пациенты с нарушением функции почек, не обусловленным сахарным диабетом

Препарат Капотен при нарушении функции почек легкой и умеренной степени тяжести назначается в дозе 75–150 мг/сутки (коррекция дозы не требуется). При тяжелой почечной недостаточности для предотвращения накопления каптоприла в организме дозы препарата будут скорректированы Вашим врачом.

Путь и (или) способ введения

Внутрь, за час до еды. Режим дозирования устанавливается индивидуально.

Продолжительность терапии

Ваш врач установит для Вас индивидуальный режим приема препарата и определит продолжительность лечения.

Если Вы приняли препарата Капотен больше, чем следовало

При передозировке могут проявляться резкое снижение артериального давления, шок, ступор, брадикардия (замедление сердцебиения), нарушения водно-электролитного баланса, почечная недостаточность (нарушение работы почек).

Если Вы приняли препарата Капотен больше, чем следовало, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Вам может потребоваться промывание желудка и введение растворов и других лекарств.

Если Вы забыли принять препарат Капотен

Если Вы забыли принять препарат Капотен, примите следующую дозу в назначенное Вашим врачом время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили прием препарата Капотен

Не отменяйте прием препарата Капотен без консультации с Вашим врачом.

При пропусках или ранней отмене препарата лечение может стать неэффективным и симптомы болезни могут вернуться.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.05.2026 № 9976
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Вам следует немедленно обратится к врачу, если у Вас возникнут какие-либо из следующих нежелательных реакций после приема этого препарата:

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- быстрый аллергический отек (ангионевротический отек) конечностей, лица, губ, слизистых оболочек, языка, глотки и гортани;
- приступ сердечной боли (стенокардия);
- учащенное или неритмичное сердцебиение (тахикардия или тахиаритмия);
- резкое падение давления при попытке встать на ноги (ортостатическая гипотензия);
- выраженное снижение артериального давления;
- приступ сужения дыхательных путей с затруднением дыхания (бронхоспазм).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- нарушение мозгового кровообращения, включая инсульт и обмороки (синкопальные состояния);
- остановка сердца;
- резкое ухудшение состояния из-за нарушения работы сердца (кардиогенный шок);
- тяжелая аллергическая реакция со стороны кожи (синдром Стивенса-Джонсона).

Эти нежелательные реакции являются очень серьезными и при отсутствии лечения могут быть смертельными.

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Капотен

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- расстройства сна;
- головокружение, сонливость;
- кашель сухой без мокроты (непродуктивный);
- одышка;
- раздражение слизистой оболочки желудка;
- нарушение вкуса;
- сухость слизистой оболочки полости рта;
- расстройство пищеварения (диспепсия);
- тошнота;
- рвота;
- боль в животе;
- диарея;
- запор;
- кожный зуд с высыпаниями и без высыпаний;
- высыпания на коже;
- выпадение волос (алопеция).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- головная боль;
- ощущение покалывания или «мурашек» (парестезия);
- ощущение сердцебиения;
- стойкое сужение кровеносных сосудов запястий (синдром Рейно);
- покраснение лица («приливы» крови к лицу);
- бледность;
- отеки на руках или ногах (периферические отеки);
- боль в груди;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.05.2026 № 9976
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- повышенная утомляемость;
- выраженная слабость (астения);
- общее недомогание.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- отсутствие аппетита (анорексия);
- нарушение координации движений (атаксия);
- воспаление слизистой рта (стоматит);
- язвочки во рту (афтозный стоматит);
- аллергический отек кишечника (ангионевротический отек кишечника);
- нарушение функции почек, включая почечную недостаточность;
- выделение большого количества мочи (полиурия);
- выделение малого количества мочи (олигурия);
- увеличение частоты мочеиспусканий.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- низкое количество нейтрофилов в крови (нейтропения);
- полное отсутствие гранулоцитов в крови (агранулоцитоз);
- снижение всех типов клеток крови (панцитопения);
- увеличение лимфоузлов (лимфаденопатия);
- повышенное количество эозинофилов в крови (эозинофилия);
- низкое количество тромбоцитов в крови (тромбоцитопения);
- малокровие (анемия), в т. ч. из-за остановки кроветворения (апластическая), из-за разрушения эритроцитов (гемолитическая);
- связанные со неправильной работой иммунитета (аутоиммунные) заболевания;
- кожная сыпь с множественными очагами покраснения (мультиформная эритема);
- обширное покраснение кожи (эритродермия);
- появление зудящих волдырей на коже, похожих на ожог крапивой (крапивница);
- воспаление кожи с обильным шелушением (эксфолиативный дерматит);
- реакции кожи с образованием крупных пузырей (пемфигоидные реакции);
- патологические реакции кожи на свет (фоточувствительность);
- высокий уровень калия в крови (гиперкалиемия);
- низкий уровень глюкозы в крови (гипогликемия);
- спутанность сознания;
- депрессия;
- нечеткость зрения;
- насморк (ринит);
- аллергическое воспаление легочной ткани (аллергический альвеолит);
- воспаление легких с повышением концентрации эозинофилов в ткани (эозинофильная пневмония);
- воспаление тканей легкого с накоплением в них эозинофилов (эозинофильный пневмонит);
- скопление жидкости в легких (отек легких);
- воспаление языка (глоссит);
- язва желудка;
- воспаление поджелудочной железы (панкреатит);
- разрастание (гиперплазия) десен;
- нарушение функции печени;
- застой желчи (холестаз);
- желтуха;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.05.2026 № 9976
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- воспаление печени (гепатит), включая редкие случаи разрушения ткани печени (гепатонекроза);
- повышение активности «печеночных» ферментов;
- боль в мышцах (миалгия);
- боль в суставах (артралгия);
- нарушение работы почек с потерей белка (нефротический синдром);
- нарушение эрекции (импотенция);
- увеличение молочных желез у мужчин (гинекомастия);
- повышенная температура (гипертермия);
- появление белка в моче (протеинурия);
- низкий уровень натрия в крови (гипонатриемия);
- повышение концентрации азота мочевины в плазме крови;
- закисление крови (ацидоз);
- повышение концентрации креатинина и билирубина в сыворотке крови;
- снижение гемоглобина и гематокрита;
- снижение числа лейкоцитов;
- снижение числа тромбоцитов;
- повышение уровня антител к ядрам клеток (повышение титра антинуклеарных антител);
- ускорение оседания эритроцитов (повышение СОЭ).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Капотен

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и контурной ячейковой упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.05.2026 № 9976
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Капотен содержит

Действующим веществом является каптоприл.

Каждая таблетка содержит 25 мг каптоприла.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, стеариновая кислота, лактозы моногидрат.

Препарат Капотен содержит лактозу (см. раздел 2.).

Внешний вид препарата Капотен и содержимое упаковки

Таблетки.

Таблетки от белого до белого с кремоватым оттенком цвета с характерным запахом, квадратные с округленными краями, двояковыпуклые с крестообразной насечкой на одной стороне. Допускается легкая «мраморность».

По 10 или 14, или 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

4 контурные ячейковые упаковки по 10 таблеток или 2 или 4 контурные ячейковые упаковки по 14 таблеток, или 2 контурные ячейковые упаковки по 20 таблеток вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Тел./факс: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Тел./факс: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.05.2026 № 9976
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.