

Памятка пациента

Зинакорен (ривароксабан)

2,5 мг

10 мг

15 мг

20 мг

(поставить галочку рядом с назначенной дозой)

Всегда носите эту памятку с собой

Предъявляйте эту памятку каждому врачу, стоматологу и любому другому медицинскому работнику, который оказывает Вам медицинскую помощь, до начала лечения.

Я получаю антикоагулянтную терапию препаратом Зинакорен (ривароксабан)

Имя, Фамилия: _____

Адрес: _____

Дата рождения: _____

Масса тела: _____

Другие препараты/заболевания: _____

При возникновении неотложной ситуации, пожалуйста, сообщите:

ФИО врача: _____

Телефон врача: _____

Пожалуйста, сообщите также: _____

Имя, Фамилия: _____

Телефон: _____

Кем приходится: _____

Информация для медицинских работников:

- Не следует использовать значение международного нормализованного отношения (МНО), поскольку оно не является показателем антикоагулянтной активности препарата Зинакорен.

Что нужно знать о препарате Зинакорен?

- Зинакорен угнетает активность свертывающей системы крови, предотвращая образование опасных тромбов.
- Зинакорен необходимо принимать точно в соответствии с назначениями врача.

Чтобы обеспечить оптимальную защиту от образования тромбов, **никогда не пропускайте прием препарата.**

- Не следует прекращать прием препарата Зинакорен без предварительной консультации с врачом, поскольку это может повысить риск образования тромбов.
- Расскажите врачу обо всех других лекарственных препаратах, которые Вы принимаете в настоящее время, принимали недавно или намереваетесь начать принимать, до начала приема препарата Зинакорен.
- Сообщите врачу, что Вы принимаете Зинакорен перед любым хирургическим вмешательством или инвазивной процедурой.

Когда следует обратиться за медицинской помощью?

Принимая препарат для разжижения крови, такой как Зинакорен, важно знать о возможных нежелательных реакциях.

Кровотечение является наиболее частым побочным эффектом. Не начинайте принимать Зинакорен, если Вы знаете о существующем у Вас риске кровотечения, не обсудив это с врачом. Немедленно обратитесь к врачу, если у Вас появились признаки или симптомы кровотечения, например, следующие:

- боль;
- отек или дискомфорт;
- головная боль, головокружение или слабость;
- необычные кровоподтеки, кровотечения из носа, кровоточивость десен, порезы, которые долго кровоточат;
- вагинальные кровотечения или менструации, более обильные, чем обычно;
- кровь в моче, которая может приобрести розовый или коричневый цвет, каловые массы красного или черного цвета;
- кашель с кровью, рвота кровью или массой, похожей на кофейную гущу.

Как принимать препарат Зинакорен?

Для обеспечения оптимальной защиты препарат Зинакорен в дозе:

- 2,5 мг можно принимать вне зависимости от приема пищи;
- 10 мг можно принимать вне зависимости от приема пищи;
- 15 мг необходимо принимать во время еды;
- 20 мг необходимо принимать во время еды.

Сообщите о побочных эффектах (нежелательных реакциях), развившихся при применении лекарственного препарата Зинакорен.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, телефоны: +7 (800) 550 99 03

Адрес электронной почты: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.roszdravnadzor.gov.ru/>

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»),

142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29,

телефон/факс: +7 (495) 702-95-03, или 105064, Россия, Москва, улица Земляной Вал, дом 9,

Бизнес-центр «СИТИДЕЛ», телефон/факс: +7 (495) 721-36-97, факс: +7 (495) 723-72-82,

адрес электронной почты: info@akrikhin.ru или safety@akrikhin.ru, сайт: <https://www.akrikhin.ru>