

Листок-вкладыш – информация для пациента

Гепарин-Акрихин 1000, 1000 МЕ/г, гель для наружного применения

Действующее вещество: гепарин натрия.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 3–7 дней, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Гепарин-Акрихин 1000, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Гепарин-Акрихин 1000.
3. Применение препарата Гепарин-Акрихин 1000.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Гепарин-Акрихин 1000.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

- 1. Что из себя представляет препарат Гепарин-Акрихин 1000, и для чего его применяют**
Действующим веществом препарата Гепарин-Акрихин 1000 является гепарин натрия, который относится к фармакотерапевтической группе под названием: «ангиопротекторы; средства для лечения варикозного расширения вен; гепарины или гепариноиды для местного применения».

Гепарин натрия оказывает противовоспалительное, противоотечное и обезболивающее действие. Ускоряет процессы рассасывания гематом и тромбов, восстанавливает

проходимость вен, что сопровождается выраженным обезболивающим и противовоспалительным действием.

Препарат Гепарин-Акрихин 1000 – антикоагулянтное средство прямого действия для местного применения.

Показания к применению

Препарат Гепарин-Акрихин 1000 показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет для лечения:

- заболеваний поверхностных вен: варикозное расширение вен, хроническая венозная недостаточность и связанные с ней осложнения (поверхностный тромбофлебит, поверхностный перифлебит);
- тупых травм и ушибов мягких тканей;
- подкожных гематом, в том числе гематом после операций на венах, удаления вен (флебэктомия);
- локализованных инфильтратов и отеков мягких тканей.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 3–7 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Гепарин-Акрихин 1000

Противопоказания

Не применяйте препарат Гепарин-Акрихин 1000:

- если у Вас аллергия на гепарин натрия или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- если у Вас нарушена целостность кожных покровов в месте нанесения препарата (язвенно-некротические поражения кожи);
- если у Вас имеется травматическое нарушение целостности кожных покровов (открытые раны);
- если у Вас есть склонность к кровоточивости и/или снижению содержания тромбоцитов в крови (тромбоцитопения).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Гепарин-Акрихин 1000 проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Обязательно сообщите врачу:

- если у Вас имеются открытые раны, гнойные поражения кожи в предполагаемом месте нанесения геля;
- если у Вас когда-либо был или имеется в настоящее время тромбоз глубоких вен (состояние, которое характеризуется образованием тромбов в глубоких венах ног).

Не рекомендуется наносить гель на слизистые оболочки.

При самостоятельном применении препарата не превышайте максимальные сроки и рекомендованные дозы.

В случае отсутствия уменьшения или при утяжелении симптомов заболевания следует обратиться к врачу.

Дети и подростки

Не применяйте препарат детям от 0 до 18 лет, поскольку безопасность и эффективность применения лекарственного препарата Гепарин-Акрихин 1000 у детей и подростков не установлены. Данные отсутствуют.

Другие препараты и препарат Гепарин-Акрихин 1000

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

При длительном применении препарата на обширных участках кожи и одновременном применении антикоагулянтов непрямого действия (например, варфарин, аценокумарол и др.) следует контролировать протромбиновое время и время свертывания крови.

Не рекомендуется смешивать с другими средствами для наружного применения.

Не рекомендуется применять местно одновременно с нестероидными противовоспалительными препаратами, тетрациклинами, антигистаминными средствами.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Гепарин-Акрихин 1000 проконсультируйтесь с врачом.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

В связи с незначительным всасыванием гепарина при наружном применении препарат не оказывает системного действия на организм.

Беременность

Применение препарата Гепарин-Акрихин 1000 не противопоказано при беременности в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Гепарин натрия не проникает через плацентарный барьер.

Грудное вскармливание

Применение препарата Гепарин-Акрихин 1000 не противопоказано в период грудного вскармливания в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Гепарин натрия не проникает в грудное молоко.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Гепарин-Акрихин 1000 не влияет на способность к вождению транспортных средств и работу, требующую повышенной концентрации внимания.

Препарат Гепарин-Акрихин 1000 содержит метилпарагидроксибензоат

Препарат Гепарин-Акрихин 1000 содержит метилпарагидроксибензоат, в связи с чем препарат может вызывать аллергические реакции замедленного типа (например, контактный дерматит) или (реже) реакции немедленного типа (крапивница, бронхоспазм) (см. раздел 4 листка-вкладыша).

Препарат Гепарин-Акрихин 1000 содержит этанол

В одном грамме геля содержится 240 мг этанола. При нанесении на поврежденную кожу этанол может вызвать чувство жжения.

3. Применение препарата Гепарин-Акрихин 1000

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Небольшое количество геля (3–10 см) 1–3 раза в сутки наносят тонким слоем на область поражения и осторожно втирают в кожу.

Путь и (или) способ применения

Наружно.

Продолжительность применения

При заболеваниях поверхностных вен:

- при начальных симптомах венозной недостаточности («тяжесть», боль в ногах, венозные отеки) курс лечения составляет 1–3 недели в зависимости от выраженности симптомов;
- при хронической венозной недостаточности курс лечения составляет 4–6 недель в зависимости от выраженности симптомов. Применять не более 6 недель.

При тупых травмах и ушибах мягких тканей:

- курс лечения составляет 5–7 дней или до исчезновения симптомов. Применять не более 10 дней.

При подкожных гематомах, в том числе гематомах после операций на венах (флебэктомии):

- курс лечения составляет 7–21 дней или до исчезновения симптомов. Применять не более 4 недель.

При локализованных инфильтратах и отеках мягких тканей:

- курс лечения составляет 4–6 недель или до исчезновения симптомов. Применять не более 6 недель.

Точные сроки лечения определяются врачом.

Если Вы применили препарата Гепарин-Акрихин 1000 больше, чем следовало

До настоящего времени случаи передозировки геля гепарина натрия не зарегистрированы.

Передозировка маловероятна в связи с низкой всасываемостью компонентов геля.

В случае передозировки следует обратиться к врачу.

Если Вы забыли применить препарат Гепарин-Акрихин 1000

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Гепарин-Акрихин 1000 может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Гепарин-Акрихин 1000 и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения одного из следующих признаков реакций гиперчувствительности, которые наблюдались очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- затрудненное дыхание или глотание;
- головокружение;
- отек лица, губ, языка или горла;
- сильный зуд кожи, появление сыпи или волдырей.

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Гепарин-Акрихин 1000

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- покраснение кожи и/или кожный зуд.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории Российской Федерации. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата Гепарин-Акрихин 1000.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru>

5. Хранение препарата Гепарин-Акрихин 1000

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на тубе и картонной пачке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Гепарин-Акрихин 1000 содержит:

Действующим веществом является гепарин натрия.

1 г препарата содержит 1000 МЕ гепарина натрия.

Прочими вспомогательными веществами являются: метилпарагидроксибензоат, этанол 96 %, карбомер 940, трометамол, лаванды масло, апельсина цветков масло (неролиевое масло), вода очищенная.

Препарат Гепарин-Акрихин 1000 содержит метилпарагидроксибензоат и этанол (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Гепарин-Акрихин 1000 и содержимое упаковки

Гель для наружного применения.

Прозрачный или почти прозрачный, бесцветный или со слегка желтоватым оттенком гель со специфическим запахом.

По 30, 50 или 100 г в тубу алюминиевую. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация,

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»),

142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

Телефон/факс: +7 (495) 702-95-03.

E-mail: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация,

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»),

142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий, следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

Российская Федерация,

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»),

142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

Телефон/факс: +7 (495) 702-95-03.

E-mail: info@akrihin.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза

<https://eec.eaeunion.org/>