ЛП-№(000041)-(РГ-RU) от 13.02.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.02.2026 № 2457
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0016)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Ацикловир-Акрихин, 5 %, мазь для наружного применения

Действующее вещество: ацикловир

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем, или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 10 дней, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Ацикловир-Акрихин, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Ацикловир-Акрихин.

3. Применение препарата Ацикловир-Акрихин.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Ацикловир-Акрихин.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Ацикловир-Акрихин, и для чего его применяют

Препарат Ацикловир-Акрихин содержит действующее вещество ацикловир и относится к группе антибиотики и противомикробные препараты, применяемые в дерматологии; противомикробные препараты для наружного применения; противовирусные препараты.

Показания к применению

Ацикловир-Акрихин показан к применению у взрослых и детей для лечения вирусных инфекций, вызванных вирусом *Herpes simplex,* на губах и коже лица (рецидивирующий герпес губ).

Способ действия препарата Ацикловир-Акрихин

Ацикловир высоко активен в отношении вируса *Herpes simplex* (HSV) 1 и 2 типов. После попадания в клетки, инфицированные вирусом герпеса, ацикловир превращается в активное соединение ацикловира трифосфат, которое препятствует дальнейшему синтезу вирусной ДНК.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 10 дней, необходимо обратиться к врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.02.2026 № 2457
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0016)

2. О чем следует знать перед применением препарата Ацикловир-Акрихин

Противопоказания

Не применяйте препарат Ацикловир-Акрихин:

если у Вас аллергия на ацикловир, валацикловир, пропиленгликоль или любые другие компоненты препарата Ацикловир-Акрихин (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Ацикловир-Акрихин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат Ацикловир-Акрихин следует применять исключительно при герпесе кожи губ и лица. Не рекомендуется наносить на слизистые оболочки полости рта, глаз и влагалища. Не применяйте препарат с целью лечения генитального герпеса. Избегайте попадания мази в глаза.

При выраженных проявлениях рецидивирующего герпеса рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Если у Вас герпес губ, то Вам следует избегать передачи вируса, особенно при наличии активных поражений.

Если у Вас диагностировано иммунодефицитное состояние, то Вам не рекомендуется применять препарат Ацикловир-Акрихин. Вы должны следовать рекомендациям врача при лечении любых инфекционных заболеваний.

Другие препараты и препарат Ацикловир-Акрихин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

При наружном применении взаимодействие с другими лекарственными средствами не выявлено.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Применение препарата Ацикловир-Акрихин возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный и неизвестный риск для плода.

Грудное вскармливание

При регулярном применении препарат Ацикловир-Акрихин попадает в грудное молоко. Однако доза, которую получает младенец, находящийся на грудном вскармливании, будет незначительна.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Ацикловир-Акрихин не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Ацикловир-Акрихин содержит пропиленгликоль

Препарат Ацикловир-Акрихин содержит пропиленгликоль, который может раздражать кожу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.02.2026 № 2457
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0016)

3. Применение препарата Ацикловир-Акрихин

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Препарат рекомендуется наносить 5 раз в день, примерно каждые 4 часа, за исключением ночного времени на пораженные и граничащие с ними участки кожи.

Нет необходимости для изменения дозы, если у Вас есть почечные или печеночные нарушения.

Применение у детей и подростков

Режим дозирования для детей не отличается от режима дозирования для взрослых.

Путь и (или) способ введения

Наружно.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в листке-вкладыше.

Важно как можно раньше начинать лечение, желательно при появлении первых признаков и симптомов. Лечение также может начаться на более поздних стадиях (папула или пузырь).

Чтобы не допустить ухудшения состояния и предупредить распространение инфекции, необходимо мыть руки до и после нанесения препарата, не тереть и не прикасаться к пораженным участкам кожи полотенцем.

Продолжительность терапии

Длительность лечения не менее 4 дней. В случае отсутствия заживления лечение может быть продолжено до 10 дней. В случае сохранения симптомов заболевания более 10 дней следует обратиться к врачу.

Если Вы приняли препарата Ацикловир-Акрихин больше, чем следовало

Не ожидается возникновения нежелательных эффектов при приеме внутрь или при местном нанесении всего содержимого потребительской упаковки мази Ацикловир-Акрихин.

Однако следует обратиться к врачу в случае подозрения на передозировку.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Ацикловир-Акрихин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Ацикловир-Акрихин **и немедленно обратитесь за медицинской помощью** в случае возникновения одного из следующих признаков **аллергической реакции:**

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- отек лица (губы, веки, щеки) и слизистой рта, может распространяться на гортань, вызывая затруднение дыхания, охриплость голоса и лающий кашель (ангионевротический отек).
- реакции повышенной чувствительности немедленного типа, в том числе сыпь, покраснение кожи с появлением пузырей и волдырей (крапивница).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.02.2026 № 2457
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0016)

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Ацикловир-Акрихин.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- кратковременное жжение, покалывание на участках нанесения препарата, небольшая сухость или шелушение кожи, зуд.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- покраснение кожи и отек тканей в месте применения препарата, кожный зуд, высыпания в виде пузырьков, заполненных жидкостью (контактный дерматит), после нанесения, чаще связанные с реакцией на вспомогательные вещества, чем на ацикловир.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Тел.: +7 800 550 99 03

Адрес электронной почты: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

5. Хранение препарата Ацикловир-Акрихин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и тубе.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Ацикловир-Акрихин содержит

Действующим веществом является ацикловир.

Каждые 100 г препарата содержат 5 г ацикловира.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются пропиленгликоль, вазелин, вазелиновое масло, воск эмульсионный, макрогол (полиэтиленоксид 1500), вода очищенная.

Препарат Ацикловир-Акрихин содержит пропиленгликоль (см. раздел 2).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.02.2026 № 2457
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0016)

Внешний вид препарата Ацикловир-Акрихин и содержимое упаковки

Препарат представляет собой мазь для наружного применения.

Мазь белого или почти белого цвета. Допускается наличие характерного запаха.

По 10 или 15 г в тубу алюминиевую с бушоном из полимерных материалов.

Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза https://grls.rosminzdrav.ru.