ЛП-№(002788)-(РГ-RU) от 16.01.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.01.2026 № 282
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

**Листок-вкладыш – информация для пациента**

**Азитромицин-Акрихин, 250 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**

**Азитромицин-Акрихин, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**

Действующее вещество: азитромицин.

**Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Азитромицин-Акрихин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Азитромицин-Акрихин.
3. Прием препарата Азитромицин-Акрихин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Азитромицин-Акрихин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

## 1. Что из себя представляет препарат Азитромицин-Акрихин, и для чего его применяют

Препарат Азитромицин-Акрихин содержит действующее вещество азитромицин.

Азитромицин относится к группе средств антибактериальные средства системного действия; макролиды, линкозамины и стрептограмины; макролиды.

**Показания к применению**

Препарат Азитромицин-Акрихин показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 12 лет для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами, в том числе:

– инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (фарингит/тонзиллит, синусит, средний отит);

– инфекции нижних дыхательных путей: острый бронхит, обострение хронического бронхита, пневмония, в том числе вызванные атипичными возбудителями;

– инфекции кожи и мягких тканей (акне вульгарис средней степени тяжести, рожа, импетиго, вторично инфицированные дерматозы);

– начальная стадия болезни Лайма (боррелиоз) – мигрирующая эритема (erythema migrans);

– инфекции мочеполовых путей, вызванные Chlamydia trachomatis (уретрит, цервицит).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.01.2026 № 282
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

**Способ действия препарата Азитромицин-Акрихин**

Препарат Азитромицин-Акрихин подавляет рост и размножение микроорганизмов (бактерий). Азитромицин способен хорошо проникать в очаг инфекции, накапливаясь там в высоких концентрациях, которые сохраняются длительное время. Благодаря этому свойству препарат Азитромицин-Акрихин способен эффективно бороться с инфекциями, вызванными чувствительными к нему микроорганизмами.

Если улучшение не наступило, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

## 2. О чем следует знать перед приемом препарата Азитромицин-Акрихин

**Противопоказания**

**Не принимайте препарат Азитромицин-Акрихин:**

- если у Вас аллергия на азитромицин, эритромицин, другие макролиды или кетолиды или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас нарушение функции печени тяжелой степени;
- если Вы принимаете эрготамин и дигидроэрготамин;
- если у Вас непереносимость лактозы, дефицит лактозы, глюкозо-галактозное нарушение всасывания;
- у детей в возрасте до 12 лет с массой тела менее 45 кг (для данной лекарственной формы и дозировок).

**Особые указания и меры предосторожности**

Перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Обязательно сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если у Вас имеются или были в прошлом:

- определенный тип мышечной слабости, называемой миастения гравис;
- нарушения функции печени;
- нарушения функции почек;
- сердечно-сосудистые заболевания, в том числе нарушения на электрокардиограмме, наличие клинически значимой брадикардии, аритмии сердца или тяжелой сердечной недостаточности;
- вы принимаете препараты, удлиняющие интервал QT (показатель на электрокардиограмме), например: антиаритмические препараты классов IA (хинидин, прокаинамид), III (дофетилид, амиодарон и соталол), цизаприд, терфенадин, антипсихотические препараты (пимозид), антидепрессанты (циталопрам), фторхинолоны (моксифлоксацин и левофлоксацин).
- нарушение водно-электролитного баланса, особенно низкий уровень калия или магния в крови;
- вы принимаете дигоксин, варфарин, циклоспорин;
- аллергические реакции (включая ангионевротический отек и анафилаксию (мгновенная генерализованная аллергическая реакция);

Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если почувствуете, что Ваше сердце начинает биться неровно, возникает ощущение перебоев, имеет место учащенное или замедленное

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.01.2026 № 282
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

сердцебиение, или Вы ощущаете головокружение, нервную или мышечную слабость во время приема препарата.

Принимайте препарат, по крайней мере, за 1 ч до или через 2 ч после приема антацидных препаратов.

Ваш врач может рекомендовать Вам дополнительные обследования для определения чувствительности к антибиотикам.

В случае развития диареи (жидкого стула) во время или после лечения обратитесь к врачу.

Не принимайте лекарственные препараты от диареи до консультации с врачом. Если диарея не проходит, сообщите об этом своему лечащему врачу.

**Дети**

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 12 лет с массой тела менее 45 кг в связи с невозможностью обеспечить режим дозирования.

**Другие препараты и препарат Азитромицин-Акрихин**

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Это особенно важно, если Вы принимаете следующие препараты:

- антацидные препараты (препараты для химической нейтрализации кислоты желудочного сока), поскольку они могут уменьшить концентрацию азитромицина в крови. Поэтому принимайте препарат Азитромицин-Акрихин, по крайней мере, за 1 час до или через 2 часа после приема антацидных препаратов и пищи;
- дигоксин (препарат для лечения сердечной недостаточности) и колхицин (препарат для лечения подагры и семейной средиземноморской лихорадки) (субстраты Р-гликопротеина), поскольку азитромицин может усилить действие субстратов Р-гликопротеина. Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете дигоксин или колхицин, так как возможно потребуется коррекция их дозы на фоне приема препарата Азитромицин-Акрихин;
- зидовудин (препарат для лечения ВИЧ-инфекции), поскольку азитромицин может усилить действие зидовудина или увеличивать вероятность появления нежелательных реакций;
- алкалоиды спорыньи (препараты для лечения мигрени, такие как эрготамин и дигидроэрготамин). Не принимайте производные алкалоидов спорыньи (эрготамин и дигидроэрготамин) одновременно с препаратом Азитромицин-Акрихин из-за риска серьезных нежелательных реакций, таких как зуд в конечностях, мышечные судороги и гангрена рук и ног, из-за нарушения кровообращения (эрготизм) (см. раздел «Противопоказания»);
- аторвастатин (препарат, снижающий уровень холестерина в крови), так как при применении в клинической практике были получены отдельные сообщения о случаях повреждения мышц (рабдомиолиз) при одновременном приеме азитромицина и статинов;
- антикоагулянты (препараты, снижающие свертываемость крови и препятствующие чрезмерному образованию тромбов) непрямого действия (производные кумарина), поскольку одновременный прием их с азитромицином может увеличить риск кровотечения. Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете внутрь антикоагулянты непрямого действия (производные кумарина) во время лечения препаратом Азитромицин-Акрихин, так как в этом случае Вам потребуется более частое определение показателей свертываемости крови;
- циклоспорин (препарат, подавляющий иммунную систему, иммунодепрессант), поскольку при одновременном приеме с азитромицином может увеличиться концентрация циклоспорина

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.01.2026 № 282
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

в крови. Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете циклоспорин, и Вам назначили препарат Азитромицин-Акрихин. Если по решению врача Вам потребуется совместное применение циклоспорина и азитромицина, для предупреждения риска Вам будет проводиться периодическое определение уровня циклоспорина в крови и коррекция его дозы при необходимости;

- рифабутин (антибиотик, в основном используемый для лечения туберкулеза), поскольку при одновременном приеме азитромицина и рифабутина иногда наблюдалось снижение в крови белых клеток крови, которые убивают бактерии, называемых нейтрофилами (нейтропения);
- терфенадин (противоаллергический препарат), так как было установлено, что одновременный прием терфенадина и макролидов, включая азитромицин, может вызывать аритмию и характерные изменения на электрокардиограмме (удлинение интервала QT);
- гидроксихлорохин или хлорохин (используются для лечения ревматических заболеваний или малярии), в связи с повышением риска сердечно-сосудистых событий и сердечно-сосудистой смертности при одновременном приеме данных препаратов с азитромицином.

Сообщите врачу, если во время лечения препаратом Азитромицин-Акрихин Вы принимаете какой-либо из следующих препаратов, ввиду имеющихся данных об их взаимодействиях с другими препаратами группы макролидов:

- препараты, метаболизирующиеся с участием изоферментов системы цитохрома Р450;
- цетиризин (препарат для лечения аллергии);
- диданозин (дидезоксиинозин), эфавиренз, индинавир и нелфинавир (противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции);
- флуконазол (противогрибковый препарат);
- карбамазепин (противоэпилептическое средство);
- метилпреднизолон (глюкокортикоидный гормон, оказывает иммунодепрессивное, противоаллергическое, противовоспалительное, противошоковое действие);
- силденафил (препарат для лечения нарушений эрекции);
- теофиллин (препарат для лечения бронхиальной астмы);
- триазолам/мидазолам (снотворные, успокаивающие препараты);
- триметоприм/сульфаметоксазол (комбинированный противомикробный препарат);
- циметидин (препарат для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки).

**Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

**Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Могут возникнуть некоторые нежелательные реакции со стороны нервной системы и органа зрения. Поэтому убедитесь, что Вы знаете, как Вы реагируете на препарат, прежде чем садиться за руль или пользоваться механизмами, которые могут повлиять на управление транспортными средствами и работу с механизмами. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.01.2026 № 282
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

**Препарат Азитромицин-Акрихин содержит лактозу**

Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

## 3. Прием препарата Азитромицин-Акрихин

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

**Рекомендуемая доза**

Взрослые

*При инфекциях верхних и нижних дыхательных путей, ЛОР-органов, кожи и мягких тканей*: по 1 таблетке (500 мг) или по 2 таблетки (250 мг) 1 раз в сутки в течение 3-х дней (курсовая доза 1,5 г).

*При акне вульгарис средней степени тяжести:* по 1 таблетке (500 мг) или по 2 таблетки (250 мг) 1 раз в сутки в течение 3-х дней, затем по 1 таблетке (500 мг) или по 2 таблетки (250 мг) 1 раз в неделю в течение 9 недель (курсовая доза 6,0 г).

Первую еженедельную таблетку следует принять через 7 дней после приема первой ежедневной таблетки (8-ой день от начала лечения), последующие 8 еженедельных таблеток - с интервалом в 7 дней.

*При болезни Лайма (начальная стадия боррелиоза) – мигрирующей эритеме (erythema migrans):* 1 раз в сутки в течение 5 дней: 1-й день – 1,0 г (2 таблетки по 500 мг или 4 таблетки по 250 мг), затем со 2-го по 5-й день – по 1 таблетке (500 мг) или по 2 таблетки (250 мг) (курсовая доза 3,0 г).

*При инфекциях мочеполовых путей, вызванных Chlamydia trachomatis (уретрит, цервицит):* неосложненный уретрит/цервицит – 1 г (2 таблетки по 500 мг или 4 таблетки по 250 мг) однократно.

Пациенты пожилого возраста, пациенты с заболеваниями печени и почек

Перед началом приема препарата сообщите врачу, если Вы старше 65 лет или у Вас проблемы с печенью или почками.

**Применение у детей и подростков**

Дети от 12 лет с массой тела более 45 кг

У детей от 12 лет с массой тела более 45 кг режим дозирования совпадает с режимом дозирования у взрослых пациентов.

Таблетки препарата Азитромицин-Акрихин по 250 мг и 500 мг предназначены для детей в возрасте от 12 лет с массой тела более 45 кг, которые в состоянии проглотить таблетку.

Для удобства применения у детей рекомендуется прием азитромицина в соответствующей лекарственной форме.

**Путь и (или) способ введения**

Внутрь, не разжевывая, по крайней мере, за 1 час до или через 2 часа после еды, 1 раз в сутки.

**Продолжительность терапии**

Продолжительность терапии будет определять Ваш лечащий врач.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.01.2026 № 282
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

**Если Вы приняли препарата Азитромицин-Акрихин больше, чем следовало**

Если Вы или Ваш ребенок приняли препарата Азитромицин-Акрихин больше, чем следовало, то в случае передозировки возможно возникновение сильной тошноты, временной потери слуха, рвоты, диареи. Обратитесь за медицинской помощью. Врач назначит Вам лечение для устранения симптомов передозировки.

**Если Вы забыли принять препарат Азитромицин-Акрихин**

В случае пропуска приема одной дозы препарата Азитромицин-Акрихин – пропущенную дозу следует принять как можно раньше, а последующие – с перерывами в 24 часа.

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

**Если Вы прекратили прием препарата Азитромицин-Акрихин**

Важно окончить курс лечения, даже если через несколько дней Вы почувствуете себя лучше. Если Вы прекратите принимать препарат слишком рано, инфекционное заболевание может быть не полностью вылечено, и его симптомы могут возвратиться или ухудшиться. У Вас может также развиться снижение чувствительности (резистентность) к препарату.

При наличии вопросов по приему препарата обратитесь к лечащему врачу.

**4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Азитромицин-Акрихин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**Прекратите прием препарата Азитромицин-Акрихин и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения следующих признаков серьезных нежелательных реакций:**

**Нечасто** (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- внезапное свистящее или затрудненное дыхание, отек век, лица, губ и слизистой оболочки полости рта (ангионевротический отек) (отек Квинке);
- кожный зуд (особенно если он затрагивает все тело), покраснения и высыпания на коже (реакции повышенной чувствительности).

**Неизвестно** (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- тяжелая или продолжительная диарея (которая может содержать кровь или слизь) во время лечения препаратом, поскольку это может быть признаком тяжелого воспаления кишечника (псевдомембранозный колит);
- синдром Стивенса-Джонсона – заболевание кожи и слизистых оболочек, характеризующееся лихорадкой, эрозиями во рту, сильным воспалением глаз и высыпаниями на коже и слизистых оболочках в виде пятен, пузырей, мокнущих эрозий, корок;
- свистящие хрипы, затруднение дыхания, крапивница, сыпь, зуд, отек лица, обморок - признаки острой аллергической реакции (анафилактическая реакция);
- токсический эпидермальный некролиз – поражение кожи и слизистых оболочек полости рта, глаз, половых органов, кишечника и дыхательной системы, отслойка участков кожи;
- воспалительная реакция, характеризующаяся образованием мишеневидных высыпаний (мультиформная эритема);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.01.2026 № 282
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

• кожная сыпь, сопровождающаяся такими симптомами, как лихорадка, воспаление лимфоузлов, поражение внутренних органов и увеличение количества эозинофилов (разновидность лейкоцитов) (лекарственная сыпь с эозинофилией и системными проявлениями) (DRESS-синдром);

• понижение артериального давления;

• внезапная сердечно-сосудистая смерть.

**Редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

• острый генерализованный экзантематозный пустулез (ОГЭП) – резкие кожные изменения (высыпания), характеризующиеся быстрым появлением на коже красных участков с небольшими пустулами (маленькими пузырьками, наполненными белой или желтой жидкостью);

• учащенное или нерегулярное сердцебиение.

**Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Азитромицин-Акрихин, перечислены ниже:**

**Очень часто** (могут возникать более чем у 1 человека из 10)**:**

• понос (диарея).

**Часто** (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

• головная боль;

• тошнота, рвота, боль в животе;

• снижение количества лимфоцитов, повышение количества эозинофилов, повышение количества базофилов, повышение количества моноцитов, повышение количества нейтрофилов, снижение концентрации бикарбонатов в плазме крови.

**Нечасто** (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

• грибковое поражение (кандидоз), в том числе слизистой оболочки полости рта;

• вагинальная инфекция;

• воспаление легких (пневмония);

• грибковая инфекция;

• бактериальная инфекция;

• воспаление слизистой оболочки глотки (фарингит);

• воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника (гастроэнтерит);

• респираторные заболевания;

• воспаление слизистой оболочки носа (ринит);

• снижение уровня лейкоцитов (лейкопения);

• снижение количества нейтрофилов (нейтропения);

• повышение уровня эозинофилов в крови (эозинофилия);

• отсутствие аппетита (анорексия);

• головокружение;

• нарушение вкусовых ощущений, чувство покалывания и «ползанья мурашек» на коже (парестезии);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.01.2026 № 282
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

- сонливость;
- бессонница;
- нервозность;
- нарушение зрения;
- расстройство слуха;
- ощущение вращения окружающих предметов вокруг тела (вертиго);
- ощущение сердцебиения, «приливы» крови к лицу;
- учащенное дыхание (одышка), носовое кровотечение;
- усиленное газообразование в кишечнике (метеоризм), ощущение боли и/или дискомфорта в животе (диспепсия), запор;
- гастрит;
- нарушение глотания (дисфагия);
- сухость слизистой оболочки полости рта;
- вздутие живота;
- отрыжка;
- язвы слизистой оболочки полости рта;
- повышение секреции слюнных желез;
- воспаление печени (гепатит);
- кожная сыпь, зуд, зудящие, выступающие над кожей, высыпания аллергического характера (крапивница);
- воспаление кожи (дерматит);
- сухость кожи;
- потливость;
- воспаление суставов (остеоартрит);
- боли в мышцах (миалгия);
- боль в спине;
- боль в шее;
- расстройства мочеиспускания (дизурия);
- боль в области почек;
- маточные кровотечения (метроррагии);
- нарушение функции яичек;
- отек;
- состояние, характеризующееся общей слабостью, повышенной утомляемостью (астения), недомогание, ощущение усталости;
- отек лица;
- боль в груди;
- лихорадка;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.01.2026 № 282
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

- скопление жидкости в тканях нижних конечностей (периферические отеки);
- повышение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), повышение концентрации билирубина в плазме крови, повышение концентрации мочевины в плазме крови, повышение концентрации креатинина в плазме крови, изменение содержания калия в плазме крови, повышение активности щелочной фосфатазы в плазме крови, повышение содержания хлоридов в плазме крови, повышение концентрации глюкозы в крови, увеличение количества клеток, участвующих в свертывании крови (тромбоцитов), снижение отношения объема форменных элементов к единице общего объема крови (гематокрита), повышение концентрации бикарбонатов в плазме крови, изменение содержания натрия в плазме крови.

**Редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- состояние сильного эмоционального возбуждения, сопровождаемое чувствами страха и тревоги (ажитация);
- нарушение функции печени;
- прекращение оттока желчи из желчного пузыря в 12-перстную кишку (холестатическая желтуха);
- повышенная чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению (реакция фотосенсибилизации).

**Очень редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- снижение количества клеток, участвующих в свертывании крови (тромбоцитопения),
- снижение количества красных клеток крови (эритроцитов) в следствие их разрушения (гемолитическая анемия);
- изменение цвета языка;
- воспаление поджелудочной железы (панкреатит).

**Неизвестно** (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- псевдомембранозный колит;
- снижение кожной чувствительности (гипестезия);
- тревога;
- агрессия;
- обморок;
- судороги;
- психомоторная гиперактивность;
- потеря обоняния, извращение обоняния, потеря вкусовых ощущений;
- мышечная слабость (миастения);
- бред, возникновение образов, видений, звуков, запахов, которые кажутся реальными, но таковыми не являются (галлюцинации);
- нарушение слуха, в том числе глухота и/или шум в ушах;
- понижение артериального давления;
- увеличение интервала QT на электрокардиограмме;
- желудочковая тахикардия;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.01.2026 № 282
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

- печеночная недостаточность (тяжелое нарушение функций печени);
- некроз печени, фульминантный гепатит;
- боли в суставах (артралгия);
- воспаление почек (интерстициальный нефрит);
- острая почечная недостаточность.

**Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

**5. Хранение препарата Азитромицин-Акрихин**

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на блистере, картонной пачке препарата после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните в оригинальной упаковке (блистер в пачке) при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию, водопровод. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

**6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

**Препарат Азитромицин-Акрихин содержит**

Действующим веществом является: азитромицин.

Азитромицин-Акрихин, 250 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Каждая таблетка содержит 250 мг азитромицина (в виде дигидрата).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: крахмал кукурузный, лактоза, кальция гидрофосфат, целлюлоза микрокристаллическая РН 102, повидон К-30, кроскармеллоза натрия, натрия лаурилсульфат, тальк, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный. Состав пленочной оболочки: гипромеллоза, титана диоксид, тальк, пропиленгликоль.

Азитромицин-Акрихин, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.01.2026 № 282
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Каждая таблетка содержит 500 мг азитромицина (в виде дигидрата).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: крахмал кукурузный, лактоза, кальция гидрофосфат, целлюлоза микрокристаллическая PH 102, повидон К-30, кроскармеллоза натрия, натрия лаурилсульфат, тальк, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный. Состав пленочной оболочки: гипромеллоза, титана диоксид, тальк, пропиленгликоль.

Препарат Азитромицин-Акрихин содержит лактозу (см. раздел 2).

**Внешний вид препарата Азитромицин-Акрихин и содержимое его упаковки**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Азитромицин-Акрихин, 250 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Белые двояковыпуклые таблетки продолговатой формы, покрытые пленочной оболочкой.

Цвет на изломе – белый или почти белый.

По 6 таблеток в блистер ПВХ/алюминиевый. 1 блистер с листком-вкладышем в пачку картонную.

Азитромицин-Акрихин, 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Белые двояковыпуклые таблетки продолговатой формы, покрытые пленочной оболочкой, с риской с одной стороны. Линия разлома (риска) предназначена исключительно для разламывания таблетки с целью облегчения проглатывания, а не для разделения на равные дозы.

Цвет на изломе – белый или почти белый.

По 3 таблетки в блистер ПВХ/алюминиевый. 1 блистер с листком-вкладышем в пачку картонную.

По 10 таблеток в блистер ПВХ/алюминиевый. 1 блистер с листком-вкладышем в пачку картонную.

**Категория отпуска лекарственного препарата**

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

**Держатель регистрационного удостоверения**

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

**Производитель**

Индия

Микро Лабс Лимитед

92, Промышленный комплекс Сипкот, Хосур - 635 126 (Т.Н.)

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.01.2026 № 282
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

**За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения:**

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

**Прочие источники информации**

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза https://grls.rosminzdrav.ru