ЛП-№(005499)-(РГ-RU) от 02.12.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.11.2025 № 29695
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Гиоксизон-Акрихин, 1 % + 3 %, мазь для наружного применения

Действующие вещества: гидрокортизон + окситетрациклин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Гиоксизон-Акрихин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Гиоксизон-Акрихин.
3. Применение препарата Гиоксизон-Акрихин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Гиоксизон-Акрихин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Гиоксизон-Акрихин, и для чего его применяют

Препарат Гиоксизон-Акрихин содержит комбинацию действующих веществ: гидрокортизон и окситетрациклин. Гиоксизон-Акрихин относится к группе препаратов кортикостероиды, применяемые в дерматологии; кортикостероиды в комбинации с антибиотиками; кортикостероиды с низкой активностью в комбинации с антибиотиками.

Показания к применению

Препарат Гиоксизон-Акрихин применяется у взрослых и детей от 2 до 18 лет.

Заболевания кожи, поддающиеся терапии глюкокортикостероидами и осложненные вторичной бактериальной инфекцией, вызванной чувствительными к окситетрациклину микроорганизмами: дерматит (в том числе аллергический, контактный, себорейный, солнечный, атопический), воспалительное заболевание кожи (экзема), острая аллергическая реакция, при которой на коже и слизистых оболочках появляются различные по виду высыпания (многоформная экссудативная эритема), поверхностные ожоги и отморожения, укусы насекомых.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Гиоксизон-Акрихин

Противопоказания

Не применяйте препарат Гиоксизон-Акрихин:

- если у Вас аллергия на гидрокортизон, окситетрациклин или любые другие компоненты

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.11.2025 № 29695
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

- если у Вас туберкулез кожи;
- если у Вас опухоли кожи;
- если у Вас предраковые заболевания кожи;
- если у Вас грибковые поражения кожи (дерматомикоз);
- если у Вас вирусные заболевания кожи (герпес, ветряная оспа);
- если у Вас кожное заболевание, при котором появляется покраснение на щеках, в области носа, лба и подбородка (розацеа);
- если у Вас кожное заболевание, при котором вокруг рта образуются ограниченные участки высыпаний (периоральный дерматит);
- если у Вас сифилитические поражения кожи;
- если у Вас были какие-либо реакции после вакцинации (поствакцинальные кожные реакции);
- если Вы беременны;
- если Вы кормите грудью;
- у детей до 2 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Гиоксизон-Акрихин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Это особенно важно, если:

- Вы планируете вакцинацию (во время лечения глюкокортикостероидами любая вакцинация противопоказана в связи угнетающим иммунитет эффектом глюкокортикостероидов);
- Вы собираетесь наносить препарат на кожу лица. При необходимости применения препарата на коже лица лечение должно быть коротким из-за повышенного всасывания и возможности появления побочного действия.

Избегайте попадания препарата в глаза. Не наносите препарат на слизистые оболочки.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте до 2 лет (см. раздел 2. «Противопоказания»).

У детей следует избегать нанесения препарата на обширные поверхности кожи и под воздухо- и водонепроницаемые травматологические (окклюзионные) повязки.

Другие препараты и препарат Гиоксизон-Акрихин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Если Вы сомневаетесь относительно состава применяемых препаратов или возможности их совместного приема с препаратом Гиоксизон-Акрихин, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.11.2025 № 29695
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Беременность

Гиоксизон-Акрихин противопоказан во время беременности. Не применяйте препарат Гиоксизон-Акрихин, если Вы беременны.

Грудное вскармливание

Гиоксизон-Акрихин противопоказан в период грудного вскармливания. Не применяйте препарат Гиоксизон-Акрихин, если Вы кормите грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Гиоксизон-Акрихин не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Гиоксизон-Акрихин содержит метилпарагидроксибензоат

Гиоксизон-Акрихин содержит метилпарагидроксибензоат, который может вызывать аллергические реакции (в том числе, отсроченные).

3. Применение препарата Гиоксизон-Акрихин

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые

Препарат наносят тонким слоем 0,5–1 г 1–3 раза в сутки на пораженные участки или на стерильную марлю, которой прикрывают кожу, перевязав бинтом. Длительность лечения индивидуальна и зависит от степени поражения и локализации.

Курс лечения не должен превышать 14 дней. При применении на коже лица мазь наносится 1 раз в сутки тонким слоем или точечно на элементы, избегая нанесения в области глаз или периорбитальной области, при этом курс лечения не должен превышать 7–10 дней.

Применение у детей и подростков

Режим дозирования у детей в возрасте от 2 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

У детей старше 2-х лет применяют на ограниченных участках кожи коротким курсом (в течение 5–7 дней).

Эффективность и безопасность у детей в возрасте от 0 до 2 лет не установлены. Данные отсутствуют.

Путь и (или) способ введения

Наружно. Не наносите препарат на слизистые оболочки.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения будет определяться врачом и зависеть от степени поражения и локализации.

Если Вы применили препарата Гиоксизон-Акрихин больше, чем следовало

При применении препарата в течение длительного времени или в высоких дозах возможно подавление функции надпочечников с развитием вторичной надпочечниковой недостаточности и развитие симптомов повышенного выделения гормона кортизола (гиперкортицизм), таких как повышение уровня глюкозы в крови (гипергликемия), появление глюкозы в моче (глюкозурия), обратимое угнетение функции коры надпочечников,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.11.2025 № 29695
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

проявление синдрома Иценко-Кушинга (лунообразное лицо, ожирение, повышение аппетита, багровосинюшные полосы на коже).

Длительное лечение окситетрациклином в повышенных дозах может привести к росту нечувствительной микрофлоры.

В этих случаях рекомендуется отмена препарата, симптоматическая терапия и при необходимости – коррекция электролитных нарушений.

Если Вы прекратили применение препарата Гиоксизон-Акрихин

Не прекращайте применять препарат Гиоксизон-Акрихин без предварительного обсуждения с лечащим врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата Гиоксизон-Акрихин возможны раздражение кожи, зуд, сыпь, суперинфекция, аллергические реакции.

При применении на коже лица: видимые мелкие красные кровеносные сосуды (телеангиэктазии), истончение (атрофия) подкожной клетчатки в области рта.

При длительном применении и/или нанесении на большие поверхности – системные побочные эффекты глюкокортикостероидов.

Если Вы заметили какие-либо нежелательные реакции, перечисленные выше, сообщите врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или медицинской сестрой. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://roszdravnadzor.gov.ru/

5. Хранение препарата Гиоксизон-Акрихин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и тубе.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки как

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.11.2025 № 29695
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Гиоксизон-Акрихин содержит

Действующими веществами являются гидрокортизон + окситетрациклин.

Каждые 100 г мази содержат 1 г гидрокортизона (в виде гидрокортизона ацетата) и 3 г окситетрациклина (в виде окситетрациклина гидрохлорида).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: метилпарагидроксибензоат, парафин жидкий (вазелиновое масло), вазелин.

Препарат Гиоксизон-Акрихин содержит метилпарагидроксибензоат (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Гиоксизон-Акрихин и содержимое упаковки

Мазь для наружного применения.

Мазь желтого цвета.

По 10 г в тубу алюминиевую.

Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.11.2025 № 29695
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0006)

Прочие источники информации

Подробные сведения о лекарственном препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств.

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза https://grls.rosminzdrav.ru.