ЛП-№(001417)-(РГ-RU) от 13.07.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.07.2026 № 13403
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Акридерм, 0,05 %, мазь для наружного применения

Действующее вещество: бетаметазон

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Акридерм, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Акридерм.

3. Применение препарата Акридерм.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Акридерм.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Акридерм, и для чего его применяют

Препарат Акридерм содержит действующее вещество бетаметазон, которое относится к группе лекарственных средств: кортикостероиды, применяемые в дерматологии; кортикостероиды; кортикостероиды с высокой активностью (группа III).

Показания к применению

Препарат Акридерм применяется у взрослых и детей в возрасте от 1 года до 18 лет для лечения заболеваний кожи, поддающихся глюкокортикостероидной (гормональной) терапии:

- атопический дерматит;
- аллергический контактный дерматит;
- экзема (различные формы);
- контактный дерматит (в т. ч. профессиональный) и другие неаллергические дерматиты (в том числе солнечный и лучевой дерматиты);
- реакции на укусы насекомых;
- псориаз;
- буллезные дерматозы;
- дискоидная красная волчанка;
- красный плоский лишай;
- экссудативная многоформная эритема;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.07.2026 № 13403
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

- кожный зуд различной этиологии.

Способ действия препарата Акридерм

Акридерм относится к гормональным препаратам с противовоспалительным и противоаллергическим действием. При нанесении на поверхность пораженной кожи при ряде заболеваний, препарат оказывает быстрое и сильное действие в очаге воспаления, уменьшая покраснение, отек, зуд, раздражение, боль, утолщение и огрубение кожи, вызванное длительным расчесыванием.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Акридерм

Противопоказания

Не применяйте препарат Акридерм:

- если у Вас аллергия на бетаметазон или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас имеются бактериальные (туберкулез кожи, кожные проявления сифилиса), грибковые, вирусные (ветряная оспа, простой герпес) кожные заболевания;
- если у Вас есть реакция на коже после вакцинации;
- если у Вас открытые раны в области нанесения препарата;
- если у Вас трофические (хронические) язвы голени;
- если у Вас розацеа (розовые угри);
- если у Вас вульгарные угри (акне);
- если у Вас рак кожи;
- если у Вас невус («родинка», доброкачественное образование на коже);
- если у Вас атерома (доброкачественная киста сальной железы);
- если у Вас меланома (злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток кожи, слизистых оболочек или глаз);
- если у Вас гемангиома (доброкачественная опухоль, возникающая из кровеносных сосудов);
- если у Вас ксантома (доброкачественное накопление жировых клеток под кожей или в тканях в виде желтоватых бляшек или узелков);
- если у Вас саркома (редкая злокачественная опухоль соединительной ткани);
- если Вы кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Акридерм проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат Акридерм применяется для лечения подострых и хронических дерматозов, в том числе сухих, лихенизированных и шелушащихся поражений.

До применения препарата Акридерм обязательно сообщите врачу:

- если у Вас имеются следующие заболевания: катаракта (помутнение хрусталика), сахарный диабет (повышенный уровень глюкозы (сахара) в крови), глаукома (нарушение

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.07.2026 № 13403
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

оттока внутриглазной жидкости), туберкулез (инфекционное заболевание легких и других органов); в этом случае при длительном применении или нанесении на большие участки тела необходимо предварительно проконсультироваться с врачом;

- если при лечении Вашего заболевания требуется нанесение препарата на кожу лица. Длительное наружное применение препарата на коже лица не рекомендуется, так как возможно развитие состояний, связанных с покраснением и/или воспалением (розацеа, периоральный дерматит и акне). Непрерывный курс применения на лице не должен превышать 5 дней;
- если у Вас отмечаются нечеткость зрения или любые другие нарушения зрения, следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу. Необходимо избегать попадания препарата в глаза. При попадании препарата на слизистые оболочки глаза возможно развитие заболеваний органов зрения (катаракты, глаукомы, грибковых инфекций глаза и обострения герпетической инфекции).

Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед применением препарата на обширных участках кожи, под повязками или в области подмышек и паха, так как это увеличивает его всасывание и риск побочных действий.

Дети

У детей в возрасте от 1 года до 18 лет препарат Акридерм применяют только под врачебным контролем, так как возможно развитие системных нежелательных реакций. Необходимо исключать нанесение препарата Акридерм у детей под повязки (согревающие, фиксирующие, окклюзионные, в том числе под подгузники), так как это может приводить к усилению всасывания препарата, что увеличивает риск развития нежелательных реакций.

Непрерывный курс лечения у детей не должен превышать 5 дней.

Не применяйте препарат у детей в возрасте от 0 до 1 года, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Акридерм

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата Акридерм проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Препарат Акридерм следует применять во время беременности только в случае необходимости, то есть если ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода. Применение препарата во время беременности должно быть непродолжительным и ограничиваться небольшими участками кожи.

Грудное вскармливание

При применении препарата Акридерм грудное вскармливание следует прекратить.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Акридерм не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.07.2026 № 13403
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Препарат Акридерм содержит пропилпарагидроксибензоат

Данный лекарственный препарат содержит пропилпарагидроксибензоат. Пропилпарагидроксибензоат может вызывать аллергические реакции (возможно, отсроченные).

3. Применение препарата Акридерм

Всегда применяйте препарат Акридерм в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Наносите препарат тонким слоем на пораженный участок кожи 2 раза в день – утром и вечером, слегка втирая. На участки с более плотной кожей (например, локти, ладони и стопы), а также места, с которых препарат легко стирается, мазь можно наносить чаще.

Применение у детей

Дети в возрасте от 1 года до 18 лет: режим дозирования совпадает с режимом дозирования у взрослых. У детей курс лечения не должен превышать 5 дней.

Препарат следует применять с осторожностью и на максимально короткий срок.

Путь и (или) способ введения

Наружно.

Только для нанесения на кожу.

Продолжительность терапии

Курс непрерывного лечения у взрослых может продолжаться до устранения основных симптомов заболевания, но не более 4 недель. В течение года возможно неоднократное повторение терапии.

Если у Вас поражения кожи лица, Ваш курс лечения не должен превышать 5 дней.

У детей от 1 года до 18 лет курс лечения не должен превышать 5 дней.

Для уточнения продолжительности применения препарата обратитесь к лечащему врачу.

Если Вы применили препарата Акридерм больше, чем следовало

При длительном непрерывном использовании препарата возможно повышенное поступление компонентов препарата в кровоток что, в свою очередь, может приводить к повышенной вероятности развития системных нежелательных реакций, перечисленных в разделе 4 листка-вкладыша.

Если Вы применяли мазь слишком часто и/или слишком долго или случайно проглотили ее и почувствовали себя плохо, немедленно сообщите об этом своему врачу или работнику аптеки, либо обратитесь в приемное отделение ближайшей больницы. Может потребоваться промывание желудка, вызов рвоты, прием внутрь активированного угля. Не забудьте взять с собой упаковку препарата Акридерм или этот листок-вкладыш.

Если Вы забыли применить препарат Акридерм

Вы должны использовать лекарственный препарат с частотой, назначенной Вам лечащим врачом, так как регулярность приема делает лечение более эффективным. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Если Вы забыли применить препарат, не наносите на болезненный участок кожи двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Примените обычную дозу препарата Акридерм, как

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.07.2026 № 13403
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

только вспомните. Затем примените следующую дозу в обычное время. Однако, если уже почти пришло время для применения следующей дозы, не применяйте дозу, которую Вы пропустили.

Если Вы прекратили применение препарата Акридерм

Не прекращайте лечение, назначенное лечащим врачом.

Важно окончить курс лечения, даже если через несколько дней Вы почувствуете себя лучше. Если Вы прекратите применять препарат, симптомы заболевания могут возвратиться или ухудшиться.

Если Вы используете препарат Акридерм в течение длительного времени, прекращать его применение следует постепенно. Вам следует проконсультироваться с лечащим врачом, который постепенно уменьшит частоту использования мази, пока Вы полностью не прекратите лечение.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Акридерм может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При наружном применении препарата Акридерм нежелательные реакции, как правило, носят слабовыраженный характер.

При наружном применении препаратов с глюкокортикостероидами, к которым относится и бетаметазон, в месте их нанесения могут наблюдаться:

- кожный зуд, жжение, раздражение;
- сухость кожи;
- воспаление волосяных фолликулов (фолликулит);
- повышенный рост волос (гипертрихоз);
- растяжки на коже (стрии);
- угревые (акнеподобные) высыпания;
- временное осветление участков кожи в месте нанесения препарата (гипопигментация);
- покраснение кожи на лице, преимущественно вокруг рта, с одновременным появлением пузырьков розового или красного цвета (периоральный дерматит);
- зуд, сыпь, покраснение кожи (аллергический контактный дерматит);
- нечеткость зрения.

При длительном применении, а также использовании окклюзионных повязок могут наблюдаться:

- временное сморщивание эпидермиса в результате длительного переувлажнения участка кожи (мацерация кожи);
- вторичная инфекция на коже в области нанесения препарата;
- обратимое истончение кожи (атрофия кожи);
- усиление роста волос в месте нанесения препарата (местный гирсутизм);
- видимое расширение капилляров в коже или «сосудистые звездочки» (телеангиэктазия);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.07.2026 № 13403
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

- потница;
- мелкие высыпания красного цвета на коже (пурпура).

При нанесении на обширные поверхности тела, в основном у детей, возможно возникновение системных нежелательных реакций глюкокортикостероидов, к которым относится и бетаметазон:

- проявление избытка кортикостероидов (повышение концентрации сахара в крови, появление сахара в моче, ожирение, «лунообразное» лицо);
- снижение концентрации гормона кортизола в крови (обратимое угнетение функции коры надпочечников).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Телефон: +7 (800) 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

5. Хранение препарата Акридерм

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и тубе.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре от 15 до 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Акридерм содержит

Действующим веществом является бетаметазон.

Каждый грамм препарата содержит 0,5 мг бетаметазона микронизированного (в виде дипропионата).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: пропилпарагидроксибензоат, парафин жидкий (вазелиновое масло), изопропилмиристат, вазелин.

Препарат Акридерм содержит пропилпарагидроксибензоат (см. раздел 2).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 07.07.2026 № 13403
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Внешний вид препарата Акридерм и содержимое упаковки

Мазь для наружного применения.

Полупрозрачная мазь от белого до белого с желтоватым оттенком цвета.

По 15 или 30 г в тубу алюминиевую.

Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).