ЛП-№(001202)-(РГ-RU) от 30.10.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.10.2026 № 20560
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

Листок-вкладыш - информация для пациента

Акридерм, 0,05 %, крем для наружного применения

Действующее вещество: бетаметазон

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат, является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Акридерм, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Акридерм.

3. Применение препарата Акридерм.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Акридерм.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Акридерм, и для чего его применяют

Препарат Акридерм содержит действующее вещество бетаметазон.

Препарат Акридерм относится к группе: кортикостероиды, применяемые в дерматологии; кортикостероиды; кортикостероиды с высокой активностью (группа III).

Показания к применению

Препарат Акридерм применяется у взрослых и детей в возрасте от 1 года до 18 лет.

Заболевания кожи, поддающиеся глюкокортикостероидной терапии:

- атопический дерматит;
- аллергический контактный дерматит;
- экзема (различные формы);
- контактный дерматит (в т. ч. профессиональный) и другие неаллергические дерматиты (в том числе солнечный и лучевой дерматиты);
- реакции на укусы насекомых;
- псориаз;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.10.2026 № 20560
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

- заболевания, сопровождающиеся образованием крупных пузырей на коже (буллезные дерматозы);
- дискоидная красная волчанка;
- красный плоский лишай;
- острое заболевание кожи, чаще инфекционно-аллергического и токсико-аллергического происхождения, характеризующееся появлением на коже пятен синюшно-красного цвета, бугорков, пузырьков и поверхностных дефектов (экссудативная многоформная эритема);
- кожный зуд различной этиологии.

Способ действия препарата Акридерм

Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, сосудосуживающее, противозудное действие. При нанесении на поверхность кожи препарат оказывает быстрое и выраженное действие в очаге воспаления, уменьшая выраженность объективных симптомов (покраснение, отек, усиление кожного рисунка) и субъективных ощущений (зуд, раздражение, боль).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Акридерм

Противопоказания

Не применяйте препарат Акридерм:

- если у Вас аллергия на бетаметазон или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас диагностированы бактериальные (туберкулез кожи, кожные проявления сифилиса), грибковые, вирусные (ветряная оспа, простой герпес) кожные заболевания;
- если у Вас диагностированы кожные поствакцинальные реакции;
- если у Вас имеются открытые раны;
- если у Вас имеются трофические язвы голени;
- если у Вас диагностирована розацеа;
- если у Вас диагностированы вульгарные угри;
- если у Вас диагностирован рак кожи;
- если у Вас диагностирован невус (родинки);
- если у Вас диагностирована атерома (киста подкожной сальной железы, «жировик»);
- если у Вас диагностирована меланома (злокачественное заболевание кожи);
- если у Вас диагностирована гемангиома (сосудистое образование);
- если у Вас диагностирована ксантома (доброкачественное новообразование кожи желто-белого цвета);
- если у Вас диагностирована саркома (злокачественное образование);
- если Вы кормите ребенка грудью.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.10.2026 № 20560
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Акридерм проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не применяйте препарат длительно и не наносите его на большие участки тела без консультации специалиста, если у Вас имеются следующие заболевания: катаракта, сахарный диабет, глаукома, туберкулез.

Не рекомендуется длительное наружное применение препарата на коже лица, так как возможно развитие состояний, связанных с покраснением и/или воспалением (розацеа, периоральный дерматит и акне). Непрерывный курс применения на лице не должен превышать 5 дней.

Необходимо избегать попадания препарата в глаза. При попадании препарата на слизистые оболочки глаза возможно развитие заболеваний органов зрения (катаракты, глаукомы, грибковых инфекций глаза и обострения герпетической инфекции). Если у Вас отмечаются нечеткость зрения или любые другие нарушения зрения, следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

При продолжительном лечении, при нанесении препарата на обширные поверхности кожи и под повязки, увеличивающие проникновение препарата в кожу, а также при нанесении в подмышечных впадинах и паховых складках, возможно повышенное поступление компонентов препарата в кровоток.

Дети

Не применяйте препарат у детей в возрасте от 0 до 1 года поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

У детей в возрасте от 1 года до 18 лет препарат применяют только под врачебным контролем, так как возможно развитие системных нежелательных реакций. Необходимо исключать нанесение препарата у детей в возрасте от 1 года до 18 лет под повязки (в том числе подгузники), так как это может приводить к усилению всасывания препарата, что увеличивает риск развития нежелательных явлений. Непрерывный курс лечения у детей не должен превышать 5 дней.

Другие препараты и препарат Акридерм

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Взаимодействие препарата Акридерм с другими лекарственными средствами не выявлено.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Акридерм проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат Акридерм следует применять во время беременности только в случае необходимости, т. е. если ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода. Применение препарата во время беременности должно быть непродолжительным и ограничиваться небольшими участками кожи.

При применении препарата грудное вскармливание следует прекратить.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Акридерм не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.10.2026 № 20560
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

Препарат Акридерм содержит метилпарагидроксибензоат

Препарат Акридерм содержит метилпарагидроксибензоат, который при местном применении может вызывать аллергические реакции (в том числе отсроченные).

Препарат Акридерм содержит пропиленгликоль

Препарат Акридерм содержит 50 мг пропиленгликоля в каждом грамме. Пропиленгликоль, может вызывать раздражение кожи.

3. Применение препарата Акридерм

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Препарат наносят на пораженный участок кожи тонким слоем 2 раза в день (утром и вечером), слегка втирая. На участки с более плотной кожей (например, локти, ладони и стопы), а также места, с которых препарат легко стирается, препарат можно наносить чаще.

Акридерм крем применяется для лечения в острую воспалительную фазу заболевания, в том числе для мокнущих поражений кожи.

Применение у детей

Режим дозирования для детей в возрасте от 1 года до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых. У детей курс лечения не должен превышать 5 дней.

Путь и (или) способ введения

Наружно.

Продолжительность терапии

Курс непрерывного лечения у взрослых может продолжаться до устранения основных симптомов заболевания, но не более 4 недель. В течение года возможно неоднократное повторение терапии.

У детей, а также у взрослых пациентов с поражениями кожи лица курс лечения не должен превышать 5 дней.

Если Вы применили препарата Акридерм больше, чем следовало

Если Вы применили больше, чем назначенная доза препарата, немедленно обратитесь к Вашему врачу.

При длительном непрерывном использовании возможно повышенное поступление компонентов препарата в кровоток, что может приводить к повышенной вероятности развития системных нежелательных реакций, описанных в разделе 4.

Если Вы забыли применить препарат Акридерм

Если Вы пропустите применение дозы, примените ее, как только Вы об этом вспомните. Если Вы об этом не вспомните до времени применения Вашей следующей дозы, не применяйте пропущенную дозу и вернитесь к Вашему обычному графику применения. Не применяйте двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили применение препарата Акридерм

Если Вы используете препарат Акридерм в течение длительного времени, прекращать его применение следует постепенно. Вам следует проконсультироваться с лечащим врачом,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.10.2026 № 20560
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

который постепенно уменьшит частоту использования крема, пока Вы полностью не прекратите лечение.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. При наружном применении нежелательные реакции, как правило, носят слабовыраженный характер.

Прекратите применение препарата Акридерм и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих признаков аллергической реакции:

- затрудненное дыхание или глотание;
- отек лица, губ, языка или горла.

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Акридерм.

При наружном применении глюкокортикостероидов в месте их нанесения могут наблюдаться:

- кожный зуд, жжение, раздражение;
- сухость кожи;
- воспаление волосяных фолликулов (фолликулит);
- повышенный рост волос (гипертрихоз);
- растяжки на коже (стрии);
- акнеподобные (угревые) высыпания;
- временное осветление участков кожи в месте нанесения препарата (гипопигментация);
- покраснение кожи на лице, преимущественно вокруг рта, с одновременным появлением пузырьков розового или красного цвета (периоральный дерматит);
- зуд, сыпь, покраснение кожи (аллергический контактный дерматит);
- нарушения зрения, в том числе нечеткость зрения.

При длительном применении глюкокортикостероидов, а также использовании окклюзионных повязок могут наблюдаться:

- временное сморщивание эпидермиса в результате длительного переувлажнения участка кожи (мацерация кожи);
- вторичная инфекция на коже в области нанесения препарата;
- обратимое истончение кожи (атрофия кожи);
- усиление роста волос в месте нанесения препарата (местный гирсутизм);
- видимое расширение капилляров в коже или «сосудистые звездочки» (телеангиэктазия);
- потница;
- мелкие высыпания пурпурного цвета на коже (пурпура).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.10.2026 № 20560
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

При нанесении на обширные поверхности тела, в основном у детей, возможно возникновение системных нежелательных реакций глюкокортикостероидов:

- проявления избытка кортикостероидов (повышение концентрации сахара в крови, появление сахара в моче, ожирение, «лунное» лицо);
- снижение концентрации гормона кортизола в крови (обратимое угнетение функции коры надпочечников).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: www.roszdravnadzor.gov.ru

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-линия, 25

Телефон: +996 (312) 21-92-88

Телефон «Горячей линии»: 008 800 26 26

Тел. Факс: +996 (312) 21-05-08

Электронная почта: dlsmi@pharm.kg

Сайт: http://www.pharm.kg/

5. Хранение препарата Акридерм

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и тубе.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Акридерм содержит:

Действующим веществом является бетаметазон.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.10.2026 № 20560
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0012)

1 г препарата содержит: бетаметазона дипропионата (бетаметазона дипропионата микронизированного) в пересчете на бетаметазон – 0,5 мг.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: метилпарагидроксибензоат, парафин твердый, вазелин, пропиленгликоль, парафин жидкий, воск эмульсионный, динатрия эдетат (трилон Б), натрия сульфит, вода очищенная.

Препарат Акридерм содержит метилпарагидроксибензоат (см. раздел 2).

Препарат Акридерм содержит пропиленгликоль (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Акридерм и содержимое упаковки

Крем для наружного применения.

Крем белого или почти белого цвета.

По 15, 30 или 50 г в тубу алюминиевую с бушоном из полимерных материалов. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий, следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

Российская Федерация, Кыргызская Республика

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»

(АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03 (Российская Федерация), +996 99 901-50-45 (Кыргызская Республика)

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru, adversereaction@drugsafety.ru

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.