ЛП-№(006028)-(РГ-RU) от 27.05.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.05.2026 № 10164
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Метопролол-Акрихин, 50 мг, таблетки

Действующее вещество: метопролол

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Метопролол-Акрихин, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Метопролол-Акрихин.

3. Прием препарата Метопролол-Акрихин.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Метопролол-Акрихин.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Метопролол-Акрихин, и для чего его применяют

Препарат Метопролол-Акрихин содержит действующее вещество метопролол, относящееся к группе: бета-адреноблокаторы; селективные бета-адреноблокаторы.

Показания к применению

Препарат Метопролол-Акрихин применяется у взрослых в возрасте от 18 лет:

- для лечения повышенного артериального давления (артериальной гипертензии): для снижения артериального давления и уменьшения риска сердечно-сосудистой и связанной с сосудами сердца (коронарной) смерти (включая внезапную смерть);
- для лечения заболевания сердца, при котором возникают боли, связанные с недостаточным кровоснабжением сердечной мышцы (стенокардия);
- для лечения нарушений ритма сердца, включая наджелудочковую (суправентрикулярную) тахикардию;
- в комплексной терапии после инфаркта миокарда;
- при функциональных нарушениях сердечной деятельности, сопровождающихся ускоренным сердцебиением (тахикардия);
- для профилактики приступов определенного типа головной боли (мигрени);

при повышенной функции щитовидной железы (гипертиреозе) в комплексной терапии.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.05.2026 № 10164
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Способ действия препарата Метопролол-Акрихин

Препарат Метопролол-Акрихин защищает сердце от чрезмерной активности. Сердечная недостаточность возникает, когда сердечная мышца слаба и не может перекачивать достаточное количество крови для поддержания работы всего организма. В результате своего действия метопролол делает процесс перекачивания крови более эффективным, способствует снижению артериального давления и восстановлению нормального ритма сердечных сокращений.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Метопролол-Акрихин

Противопоказания

Не принимайте препарат Метопролол-Акрихин:

– если у Вас аллергия на метопролол, другие бета-блокаторы или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);

– если у Вас есть нарушение проведения электрических импульсов в сердце – атриовентрикулярная блокада II и III степени;

– если у Вас сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;

– если Вы постоянно или периодически принимаете лекарственные препараты, повышающие артериальное давление (инотропные средства) за счет стимуляции рецепторов адреналина (бета-адреномиметики);

– если у Вас значительно снижена частота сердечных сокращений (клинически значимая синусовая брадикардия);

– если Вы страдаете тяжелым нарушением сердечного ритма, называемым синдромом слабости синусового узла (у пациентов без функционирующего постоянного электрокардиостимулятора);

– если у Вас возникло резкое снижение артериального давления с угнетением сознания, вызванное тем, что Ваше сердце не работает должным образом (кардиогенный шок);

– если у Вас есть выраженные нарушения кровообращения в конечностях (периферического кровообращения);

– если у Вас снижено артериальное давление (артериальная гипотензия);

– если у Вас острый инфаркт миокарда, сопровождающийся урежением сердечного ритма до 45 ударов в минуту, изменениями на электрокардиограмме (увеличение интервала PQ) или низким систолическим («верхним») артериальным давлением (менее 100 мм рт. ст.);

– если у Вас серьезные заболевания периферических сосудов и имеется угроза омертвения тканей (гангрены);

– если Вам необходимо внутривенное введение так называемых блокаторов «медленных» кальциевых каналов типа верапамила (см. также разделы «Особые указания и меры предосторожности» и «Другие препараты и препарат Метопролол-Акрихин»).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Метопролол-Акрихин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

До начала приема препарата Метопролол-Акрихин обязательно сообщите врачу:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.05.2026 № 10164
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

– если у Вас есть нарушение проведения электрических импульсов в сердце – атриовентрикулярная блокада I степени. Применение метопролола может ухудшить Ваше состояние, поэтому врачу потребуется уменьшить дозу препарата или отменить его;

– если у Вас особый вариант стенокардии – стенокардия Принцметала. В этом случае врач может пересмотреть Ваше лечение;

– если у Вас есть заболевания легких, сопровождающиеся сужением просвета бронхов и затруднением дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких). Некоторые бета-блокаторы могут ухудшать течение таких заболеваний;

– если у Вас заболевание, при котором нарушена способность организма усваивать глюкозу (сахарный диабет). Метопролол может влиять на углеводный обмен или маскировать признаки снижения уровня глюкозы в крови (гипогликемии);

– если у Вас подтверждена сниженная функция почек (почечная недостаточность). В подобных случаях врач предпримет дополнительные меры для оценки Вашего состояния;

– если Вы будете применять лекарственные препараты, которые называются блокаторами «медленных» кальциевых каналов;

– если у Вас в настоящее время хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;

– если у Вас возникло закисление крови (метаболический ацидоз) или Вы применяете лекарственные препараты, называемые сердечными гликозидами. В подобных случаях врач предпримет дополнительные меры для оценки Вашего состояния;

– если у Вас есть опухоль надпочечников (феохромоцитома). В таком случае врач дополнительно назначит Вам лекарственные препараты из группы альфа-адреноблокаторов;

– если у Вас есть тяжелое нарушение работы печени (цирроз). В подобных случаях Вам будут требоваться меньшие дозы препарата;

– если Вам предстоит хирургическое вмешательство. В случае хирургического вмешательства следует проинформировать врача-анестезиолога, что Вы принимаете бета-адреноблокатор;

– если Вы предрасположены к аллергическим реакциям. У пациентов, принимающих бета-адреноблокаторы, серьезные аллергические реакции (анафилактический шок) протекают в более тяжелой форме;

– если Вы собираетесь прекратить применение препарата. Следует избегать резкой отмены препарата. При необходимости отмены препарата ее следует проводить постепенно. У большинства пациентов прием препарата можно отменить за 14 дней. Дозу препарата снижают постепенно, в несколько приемов, до достижения конечной дозы 25 мг 1 раз в сутки. Пациенты с ишемической болезнью сердца должны находиться под тщательным наблюдением врача во время отмены препарата.

Это важно для того, чтобы врач в полной мере смог оценить, насколько безопасно Вам принимать данный препарат и потребуется ли соблюдение особых мер предосторожности.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Метопролол-Акрихин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.05.2026 № 10164
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Некоторые лекарственные препараты могут повлиять на действие препарата Метопролол-Акрихин или увеличить вероятность развития нежелательных реакций. Препарат Метопролол-Акрихин также может повлиять на действие некоторых других лекарственных препаратов.

Препарат Метопролол-Акрихин не следует принимать совместно со следующими препаратами:

– фенобарбитал – препарат из группы производных барбитуровой кислоты (барбитурат);

– пропафенон – средство для лечения нарушений сердечного ритма;

– верапамил – средство для лечения нарушений сердечного ритма и нарушений кровоснабжения сердца из группы блокаторов «медленных» кальциевых каналов.

Обязательно сообщите врачу, если Вы принимаете какой-либо из следующих препаратов, так как он может принять решение о необходимости коррекции их дозы:

– препараты для лечения нарушений сердечного ритма из группы антиаритмических средств I класса (например, дизопирамид);

– амиодарон – средство для лечения нарушений сердечного ритма из группы антиаритмических средств III класса;

– дилтиазем – средство для лечения нарушений сердечного ритма и нарушений кровоснабжения сердца из группы блокаторов «медленных» кальциевых каналов;

– препараты, применяемые для устранения жара, боли и других признаков воспаления, называемые нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП);

– дифенгидрамин – средство от аллергии (антигистаминное средство);

– эпинефрин (адреналин) – средство для повышения артериального давления, используемое при шоковых состояниях;

– хинидин – средство для лечения нарушений сердечного ритма из группы антиаритмических средств IA класса;

– клонидин – средство для снижения артериального давления;

– рифампицин – антибактериальное средство, применяемое для лечения туберкулеза;

– препараты, применяемые для лечения сердечной недостаточности, называемые сердечными гликозидами;

– другие лекарственные средства, в том числе: циметидин; гидралазин; препараты, содержащие этанол; так называемые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как пароксетин, флуоксетин и сертралин; ингибиторы моноаминоксидазы (МАО); глазные капли, содержащие другие бета-адреноблокаторы;

– средства для анестезии, подающиеся через маску (ингаляционные анестетики);

– средства для лечения сахарного диабета, принимаемые внутрь (пероральные гипогликемические средства).

Если Вы не уверены, что перечисленное выше не применимо к Вам, проконсультируйтесь у лечащего врача.

Препарат Метопролол-Акрихин с алкоголем

Не принимайте препарат Метопролол-Акрихин совместно с алкоголем, поскольку алкоголь может повышать концентрацию метопролола в крови, что усиливает его действие.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.05.2026 № 10164
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Применение препарата не рекомендуется во время беременности. Препараты, относящиеся к группе метопролола (бета-адреноблокаторы) могут способствовать уменьшению плацентарного кровотока, что может приводить к замедлению роста плода, внутриутробной гибели плода, выкидышу и преждевременным родам. Если прием препарата необходим, врач будет тщательно следить за плодом, а затем и за новорожденным в течение нескольких дней (48–72 часа) после родов, так как возможно чрезмерное снижение частоты сердечных сокращений (брадикардия), угнетение дыхания, снижение артериального давления и гипогликемия.

Грудное вскармливание

Применение препарата в период грудного вскармливания не рекомендуется. Если прием препарата необходим, врач будет тщательно следить за новорожденным из-за риска развития брадикардии. При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания, грудное вскармливание следует прекратить.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат может вызывать головокружение и общую слабость (см. раздел 4). При появлении данных симптомов воздержитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами.

Препарат Метопролол-Акрихин содержит лактозу

Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

Препарат Метопролол-Акрихин содержит натрий

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на одну таблетку, то есть, по сути, не содержит натрия.

3. Прием препарата Метопролол-Акрихин

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Артериальная гипертензия

По 100–200 мг препарата Метопролол-Акрихин однократно утром или в 2 приема (утром и вечером). При необходимости врач может повысить дозу или добавить другое средство для лечения артериальной гипертензии.

Стенокардия

По 100–200 мг в сутки в два приема (утром и вечером). При необходимости врач может добавить другое средство для лечения стенокардии.

Нарушения ритма сердца

По 100–200 мг в сутки в 2 приема (утром и вечером). При необходимости врач может добавить другое средство для лечения аритмии.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.05.2026 № 10164
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

В комплексной терапии после инфаркта миокарда

Лечение в остром периоде

При развитии симптомов, указывающих на острый инфаркт миокарда, следует как можно скорее начать внутривенное введение метопролола, которое проводится в условиях кардиореанимации или аналогичном. Если Вы хорошо перенесли внутривенное введение полной дозы препарата (15 мг), через 15 минут после последней внутривенной инъекции Вам назначат препарат Метопролол-Акрихин в дозе 50 мг 4 раза в сутки. Прием препарата нужно будет продолжать в течение 48 часов.

Если Вы не перенесли внутривенное введение полной дозы препарата (15 мг), препарат Метопролол-Акрихин назначат в более низкой дозе.

Поддерживающая терапия

Поддерживающая доза составляет 200 мг в сутки в 2 приема (утром и вечером).

Функциональные нарушения сердечной деятельности, сопровождающиеся тахикардией

По 100 мг препарата Метопролол-Акрихин 1 раз в сутки, рекомендуется принимать таблетки утром. При необходимости врач может увеличить дозу до 200 мг.

Профилактика приступов мигрени

По 100–200 мг в сутки в 2 приема (утром и вечером).

Гипертиреоз

По 150–200 мг в сутки в 3–4 приема.

Путь и (или) способ введения

Внутрь. Таблетки следует принимать натощак.

Продолжительность терапии

Принимайте препарат так долго, как рекомендует лечащий врач.

Если Вы приняли препарата Метопролол-Акрихин больше, чем следовало

Если Вы приняли слишком много препарата Метопролол-Акрихин, немедленно обратитесь к врачу. Последствиями передозировки препарата Метопролол-Акрихин могут быть выраженное снижение артериального давления, замедление сердечного ритма (брадикардия), сердечная недостаточность, другие нарушения работы сердца и сосудов, в том числе остановка сердца, а также бронхоспазм, нарушение сознания или кома, тошнота, рвота и посинение конечностей (цианоз). При развитии любых признаков передозировки Вам потребуется медицинская помощь.

Если Вы забыли принять препарат Метопролол-Акрихин

Вы должны использовать препарат с частотой, назначенной Вам лечащим врачом, или как указано в листке-вкладыше, так как регулярность приема делает лечение более эффективным. Тем не менее, если Вы забыли принять лекарственный препарат, используйте следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили прием препарата Метопролол-Акрихин

Не прекращайте прием препарата без консультации с врачом, так как симптомы заболевания могут вернуться. Прекращать прием препарата Метопролол-Акрихин следует постепенно (см. также «Особые указания и меры предосторожности»).

Резкое прекращение лечения может привести к ухудшению состояния, особенно если Вы страдаете заболеваниями сердца и сосудов.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.05.2026 № 10164
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Метопролол-Акрихин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Метопролол-Акрихин и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих признаков серьезных нежелательных реакций:

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

– резкое снижение артериального давления с угнетением сознания, вызванное нарушением работы сердца после перенесенного инфаркта (кардиогенный шок);

– спазм мышц бронхов (бронхоспазм) у пациентов с бронхиальной астмой, приводящий к затруднению дыхания.

Другие нежелательные реакции, которые могут возникать при приеме препарата Метопролол-Акрихин

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

– повышенная утомляемость.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

– головокружение;

– головная боль;

– урежение частоты сердечных сокращений (брадикардия);

– ощущение сердцебиения;

– снижение артериального давления при резком изменении положения тела (ортостатическая гипотензия), которое может привести к обмороку;

– холодные конечности;

– одышка при физической нагрузке;

– тошнота;

– боль в животе;

– диарея;

– запор.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

– увеличение массы тела;

– длительно сохраняющееся подавленное настроение (депрессия);

– ослабление внимания;

– сонливость или бессонница;

– ночные кошмары;

– нарушения чувствительности, проявляющиеся покалыванием или жжением (парестезии);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.05.2026 № 10164
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

– временное усиление симптомов сердечной недостаточности;

– нарушения проведения электрических импульсов в сердце (атриовентрикулярная блокада I степени);

– рвота;

– высыпания на коже, сопровождающиеся зудом (крапивница);

– повышенная потливость;

– судороги.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

– повышенная нервная возбудимость;

– тревожность;

– нарушение зрения;

– сухость и/или раздражение глаз;

– воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивит);

– нарушения проводимости электрических импульсов в сердце;

– нарушение сердечного ритма (аритмия);

– воспаление слизистой оболочки носа (ринит);

– сухость во рту;

– нарушение функции печени;

– выпадение волос;

– импотенция/сексуальная дисфункция.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

– снижение количества кровяных пластинок, называемых тромбоцитами (тромбоцитопения);

– потеря памяти (амнезия), нарушение памяти;

– подавленность;

– галлюцинации;

– нарушение вкусовых ощущений;

– звон в ушах;

– омертвение тканей нижних конечностей (гангрена) у пациентов с предшествующими тяжелыми нарушениями периферического кровообращения;

– воспаление печени (гепатит);

– повышенная чувствительность кожи к солнечному свету (фотосенсибилизация);

– обострение течения кожного заболевания, вызывающего покраснение, зуд и шелушение кожи (псориаз);

– боль в суставах (артралгия).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.05.2026 № 10164
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Метопролол-Акрихин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и контурной ячейковой упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке (в пачке).

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Метопролол-Акрихин содержит

Действующим веществом является метопролол.

Каждая таблетка содержит 50 мг метопролола тартрата.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат, кремния диоксид коллоидный, крахмал картофельный, повидон (тип К25), карбоксиметилкрахмал натрия, магния стеарат.

Препарат Метопролол-Акрихин содержит лактозу, натрий (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Метопролол-Акрихин и содержимое упаковки

Таблетки.

Таблетки белого с сероватым или желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические, с фаской.

По 10, 15 или 30 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

3 или 6 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток, или 2 или 4 контурные ячейковые упаковки по 15 таблеток, или 1 или 2 контурные ячейковые упаковки по 30 таблеток вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.05.2026 № 10164
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru/ (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).