ЛП-№(007131)-(РГ-RU) от 01.10.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.09.2026 № 18493
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Комфодерм М$_2$, 0,1 % + 2 %, крем для наружного применения

Действующие вещества: метилпреднизолона ацепонат и мочевина

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Комфодерм М$_2$, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Комфодерм М$_2$.

3. Применение препарата Комфодерм М$_2$.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Комфодерм М$_2$.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Комфодерм М$_2$, и для чего его применяют

Препарат Комфодерм М$_2$ содержит действующие вещества: метилпреднизолона ацепонат и мочевину.

Препарат Комфодерм М$_2$ относится к группе: кортикостероиды, применяемые в дерматологии; кортикостероиды в комбинации со средствами; кортикостероиды с высокой активностью в комбинации со средствами.

Показания к применению

Препарат Комфодерм М$_2$ показан к применению у взрослых от 18 лет для лечения воспалительных заболеваний кожи, чувствительных к терапии топическими глюкокортикостероидами и сопровождающихся нарушением кератинизации (процессов отмирания и ороговения клеток в верхнем защитном слое кожи):

- атопический дерматит, нейродермит;
- истинная экзема (хроническое воспалительное кожное заболевание, сопровождающееся зудом, покраснением и высыпаниями в виде маленьких пузырьков с жидкостью);
- микробная экзема;
- простой контактный дерматит;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.09.2026 № 18493
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- аллергический (контактный) дерматит;
- дисгидротическая экзема.

Способ действия препарата Комфодерм М$_2$

Комфодерм М$_2$ – комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

При наружном применении Комфодерм М$_2$ подавляет воспалительные и аллергические кожные реакции, а также реакции, связанные с усиленным делением клеток кожи, что приводит к уменьшению объективных симптомов воспаления (покраснение (эритема), отек, мокнутие) и субъективных ощущений (зуд, раздражение, боль и т. д.).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Комфодерм М$_2$

Противопоказания

Не применяйте препарат Комфодерм М$_2$:

- если у Вас аллергия на метилпреднизолона ацепонат, мочевину или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас диагностированы туберкулезный или сифилитический процессы в области нанесения препарата;
- если у Вас диагностированы вирусные заболевания (например, ветряная оспа, опоясывающий лишай);
- если у Вас диагностированы воспалительные поражения кожи красного/розового цвета (розацеа), специфическое воспаление кожи в области верхней губы и подбородка (периоральный дерматит) в области нанесения препарата;
- если у Вас имеются участки кожи с проявлениями реакции на вакцинацию;
- у детей в возрасте младше 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Комфодерм М$_2$ проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

До начала применения препарата Комфодерм М$_2$ обязательно сообщите врачу о том, что у Вас диагностированы бактериальные дерматозы и/или заболевания кожи, вызванные грибковой инфекцией (дерматомикозы). В дополнение к терапии препаратом Комфодерм М$_2$ Ваш врач может назначить специфическое антибактериальное или антимикотическое лечение.

Препарат не предназначен для применения в офтальмологии. Следует избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

Как и при применении глюкокортикостероидов, оказывающих действие на весь организм (системное действие), после наружного применения глюкокортикостероидов может развиться повышение внутриглазного давления (глаукома) (например, при применении больших доз, вследствие очень длительного применения окклюзионных повязок или нанесения на кожу вокруг глаз).

На коже лица чаще, чем на других поверхностях тела, после длительного лечения глюкокортикостероидами наружного применения могут появляться атрофические изменения – истончение кожи, шелушение, сухость.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.09.2026 № 18493
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Дети и подростки

Препарат Комфодерм М$_2$ противопоказан детям в возрасте от 0 до 18 лет (см. раздел 2. «Противопоказания»).

Другие препараты и препарат Комфодерм М$_2$

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не выявлено, однако следует учитывать, что одновременное применение препарата Комфодерм М$_2$ с другими мазями или кремами может привести к усилению обратного всасывания (резорбции) входящих в их состав лекарственных веществ.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При необходимости применения препарата Комфодерм М$_2$ во время беременности и лактации Ваш лечащий врач тщательно взвесит потенциальный риск для плода и ребенка и ожидаемую пользу лечения для матери. В эти периоды не рекомендуется длительное применение препарата на обширных поверхностях кожи.

Если Вы кормите ребенка грудью, Вам не следует наносить препарат на молочные железы.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Комфодерм М$_2$ не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Комфодерм М$_2$ содержит пропиленгликоль

Данный лекарственный препарат содержит 50 мг пропиленгликоля в каждом 1 г крема. Пропиленгликоль может вызывать раздражение кожи.

Препарат Комфодерм М$_2$ содержит метилпарагидроксибензоат

Данный лекарственный препарат содержит метилпарагидроксибензоат, который может вызывать аллергические реакции (возможно, отсроченные).

3. Применение препарата Комфодерм М$_2$

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем и с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Препарат наносят 1 раз в сутки тонким слоем на пораженные участки кожи.

Путь и (или) способ введения

Наружно.

Продолжительность терапии

Как правило, длительность непрерывного ежедневного лечения препаратом Комфодерм М$_2$ не должна превышать 12 недель.

При лечении пациентов с поражением кожи лица курс лечения не должен превышать 5 дней.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.09.2026 № 18493
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Если Вы применили препарата Комфодерм М$_2$ больше, чем следовало

Если Вы применили больше, чем назначенная доза препарата, немедленно обратитесь к Вашему врачу.

Не было выявлено какого-либо риска острой интоксикации при чрезмерном однократном кожном применении (нанесение препарата на большую площадь при условиях, благоприятных для абсорбции) или при непреднамеренном приеме внутрь.

При чрезмерно долгом и/или интенсивном наружном применении глюкокортикостероидов может развиться атрофия кожи (истончение кожи, «сосудистые звездочки» (телеангиэктазии), «растяжки» (стрии)).

При появлении признаков атрофии кожи необходимо прекратить применение препарата.

При наружном применении мочевины передозировка маловероятна.

Если Вы забыли применить препарат Комфодерм М$_2$

Если Вы пропустите применение дозы, примените ее, как только Вы об этом вспомните. Если Вы об этом не вспомните до времени применения Вашей следующей дозы, не применяйте пропущенную дозу и вернитесь к Вашему обычному графику применения. Не применяйте двойную дозу препарата.

Если Вы прекратили применение препарата Комфодерм М$_2$

Продолжайте применять этот препарат так долго, сколько назначит Ваш врач. Вы не должны прекращать применение этого препарата, не проконсультировавшись предварительно со своим врачом.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение препарата Комфодерм М$_2$ и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих симптомов серьезных нежелательных реакций

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- затрудненное дыхание или глотание;
- отек лица, губ, языка или горла.

Это может означать, что у Вас развилась серьезная аллергическая реакция, для лечения которой необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Комфодерм М$_2$

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- специфическое воспаление кожи в области верхней губы и подбородка (периоральный дерматит);
- появление участков неравномерно окрашенной кожи (депигментация кожи);
- аллергические реакции на один из компонентов препарата (например, сыпь, зуд);
- воспаление волосяных фолликулов (фолликулит);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.09.2026 № 18493
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- избыточный рост волос на всех участках тела и головы (гипертрихоз).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- зуд;
- жжение;
- покраснение кожи (эритема);
- образование сыпи в виде пузырьков (везикулезной сыпи).

При применении препарата более 4-х недель и/или на площади 10 % и более поверхности тела:

- атрофия кожи;
- «сосудистые звездочки» (телеангиэктазии);
- «растяжки» (стрии);
- угреподобные (акнеподобные) изменения кожи;
- действие на весь организм (системные эффекты), обусловленное всасыванием (абсорбцией) глюкокортикостероида.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Комфодерм М$_2$

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и на тубе.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 ºС.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Комфодерм М$_2$ содержит

Действующими веществами являются метилпреднизолона ацепонат и мочевина.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.09.2026 № 18493
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Каждые 100 г крема содержат 0,1 г метилпреднизолона ацепоната (метилпреднизолона ацепоната микронизированного) (в пересчете на 100 % вещество), 2 г мочевины (в пересчете на 100 % вещество).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: парафин жидкий (вазелиновое масло), пропиленгликоль, полисорбат-80, карбомер интерполимер (тип А), трометамол, метилпарагидроксибензоат, вода очищенная.

Препарат Комфодерм $М_2$ содержит пропиленгликоль и метилпарагидроксибензоат (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Комфодерм $М_2$ и содержимое упаковки

Крем для наружного применения.

Крем белого или почти белого цвета. Допускается наличие слабого специфического запаха.

По 10 или 30 г в тубу алюминиевую с бушоном из полимерных материалов (полиэтилен или полипропилен). Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3.

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.