ЛП-№(001848)-(РГ-RU) от 23.06.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.06.2026 № 11462
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Микозорал, 2 %, мазь для наружного применения

Действующее вещество: кетоконазол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки или медицинской сестры.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 28 дней, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Микозорал, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Микозорал.

3. Применение препарата Микозорал.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Микозорал.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Микозорал, и для чего его применяют

Препарат Микозорал содержит действующее вещество кетоконазол, относящееся к фармакотерапевтической группе «противогрибковые средства, применяемые в дерматологии; противогрибковые средства для наружного применения; производные имидазола и триазола».

Показания к применению

Препарат Микозорал применяется у взрослых в возрасте от 18 лет для лечения грибковых инфекций (микозов) кожи, вызванных чувствительными к кетоконазолу возбудителями: грибковых инфекций паха, стоп, кистей рук или других областей тела (паховой эпидермофитии, эпидермофитии кистей и стоп, дерматомикоза гладкой кожи, кандидоза кожи и отрубевидного (разноцветного) лишая), кожной инфекции с образованием красновато-коричневых пятен и шелушением в виде жирных или сухих чешуек, как «перхоть» на голове (себорейном дерматите), вызванной *Pityrosporum ovale*.

Способ действия препарата Микозорал

Кетоконазол может замедлять рост или уничтожать грибковые клетки (фунгистатическое и фунгицидное действие) путем блокировки образования важных для строительства клеточной стенки грибков соединений, таких как эргостерол, триглицериды и фосфолипиды.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.06.2026 № 11462
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 28 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Микозорал

Противопоказания

Не применяйте препарат Микозорал:

- если у Вас аллергия на кетоконазол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Во время лечения следует соблюдать общие правила гигиены. Микозорал не следует применять при нарушении целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения мази.

Перед применением препарата Микозорал проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат предназначен только для наружного применения. Избегайте попадания мази в глаза!

Дети и подростки

Не давайте препарат детям и подросткам в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность применения лекарственного препарата Микозорал в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Микозорал

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Взаимодействие кетоконазола при наружном применении и других лекарственных средств не описано.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Если Вы беременны или кормите грудью, врач примет решение о возможности лечения препаратом Микозорал. Данных о применении кетоконазола при беременности или кормлении грудью нет.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Микозорал не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Микозорал содержит пропиленгликоль

Пропиленгликоль может вызывать раздражение кожи. Данный лекарственный препарат содержит 200 мг пропиленгликоля в 1 г мази.

Препарат Микозорал содержит клещевины обыкновенной семян масло (касторовое масло)

Клещевины обыкновенной семян масло (касторовое масло) может вызывать кожные реакции.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.06.2026 № 11462
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Препарат Микозорал содержит метилпарагидроксибензоат (нипагин)

Метилпарагидроксибензоат (нипагин) может вызывать аллергические реакции (возможно, отсроченные).

Препарат Микозорал содержит бутилгидрокситолуол (дибунол)

Бутилгидрокситолуол (дибунол) может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек.

3. Применение препарата Микозорал

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

При грибковых инфекциях паха, стоп, кистей рук или других областей тела (при паховой эпидермофитии, эпидермофитии кистей и стоп, дерматомикозе гладкой кожи, кандидозе кожи и отрубевидном лишае) Ваш врач назначит нанесение мази на пораженную и непосредственно прилегающую к ней область 1 раз в сутки.

При кожных инфекциях с образованием красновато-коричневых пятен и шелушением в виде жирных или сухих чешуек, как «перхоть» на голове (себорейном дерматите) мазь наносят на пораженную область 1–2 раза в сутки, в зависимости от тяжести поражения.

Путь и (или) способ введения

Наружно.

Продолжительность терапии

Врач назначит Вам лечение от 2 до 6 недель. Не применяйте препарат чаще и дольше, чем рекомендовано Вашим врачом.

Продолжайте лечение, по крайней мере, несколько дней после исчезновения симптомов заболевания. Если улучшение не отмечено после 4 недель лечения, обратитесь к врачу.

Если Вы применили препарата Микозорал больше, чем следовало

Если наносить слишком много мази, это может привести к покраснению (эритема), отеку и ощущению жжения на коже, которые обычно исчезают после прекращения терапии.

При случайном приеме мази внутрь незамедлительно проведите промывание желудка и обратитесь за медицинской помощью.

Если Вы забыли применить препарат Микозорал

Не наносите двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили применение препарата Микозорал

Не отменяйте препарат без консультации с врачом. Самостоятельная отмена препарата может привести к возобновлению симптомов.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.06.2026 № 11462
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Прекратите применение препарата Микозорал и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих симптомов аллергии:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- покраснение (эритема) и зуд в месте нанесения.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- появление на коже пузырей, наполненных жидкостью (буллезная сыпь);
- повышенная чувствительность;
- воспаление кожи;
- раздражение кожи.

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- появление зудящих волдырей на коже, похожих на ожог крапивой (крапивница).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Микозорал:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- жжение кожи.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- воспаление кожи при контакте с некоторыми веществами (контактный дерматит);
- сыпь;
- шелушение кожи;
- липкость кожи;
- кровотечение;
- неприятное ощущение (дискомфорт);
- сухость кожи;
- расстройства чувствительности, напоминающие «мурашки», онемение, покалывание без причин (парестезия);
- реакции в месте нанесения.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550 99 03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://roszdravnadzor.gov.ru/

5. Хранение препарата Микозорал

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.06.2026 № 11462
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и тубе.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Микозорал содержит

Действующим веществом является кетоконазол.

Каждые 100 г мази содержат 2 г кетоконазола.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: пропиленгликоль, кармеллоза натрия, клещевины обыкновенной семян масло (касторовое масло), моноглицериды дистиллированные, воск эмульсионный, метилпарагидроксибензоат (нипагин), бутилгидрокситолуол (дибунол), вода очищенная.

Препарат Микозорал содержит пропиленгликоль, клещевины обыкновенной семян масло (касторовое масло), метилпарагидроксибензоат (нипагин), бутилгидрокситолуол (дибунол) (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Микозорал и содержимое упаковки

Мазь для наружного применения.

Мазь от белого до белого с кремоватым или розоватым оттенком цвета, со слабым специфическим запахом.

По 15 г в тубу алюминиевую с бушоном из полимерных материалов (полиэтилен или полипропилен).

Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация
Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)
142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29
Телефон: +7 (495) 702-95-03
Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация
Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН)
142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий, следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.06.2026 № 11462
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0007)

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»
(АО «АКРИХИН»)
142450, Московская обл., г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29
Телефон: +7 (495) 702-95-03
Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://www.grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).