ЛП-№(003195)-(РГ-RU) от 01.09.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.08.2026 № 17002
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Грелорта, 90 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: тикагрелор

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Грелорта, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Грелорта.

3. Прием препарата Грелорта.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Грелорта.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Грелорта, и для чего его применяют

Препарат Грелорта содержит действующее вещество тикагрелор, которое относится к группе «антитромботические средства; антиагреганты, кроме гепарина».

Показания к применению

Препарат Грелорта, применяемый одновременно с ацетилсалициловой кислотой, назначается взрослым в возрасте от 18 лет:

- для профилактики атеротромботических событий у пациентов с острым коронарным синдромом (нестабильной стенокардией, инфарктом миокарда без подъема сегмента ST или инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST [STEMI]), включая пациентов, получавших лекарственную терапию, и пациентов, подвергнутых чрескожному коронарному вмешательству или аортокоронарному шунтированию;
- для профилактики инсульта у пациентов с острым ишемическим инсультом или транзиторной ишемической атакой.

Способ действия препарата Грелорта

Препарат Грелорта влияет на клетки, называемые «тромбоцитами». Тромбоциты — это очень маленькие клетки крови. Задача тромбоцитов — помочь остановить кровотечение. Когда кровеносный сосуд поврежден, они склеиваются между собой, помогая образовать тромб. Это останавливает кровотечение.

Однако тромб также может образовываться внутри поврежденного кровеносного сосуда. Это может быть очень опасно, потому что:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.08.2026 № 17002
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

- тромб может полностью перекрыть движение крови по сосуду, ведущему к сердцу — это может вызвать сердечный приступ (инфаркт миокарда);
- тромб может частично закупорить кровеносный сосуд, ведущий к сердцу, и уменьшить приток крови к сердцу. Это может вызвать боль в груди, которая повторяется (называемую «нестабильной стенокардией»);
- тромб может полностью перекрыть движение крови по сосуду, ведущему в головной мозг — это может вызвать инсульт.

Препарат Грелорта помогает предотвратить склеивание тромбоцитов, что снижает вероятность образования тромба, который может закрыть просвет кровеносного сосуда. Это означает, что препарат Грелорта снижает у Вас вероятность повторного сердечного приступа (инфаркта миокарда) или инсульта, или смерти от заболевания, связанного с сердцем или кровеносными сосудами.

Скорее всего, лечащий врач также посоветует Вам принимать ацетилсалициловую кислоту. Это вещество присутствует во многих лекарственных препаратах, применяемых для предотвращения тромбообразования.

Если улучшение не наступило, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Грелорта

Противопоказания

Не принимайте препарат Грелорта:

- если у Вас аллергия на тикагрелор или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас кровотечение, такое как кровотечение из язвы желудка или кишечника (активное патологическое кровотечение);
- если у Вас было кровоизлияние в мозг (внутричерепное кровоизлияние);
- если у Вас тяжелое заболевание печени (печеночная недостаточность тяжелой степени);
- если Вы одновременно принимаете мощные ингибиторы CYP3A4, например, какие-либо из следующих препаратов:
  - кетоконазол (применяется для лечения грибковых инфекций);
  - кларитромицин (применяется для лечения бактериальных инфекций);
  - нефазодон (антидепрессант);
  - ритонавир и атазанавир (применяются для лечения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)).
- если Вы беременны или кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Грелорта проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Обязательно предупредите Вашего лечащего врача, если:

- у Вас повышенный риск кровотечения из-за:
  - недавней серьезной травмы;
  - недавней операции (в том числе стоматологической);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.08.2026 № 17002
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

  - заболевания, которое влияет на свертываемость крови;
  - недавнего желудочного или кишечного кровотечения (например, из язвы желудка или полипов толстой кишки);
  - умеренных нарушений функции печени.
- Вам предстоит операция (в том числе стоматологическая) в то время, когда Вы принимаете препарат Грелорта. Это связано с повышенным риском кровотечения. Лечащий врач может порекомендовать Вам приостановить прием препарата Грелорта за 5 дней до операции;
- у Вас очень медленный сердечный ритм, и Вам еще не установлено устройство, регулирующее ритм Вашего сердца (электрокардиостимулятор);
- у Вас бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких или другое заболевание легких, или затрудненное дыхание;
- у Вас возникает нерегулярное дыхание;
- у Вас были нарушения функции печени, или ранее было какое-нибудь заболевание, которое могло повлиять на печень;
- Вы сдавали анализ крови, который показал большее, чем обычно, содержание мочевой кислоты;
- Вы старше 75 лет;
- у Вас имеются нарушения работы почек;
- Вы принимаете препараты для снижения артериального давления из группы антагонистов рецепторов ангиотензина II (АРА II). К ним относятся, например: лозартан, валсартан, кандесартан;
- Вы одновременно принимаете препарат Грелорта и применяете гепарин. Лечащему врачу может потребоваться образец Вашей крови для проведения диагностического теста, если он подозревает редкое нарушение функции тромбоцитов, вызываемое гепарином. Важно сообщить лечащему врачу о том, что Вы одновременно принимаете препарат Грелорта и применяете гепарин, поскольку препарат Грелорта может оказать влияние на результат этого диагностического теста;
- Вы одновременно принимаете какие-либо другие препараты (см. подраздел «Другие препараты и препарат Грелорта» раздела 2 листка-вкладыша).

Если что-либо из перечисленного выше относится к Вам (или Вы не уверены), перед приемом препарата Грелорта проконсультируйтесь с лечащим врачом и/или стоматологом.

Сообщите лечащему врачу, если во время лечения препаратом Грелорта Вы отметили (также см. раздел 4 листка-вкладыша):

- **ощущение нехватки воздуха (одышка)**. Это может быть связано с Вашим заболеванием сердца или какой-либо другой причиной, или являться нежелательной реакцией на препарат Грелорта. Одышка, обусловленная приемом тикагрелора, как правило, легкая и характеризуется внезапным, неожиданным ощущением нехватки воздуха, обычно возникающим в состоянии покоя; она может появиться в первые недели терапии и у многих может исчезнуть. Если ощущение нехватки воздуха усиливается или длится долгое время, сообщите об этом лечащему врачу. Лечащий врач решит, необходимо ли Вам лечение или дальнейшее обследование;
- **признаки нерегулярного дыхания (центральное апноэ сна и дыхание Чейна — Стокса)**. Центральное апноэ сна связано с нерегулярным дыханием и может

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.08.2026 № 17002
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

возникать у пациентов с заболеванием сердца, инсультом или по другим причинам. Сообщите лечащему врачу, если у Вас появились эпизоды нерегулярного дыхания, такие как учащение дыхания, замедление дыхания или короткие паузы в дыхании. Лечащий врач решит, нужно ли Вам дальнейшее обследование.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Грелорта

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Это необходимо потому, что препарат Грелорта может повлиять на действие некоторых препаратов, и некоторые препараты могут повлиять на действие препарата Грелорта.

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете какие-либо из следующих препаратов:

- рифампицин (применяют для лечения бактериальных инфекций, в том числе туберкулеза);
- фенитоин (применяют для лечения судорожных припадков);
- карбамазепин (применяют для лечения судорожных припадков);
- фенобарбитал (применяют для лечения судорожных припадков и как успокоительное средство);
- дигоксин (применяют для лечения нарушений сердечного ритма и сердечной недостаточности);
- циклоспорин (применяют для снижения избыточной реакции иммунной системы);
- статины (а именно: симвастатин, ловастатин, аторвастатин, розувастатин — применяют для снижения содержания холестерина в крови);
- блокаторы «медленных» кальциевых каналов (например, дилтиазем, верапамил — применяют для лечения нарушений сердечного ритма, повышенного артериального давления и ишемической болезни сердца);
- хинидин (применяют для лечения нарушений сердечного ритма);
- флуконазол (применяют для лечения грибковых инфекций);
- ампренавир (применяют для лечения ВИЧ-инфекции);
- эритромицин (применяют для лечения бактериальных инфекций);
- апрепитант (применяют для лечения тошноты и рвоты во время лечения рака);
- блокаторы бета-адренорецепторов (например, метопролол, бисопролол — применяют для лечения нарушений сердечного ритма, повышенного артериального давления, ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности);
- морфин (применяют для уменьшения сильной боли);
- цизаприд (применяют для лечения изжоги);
- алкалоиды спорыньи (например, эрготамин — применяют для лечения некоторых видов головной боли);
- этинилэстрадиол (входит в состав препаратов, которые применяют для контрацепции и лечения заболеваний половой системы у женщин);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.08.2026 № 17002
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

- левоноргестрел (применяют для контрацепции и лечения заболеваний половой системы у женщин);
- десмопрессин (применяют для лечения определенных нарушений мочеиспускания и гормональных нарушений).

Особенно важно сообщить лечащему врачу о том, что Вы принимаете какие-либо из следующих препаратов, которые увеличивают риск кровотечения:

- пероральные антикоагулянты (например, варфарин — применяют для уменьшения образования тромбов);
- антикоагулянты группы гепарина (например, гепарин, эноксапарин — применяют для уменьшения образования тромбов);
- фибринолитики (например, стрептокиназа, алтеплаза — применяют для растворения внутрисосудистых тромбов);
- нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибупрофен, напроксен — применяют для уменьшения боли и воспаления, снижения повышенной температуры тела);
- селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (например, пароксетин, сертралин, циталопрам — применяют для лечения депрессии);
- нефазодон (применяют для лечения депрессии);
- кетоконазол (применяют для лечения грибковых инфекций);
- кларитромицин (применяют для лечения бактериальных инфекций);
- ритонавир (применяют для лечения ВИЧ-инфекции и гепатита С);
- атазанавир (применяют для лечения ВИЧ-инфекции).

Препарат Грелорта с пищей и напитками

Сообщите лечащему врачу, если Вы употребляете грейпфрутовый сок в больших объемах (например, по 200 мл 3 раза в сутки).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Не принимайте препарат Грелорта, если Вы беременны или планируете беременность. Женщинам следует использовать надежные методы контрацепции, чтобы избежать беременности в период лечения препаратом Грелорта.

Грудное вскармливание

Не принимайте препарат Грелорта, если Вы кормите грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Маловероятно, что препарат Грелорта окажет влияние на Вашу способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Если во время лечения препаратом Грелорта у Вас возникает головокружение или спутанность сознания, будьте осторожны при управлении транспортными средствами или работе с механизмами.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.08.2026 № 17002
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Препарат Грелорта содержит натрий

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на 1 таблетку, то есть, по сути, «не содержит натрия».

3. Прием препарата Грелорта

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза:

Начальная доза составляет 2 таблетки 90 мг одновременно (нагрузочная доза 180 мг). Эту дозу обычно дают в медицинском учреждении.

После приема начальной дозы обычная доза составляет 1 таблетку 90 мг 2 раза в сутки.

Принимайте препарат Грелорта ежедневно примерно в одно и то же время (например, 1 таблетку утром и 1 таблетку вечером).

Скорее всего, лечащий врач также назначит Вам ацетилсалициловую кислоту в низкой дозе. Лечащий врач скажет Вам, в какой именно дозе ее принимать.

Путь и (или) способ введения

Вы можете принимать таблетку внутрь независимо от приема пищи.

Если у Вас возникли затруднения с проглатыванием таблетки (таблеток)

Если у Вас возникли затруднения с проглатыванием таблетки (таблеток), ее (их) можно измельчить и размешать в питьевой воде следующим образом:

- измельчите таблетку (таблетки) до состояния мелкого порошка;
- всыпьте порошок в половину стакана питьевой воды;
- размешайте и сразу же выпейте;
- чтобы убедиться, что препарат не остался в стакане, ополосните его дополнительной половиной стакана питьевой воды и выпейте.

В некоторых случаях врач может назначить Вам введение препарата через зонд, установленный в желудке.

Продолжительность применения

После острого коронарного синдрома лечение рекомендуется проводить в течение 12 месяцев, после острого ишемического инсульта или транзиторной ишемической атаки — в течение 30 дней, если только лечащий врач не назначит иначе.

Через 1 год после острого коронарного синдрома лечащий врач может продолжить Ваше лечение препаратом в более низкой дозе (таблетки 60 мг) 2 раза в сутки.

Если Вы приняли препарата Грелорта больше, чем следовало

Если Вы приняли препарата Грелорта больше, чем следовало, свяжитесь с врачом или незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение. Возьмите упаковку с препаратом с собой. У Вас может быть повышен риск развития кровотечения, а также могут наблюдаться нарушения работы сердца и одышка.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.08.2026 № 17002
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Если Вы забыли принять препарат Грелорта

Если Вы забыли принять препарат Грелорта, примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили прием препарата Грелорта

Не прекращайте прием препарата Грелорта, не проконсультировавшись с лечащим врачом.

Принимайте препарат до тех пор, пока лечащий врач назначает Вам его. Если Вы хотите прекратить прием препарата, сначала проконсультируйтесь с лечащим врачом. Это необходимо потому, что оценка риска и пользы препарата Грелорта основана на регулярном приеме препарата.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Грелорта и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения следующих признаков серьезных нежелательных реакций:

- признаки кровотечения, такие как:
  - тяжелое кровотечение или кровотечение, которое невозможно остановить, или продолжительное кровотечение;
  - моча розового, красного или коричневого цвета (гематурия) (часто — могут возникать не более чем у 1 человека из 10);
  - рвота красной кровью или рвота, которая выглядит как «кофейная гуща», красный или черный стул (похожий на деготь) (признаки желудочно-кишечного кровотечения) (часто — могут возникать не более чем у 1 человека из 10);
  - кашель с кровью или сгустками крови (кровохарканье) (часто — могут возникать не более чем у 1 человека из 10);
  - внутреннее кровотечение (например, ретроперитонеальное кровотечение), признаками которого могут быть головокружение и ощущение дурноты (нечасто — могут возникать не более чем у 1 человека из 100).
- признаки определенного типа инсульта, который вызван кровоизлиянием в мозг (внутричерепное кровоизлияние) (нечасто — могут возникать не более чем у 1 человека из 100), такие как:
  - внезапное онемение или слабость руки, ноги или лица, в особенности если они проявляются только с одной стороны тела;
  - внезапная спутанность сознания, нарушение речи или затруднения с пониманием других;
  - внезапное нарушение ходьбы или потеря равновесия или координации;
  - внезапное головокружение или внезапная сильная головная боль без видимой причины.
- обморок (синкопе) (часто — могут возникать не более чем у 1 человека из 10):
  - временная потеря сознания из-за резкого снижения притока крови к мозгу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.08.2026 № 17002
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

- признаки нарушения свертываемости крови, называемого тромботической тромбоцитопенической пурпурой, такие как:
  - лихорадка и пурпурные пятна (называемые пурпурой) на коже или во рту, с пожелтением кожи или глаз (желтуха) или без него, необъяснимая сильная усталость или спутанность сознания. Сообщалось о развитии тромботической тромбоцитопенической пурпуры у небольшого количества пациентов, получавших тикагрелор (частота неизвестна — на основании имеющихся данных оценить невозможно).
- признаки тяжелой аллергической реакции, включая ангионевротический отек (нечасто — могут возникать не более чем у 1 человека из 100):
  - отек лица, губ, ротоглотки или языка, который может затруднять дыхание или глотание.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы заметили что-либо из следующего (также см. подраздел «Сообщите лечащему врачу, если во время лечения препаратом Грелорта Вы отметили» раздела 2 листка-вкладыша):

- ощущение нехватки воздуха (одышка) (очень часто — могут возникать более чем у 1 человека из 10);
- признаки нерегулярного дыхания (центральное апноэ сна и дыхание Чейна — Стокса) — может возникать у небольшого числа пациентов, принимающих тикагрелор (частота неизвестна — на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Грелорта

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- повышение концентрации мочевой кислоты в крови (гиперурикемия) обнаруживают при анализе крови;
- склонность к образованию кровоподтеков, кровоподтеки без видимых причин (спонтанные гематомы), повышенная кровоточивость (геморрагический диатез) — признаки кровотечения, вызванного заболеванием крови.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- кровоподтеки (экхимоз), кровоизлияния в кожу, маленькие красные или пурпурные точечные пятна на коже, вызванные кровоизлиянием из капилляров (петехии) — признаки подкожного или кожного кровоизлияния;
- носовое кровотечение;
- головокружение;
- ощущение, что комната вращается (вертиго);
- головная боль;
- понос (диарея);
- тошнота;
- расстройство пищеварения (диспепсия);
- запор;
- кожный зуд;
- кожная сыпь;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.08.2026 № 17002
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

- сильная боль и припухлость суставов — возможные признаки подагры и подагрического артрита, которые связаны с повышенным содержанием мочевой кислоты в крови;
- головокружение, ощущение дурноты или помутнение зрения — признаки низкого артериального давления;
- более сильное кровотечение, чем обычно, после операции или медицинской манипуляции, после порезов (например, во время бритья), после травмы (например, ушиб, гематома, травматическое кровотечение);
- кровотечение из десен;
- кровотечение из язвы желудка;
- повышение содержания креатинина в крови (обнаруживают при анализе крови).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- спутанность сознания;
- кровоизлияние в глаз (например, в конъюнктиву, в сетчатку глаза, внутриглазное кровоизлияние);
- кровотечение из влагалища, которое сильнее или происходит в другое время по сравнению с обычным менструальным кровотечением, кровь в сперме, кровотечение из влагалища у женщин в постменопаузе — признаки кровотечения из половых путей;
- кровотечение из опухоли (например, кровотечение из опухоли (рак) мочевого пузыря, из опухоли (рак) желудка, из опухоли (рак) толстой кишки);
- кровоизлияние в ухо;
- болезненный отек суставов или мышц — признаки кровоизлияния в суставы или мышцы.

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- медленный сердечный ритм (брадиаритмия);
- нарушение в электрической системе сердца, которое выявляется при электрокардиографии (атриовентрикулярная блокада).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.08.2026 № 17002
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер., д. 2а

Телефон/факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rceth@rceth.by

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.rceth.by

5. Хранение препарата Грелорта

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:» и блистере.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Грелорта содержит

Действующим веществом является тикагрелор.

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 90 мг тикагрелора.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: маннитол (Е421), кальция гидрофосфат дигидрат, гипромеллоза 2910, карбоксиметилкрахмал натрия (тип А), магния стеарат; пленочная оболочка: гипромеллоза 2910, титана диоксид, тальк, макрогол 8000, краситель железа оксид желтый (Е 172).

Препарат Грелорта содержит натрий (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Грелорта и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой светло-желтого цвета. На изломе ядро белого или почти белого цвета.

По 10, 12 или 20 таблеток в блистер из пленки поливинилхлоридной/ поливинилиденхлоридной (ПВХ/ПВДХ) и фольги алюминиевой.

6 или 18 блистеров по 10 таблеток или 5 или 15 блистеров по 12 таблеток или 3 или 9 блистеров по 20 таблеток вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.08.2026 № 17002
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон: +7 (495) 702-95-03

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Республика Беларусь

ООО «Акрихин БиУай»

220005, г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 4, пом. 17

Телефон: +375 17 368 59 98

Адрес электронной почты: office@akrikhin.by

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.