ЛП-№(004990)-(РГ-RU) от 08.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.07.2026 № 14144
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Клотримазол-Акрихин, 1 %, раствор для наружного применения

Действующее вещество: клотримазол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Клотримазол-Акрихин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Клотримазол-Акрихин.
3. Применение препарата Клотримазол-Акрихин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Клотримазол-Акрихин.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Клотримазол-Акрихин, и для чего его применяют

Препарат Клотримазол-Акрихин содержит действующее вещество клотримазол, которое относится к группе: противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии; противогрибковые препараты для местного применения; производные имидазола и триазола.

Клотримазол действует на некоторые микроскопические грибы, которые вызывают различные инфекции.

Показания к применению

Препарат Клотримазол-Акрихин показан к применению у взрослых при:

- грибковых заболеваниях кожи, кожных складок, стоп;
- отрубевидном лишае, эритразме, поверхностных кандидозах, вызванных дерматофитами, дрожжевыми (включая род *Candida*), плесневыми и другими грибами и возбудителями, чувствительными к клотримазолу;
- грибковых инфекциях (микозах), осложненных гнойной инфекцией кожи (вторичной пиодермией).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.07.2026 № 14144
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Способ действия препарата Клотримазол-Акрихин

Клотримазол воздействует на грибковые клетки, тормозит их размножение или уничтожает их.

Если улучшение не наступило, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Клотримазол-Акрихин

Противопоказания

Не применяйте препарат Клотримазол-Акрихин :

- если у Вас аллергия на клотримазол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если Вы беременны (в I триместре беременности).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Клотримазол-Акрихин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат Клотримазол-Акрихин следует применять только наружно. Не наносите препарат на кожу в области глаз.

Если во время лечения препаратом Клотримазол-Акрихин у Вас возникли какие-либо аллергические реакции (например, сильный зуд, сыпь или волдыри) или признаки раздражения (например, покраснение, зуд или отек) в месте нанесения препарата, **прекратите применение препарата и обратитесь к врачу**.

Если через 4 недели терапии у Вас сохраняются симптомы, обратитесь к врачу для проведения дополнительного обследования.

Другие препараты и препарат Клотримазол-Акрихин

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

В частности, сообщите лечащему врачу, если Вы применяете:

- другие противогрибковые средства (амфотерицин В, нистатин, натамицин), так как при одновременном применении эффективность клотримазола может снижаться.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не принимайте препарат Клотримазол-Акрихин, если Вы беременны (в I триместре беременности). Ваш врач примет решение о необходимости применения препарата Клотримазол-Акрихин, если Вы находитесь во II и III триместре беременности.

Не наносите препарат непосредственно на молочную железу при грудном вскармливании.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Клотримазол-Акрихин при наружном применении не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Клотримазол-Акрихин содержит этанол

Данный лекарственный препарат содержит до 8,28 г спирта (безводного этанола) в одном флаконе (15 мл), что эквивалентно 552 мг/мл.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.07.2026 № 14144
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

Может вызывать чувство жжения на поврежденной коже.

У новорожденных (недоношенных и доношенных новорожденных младенцев) высокие концентрации этанола могут приводить к тяжелым локальным реакциям и системной токсичности ввиду значительной абсорбции через незрелую кожу.

3. Применение препарата Клотримазол-Акрихин

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Наносите раствор тонким слоем на предварительно очищенные (с применением мыла с нейтральным значением pH) и сухие пораженные участки кожи 2 раза в день (утром и вечером) и осторожно втирайте.

Путь и (или) способ введения

Наружно.

Продолжительность терапии

Лечение следует продолжать до устранения симптомов заболевания.

Лечение поражения кожных покровов и их придатков (ногти и волосы) грибковыми инфекциями (дерматомикозов) продолжайте не менее 4 недель, отрубевидного лишая – 1–3 недели.

При грибковых заболеваниях кожи ног продолжайте лечение еще в течение не менее 2 недель после устранения симптомов заболевания.

Если Вы применили препарата Клотримазол-Акрихин больше, чем следовало

Если Вы или Ваш ребенок нанесли или случайно проглотили слишком много препарата Клотримазол-Акрихин, **обратитесь к врачу.** По возможности покажите врачу упаковку препарата Клотримазол-Акрихин.

Признаки передозировки клотримазолом в случае его непреднамеренного приема внутрь включают головокружение, тошноту и рвоту.

Если Вы забыли применить препарат Клотримазол-Акрихин

Если Вы забыли нанести препарат в обычное время, нанесите препарат, как только вспомните об этом. Не наносите двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Клотримазол-Акрихин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Клотримазол-Акрихин

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- аллергические реакции: зудящие волдыри на коже (*крапивница*), отек, сыпь, покраснение кожи (*эритема*);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.07.2026 № 14144
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

- местные реакции: жжение, зуд, шелушение кожи, нарушения чувствительности, проявляющиеся покалыванием или жжением (*парестезии*), раздражение в местах нанесения препарата.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Клотримазол-Акрихин

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на этикетке флакона и картонной пачке после слов «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25°С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Клотримазол-Акрихин содержит

Действующим веществом является клотримазол.

Каждый мл раствора содержит 10 мг клотримазола.

Каждый флакон объемом 15 мл содержит 150 мг клотримазола.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются изопропилмиристат, этанол 99,9 %.

Препарат Клотримазол-Акрихин содержит этанол (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Клотримазол-Акрихин и содержимое упаковки

Препарат Клотримазол-Акрихин представляет собой раствор для наружного применения.

Прозрачная, бесцветная жидкость с характерным запахом.

По 15 мл во флаконы темного стекла, укупоренные пробкой-капельницей и навинчивающейся крышкой из полиэтилена с контролем первого вскрытия.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.07.2026 № 14144
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0005)

1 флакон вместе с листком-вкладышем помещают в картонную пачку.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Польша

Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО

ул. Пельплиньска 19, 83-200 Старогард Гданьски

Телефон: +48 58 5631600

Факс: +48 58 5622353

Адрес электронной почты: phv@polpharma.com

Производитель

Польша

Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО

Отдел Медана в Серадзе

ул. Владислава Локетка 10, 98-200 Серадз

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»)

142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

Телефон: +7 (495) 702-95-03.

Адрес электронной почты: info@akrikhin.ru

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) http://grls.rosminzdrav.ru/ (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).