

Анафилактический шок в анамнезе, поливалентная аллергия, аллергия на сою, арахис, куриные яйца;

Острые респираторные и инфекционные заболевания;

Обострение хронических заболеваний;

Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя, наркотиков;

Психические нарушения, деменция (МКБ10 F00-F03);

Неконтролируемое течение СД с гликемией натощак >11 ммоль/л, либо инсулин-зависимый СД;

«Полный желудок» - прием твердой и молочной пищи менее чем за 6 часов и прозрачных жидкостей менее чем за 2 часа до анестезии;

ОНМК/ ТИА менее 9 месяцев назад;

ОИМ менее 6 мес назад;

Нестабильная стенокардия;

Тяжелое течение патологии клапанного аппарата сердца;

Неконтролируемая АГ $>180/100$ мм рт ст;

Импантированный кардиостимулятор, кардиовертер-дефибриллятор;

ХСН с Фв <49 %;

Нарушения ритма сердца;

Хроническая обструктивная болезнь легких высокого риска осложнений (GOLD 3-4), обострение;

ХОБЛ;

Обострение или неконтролируемое течение бронхиальной астмы;

Тяжелая легочная гипертензия IV класса (>111 мм.рт ст);

Беременность;

Острая кровопотеря;

Криз серповидно-клеточной анемии;

Миастения;

Фармакорезистентная эпилепсия (с наличием судорожных приступов на фоне лечения);

Гематологические заболевания, сопровождающиеся нарушением свертывающей системы крови (МКБ 10 D65-D 69);

Преклонный возраст (>80 лет);

Хроническая почечная недостаточность 5ст;

Цирроз печени (класс В,С по Чайлд-пью), острые заболевания печени;

Морбидное ожирение (ИМТ >40);

Трахеостомия в анамнезе, стеноз гортани, трахеи, опухоли полости рта, основания языка, глотки, гортани, трахеи, лучевая терапия на данные области в анамнезе;

Синдром Дауна;

Для детей дополнительно:

- менее недели от последней вакцинации
- дети-инвалиды с которыми затруднен контакт (аутизм, синдром Дауна, ДЦП, ЗПР).