



ИНСТРУКЦИЯ

по применению СалФид для снижения уровня патогенной микрофлоры в кормах и предотвращения роста плесневых грибов в кормовом сырье и кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птицы

I. Общие сведения

1. «СалФид» - кормовая добавка для снижения уровня патогенной микрофлоры в кормах и предотвращения роста плесневых грибов в кормовом сырье и кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.
2. Кормовая добавка в своем составе содержит: муравьиную кислоту* – 20%, пропионовую кислоту* – 20%, уксусную кислоту* – 20%, наполнитель - карбонат кальция, диоксид кремния.
Не содержит генно-модифицированных продуктов.
3. Кормовая добавка представляет собой порошок от белого до светло-серого цвета, с кислым запахом, плохо растворимый в воде.
4. Выпускают добавку расфасованной по 25 кг в бумажные многослойные мешки с полиэтиленовым вкладышем. Каждую единицу фасовки маркируют этикеткой на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия добавки, состава, массы нетто, гарантированных показателей, назначения, способа применения, номера партии, срока годности и условий хранения, даты изготовления, надписи «Для животных», номера государственной регистрации и снабжают инструкцией по применению.
5. Хранят добавку в упаковке организации-производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от минус 0° С до 30° С.
Срок годности - 24 месяца со дня изготовления.
Не использовать добавку по истечении срока годности.

II. Биологические свойства.

6. Применение СалФид обусловлено антибактериальными свойствами и способностью снижать количество патогенных бактерии в кормах и кормовом сырье для сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.

7. Органические кислоты в составе добавки препятствуют росту и размножению плесневых грибов в кормовом сырье и кормах в период хранения, предотвращает накопление в них микотоксинов, способствует сохранению питательной ценности корма.

В рекомендуемых дозах не токсичен, легко метаболизируется в организме.

III. Порядок применения.

8. Кормовую добавку применяют для снижения уровня патогенной микрофлоры в кормах и предотвращения роста плесневых грибов в кормовом сырье и кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птицы
9. Вводят на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств с использованием существующих технологий ступенчатого смешивания.
Норма ввода:
 - 1 -3 кг /1 т готового корма;
 - 3-5 кг /1 т мясо-костной, костной муки или других ингредиентов животного происхождения;
 - 3- 5 кг/1 т рыбной муки.
10. Побочных явлений и осложнений при применении добавки не выявлено. Противопоказаний не установлено.
11. Совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.
12. Продукцию, полученную от сельскохозяйственных животных и птицы после применения кормовой добавки СалФид используют в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики.

13. При работе с кормовой добавкой необходимо использовать защитные очки, перчатки ПВХ, защитную одежду, обеспечить вентиляцию рабочих помещений и хранилищ. При недостаточной системе кондиционирования воздуха использовать респиратор.
14. Избегать попадания добавки в глаза и кожу. При вдыхании вывести/выйти на свежий воздух. При контакте с кожей сменить загрязненную одежду, промыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть в течение 15 мин в проточной воде.
15. СалФид следует хранить в местах недоступных для детей.

Рекомендации по применению разработаны ООО «Фидэксперт» Россия.

(Адрес организации-производителя: 352700, Россия, Краснодарский край, , г.Тимашевск, ул.Транспортная, 10г. [Http://feedexpert.ru](http://feedexpert.ru)

E-mail: feedexpert@feedexpert.ru).

*Кислоты используются в виде солей