

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП)



Венерические болезни (от *Венера* – богиня любви и красоты в римской мифологии)

– это группа инфекционных болезней, возбудители которых передаются преимущественно половым путём.




В настоящее время насчитывается более **20** ИППП.

За последние годы количество заболеваний, передаваемых половым путём, увеличилось в несколько раз.

Одна из главных причин – это более свободный взгляд на секс и сексуальные отношения молодых людей.



КЛАССИФИКАЦИЯ ИППП

- Венерические заболевания, или классические – **сифилис, гонорея**
 - «Новые» венерические болезни (инфекции мочеполовых органов с преимущественным поражением половых органов) – **хламидиоз, трихомониаз, микоплазмоз, генитальный герпес, лобковый педикулез (вшивость, чесотка)**
 - Болезни, передаваемые половым путем, с преимущественным поражением других органов – **ВПЧ, ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты В и С.**
- 

СИФИЛИС


Хроническая венерическая болезнь, характеризующаяся поражением нервной системы, костей, внутренних органов.

Название происходит от имени греческого пастуха Сифилуса, имевшего интимные отношения со свиньей (1530 год, описано поэтом Фрагсосторо).

Возбудитель – бледная трепонема

Она попадает в кровь не только половым путем, но и через порезы, ссадины, даже поцелуи.

Проявляются признаки заболевания через 3-4 недели после контакта.



СИМПТОМЫ

Заболевание начинается с появления в месте внедрения трепонемы твердого шанкра, безболезненной язвы на плотном основании.

Затем возникают признаки недомогания, схожие с признаками простуды, возникает характерная сыпь («ожерелье Венеры»).

В третичном сифилисе (через 2-3 месяца) возникают различные деструктивные поражения различных органов и систем, паралич, поражения головного мозга





ГОНОРЕЯ


Инфекционное заболевание слизистых оболочек мочеполовых органов, рта и прямой кишки.


Возбудитель заболевания – гонококк.

Возможно бытовое заражение при пользовании общей с больным постелью, бельём, полотенцем.

Выделяют мужскую, женскую и детскую гонорею.

Инкубационный период 3-5 дней.





У женщин гонорея протекает без отчетливых признаков.

Отмечаются зуд, выделения.

Поражаются почти все отделы мочеполовой системы, а также прямая кишка, мочеиспускательный канал, влагалище, матка, придатки, шейка матки, яичники.

У девочек в основном поражаются влагалище, мочеиспускательный канал и область заднего прохода.



Отмечается болезненность при мочеиспускании и дефекации.

Лечение больных должно быть комплексным, индивидуальным, одновременным для обоих половых партнеров.

ХЛАМИДИОЗ

Хламидиоз самое распространённое ЗППП.

Возбудитель хламидиоза *Chlamidia trachomatis* занимает промежуточное положение между вирусами и бактериями, по этой причине заболевание очень трудно диагностировать и тяжело лечить.




СИМПТОМЫ



- Выделения из влагалища слизистые или слизисто-гнойные. От нормальных выделений они могут отличаться неприятным запахом или желтоватым оттенком.
- Несильные боли в области наружных и внутренних половых органов
- Зуд и жжение (в том числе, при мочеиспускании)
- Боли внизу живота — в области малого таза, усиление болей перед менструацией
- Межменструальные кровотечения.
- Также у женщины может наблюдаться общая слабость и легкая температура — симптомы интоксикации.

ТРИХОМОНИАЗ

- Вызывается простейшим организмом – **трихомонадой**
- Пути передачи – контактно - половой и бытовой
- купание в грязных водоёмах, стоячей воде, в том числе иногда и в частных бассейнах.
- Симптомы похожи на симптомы гонореи, поэтому любое состояние дискомфорта в половых путях - зуд, выделения и прочее требует лабораторной диагностики с целью определения возбудителя.
- Заболевание излечимо





●●● МИКОПЛАЗМОЗ

Микоплазма – микроорганизмы, промежуточные между бактериями и вирусами.

Паразитируют на клетках живого существа, сами не жизнеспособны.

Передается – половым путем, жидкостным, внутриутробный и т.д.



ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС

Вирусное поражение кожи и язвенное поражение половых органов, возбудителем которого является **вирус простого герпеса**.


Заболевание характеризуется пузырьковыми высыпаниями на лице, половых органах и ягодицах.

Генитальный герпес вызывает болячки и язвы на половых органах и вокруг них.

Появление сыпи нередко сопровождается головной, недомоганием, температурой.



- Передача заболевания осуществляется от больного человека здоровому при прямом контакте (поцелуи, половые связи) или через предметы домашнего обихода.



- Появление сыпи сопровождается чувством жжения, зудом.




- Пузырьки либо сосыхаются в корочки, либо вскрываются с образованием эрозии.


- От момента появления сыпи до её регресса в среднем проходит 7-10 дней.

- Процесс склонен к частому рецидивированию.





ЛОБКОВЫЕ ВШИ



Вши передаются как при половом контакте, так и при бытовом контакте.

Вызывают сильный зуд.

Разглядеть их не просто, нужно сбрить волосы и тогда их станет видно.

Убийственно на них действует серная мазь.



ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

Одна из распространенных болезней современности, передается не только половым путем.

Выражается в появлении **кондиллом** – остроконечных образований на слизистой половых органов а также бородавок на руках и других участках кожи.

У женщин поражения внутренних органов может переходить в злокачественные образования.



СПИД

– синдром приобретённого иммунодефицита.

Это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и передающаяся при половом контакте и с кровью.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ

- Половой
- При переливании крови и её компонентов
- При использовании медицинского инструмента, загрязненного кровью с возбудителем
- При внутривенных инъекциях нестерильными шприцами среди наркоманов

Единственный путь борьбы со СПИДом – профилактика.

Главной причиной заболеваемости и смертности от СПИДа является не сам вирус, а другие инфекции и заболевания, которым организм не может сопротивляться в результате действия ВИЧ-инфекции.

ГЕПАТИТ

Гепатит – это острое или хроническое воспаление печени.

Наиболее распространены вирусные гепатиты А, В, С и Д.

Способы передачи:


- вирус гепатита А передается бытовым путем;
- вирусы гепатитов В и Д передаются через кровь, сперму и женские вагинальные выделения;
- вирус гепатита С в основном передается через кровь, вероятность заражения через сперму и вагинальные выделения гораздо меньше.



СИМПТОМЫ

- Пожелтение кожи;
- Тошнота;
- Рвота;
- Отсутствие аппетита;
- Слабость;
- Потемнение мочи;
- Осветление кала.

Часто острая форма гепатита (А) вообще проходит без симптомов или наблюдаются лишь небольшие недомогания вроде тошноты, общей слабости или отсутствия аппетита.



Гепатиты В, С и Д – это тяжелые заболевания.


У большого количества больных развивается хроническая форма, которая может привести к циррозу или раку печени.

Острая форма может перейти в хроническую через несколько месяцев.

При этом чем раньше начато лечение хронического гепатита, тем лучше его прогноз.

**ЧЕМ
ОПАСНЫ
ИППП?**





**ПОРАЖЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ
ОРГАНОВ**




БЕСПЛОДИЕ



ПАРАЛИЧ



**НАРУШЕНИЕ
ПСИХИКИ**



**РОЖДЕНИЕ
БОЛЬНЫХ
ДЕТЕЙ
И УРОДОВ**



**РАСПАД
СЕМЬИ**

ПРОФИЛАКТИКА ЗППП



- **Использование презервативов**

Однако эффективность презерватива как средства профилактики венерических инфекций – не **100%**.

- **Постоянные сексуальные партнеры**

Самые опасные виды секса – это вагинальный или анальный половой контакт без презерватива.

- **Здоровый образ жизни**

- **Своевременное обращение при появлении первых симптомов заболеваний в медицинское учреждение.**



САМОЛЕЧЕНИЕ НЕДОПУСТИМО!



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !**



Волонтеры
медики