



Алгоритм ведения пациента

Клинические рекомендации

«Красный плоский лишай: проявления в полости рта»

Код по МКБ-10: L43; L43.1 / L43.1X; L43.2 / L43.2X; L43.8 / L43.80, L43.81, L43.82, L43.83, L43.88, L43.89

Приложение Б. Алгоритмы действий врача

1. Красный плоский лишай: проявления в полости рта

Нозологическая форма: Красный плоский лишай: проявления в полости рта

Код по МКБ-10: L43; L43.1 / L43.1X; L43.2 / L43.2X; L43.8 / L43.80, L43.81, L43.82, L43.83, L43.88, L43.89

1.1. Диагностические мероприятия:

1.1.1. Сбор жалоб и анамнеза, формулирование предварительного диагноза

1.1.2. Внешний осмотр челюстно-лицевой области, пальпация регионарных лимфатических узлов.

1.1.3. Детально описывать первичные (пятно, папула, пузырёк) и вторичные (эрозия, язва, трещина, налёт, чешуйка, корка) элементы

Оценивать болевой симптом по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).

1.1.4. Осмотр ротовой полости с помощью инструментов

1.1.5. Лабораторные исследования

1.1.6. Инструментальные исследования

1.1.7. Консультации врачей-специалистов

1.2. Лечение

1.2.1. Комплексное лечение консервативное лечение

1.2.2. Оперативное (хирургическое) лечение

1.3. Рекомендации

1.3.1. Кратность диспансерных осмотров пациентов с КПЛ СОПР зависит от формы заболевания: при типичной форме – каждые 6 месяцев; гиперкератотической – каждые 3 месяца; при осложненном течении заболевания (эрозивно-язвенной,

буллезной, экссудативно-гиперемической) – в течение первого года каждые 1,5-2 месяца, в последующие годы – 1 раз в 3 месяца

1.3.2. Рекомендуется пациентам с КПЛ СОПР после стабилизации воспалительного процесса проведение санации полости рта: замена некачественных реставраций с использованием максимально-атравматичных методик и биологически инертных стоматологических реставрационных материалов, исключающих раздражающее / аллергизирующее и механически-травмирующее действие на СОПР

1.3.3. Рекомендуется пациентам с КПЛ СОПР по достижению стойкой ремиссии / стабилизации проведение протезирования по поводу дефектов зубных рядов, основанного на рациональном подборе конструкционных материалов и ортопедических конструкций (предпочтительно использование протетических конструкций с опорой на имплантаты), исключающих раздражающее / аллергизирующее и механически-травмирующее действие на СОПР

Пациент с подозрением на КПЛ СОПР

