

ФЕРМЕНКОЛ® НАБОР ДЛЯ ЭНЗИМНОЙ КОРРЕКЦИИ
косметической линии EnTher®

ОПИСАНИЕ:

Ферменкол® средство косметическое ферментное, 4 мг — лиофилизированный порошок от светло-желтого до светло-коричневого цвета в стеклянном флаконе.

Состав: комплекс коллагенолитических протеаз из гидробактерий.

Солактин® средство для приготовления раствора ферментов, 40 мл — прозрачная жидкость в полимерном флаконе.

Состав: вода, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, кислота лимонная, калия гидроксид, кальция хлорид, аммония сульфат.

Патенты на изобретение: РФ №2462265; US 9,468,682 B2.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Электрофорез

Исходя из специфических факторов, вызвавших появление проблемных рубцово-измененных участков кожи, применяют растворы

Ферменкол® различной концентрации.

Рекомендуемая концентрация составляет 0,01-0,02%, увеличение концентрации раствора ферментов до 0,05-0,1% возможно после консультации со специалистом.

Концентрация раствора Ферменкол	Количество средства Солактин на 1 флакон Ферменкол
0,01%	40 мл
0,02%	20 мл
0,05%	8 мл
0,1%	4 мл

Для проведения процедуры на 1 см² рубцово-измененной кожи требуется 0,1-0,2 мл раствора **Ферменкол®**.

Раствором **Ферменкол®** смочить прослойку из фильтровальной бумаги или марлевую салфетку, наложить на чистую сухую кожу.

Провести процедуру электрофореза.


Введение раствора Ферменкол® осуществлять с положительного полюса (с анода)!

Режим введения: плотность тока не более 0,1 мА/см² при применении в области туловища и конечностей, и не более 0,05 мА/см² в области лица и шеи. Продолжительность процедуры: 10-25 минут. Периодичность процедур: ежедневно, допустимый интервал между процедурами не более 2-х дней. Длительность курса: 10-15 процедур. Интервал между курсами: не менее 14 дней.

Рекомендуется для коррекции формирующихся и сформировавшихся рубцово-измененных участков кожи.




1 Ознакомиться с инструкцией



2 Вскрыть флаконы



3 Влить небольшое количество Солактина во флакон с Ферменколом



4 Влить содержимое флакона в мерный стакан



5 Добавить необходимое количество Солактина, руководствуясь таблицей



6 Смочить салфетку приготовленным раствором. Провести процедуру электрофореза

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре от 4°C до 25°C.

Срок хранения приготовленного раствора **Ферменкол®** составляет 10 суток при температуре от 2°C до 6°C.

Нагрев готового раствора выше 40°C может привести к снижению активности средства.

СРОК ГОДНОСТИ:

3 года с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (812) 327 54 47 или на сайте fermentol.ru

EnTher