




Памятка

Деколонизация при фурункулёзе



Май, 2027

Протокол деколонизации



Очень важно! Все нижеописанные мероприятия выполняются не только пациентом, но и членами его семьи.

До начала деколонизации:



Снятие пирсинга и сережек на период деколонизации.



Ликвидация старых зубных щеток и бритв.



Снятие лака и других покрытий с ногтей. Ногти должны быть короткими и чистыми.



При использовании зубных протезов – ежедневное снятие и тщательная чистка протезов с последующей дезинфекцией в специальном растворе (например, Aktident).

Деколонизация:

Мытье тела с 2% раствором хлоргексидина

(есть вариант с распылителем – удобно наносить) – ежедневно, в течение как минимум 5-ти дней (до достижения контроля над высыпаниями), далее 1-2 раза в неделю.

Можно сделать следующим образом:

Сначала вымыться с использованием геля или мыла для душа (как вариант гель Uriage Cu-Zn).

А потом намочить тряпочку или полотенце раствором хлоргексидина и тщательно протереть всю поверхность тела, оставить не менее, чем на 30 секунд, затем сполоснуть водой.

Волосы просто промыть раствором хлоргексидина 2% без тряпочки.

Мупироцин 2% (Бактробан назальная мазь*) –

ежедневно, в течение как минимум 5-ти дней (до достижения контроля над высыпаниями), далее 1 раз в неделю.

Мероприятия в квартире

– проводятся в 2 и 5 дни от начала лечения.

Тщательная уборка квартиры (особенно спальни и ванной комнаты).

Очищение всех поверхностей, к которым часто прикасаются члены семьи.

Стирка одежды, нижнего белья, пижам, постельного белья и полотенца на высокой температуре.

По возможности – использование автоматической сушилки (режимы на высоких температурах).



После деколонизации:

Наблюдение

если в течение следующих 6 месяцев фурункулы не появятся вновь, значит деколонизация прошло успешно.

ИЛИ

Продолжение мероприятий

– обработка тела 2% раствором хлоргексидина (1–2 раза в неделю)
и нанесение назальной мази с 2% мупироцином (1 раз в неделю)

