

Правила использования антисептиков

🔑 **Первое и главное правило:** для промывания раны и обработки кожи вокруг неё требуются разные средства!

📁 АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ РАНЫ

- **Подготовка:**
 - Тщательно вымыть руки с мылом и/или обработать **спиртовым антисептиком**
 - Подготовить стерильные материалы
 - После обработки наблюдать за раной **3-5 дней, при ухудшении – к врачу!**
- **Обработка:**
 - Промыть рану **чистой водой**
 - Обработать рану специальными растворами, края раны спиртовыми растворами
 - Наложить стерильную повязку или бактерицидный пластырь

📄 ТАБЛИЦА АНТИСЕПТИКОВ

Препарат Концентрация	Назначение	Способ применения	Важные примечания
Перекись водорода 3%	Первичная обработка ран, ссадин, царапин	Нанести на салфетку или промыть рану	Пенится при контакте с кровью. Только первичная обработка. Частое использование замедляет заживление
Хлоргексидин 0,05% водный раствор	Обработка ран, слизистых, порезов	Нанести на рану или использовать для промывания	Не раздражает ткани. Активен против бактерий, вирусов и грибков. Время воздействия — 1-2 минуты
Мирамистин	Универсальный антисептик	Нанести на рану	Без запаха и цвета. Подходит для детей. Длительный антисептический эффект
Йод 5% спиртовой раствор	Обработка кожи вокруг раны	Нанести на кожу вокруг раны	Не наносить на открытую рану! Вызывает ожог тканей
Зелёнка 1%	Обработка краёв ран, ссадин	Наносить на повреждённую поверхность	Можно применять на неглубокие раны. Избегать глубоких повреждений
Спирт 70% этиловый	Обработка кожи вокруг раны	Протирать кожу вокруг повреждения	Не наносить на открытые раны и слизистые!

🚫 Запрещено использовать:

- Йод и спирт в открытую рану
- Вату (только марлевые салфетки)
- Масла, керосин, бензин
- Травяные отвары без консультации
врача
- Нестерильные материалы
- **Нельзя:**
 - Использовать просроченные
препараты
 - Хранить открытые антисептики в тепле
 - Применять средства при аллергии на
компоненты