

Рекомендуемый способ применения и дозы препарата Флогэнзим



**х3 раза
в день**
2 недели

Лечение

- на 2–3 сутки после операции
- при остром воспалении
- для снижения риска развития спаечной болезни



**х3 раза
в день**
4 недели

Предупреждение

отдалённых последствий после операции



**х3 раза
в день**
до 4 недель
и более

**далее
при необходимости**

Внутри, не менее чем за

30 минут
до еды

Не раскусывая,
запивая водой
(200 мл)



Формы выпуска

40
таблеток

100
таблеток

ФЛОГЭНЗИМ®

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ, ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ ПРЕПАРАТ
КОД АТХ: LO2AX


Бромелаин 450 FIP Ед.* (90мг)

Трипсин 1 440 FIP Ед.* (48 мг)

Рутозида тригидрат 100 мг




1. Приём
за 30 минут до еды




2. Всасывание
в тонком кишечнике



3. Доставка в очаг
воспаления



5. Модуляция
процесса
воспаления



4. Связь
с транспортными
белками

Эффекты:

- противоотечный
- вторично
анальгезирующий
- противовоспалительный
- иммуномодулирующий
- антиагрегантный
- фибринолитический
- тромболитический
- повышение
эффективности
антибиотиков