
Схема применения при старте терапии

ПЕРИМЕНОПАУЗА



Режим и доза подбираются индивидуально!

Утрожестан®: МП 200 мг (на каждое нажатие Эстрожель® + 100 мг МП — max 400 мг)

Увеличение дозы эстрогена при сохранении вазомоторных симптомов через 2–3 месяца после старта терапии. Соотношение дозы: ТДЭ 2,25 мг (3 нажатия) — 300 мг МП; ТДЭ 3 мг (4 нажатия) — 400 мг МП.

ПОСТМЕНОПАУЗА

Эстрожель®: 1–2 нажатия на помпу (0,75–1,5 мг ТДЭ)

Утрожестан®: 100 мг
При необходимости можно увеличить дозу до 200 мг

ТДЭ — трансдермальный эстрадиол, МП — микронизированный прогестерон, МГТ — менопаузальная гормональная терапия.

1. *ОХЛП Утрожестан®, 100 мг/200 мг, капсулы https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC.*
2. *ОХЛП ЭстрожельОХЛП Эстрожель®, 0,6 мг/г, гель трансдермальный https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC.*

Информационный материал подготовлен при поддержке компании «Безен Хелскеа Рус» и предназначен только для медицинских и фармацевтических работников.