

СХЕМА ТЕРАПИИ ДЛЯ НЕБЕРЕМЕННЫХ ПАЦИЕНТОК

ПЕРВЫЙ ВЫБОР ПРИ ВЗОМТ (В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ)¹



Доксициклин
ЭКСПРЕСС

100 мг перорально
2 раза в день
в течение 14 дней

ПЕРВЫЙ ВЫБОР ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИИ^{2,3}



Джозафен®

500 мг перорально
3 раза в день
в течение 10 дней

ВЫБИРАЙТЕ ЭКСПРЕСС-МАРШРУТ
К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ!



ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза

1. КР МЗ РФ «Воспалительные болезни женских газовых органов». 2. 2022 European Academy of Dermatology and Venereology.
3. IUSTI Guidelines 2015. 4. ИМП Доксициклин Экспресс. 5. ИМП Джозафен®.

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
ПОДГОТОВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ФАРМСТАНДАРТ».

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИИ ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ПАЦИЕНТОК

КОЛЬПИТ (ВАГИНИТ, ВАГИНОЗ)

Неспецифическая флора

- *Streptococcus spp.*
- *Escherichie coli*
- *Peptostreptococcus spp.*
- *Bacteroides spp*

Местная терапия:

«вагинальные»
свечи, или крем
с клиндамицином,
метронидазолом

ЦЕРВИЦИТ

Неспецифическая флора

- *Trichomonas vaginalis*

- *Chlamydia spp.*
- *Mycoplasma spp.*

- *Neisseria gonorrhoeae*

Внутри:
клиндамицин,
метронидазол

Джозафен®

**Цефиксим
ЭКСПРЕСС**

**ВЫБИРАЙТЕ ЭКСПРЕСС-МАРШРУТ
К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ!**

1. Доброхотова Ю.Э., Баранова Е.И., Залеская С.А. Цервицит у беременных: комплексный подход к диагностике и терапии. Consilium Medicum. 2018; 20(6): 31–36. DOI: 10.26442/2075-1753_2018.6.31-36.
2. Physicians Desk Reference. 57th ed. Montvale, NJ: Thomson PDR; 2004, 2684.