

**Владелец регистрационного удостоверения:** ЭЛАНКО РУС, ООО (Россия)

**Произведено:** ELANCO FRANCE, SAS (Франция)

**Контакты для обращений:** ЭЛАНКО РУС ООО (Россия)

**Активное вещество:** робенакоксиб (robenacoxib)

**Рес. INN** зарегистрированное ВОЗ

## Лекарственная форма

Онсиор™ таблетки

Таблетки для орального применения (для кошек) 6 мг

рег. 826-3-2.17-3579№ПВИ-3-2.17/04923 от 01.03.17 - Действующее

## Форма выпуска, состав и упаковка

**Таблетки для орального применения** (для кошек) от бежевого до коричневого цвета, круглые, с оттиском "NA" на одной стороне и оттиском "AK" на другой стороне.

	<b>1 таб.</b>
робенакоксиб	6 мг

**Вспомогательные вещества:** дрожжи, целлюлоза микрокристаллическая, повидон (К-30), кросповидон, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.

Расфасованы по 6 таблеток в блистеры из алюминиевой фольги, помещенные по 1, 2, 5 или 10 шт. в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

## Фармакологические (биологические) свойства и эффекты

Робенакоксиб - НПВС группы коксибов, является селективным специфическим ингибитором ЦОГ-2 и обладает противовоспалительным и анальгезирующим действием. ЦОГ представлена в двух формах: ЦОГ-1 - конститутивная форма энзима, выполняет защитные функции, в т.ч. в ЖКТ и почках; ЦОГ-2 - индуцируемая форма энзима, отвечает за выработку медиаторов, включающих ПГЕ<sub>2</sub>, вызывающих боль, воспаление и жар.

После подкожного введения препарата робенакоксиб быстро всасывается из места инъекции, при пероральном введении - быстро всасывается в кишечнике. Поступает в системный кровоток и большинство органов и тканей; более 99% робенакоксиба связывается с белками плазмы. Максимальная концентрация в плазме при применении раствора для инъекций отмечается через 1 ч, биодоступность составляет 69% у кошек и 88% у собак. При пероральном применении максимальная концентрация в плазме отмечается через 0.5 ч, биодоступность составляет 49% у кошек и 62% у собак при применении таблеток с кормом и 84% - без корма.

Метаболизируется робенакоксиб в печени, выделяется в основном с желчью (около 70% у кошек и около 65% у собак) и частично - с мочой; период полувыведения из организма собак составляет около 1.2 ч, кошек - 1.1-1.7 ч.

Онсиор™ по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

## Показания к применению препарата ОНСИОР™

Назначают собакам и кошкам в качестве противовоспалительного и болеутоляющего препарата при воспалительных и болевых синдромах различного происхождения, в т.ч.:

- острые и хронические заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, синовиты, вывихи);
- воспалительные заболевания мягких тканей;
- в качестве анальгезирующего и противовоспалительного препарата в послеоперационный период.

## Порядок применения

### Раствор для инъекций

Применяют **кошкам** и **собакам** в дозе 1 мл на 10 кг массы животного (что соответствует 2 мг робенакоксиба на 1 кг массы тела животного).

При *хирургических вмешательствах* препарат вводят примерно за 30 мин до введения в наркоз. В послеоперационный период в качестве анальгезирующего и противовоспалительного препарат вводят в течение 1-2 дней.

При *лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата* препарат применяют для снятия острой боли однократно или двукратно в дозе 1 мг на 10 кг массы животного (что соответствует 2 мг робенакоксиба/кг массы животного); дальнейшее лечение рекомендуется продолжить препаратом в форме таблеток в соответствии с инструкцией по применению.

### Таблетки

Применяют **собакам** и **кошкам** индивидуально, 1 раз/сут, в дозах, указанных в таблице:

Вид и масса животного	Доза действующего вещества (мг/таб.) и количество таблеток на животное				
	6 мг	5 мг	10 мг	20 мг	40 мг
<i>Кошки</i>					
от 2.5 кг до 6 кг	1 таб.				
от 6 кг до 12 кг	2 таб.				
<i>Собаки</i>					
от 2.5 кг до 5 кг		1 таб.			
от 5 кг до 10 кг			1 таб.		
от 10 кг до 20 кг				1 таб.	
от 20 кг до 40 кг					1 таб.
от 40 кг до 80 кг					2 таб.

Рекомендуется давать препарат отдельно от кормления, но, при необходимости, препарат может быть дан вместе с кормом. Таблетки не следует дробить или разламывать.

Онсиор™ таблетки для кошек применяют при *оперативных вмешательствах* за 30 мин до введения в наркоз в дозе 1-2.4 мг/кг массы животного; лечение можно продолжать в течение периода длительностью до 2 дней после операции; при *заболеваниях опорно-двигательного аппарата* препарат применяют до 6 дней.

Онсиор™ таблетки для собак применяют за 30 мин до или после кормления в дозе 1-2 мг/кг массы животного.

Курс лечения определяет лечащий ветеринарный врач. Как правило, продолжительность лечения составляет 7 дней. Если по истечении 10 дней клиническое улучшение не наступает, применение препарата прекращают.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

Следует избегать нарушения рекомендуемого интервала между введениями препарата, т.к. это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска повторного введения препарат следует ввести как можно скорее в предусмотренной дозе.

### Побочные эффекты

При применении препарата в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. У кошек и собак возможны желудочно-кишечные расстройства (рвота, мягкий кал или диарея), указанные симптомы проходят самопроизвольно и не требуют применения лекарственных средств. При индивидуальной повышенной чувствительности животного к препарату и появлении аллергических реакций, применение препарата прекращают и животному назначают антигистаминные и симптоматические средства.

При *передозировке* у животных с выраженной чувствительностью к компонентам препарата могут наблюдаться расстройство ЖКТ, печеночная или почечная недостаточность. Специфические

средства детоксикации отсутствуют, применяют общие меры, направленные на выведение лекарственного препарата из организма.

### **Противопоказания к применению препарата ОНСИОР™**

- индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата;
- гиповолемия;
- артериальная гипотензия;
- состояние дегидратации;
- масса животного менее 2.5 кг.

При крайней необходимости назначения лекарственного препарата таким животным лечение проводят под постоянным наблюдением ветеринарного врача.

Не следует применять препарат животным с выраженной сердечной, почечной и печеночной недостаточностью.

### **Особые указания и меры личной профилактики**

Запрещено применять препарат беременным и лактирующим самкам, щенкам моложе 2-месячного и котятм моложе 4-месячного возраста.

Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Онсиор™ раствор для инъекций не следует применять одновременно с другими НПВС, а также смешивать в одном шприце с другими лекарственными препаратами.

Онсиор™ таблетки не следует применять одновременно с другими НПВС и в течение 24 ч после их отмены, диуретиками, а также ингибиторами АПФ и другими лекарственными средствами с высокой степенью связывания с белками сыворотки крови из-за вероятности взаимного усиления токсического действия.

#### *Меры личной профилактики*

При применении препарата следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Онсиор™. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками их необходимо немедленно промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Запрещается использование пустой упаковки из-под препарата для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

### **Условия хранения Онсиор™ таблетки**

Онсиор™ раствор для инъекций следует хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре от 2°C до 8°C.

### **Срок годности Онсиор™ таблетки**

Срок годности при соблюдении условий хранения - 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона - 28 суток.

Онсиор™ таблетки следует хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре от 0°C до 25°C. Срок годности при соблюдении условий хранения - 4 года с даты производства.

Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

### **Условия отпуска**

Препарат отпускается без рецепта.