

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ для восстановления и поддержания нормальной микрофлоры кишечника, повышения сохранности и продуктивности животных

(Организация-производитель: ООО БФ «Компонент», г. Бугуруслан, Оренбургской области)

I. Общие сведения

1. Название кормовой добавки: ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ (LACTOBIFADOL FORTE).

2. Состав: содержит высушенную сорбционным методом микробную массу молочнокислых бактерий *Lactobacillus acidophilus* ЛГ1-ДЕП-ВГНКИ в количестве не менее $1,0 \times 10^6$ КОЕ/г, бифидобактерий *Bifidobacterium adolescentis* В-1-ДЕП-ВГНКИ в количестве не менее $8,0 \times 10^7$ КОЕ/г и наполнитель – отруби пшеничные или муку пшеничную, или мальтодекстрины.

3. По внешнему виду ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ представляет собой однородный сыпучий порошок от белого до бежево-коричневого цвета.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных компонентов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих на территории Российской Федерации.

4. ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ выпускают расфасованным по 40, 50, 500, 1000, 2000, 10000 г в герметично запааянные полиэтиленовые пакеты.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: организации производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения, способа применения, массы нетто, состава и гарантированных показателей, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, информации о соответствии, номера государственной регистрации, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, 18 месяцев с даты выпуска при температуре от 2 до 10°C, 12 месяцев с даты выпуска при температуре от 10 до 20°C.

По истечении срока годности ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ к применению не пригоден.

II. Биологические свойства

5. Эффект от применения добавки обеспечивается за счет восстановления и поддержания в кишечнике животных высокого популяционного уровня ацидофильных и бифидобактерий. Размножаясь, эти бактерии выделяют молочную кислоту и другие биологически активные субстанции, которые сдерживают развитие патогенной и условно-патогенной микрофлоры, в том числе эшерихий, протей, сальмонелл, стафилококков, активизируют обмен веществ, в результате чего повышается сохранность и продуктивность поголовья.

III. Порядок применения

6. ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ применяют для восстановления и поддержания нормальной микрофлоры кишечника, повышения сохранности и продуктивности животных.

7. ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ применяют индивидуальным или групповым методом, смешивая его с кормом или выпаивая с молоком, заменителем цельного молока, молозивом, питьевой водой.

Рекомендуемые нормы ввода в корма и кормосмеси:

- молодняку крупного рогатого скота, жеребятam в возрасте 1-6 месяцев по 12 г на голову в сутки в смеси с концентрированными кормами ежедневно;

- взрослому крупному рогатому скоту на откорме, лактирующим коровам, лошадям по 25г на голову в сутки в смеси с концентрированными кормами ежедневно;

- свиноматкам супоросным по 5 кг на 1 т корма ежедневно;

- свиноматкам лактирующим по 4 кг на 1 т корма ежедневно;

- пороссятам в период дорастивания (живой массой 10-35 кг) по 2 кг на 1 т корма ежедневно;

- подсвинкам живой массой 35-70 кг по 2,5 кг на 1 т корма ежедневно;

- свиньям на откорме живой массой 70 кг и более по 3 кг на 1 т корма ежедневно;

- пушным зверям, кошкам, собакам по 0,1 г/кг массы животного в сутки один раз в день ежедневно;

- бройлерным цыплятам по 1 кг на 1 т комбикорма ежедневно в течение 20-30 дней или с питьевой водой по 0,3-0,4 г на голову в сутки;

- молодкам и взрослым курам-несушкам по 1,5 кг на 1 т комбикорма ежедневно в течение 20-30 дней или с питьевой водой по 0,3-0,4 г на голову в сутки.

Корма и кормосмеси с добавкой термической обработке подвергать запрещается.

8. При применении добавки в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не отмечается.

9. В период применения добавки пероральное введение антибиотиков и других химиотерапевтических веществ не рекомендуется. Внутримышечное применение антимикробных препаратов при наличии показаний не ограничивается.

10. Противопоказаний для применения не выявлено.

11. Продукцию животноводства после применения ЛАКТОБИФАДОЛА ФОРТЕ реализуют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

12. При применении добавки ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы следует вымыть руки с мылом.

13. При попадании добавки на кожу и/или слизистые оболочки рекомендуется промыть их большим количеством водопроводной воды.

Инструкция разработана: ООО БФ «Компонент», 461631, г. Бугуруслан Оренбургской области, ул. Пилюгинское шоссе, д. 51.

Организация-производитель: ООО БФ «Компонент», 461631, г. Бугуруслан Оренбургской области, ул. Пилюгинское шоссе, д. 51.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ПВР-2-417/03338