

Описание лекарственного препарата ветеринарного назначения ФИПРИСТ® СПРЕЙ

Владелец регистрационного удостоверения: KRKA d.d., Novo Mesto (Словения)

Контакты для обращений: КРКА, фармацевтический завод, д.д., Ново место АО (Словения)

ФИПРИСТ® СПРЕЙ Спрей дозированный для наружного применения
рег. №РК-ВП-4-3569-18 от 20.04.18 - Действующее

Форма выпуска, состав и упаковка

Спрей дозированный для наружного применения бесцветный, прозрачный.

	1 мл
фипронил	2.5 мг

Вспомогательные вещества: коповидон, изопропанол, вода очищенная.

Расфасован по 100 мл, 250 мл и 500 мл в полиэтиленовые флаконы с распылительной головкой.

Фармакологические (биологические) свойства и эффекты

Инсектоакарицидный препарат контактного действия. *Активен в отношении* половозрелых фаз развития блох *Ctenocephalides* spp., власоедов *Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*, иксодовых клещей (все фазы развития) *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor variabilis*, *Ixodes* spp., *Haemaphysalis* spp., вшей *Linognathus setosus*, саркоптоидных клещей *Sarcoptes scabiei* var. *canis*, комаров *Aedes aegypti*.

Механизм действия фипронила, входящего в состав препарата, заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов.

После нанесения препарата на кожно-волосую покров фипронил практически не всасывается в системный кровоток, накапливается в шерсти, эпидермисе, волосах луковицах и сальных железах тела животного, оказывает длительное контактное инсектоакарицидное действие, а также предотвращает прикрепление и развитие эктопаразитов на животных. Однократная обработка животного обеспечивает уничтожение блох и клещей в течение 24 ч и 48 ч соответственно.

Защитное действие препарата после обработки собак против иксодовых клещей продолжается до 5 недель, против блох - до 3 месяцев, после обработки кошек против блох - до 6 недель, против клещей - до 4 недель.

Фиприст® Спрей по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местнораздражающего и резорбтивно-токсического действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для кроликов, а также рыб и других гидробионтов.

Показания к применению препарата ФИПРИСТ® СПРЕЙ

Собакам и кошкам для лечения и профилактики:

- энтомозов, вызываемых блохами, вшами и власоедами;
- акарозов, вызываемых иксодовыми и саркоптоидными клещами;
- в комплексной терапии аллергического дерматита, вызываемого блохами.

Порядок применения

Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении при открытых окнах (форточках), предварительно удалив из помещения клетки с декоративными птицами и накрыв аквариумы с рыбами. Для предотвращения слизывания препарата животному надевают намордник, шейный воротник или фиксируют челюсти петлей из тесьмы, которые снимают после полного высыхания шерстного покрова.

Перед использованием флакон с препаратом тщательно встряхивают и, держа его вертикально, нажимают на распылительную головку, направляя струю аэрозоля на обрабатываемую поверхность с расстояния 10-20 см. Доза препарата в зависимости от длины шерсти составляет 3-6 мл на 1 кг массы животного.

Препарат легко дозируется:

- одно нажатие на распылительную головку флакона вместимостью 100 мл обеспечивает дозу препарата 0.5 мл;
- одно нажатие на распылительную головку флакона вместимостью 250 мл обеспечивает дозу препарата 1.5 мл;
- одно нажатие на распылительную головку флакона вместимостью 500 мл обеспечивает дозу препарата 3 мл.

Спреем обрабатывают все туловище животного против роста волос, слегка увлажняя шерсть (у животных длинношерстных пород шерсть приподнимают рукой). Прикрыв глаза животного, обрабатывают ушные раковины и грудь, кончиками пальцев (в перчатке) препарат слегка втирают вокруг глаз и носа.

В целях предотвращения повторной инфекации животных блохами рекомендуется обрабатывать всех кошек и собак, обитающих совместно, а также заменить подстилки или обработать их инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по применению.

Повторные обработки животных проводятся по показаниям, но не чаще 1 раза в 4 недели.

В течение 24 ч после обработки (до полного высыхания шерсти) не следует подпускать обработанное животное к открытому огню и нагревательным приборам.

Не рекомендуется мыть животное за 2 дня до обработки, а также мыть и купать в открытом водоеме в течение 2 дней после обработки препаратом Фиприст® Спрей.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

Следует избегать нарушений схемы применения препарата, т.к. это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

Побочные эффекты

При применении препарата в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реакций, препарат следует смыть водой с моющим средством и назначить животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

При *передозировке* препарата у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством, животному назначают средства симптоматической терапии.

Противопоказания к применению препарата ФИПРИСТ® СПРЕЙ

- индивидуальная чувствительность животного к ингредиентам препарата (в т.ч. в анамнезе).

Запрещается применение препарата:

- больным инфекционными заболеваниями, выздоравливающим и ослабленным животным;
- щенкам и котятм моложе недельного возраста.

Особые указания и меры личной профилактики

Фиприст® Спрей не следует применять совместно с другими инсектоакарицидными средствами для обработки животных.

Препарат можно применять беременным и лактирующим сукам, беременным кошкам. Препарат не рекомендуется применять лактирующим кошкам с котятами моложе недельного возраста.

Фиприст® Спрей не предназначен для обработки продуктивных животных.

Меры личной профилактики

При обработке животных препаратом Фиприст® Спрей следует использовать резиновые перчатки. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы вымыть руки теплой водой с мылом, вымыть и просушить перчатки.

В течение 24 ч после обработки животное не следует гладить и подпускать к маленьким детям.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Фиприст® Спрей.

При случайном попадании препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом; при попадании в глаза - промыть их в течение нескольких минут проточной водой. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Запрещается использование пустых флаконов из-под препарата для бытовых целей, их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

Условия хранения ФИПРИСТ® СПРЕЙ

Препарат следует хранить в упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в недоступном для детей, защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от нагревательных приборов и источников огня при температуре от 0°C до 25°C.

Срок годности ФИПРИСТ® СПРЕЙ

Срок годности при соблюдении условий хранения - 3 года с даты производства. Запрещается использование препарата после окончания срока годности.

Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Условия отпуска

Препарат отпускается без рецепта.