

БЕЗОПАСНЫЕ И НЕБЕЗОПАСНЫЕ ЛЕКАРСТВА

НЕБЕЗОПАСНЫЕ ЛЕКАРСТВА

**Средства для анестезии,
применение которых при Дюшенне требует осторожности**

Следующие анестетики **НЕ БЕЗОПАСНЫ** при Дюшенне.

Более подробную информацию можно найти на parentprojectmd.org/anesthesia

Деполяризующие миорелаксанты вызывают рабдомиолиз:

Сукцинилхолин (суксаметоний)

Ингаляционные общие анестетики (избегать при возможности):

Примеры: десфлуран, энфлуран, галотан, изофлуран, севофлуран, ксенон

***НЕ ПРИМЕНЯТЬ ЭПИНЕФРИН* – МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАБДОМИОЛИЗ**

БЕЗОПАСНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Все нижеприведенные препараты считаются безопасными для людей с Дюшенным при условии тщательного мониторинга состояния.

Аnestезия/Обезболивание

Барбитураты/Внутривенные анестетики:

диазepam, этомидат, кетамин, метогекситал, мидазолам, пропофол, тиопентал

Ингаляционный нелетучий общий анестетик:

оксид азота («веселящий газ»)

Местные анестетики:

аметокайн, артикаин, бензокайн (с осторожностью: риск метгемоглобинемии), бупивакайн, этидокаин, лидокаин, левобупивакайн, мепивакайн, прокайн, прилокайн, ропивакайн

Наркотики (опиоиды):

альфетанил, фентанил, гидроморфин, меперидин, метилморфин, морфин, налоксон, оксидон, ремифентанил, суфентанил

Миорелаксанты:

атракурий, цисатракурий, доксакуриум, d-тубокуарин, метокурин, мивакурий, панкуроний, пипекуроний, рокуроний, векуроний

Препараты, влияющие на поведение и на психическое здоровье

СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ (С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ ИЛИ БЕЗ)

- Стимуляторы короткого действия: перед употреблением сделать ЭКГ.
Примеры: дексметилфенидат, декстроамфетамин и амфетамин, декстроамфетамин, метилфенидат
- Стимуляторы длительного действия.
Примеры: амфетамин сульфат, декстроамфетамин, декстроамфетамин и амфетамин, дексметилфенидат, лиздексамфетамин, метилфенидат
- Не стимулирующие средства: использовать с осторожностью при наличии сердечных аномалий; риск внезапной сердечной смерти; перед употреблением сделать ЭКГ.
Примеры: атомоксетин, клонидин, гуанфацин

ДЕПРЕССИЯ

- Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (ИОЗС/ИОЗН).
Примеры: десвенлафаксин, дулоксетин, флуоксетин, сертралин, венлафаксин
- Ингибиторы обратного захвата норэpineфрина-дофамина (ИОЗНД): при одновременном приеме дофаминергических и других неадренергических препаратов наблюдалось повышение артериального давления (гипертония).
Примеры: бупропион
- Трициклические антидепрессанты (ТЦА): использовать с осторожностью; ТЦА были связаны с внезапной сердечной смертью и желудочковыми аритмиями.
Примеры: амитриптилин, амоксапин, кломипрамин, дезипрамин, доксепин, имипрамин, нортриптилин, протриптилин, тримипрамин
- Ингибиторы моноаминооксидазы (ИМОАО): Редко применяются у детей из-за высокой частоты побочных эффектов.
Примеры: изокарбоксазид, фенелзин, селегилин, транилципромин

ТРЕВОЖНОСТЬ

Примеры: хлордиазепоксид, клоназепам, хлоразепам, диазепам, флуразепам, галазепам, лоразепам, мидазолам, оксазепам, празепам, темазепам, триазолам

ДРУГИЕ ЧАСТО НАЗНАЧАЕМЫЕ ЛЕКАРСТВА

Антиконвульсанты

Примеры: габапентин, топирамат

Противовирусные препараты

Реленза (занамивир). Это лекарство следует использовать с осторожностью, не рекомендуется его использовать у детей с психическими сопутствующими заболеваниями; были сообщения о галлюцинациях и симптомах психоза у многих детей и подростках. Узнайте больше о лечении гриппа на parentprojectmd.org/flu.

Безрецептурные препараты

Жаропонижающие (Antipyretics)

Парацетамол (ацетаминофен)

Лекарства от кашля:

- Сироп от кашля без судафеда (псевдоэфедрина)
- Лекарство от кашля с подавлением кашля, только если кашель мешает спать.
- Лекарство от кашля с отхаркивающими средствами может минимизировать кашель по ночам.
- Леденцы (капли) от кашля
- Mucinex (гуайфенезин) (если разжиженные выделения и нарушение дыхательной функции не вызывают аспирацию с повышенным риском пневмонии)
- Физиологический раствор, капли и спрей для носа

ВСЕГДА КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С СЕМЬЕЙ ИЛИ ЛИЦАМИ, УХАЖИВАЮЩИМИ ЗА ПАЦИЕНТОМ, В СЛУЧАЕ НЕОТЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ

Мои лекарства

Лекарства	Доза	Расписание
Информация аптеки		

ПЕРЕВОД И ВЕРСТКА ВЫПОЛНЕНЫ
ФОНДОМ «ГОРДЕЙ»

