


Применение КДБА более 2 раз в неделю может говорить **о неконтроле бронхиальной астмы** (либо базисная терапия недостаточно эффективна, либо пациент ее не принимает)¹.

Избыточное применение КДБА повышает сердечно-сосудистые риски (нарушение сердечного ритма, повышение давления, ишемия миокарда) и риски обострений и госпитализаций из-за неконтроля астмы^{1 2}.

Переведите пациента на предпочтительный трек: ИГКС-формотерол в режиме Единого ингалятора - Симбикорт® Турбухалер®¹.

Режим Единого ингалятора повышает приверженность, не позволяя пациенту остаться без ИГКС, и повышает эффективность терапии³.

↓ **на 48%** снижение риска тяжелых обострений²



БА - бронхиальная астма, КДБА - короткодействующие b2-агонисты, ИГКС – ингаляционные глюкокортикоиды, ИБС – ишемическая болезнь сердца

**в данном случае «лечебный ингалятор» подразумевает комбинацию с ИГКС, что соответствует заявленному в федеральных клинических рекомендациях предпочтительному треку терапии астмы для пациентов 12+¹*

1. Федеральные клинические рекомендации «Бронхиальная астма» (утв. Минздравом России). ID: 359. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/359_3 (дата доступа: 21.01.2025)

2. Sears MR. Adverse effects of beta-agonists. J Allergy Clin Immunol. 2002;110(6 Suppl):S322-S328. doi:10.1067/mai.2002.129966

3. Rabe KF, et al. Lancet 2006; 368:744-753

Материал предназначен для специалистов здравоохранения. ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз». Адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1., Башня «ОКО», 30 этаж. Тел.: +7 (495) 799-56-99, www.astrazeneca.ru, www.az-most.ru

Номер одобрения: SYM_RU-24806 Дата одобрения: 15.05.2025 Дата истечения: 15.05.2027