


ОРГАНИЗАТОРЫ:

- Национальное общество по изучению атеросклероза
- Российское кардиологическое общество
- Санкт-Петербургское отделение Национального общества по изучению атеросклероза
- Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факультет
- Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова
- Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины
- Институт профессиональной переподготовки ММЦ «СОГАЗ»
- ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
- При поддержке гранта Минобрнауки № 075-15-2022-1110

XV САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА с международным участием ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ АТЕРОСКЛЕРОЗА



КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

18–19 ноября 2022 года

Формат мероприятия:

18 ноября — онлайн

Ссылки на страницу трансляции: <https://spb.doctor/info/22111809/>
НМО — <https://spb.doctor/info/22111817/>

19 ноября — комбинированный (аудиторный с трансляцией в интернет)

Место проведения для очных участников:

гостиница «Crowne Plaza Санкт-Петербург – Лиговский»

(Санкт-Петербург, Лиговский пр., 61, конференц-зал «Ломоносов-Петергоф», 2 этаж).

Ссылки на страницу трансляции: <https://spb.doctor/info/22111909/>
НМО — <https://spb.doctor/info/22111913/>

Генеральные спонсоры:



PMI SCIENCE
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL



Участники:



ГЕДЕОН РИХТЕР

Базовая терапия АГ

Гипосарт (кандесартан)



При подъеме АД

Капотен (каптоприл)



Терапия дислипидемии

Отрио (эзетимиб)



Базовая терапия ХСН

Эспиро (эплеренон)



Улучшение качества жизни при ХСН

Триграм (торасемид)



ПОКАЗАНИЯ

Артериальная гипертензия

Хроническая сердечная недостаточность⁴

Артериальная гипертензия (включая неосложненный гипертонический криз)⁴

Первичная гиперхолестеринемия
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний⁴

Хроническая сердечная недостаточность

Инфаркт миокарда⁴

Отеки, вызванные сердечной недостаточностью, заболеваниями печени, почек и легких⁴

ПРЕИМУЩЕСТВА

Предупреждение развития и прогрессирования АГ и ХСН^{5,6}

Начало действия через 10 минут при неосложненном гипертоническом кризе (при сублингвальном применении)⁴

Достижение ЦУ ХС-ЛНП при добавлении к статину без увеличения частоты побочных эффектов⁷

Снижает смертность при ХСН, инфаркте миокарда³

Уменьшает симптомы декомпенсации при ХСН³

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

8-32 мг 1 раз в день⁴

При неосложненном гипертоническом кризе 25-50 мг под язык⁴

10 мг 1 раз в день⁴

25-50 мг 1 раз в день⁴

5-20 мг 1 раз в день⁴

1. Клинические рекомендации Артериальная гипертензия у взрослых, 2020. 2. Клинические рекомендации Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза, 2020. 3. Клинические рекомендации Хроническая сердечная недостаточность, 2020. 4. Более подробная информация содержится в инструкциях по медицинскому применению препаратов Гипосарт, Капотен, Отрио, ЭСПИРО, Триграм. 5. Julius S., et al. TROPHY, N ENGL J Med 2006; 354:1685-1697. 6. Kjeldsen S.E. et al. REAL-LIFE. J of H Hypert 2010; 24, 263-273. 7. Toth P. et al. Safety profile of statins alone or combined with ezetimibe. Int J Clin Pract 2012; 66 (8) 800-813. 7. Дроботя Н.В., Калтыкова В.В., Пироженко А.А. Лечение отеочного синдрома у больных хронической сердечной недостаточностью: успехи есть, но проблемы остаются. РМЖ. 2021;1(9):17-21; 8. Терещенко С. Н. и совт. Неотложная помощь при внезапном выраженном индивидуально-значимом повышении артериального давления без клинически явного поражения органов-мишеней. Место каптоприла. Заключение Совета экспертов. РКЖ 2020;25(2): 3748. РИМ-2022-0320

 **акрихин**
Люди заботятся о Людах

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

АО «АКРИХИН»



Адрес: 105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, Бизнес-центр «СИТИДЕЛ»
Телефон: +7 (495) 721 36 97
Факс: +7 (495) 723 72 82
E-mail: info@akrikhin.ru

АО «АКРИХИН» — одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая эффективные, доступные по цене и высококачественные лекарственные средства наиболее востребованных российскими пациентами терапевтических групп. Компания по объему продаж входит в пятерку ведущих локальных фармацевтических производителей на российском фармацевтическом рынке, показывая при этом значительные темпы роста и развития.

В продуктивном портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более ста из которых производятся на производственной площадке в Московской области. Наши препараты относятся к основным фармакотерапевтическим направлениям — туберкулез, диабет, дерматология, кардиология, неврология, гинекология и др. и выпускаются в полном соответствии со стандартами GMP. 45 % препаратов в объеме реализации продукции, выпускаемой компанией, входят в перечень ЖНВЛП.

Проект PMI Science



Адрес: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 2
Телефон: +7 (495) 705 92 20
Сайт: www.pmiscience.com

Проект PMI Science — научный проект компании Philip Morris International (PMI), направленный на повышение осведомленности медицинского и научного сообщества о концепции снижения вреда табакокурения, вопросах возможности минимизации воздействия продуктов горения на организм, а также фундаментальной науке по разработке и оценке продуктов, которые могут снизить индивидуальный риск и вред для населения, связанный с употреблением табака.

ООО «ЭГИС-РУС»



Адрес: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, 8
Телефон: +7 (495) 363 39 66
E-mail: moscow@egis.ru
Сайт: www.ru.egis.health

Фармацевтическая компания «ЭГИС» является один из ведущих региональных производителей высококачественных дженериков в Центральной и Восточной Европе с более, чем вековой историей. Деятельность компании охватывает все звенья фармацевтической производственно-сбытовой цепочки: от исследований и разработок, производства активных фармацевтических ингредиентов и готовой продукции до продажи и маркетинга.

Ассортимент продуктового портфеля насчитывает 617 препаратов, большая доля которого принадлежит к таким областям медицины как кардиология, неврология, психиатрия, аллергология, дерматология и гинекология.

Кардиологический портфель «ЭГИС» в России представлен:

- ЛИПОБОН® (эзетимиб)
- РОЗУЛИП® ПЛЮС (розувастатин+эзетимиб)
- МИЛУРИТ® (аллопуринол)
- ХАРТИЛ® (рамиприл)
- ЭГИПРЕС® (амлодипин+рамиприл)

УЧАСТНИКИ

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»



Адрес: 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, Башня «ОКО», 30 этаж
Телефон: +7 (495) 799 56 99
Факс: +7 (495) 799 56 98
E-mail: Moscow.reception@astrazeneca.com
Сайт: www.astrazeneca.com

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» является международной инновационной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследование, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких терапевтических областях, как кардиология, эндокринология, онкология, респираторные заболевания и воспалительные процессы, инфекции и психиатрия.

Компания представлена более чем в 100 странах мира, а её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов.

Гедеон Рихтер



ГЕДЕОН РИХТЕР

Адрес: 119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8,
195027, Санкт-Петербург, Свердловская наб. 44 лит Ю б/ц Зима, офис 201
Телефон: +7 (812) 313 80 15
Факс: +7 (812) 313 80 15
E-mail: centr@g-richter.ru
Сайт: www.g-richter.ru

«Гедеон Рихтер» — международная фармацевтическая корпорация, чья продукция представлена в более чем 100 странах. Штабквартира компании расположена в г. Будапеште (Венгрия).

Являясь крупнейшим в Центральной и Восточной Европе производителем лекарственных препаратов, «Гедеон Рихтер» уже более 120 лет обеспечивает пациентам высокое качество лечения.

Розулип® Плюс

Розувастатин
Эзетимиб



Двойное действие против гиперхолестеринемии

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Розулип® Плюс

Регистрационное удостоверение ЛП-005291. Торговое название препарата: Розулип® Плюс. Международное непатентованное название: розувастатин+эзетимиб. Лекарственная форма: капсулы. Фармакотерапевтическая группа: гиполипидемическое средство комбинированное (ГМГ-КоА-редуктазы ингибитор + холестерина абсорбции ингибитор). Показания к применению: Первичная гиперхолестеринемия. Препарат Розулип® Плюс показан в дополнение к диете пациентам с первичной гиперхолестеринемией (за исключением гетерозиготной семейной гиперхолестеринемии). Розулип® Плюс назначается в качестве заместительной терапии пациентам, липидный профиль которых адекватно контролировался одновременным применением отдельных препаратов розувастатина и эзетимиба в дозах, эквивалентных соответствующим дозам в фиксированной комбинации. Противопоказания: Повышенная чувствительность к розувастатину, эзетимибу или любому из компонентов/вспомогательных веществ в составе препарата; заболевания печени в активной фазе, включая стойкое повышение сывороточной активности трансаминаз и любое повышение активности трансаминаз в сыворотке крови; умеренная и тяжелая степень печеночной недостаточности; одновременный прием циклоспорина; беременность, период грудного вскармливания, отсутствие надежных методов контрацепции у женщин с сохранной репродуктивной функцией; тяжелые нарушения функции почек (КК < 30 мл/мин); миопатия; предрасположенность к развитию миотоксических осложнений; дети и подростки до 18 лет. Побочные действия: Побочные эффекты, наблюдаемые при приеме розувастатина, обычно выражены незначительно и проходят самостоятельно. Часто: сахарный диабет (для розувастатина, частота зависит от наличия или отсутствия факторов риска (концентрация глюкозы натощак $\geq 5,6$ ммоль/л, индекс массы тела >30 кг/м², повышение концентрации ПГ, артериальная гипертензия в анамнезе); головная боль, головокружение; запор, тошнота, боль в животе, диарея, метеоризм; миалгия; астения, утомляемость; повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и/или аспартатаминотрансферазы (АСТ). Влияние на способность к вождению транспортных средств и управлению механизмами. Не проводилось исследований для оценки влияния Розулип® Плюс на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами, однако следует учитывать, что во время лечения может возникнуть головокружение. Код АТХ: С10ВА06. Срок годности: 3 года. Перед применением необходимо ознакомиться с полной инструкцией по медицинскому применению препарата.



Организация, принимающая претензии потребителей:
ООО «ЭГИС-РУС». 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8.
Тел: (495) 363-39-66, Факс: (495) 789-66-31.
E-mail: moscow@egis.ru, www.egis.ru



МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ