

Карточки

«Животные зимой и летом»

© Данный материал авторский!

Комплект предназначен только для личного использования, распространение в коммерческих целях запрещено, так же запрещается редактировать, копировать, выкладывать его в сеть интернет без ссылки на автора @m_bezb

Все и изображения, которые использованы в комплекте, были найдены в сети интернет, как свободно распространяемые.

Зимой



БЕЛКА

Каждую осень белки делают запасы на зиму, пряча по разным укромным местам орехи, шишки, грибы, разные корни. Чтобы пережить зиму одной белке необходимо около 3 000 орехов. Белка сезонно меняет окраску.



Летом



БЕЛКА

Самое активное время суток у белок утро и вечер. Хвост белки служит рулем, когда она совершает прыжки. Самое развитое чувство у зверька — это слух. елка может остаться целой и невредимой при падении с высоты 30 метров.



Зимой



ГОРНОСТАЙ

На зиму горностаи сменяют свою окраску с коричневой на белую. Зимой в поисках добычи горностаи проходят 3 километра в день, а в летний период до 15 км.



Летом



ГОРНОСТАЙ

Горностаи очень быстро передвигаются. Горностаям нужно питаться каждые 2-3 часа. Горностаи хорошо лазают по деревьям, но увидеть зверька на дереве большая удача.



Зимой



СИНИЦА

На зиму синицы не улетают на юг, но перебираются из лесов в города, потому что там проще найти место, где можно погреться и добыть пропитание. Чёрный хлеб для синиц чрезвычайно опасен. Синиц можно подкармливать не соленым салом.



Летом



СИНИЦА

Летом синицы живут в лесах. За день птица поедает 300-400 гусениц. Синицы кормят своих птенцов по 30-40 раз в час. Во время полёта редко машут крыльями, но это не мешает им летать впечатляющей скоростью.



Зимой



РЫСЬ

Рысь хорошо приспособлена к снегу. Животное не боится сильных морозов, она способна выдерживать до -60° . Зимой у рыси шерсть становится темной.



Летом



РЫСЬ

Слух у рыси отменный, она способна услышать шаги человека на расстоянии в несколько километров. Без кисточек слух у животного сильно снижается. Рысь занесена в Красную книгу.



Зимой



МЕДВЕДЬ

За время спячки, которая может продлиться до полугода, медведь теряет до половины массы тела. Не все медведи впадают на зиму в спячку. Например, полярные медведи не спят. У белых медведей кожа чёрная.



Летом



МЕДВЕДЬ

У всех медведей два слоя шерсти — один защищает от воды, другой помогает сохранять тепло. Медведи действительно любят разорять пчелиные ульи, чтобы полакомиться мёдом.



Зимой



ВОЛК

Зимой меняет цвет шерсти. Мех волков состоит из двух слоев, подшерстка и верхних жестких волос.



Летом



ВОЛК

Волк умнее собаки. Вожак стаи всегда идет впереди своей стаи с высоко поднятым хвостом. Самая большая волчья стая может состоять из 40 особей.



Зимой



ЁЖ

Зимуют ежи обычно в норах, впадая в спячку из-за недостатка питания. В зависимости от запасов жира ежи могут залегать в спячку с начала зимы и до конца февраля.



Летом



ЁЖ

Ежи ночные животные. Рацион ежей состоит из различных насекомых и их личинок, моллюсков, мелких грызунов, змей. Эти животные достаточно доверчивы и быстро привыкают к людям.



Зимой



СОВА

Сидит сова на дереве посматривает, да прислушивается, а с приходом сумерек вылетает на охоту. Бесшумно летая над поверхностью снега. Услышав писк мыши под снегом, она делает точный бросок в снег за добычей.



Летом



СОВА

Большинство сов — ночные охотники. Глаза у сов неподвижные. За счет очень гибкой шеи сова может поворачивать голову на 270 градусов.



Зимой



БАРСУК

Впадает в спячку, но часто просыпается, а в оттепели может выходить из норы. Каждая особь зимует в отдельной гнездовой камере. Как только весной снег начинает таять, зверек окончательно просыпается.



Летом



БАРСУК

Тело барсука предрасположено к рытью, пальцы имеют тупые и длинные когти, шея короткая и за счет массивного тела, опираясь на коротенькие ножки, он проталкивает тело в землю. Норы с годами могут превращаться в целые городки.



Зимой



ГЛУХАРЬ

В начале зимы, когда снежный покров на земле минимальный, они ночуют на вершинах сосен. Когда землю покрывает толстый слой снега и наступают сильные морозы, глухари меняют свое место ночевки на снежные лунки.



Летом



ГЛУХАРЬ

Глухарь – птица осторожная и пугливая. Название «глухарь» произошло из-за строения слуховой системы этой птицы. Он теряет слух лишь на некоторое время, это происходит в период токования, то есть во время пения.



Зимой



СУСЛИК

Когда наступают холода и морозы, суслики прячутся в норы, и впадают в зимнюю спячку. Во время спячки пищи не употребляют. В таком состоянии суслики могут быть до 6-ти месяцев, а при неблагоприятных условиях и до 9-ти.



Летом



СУСЛИК

Суслики живут колониями. Они обустривают себе туннели и норы глубиной до 3 метров. Туннели могут быть очень запутанными, а их общая длина достигает порой 15 метров.



Зимой



БУРУНДУК

Бурундук запасливый, на зиму забивают "кладовку" орехами или семенами. С поздней осени и примерно до середины марта впадает в спячку. Раз в неделю бурундук просыпается и перекусывает имеющимися запасами.



Летом



БУРУНДУК

Бурундуки носят еду, пряча её в рот, за щёки. Взрослый бурундук способен таким образом за раз перенести десяток орехов. Бурундуки всегда чувствуют приближение дождя заранее.



Зимой



ЛЯГУШКА

Лягушка – амфибия. С наступлением холодов ныряет в пруд, зарывается в ил и остается там на всю зиму, практически не вдыхая кислород.



Летом



ЛЯГУШКА

Одновременно смотрит вверх, вперед и вбок. Дышит ртом на суше, а под водой кожей. В старину было принято бросать лягушек в емкость с молоком, так как их влажная кожа обладает бактерицидными свойствами, поэтому молоко никогда не скисало.

Зимой



ЗАЯЦ

Зимой зайчик меняет свою шубку на белую. Ведь белый цвет отлично подходит для маскировки. Зимой шерсть на брюшке удлиняется на пару миллиметров, чтобы животное не заморозило животик. Отрастают волосики и вокруг носа.

Летом



ЗАЯЦ

Зяц всеядное животное. Летом ему помогают спастись от перегрева уши, которые выводят тепло из организма. Зубы у косога растут всю жизнь. И «косога» заяц лишь потому, что петляет во время бега из-за асимметрии задних лап.