

***Какие бывают речедвигательные  
расстройства у детей раннего возраста***

**Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям!!!** В первые годы жизни ранние проявления неврологической симптоматики в мускулатуре и моторике артикуляционного аппарата приведут в дальнейшем к логопедическим проблемам, которые могут сохраниться у ребёнка на всю жизнь.

- ✓ **Нарушение мышечного тонуса** лица, губ, языка (в виде спастичности, гипотонии, дистонии)
- ✓ **Ограничение подвижности** губ, языка
- ✓ **Недостаточность смыкания губ**, затруднение удержания рта закрытым
- ✓ **Сглаженность носогубных складок**
- ✓ **Повышение глоточного рефлекса**
- ✓ **Гипомимия** (ослабление мимики за счёт снижения иннервации лицевой мускулатуры).
- ✓ **Асимметрия лица**
- ✓ **Гиперсаливация** (постоянная или усиливающаяся при определенных условиях).
- ✓ **Нарушение акта приема пищи:**
  - сосания (слабость, вялость, неактивность, неритмичность сосательных движений; подтекание молока изо рта);
  - глотания (поперхивание, захлебывание);
  - жевания (отсутствие или затруднение жевания твердой пищи);
  - откусывания от куска, питья из чашки.
- ✓ **Оральные синкинезии** (открывание рта при выполнении любого произвольного движения – до года должны исчезнуть)
- ✓ **Нарушения дыхания** (учащенное, неглубокое дыхание; поверхностный вдох, укороченный слабый выдох; преобладание брюшного дыхания).
- ✓ **Нарушения голосообразования:** недостаточная сила голоса (тихий, слабый, иссякающий), отклонения тембра (глухой, сдавленный, назализованный, хриплый, напряженный, прерывистый, дрожащий). Нарушение голосовых модуляций, интонационной выразительности.