

Национальный календарь прививок



В каком возрасте и когда делают прививку	Название прививки	Условия вакцинации, можно ли ставить и какие ограничения
Новорожденным, в первые двое суток после рождения.	Первая прививка от гепатита В.	Ставится всем детям после рождения, в особенности новорожденным, у кого родители болели гепатитом В.
На 3 или 7 день после рождения.	Прививка от туберкулеза	Первая серьезная вакцина. Ставится в плечо, оставляет шрам. Реакция может быть сильной.
В 1 месяц жизни	Повторная прививка от гепатита В	Ставится всем детям без ограничений.
2 месяца	Третья прививка от гепатита В	Без ограничений.
3 месяца	АКДС – от дифтерита, коклюша и столбняка. Первая прививка этого типа.	Самая опасная прививка. Если ребенок недоношенный, лучше подождать.
От 3-го до 6 месяца	Первая прививка от гемофильной инфекции.	Проводятся детям из группы риска – если есть склонность к этой болезни
От 4 до 5 месяцев	Первая прививка от полиомиелита.	Делается орально (капают ребенку в рот) или инъекцией.
	Вторая прививка АКДС.	Точный срок укажут после первой вакцинации. Если есть проблемы со здоровьем малыша – стоит обсудить повторную прививку с педиатром.
	Вторая вакцинация от гемофильной инфекции.	
	Вторая прививка от полиомиелита.	Без ограничений для здоровых детей.
Ребенок от 6 месяцев.	Третья прививка АКДС.	Ставят всем детям, но могут быть индивидуальные ограничения. Естественно, если был пропущен второй этап, делают его. Необходимо соблюдать периоды и поддерживать иммунитет ребенка в хорошем состоянии.
	Третья прививка от гепатита В	
	Третья вакцина от гемофильной инфекции	
	Третья – от полиомиелита	

Ребенку – 1 год.	Сборная прививка от кори, краснухи, паротита. Могут быть отдельные вакцины.	Противопоказания – аллергия (особенно на яйцо), слабый иммунитет.
	Четвертая прививка от гепатита В.	
Дети в 1,5 года.	Ревакцинация от дифтерии, коклюша и столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции.	Все согласно возрасту, предусмотрены индивидуальные ограничения.
Ребенку – 2 года.	Прививка от полиомиелита.	По рекомендациям Министерства здравоохранения.
Ребенку – 6 лет	Ревакцинация: корь, краснуха и эпидемический паротит.	Ставится для поддержания иммунитета от данных заболеваний. Пропускается по индивидуальным особенностям.
Дети 6-7 лет	Вторая ревакцинация от дифтерита и столбняка.	Делают на основании индивидуальных предписаний, чаще всего, после анализов.
Дети в 7 лет	Ревакцинация от туберкулеза.	Если отрицательная реакция Манту. То есть, если после Манту следа не останется никакого на руке.
Подростки после 14 лет	Еще одна ревакцинация от дифтерии и столбнячной инфекции.	Обычно ставят всем детям без иммунных нарушений. Делают прививку в школе.
	От полиомиелита.	
Дети и взрослые до 18 лет	БЦЖ от туберкулеза.	При отрицательной реакции Манту.
	Очередная ревакцинация от дифтерии и столбняка.	Будет ставиться каждые 10 лет.
Дети и взрослые от 1 до 18 лет	Прививка от краснухи.	Детям, не болевшим этой болезнью. Ставят также девушкам детородного возраста от 18 до 25 лет, которые раньше не прививались.
Школьники, студенты, взрослые с 6 лет.	Прививка от гриппа.	
Подростки в 15-17 лет	Вакцина от кори.	Ставится всем, кто раньше не прививался и не имеет противопоказаний.