

О профилактических
прививках
детям



МУЗ «Городская детская поликлиника № 2»
Рязань 2008 год.

В последние годы в нашей стране участились случаи заболевания детей дифтерией, корью, полиомиелитом, коклюшем, столбняком, туберкулезом, гепатитом. Особенно часто и тяжело болеют дети, которым не были сделаны прививки или вакцинация была проведена несвоевременно.

Зачем нужны профилактические прививки детям?

Прививки, полученные ребенком в детстве, создают основу иммунитета (невосприимчивости к инфекциям).

Оказывают вакцины среднее влияние на организм ребенка?

Все современные вакцины, применяемые в нашей стране, проходят тщательный контроль и соответствуют мировым стандартам. Они не оказывают вредного влияния на организм ребенка.

Почему прививки делают повторно?

Для поддержания надежного иммунитета.

Можно ли прививать часто болеющих, ослабленных детей?

Таких детей надо прививать в первую очередь, так как они наиболее подвержены инфекциям, протекающих у них, как правило, в тяжелой форме.

Может ли заболеть привитый ребенок?

Да, может, так как никакая вакцина не дает 100% гарантии на всю жизнь. Однако, это происходит редко, а в случае заболевания привитый ребенок переносит заболевание в легкой форме и не погибает.

Возможна ли реакция на прививки?

Да, но она всегда бывает легче той инфекции, против которой делается прививка.

В чем может выражаться реакция на прививки?

Наиболее частой реакцией на прививки является кратковременное повышение температуры, местные реакции (краснота, припухлость в месте прививки). Температура редко бывает выше $38,5^{\circ}\text{C}$, держится не более 1-2 дней, обычно снижается без применения лекарственных препаратов.

Как нужно готовить ребенка к прививкам?

Нужно оберегать ребенка от контактов с инфекционными больными, строго соблюдать диету у детей с пищевой аллергией. В день прививки ребенка осматривает врач, ему измеряется температура.

В чем нуждается ребенок после проведения прививки?

Во внимательном отношении к себе со стороны взрослых. В случае изменения поведения ребенка, повышения температуры, появления жалоб, они должны обязательно обратиться к врачу.

Помните!

Прививая ребенка, вы спасете его от инфекционных заболеваний, отказываясь от прививки, вы рискуете здоровьем и жизнью ребенка!



КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК.

Возраст		Наименование прививки
Новорожденные (первые 12 часов жизни)	V1	Первая вакцинация против вирусного гепатита В
Новорожденные (3-7 дней)	V	Вакцинация против туберкулеза
1 месяц	V2	Вторая вакцинация против вирусного гепатита В
3 месяца	V1	Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита
4,5 месяца	V2	Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита
6 месяцев	V3	Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита
	V3	Третья вакцинация против вирусного гепатита В
12 месяцев	V	Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
18 месяцев	R1	Первая ревакцин. против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита
20 месяцев	R2	Вторая ревакцинация против полиомиелита
6 лет	R	Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
	R2	Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка
7 лет	R1	Ревакцинация против туберкулеза
13 лет	V	Вакцинация против краснухи (девочки)
		Вакцинация против вирусного гепатита В (ранее не привитые -3-хкратно)
14 лет	R3	Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка
	R1	Ревакцинация против туберкулеза
	R3	Третья ревакцинация против полиомиелита
Взрослые		Ревакцинация против дифтерии, столбняка – каждые 10 лет от момента последней ревакцинации

Примечание.

1. Иммунизация в рамках национального календаря профилактических прививок проводится вакцинами отечественного и зарубежного производства зарегистрированными и разрешенными к применению в установленном порядке в соответствии с инструкцией по их применению.

2. Детям, родившимся от матерей, носителей вируса гепатита В или больных вирусным гепатитом В в третьем триместре беременности вакцинация против вирусного гепатита В проводится по схеме 0-1-2-12 месяцев.

3. Вакцинация против гепатита В в 13 лет проводится ранее не привитым по схеме 0-1-6 месяцев.

4. Вакцинация против краснухи проводится девочкам в 13 лет ранее не привитым или получившим только одну прививку.

5. Ревакцинация против туберкулеза в 14 лет проводится не инфицированными микробактериями туберкулеза туберкулинотрицательным детям.

6. Ревакцинация против туберкулеза в 14 лет проводится не инфицированными микробактериями туберкулеза туберкулинотрицательным детям, не получившим прививку в 7 лет.

7. Применяемые в рамках национального календаря профилактических прививок вакцины (кроме БЦЖ) можно вводить одновременно разными шприцами в разные участки тела, или с интервалом 1 месяц.

8. При нарушении срока начала прививок последние проводят по схемам предусмотренным настоящим календарем и инструкциями по применению препаратов.