

## Листовка

### Прививаться против гриппа нужно!

Грипп – инфекция непредсказуемая и очень коварная. Единственной эффективной мерой защиты населения от гриппа является вакцинация, которая приводит к существенному снижению заболеваемости и смертности. Высокий уровень охвата профилактическими прививками организованного коллектива обеспечивает, как индивидуальную защиту, так и снижает заболеваемость гриппом среди не вакцинированного населения.

В связи с ежегодной сменой штаммового состава вакцин и непродолжительным иммунитетом (6-12 месяцев) как после прививки, так и после перенесенного заболевания, вакцинацию необходимо проводить ежегодно. Оптимальным сроком проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь.

Согласно национальному календарю профилактических прививок вакцинация против гриппа за счет средств федерального бюджета проводится следующим групп население: детям с 6 месяцев, учащимся 1 - 11 классов, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, лицам, подлежащих призыву на военную службу, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Руководителям всех учреждений и предприятий необходимо обеспечить иммунизацию сотрудников, прививаемых против гриппа вне Национального календаря прививок за счет средств организации. Отечественные вакцины не содержат консерванты (мертиолят), по качеству приближаются к импортным аналогам, имеют современную форму выпуска (готовая к применению шприц-доза). В состав вакцин входят актуальные штаммы вирусов гриппа, которые ежегодно обновляются. Вакцина не содержит живых вирусов, поэтому заболеть гриппом в результате проведенной прививки невозможно. Противопоказанием к введению вакцины является только аллергия к белкам куриного яйца, временно отводятся от прививки лица с ОРВИ и хроническими заболеваниями в стадии обострения. В первую очередь, необходимо не отводить от вакцинации, а прививать страдающих хроническими заболеваниями, так как они наиболее восприимчивы ко всем инфекциям. Привитой имеет защиту от инфекции только с 14 дня после прививки.

Важно, прививку сделать вовремя, чтобы защита от гриппа успела сформироваться до начала периода подъема заболеваемости.

**Сделайте прививку против гриппа, защитите себя и своих детей!**

Балахнинский ТО УРПН