

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

2.804.004.1

Москва

№ 4

Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 3.3686-21
«Санитарно-эпидемиологические
требования по профилактике
инфекционных болезней»



В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2021, № 29, ст. 4504), постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (приложение).

2. Ввести в действие санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» с 01.09.2021.

3. Установить срок действия санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» до 01.09.2027.

4. Установить, что пункт 1234 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» действует до внесения изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277) в части регулирования порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников в отношении лиц, подвергнутых риску заражения бруцеллезом.

5. Признать утратившими силу с 01.09.2021:

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.04.2003 № 60 «О внесении в действие Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.1288-03» (зарегистрировано Минюстом России 22.05.2003, регистрационный № 4584);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 85 «О внесении в действие Санитарно-эпидемиологических правил СП 1.2.1318-03» (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2003, регистрационный № 4558);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О внесении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03» (зарегистрировано Минюстом России 19.06.2003, регистрационный № 4757);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.08.2007 № 61 «Об утверждении СП 3.1.2260-07» (зарегистрировано Минюстом России 17.09.2007, регистрационный № 10149);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.01.2008 № 3 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 1.4.2318-08» (зарегистрировано Минюстом России 03.04.2008, регистрационный № 11459);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2008 № 4 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08» (зарегистрировано Минюстом России 21.02.2008, регистрационный № 11497);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2008 № 14 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.2341-08» (зарегистрировано Минюстом России 26.03.2008, регистрационный № 11411);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.03.2008 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08» (зарегистрировано Минюстом России 01.04.2008, регистрационный № 11444);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.03.2008 № 19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08» (зарегистрировано Минюстом России 01.04.2008, регистрационный № 11446);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.04.2008 № 29 «Об утверждении СП 3.4.2366-08» (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2008, регистрационный № 11760);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.06.2008 № 34 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08» (зарегистрировано Минюстом России 25.06.2008, регистрационный № 11881);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2009 № 42 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3.2518-09» (зарегистрировано Минюстом России 08.07.2009, регистрационный № 14280);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2009 № 43 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.2521-09» (зарегистрировано Минюстом России 09.07.2009, регистрационный № 14285);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 36 «Об утверждении СП 3.1.7.2616-10» (зарегистрировано Минюстом России 08.06.2010, регистрационный № 17526);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 37 «Об утверждении СП 3.1.7.2615-10» (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2010, регистрационный № 17448);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 38 «Об утверждении СП 3.1.7.2614-10» (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный № 17491);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 39 «Об утверждении СП 3.1.7.2613-10» (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2010, регистрационный № 17435);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.05.2010 № 53 «Об утверждении СП 3.1.2.2626-10» (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный № 17506);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54 «Об утверждении СП 3.1.7.2627-10» (зарегистрировано Минюстом России 19.07.2010, регистрационный № 17891);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.05.2010 № 56 «Об утверждении

СП 3.1.7.2642-10» (зарегистрировано Минздравом России 17.06.2010, регистрационный № 17577);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.05.2010 № 61 «Об утверждении СП 3.1.7.2642-10» (зарегистрировано Минздравом России 07.07.2010 № 17745);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.12.2010 № 181 «Об утверждении СП 3.1.7.2811-10 «Профилактика коклюша (исхоразо Ку)» (зарегистрировано Минздравом России 21.03.2011, регистрационный № 20201);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 185 «Об утверждении СП 3.1.7.2815-10 «Профилактика орнитоза» (зарегистрировано Минздравом России 17.03.2011, регистрационный № 20170);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 186 «Об утверждении СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у людей» (зарегистрировано Минздравом России 21.03.2011, регистрационный № 20202);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 188 «Об утверждении СП 3.1.7.2816-10 «Профилактика кампилобактериоза среди людей» (зарегистрировано Минздравом России 14.03.2011, регистрационный № 20083);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2010 № 190 «Об утверждении СП 3.1.7.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А» (зарегистрировано Минздравом России 10.03.2011, регистрационный № 19737);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 № 1 «Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» (зарегистрировано Минздравом России 24.03.2011, регистрационный № 20263);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.01.2011 № 6 «Об утверждении СП 3.1.7.2835-11 «Профилактика лептоспиральной инфекции у людей» (зарегистрировано Минздравом России 17.03.2011, регистрационный № 20168);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2011 № 10 «Об утверждении СП 3.1.7.2836-11 «Изменения и дополнения № 1 к СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» (зарегистрировано Минюстом России 14.03.2011, регистрационный № 20084);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 86 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.2885-11 «Дополнения и изменения № 2 к СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» (зарегистрировано Минюстом России 12.07.2011, регистрационный № 21317);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.07.2011 № 106 «Об утверждении СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (менюлия) инфекции» (зарегистрировано Минюстом России 24.11.2011, регистрационный № 22389);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2011 № 107 «Об утверждении СП 3.1.2951-11 «Профилактика дождевых лих» (зарегистрировано Минюстом России 24.11.2011, регистрационный № 22378);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2011 № 108 «Об утверждении СП 3.1.2952-11 «Профилактика корн. крипуса в эпидемиологический паротит» (зарегистрировано Минюстом России 24.11.2011, регистрационный № 22379);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 52 «Об утверждении СП 3.1.7.3107-13 «Профилактика лихорадки Западного Нила» (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2014, регистрационный № 32320);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 53 «Об утверждении СП 3.1.7.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (зарегистрировано Минюстом России 14.06.2014, регистрационный № 31602);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 54 «Об утверждении СП 3.1.2.3109-13

«Профилактика дифтерии» (зарегистрировано Минюстом России 20.05.2014, регистрационный № 32331);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 57 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.2.3110-13 «Профилактика тифозно-паратифоза» (зарегистрировано Минюстом России 20.01.2014, регистрационный № 31053);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 58 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С» (зарегистрировано Минюстом России 19.03.2014, регистрационный № 31646);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 59 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка» (зарегистрировано Минюстом России 06.06.2014, регистрационный № 32613);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 62 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика инфекционных заболеваний» (зарегистрировано Минюстом России 05.02.2014, регистрационный № 31225);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (зарегистрировано Минюстом России 04.04.2014, регистрационный № 31831);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2013 № 64 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)» (зарегистрировано Минюстом 19.05.2014, регистрационный № 32326);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65 «Об утверждении СП 3.1.3.2.3146-13» (зарегистрировано Минюстом России 16.04.2014, регистрационный № 32001);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.12.2013 № 66 «Об утверждении СП 3.1.2.3149-13» (зарегистрировано Минюстом России 09.04.2014, регистрационный № 31452);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.12.2013 № 67 «Об утверждении СП 3.1.2.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки» (зарегистрировано Минюстом России 17.04.2014, регистрационный № 32002);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2013 № 69 «О внесении изменений № 1 в СП 3.1.3.2352-08» (зарегистрировано Минюстом России 03.03.2014, регистрационный № 31476);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.03.2014 № 9 «Об утверждении СП 3.1.2.3162-14» (зарегистрировано Минюстом России 19.06.2014, регистрационный № 32810);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 № 50 «Об утверждении СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 12.11.2014, регистрационный № 34659);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 № 58 «Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (зарегистрировано Минюстом России 26.02.2015, регистрационный № 36212);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.02.2015 № 6 «О внесении изменений в пункт 9.5 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (зарегистрировано Минюстом России 19.02.2015, регистрационный № 36094);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.06.2015 № 20 «Об утверждении СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при энтомологических вмешательствах» (зарегистрировано Минюстом России 21.07.2015, регистрационный № 38116);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.11.2015 № 78 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся воздушно-капельным путем» (зарегистрировано Минюстом России 12.02.2016, регистрационный № 41065);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2015 № 97 «О регистрации постановления о внесении изменения № 1 в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2016, регистрационный № 40901);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2016 № 1 «О внесении изменений № 2 в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 10.02.2016, регистрационный № 41052);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.02.2016 № 19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения биологических лекарственных препаратов» (зарегистрировано Минюстом России 28.04.2016, регистрационный № 41968);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.05.2016 № 65 «О внесении изменений № 1 в СП 3.1.1.2521-09» (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2016, регистрационный № 42451);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2016 № 93 «О внесении изменений в СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» (зарегистрировано Минюстом России 20.10.2016, регистрационный № 44101);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.11.2016 № 173 «О внесении изменений № 1 в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 20.12.2016, регистрационный № 44816);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.03.2017 № 44 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.3465-17 «Профилактика чумы» (зарегистрировано Минюстом России 16.08.2017, регистрационный № 47817);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.03.2017 № 45 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.05.2010 № 56 (зарегистрировано Минюстом России 15.08.2017, регистрационный № 47778);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекционных мероприятий в борьбе с клещевыми, клещевыми эндемическими и санитарно-гигиеническими заболеваниями» (зарегистрировано Минюстом России 27.09.2017, регистрационный № 48349);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.06.2017 № 84 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифа» (зарегистрировано Минюстом России 25.08.2017, регистрационный № 47972);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.12.2017 № 149 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.3103-02 «Профилактика острых кишечных инфекций», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 53» (зарегистрировано Минюстом России 28.12.2017, регистрационный № 49508);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.02.2018 № 12 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3525-18 «Профилактика лихорадки оспы и

опиывающего лощав» (зарегистрйровано Минздравом России 19.04.2018, регистрационный № 50833);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2018 № 52 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3542-18 «Профилактика менингококковой инфекции» (зарегистрйровано Минздравом России 09.01.2019, регистрационный № 53254);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.09.2020 № 26 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 60 в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (зарегистрйровано Минздравом России 05.10.2020, регистрационный № 60259).



[Handwritten signature]

А.Ю. Пашова

УТВЕРЖДЕНЫ
главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации
от 28.01.2021 № 4

**Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней»**

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящие санитарные правила и нормы (далее – Санитарные правила) разработаны с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней среди населения Российской Федерации.

2. Санитарные правила устанавливают обязательные требования:

к коммунальному предприятиям, профессиональным, в том числе учебно-профессиональным, санитарно-противоэпидемиологическим лабораториям, для осуществления мероприятий, направленных на обеспечение раннего выявления, протекторизацию населения и распространения инфекционных болезней среди населения Российской Федерации:

к организациям, санитарно-противоэпидемиологическим (профилактическим), инженерно-техническим мероприятиям, направленным на обеспечение личной и общественной безопасности, защиту окружающей среды при работе с микроорганизмами, вирусами, белковошаровыми инфекционными агентами (применяя, в том числе биохимическое происхождение (токсичность) в целях биологической защиты, в том числе созданными в результате генетических манипуляций, применением технологий синтетической биологии и другой направленной деятельности, способных вызывать экологический процесс и организм человека или животного, а также биологические материалы, в которых могут содержаться переносимые вирусы (далее – ПБА);

к порядку учета, хранения, передачи и транспортирования ПБА, а также объектам и материалам, содержащим или подпадающим под содержание ПБА.

3. Санитарные правила распространяются на проведение следующих видов работ с использованием ПБА, а также с использованием объектов и материалов, содержащих ПБА или подозрительных на содержание ПБА:

1) лабораторные исследования объектов биотической и абиотической природы:

с целью выявления возбудителей ПБА (индикаторов ПБА), в том числе: установление биологической природы агента, detection нуклеиновых кислот, обнаружение антигенов или антител к патогенному агенту, нуклеотидных кислот и других маркеров;

с целью выявления и идентификации ПБА;

2) экспериментальные работы, включая манипуляции на молекулярном, клеточном уровнях для создания модифицированных, в том числе генно-инженерно-модифицированных, вариантов ПБА, с использованием микроорганизмов и продуктов их микробиологического синтеза, при этом, исключая в виде биологического происхождения:

микробиологические (вирусологические) исследования (в том числе с использованием животных);

цитофизиологические исследования;

исследования в области биотехнологии, в том числе генно-инженерная деятельность;

3) прикладные работы (работы по производству микробиологических препаратов: вакцин, сывороток, ферментов, культуральных диагностических тест-систем, и других продуктов с использованием микроорганизмов и продуктов их микробиологического синтеза);

4) обезвреживание материалов, содержащих или подозреваемых на содержание ПБА (участки/секторы/объекты/организмы, осуществляющие деятельность по обезвреживанию объектов, содержащих или подозреваемых на содержание ПБА, химических и (или) физическими методами);

5) зоолого-антропологические работы, включая сбор зоолого-парazitологического материала, объектов окружающей среды на определенных по зоолого-санитарным критериям территориях и его транспортирование, содержание диких позвоночных животных и человекообразных;

6) работы с ПБА в целях инфекционных исследований, в инфекционных больницах (подразделениях), изоляторах и учреждениях, определенных для исследований (лабораториях);

7) обучение специально подготовленной медицинской помощи в больницах (клиниках), изоляторах и учреждениях с койками, предназначенными для оказания (далее — обсерваториях);

8) лечение больных особо опасными инфекционными болезнями;

9) работы, связанные с сбором клинического, серологического или любого иного биологического материала людей и животных, содержащего или содержащегося в содержимом ПБА, в том числе при патологическом исследовании трупох людей и паших животных, или проводимых исследований по обнаружению и идентификации ПБА;

10) работы по хранению, передаче, транспортированию ПБА I - IV групп патогенности (инфекционная опасность);

11) образовательная деятельность с использованием ПБА;

12) другие виды работ с использованием ПБА или с использованием объектов и материалов, содержащих ПБА или подготавливаемых на содержание ПБА;

4. Санитарные правила распространяются на трудов, выполняющих профессиональные и юридические лиц.

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

5. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должны обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусов, бактерий, грибов и плесень) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), в том числе должны соблюдаться и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, включая охраняемые территории (варианты), осуществлению производственного контроля, принятии мер в отношении больных инфекционными болезнями, передачи и передачи (санитарно-гигиенические мероприятия, проведение эпидемиологического контроля, организации и осуществления профилактических мероприятий, эпидемиологического контроля и обучения персонала).

6. Проведение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки или при угрозе ее возникновения обеспечивается органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. При необходимости в проведении санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий или действий руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека могут быть задействованы специализированные профилактические бригады

«СПЭБГ», функционирующие на базе протипочувствительных или модифицированных энзимостойких групп, функционирующие на базе научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора.

7. Задачи эпидемиологических санитарно-противоэпидемиологических комплексов в субъектах Российской Федерации для оперативного управления и координации деятельности по предупреждению возникновения и распространения инфекционных болезней, а также их осложнений, проводятся в установленном порядке в режиме единого плана в карантин, а также в оперативном порядке при возникновении или угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

8. В целях обеспечения протипочувствительной деятельности и проведения мероприятий в случае возникновения или возникновения опасных инфекций, возможных внутренних перемещаемых переносов, инфекционных болезней в течение эпидемии, предоставления помощи для населения Российской Федерации в экстренных ситуациях должны быть приняты все необходимые меры по проведению санитарно-противоэпидемиологических мероприятий при возникновении болезни (угрозы), предотвращению на эту деятельность.

9. Санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия должны включать в себя разработанные методы профилактики, охраны и улучшения здоровья населения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также комплексные меры по профилактике инфекционных болезней.

10. Санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия проводятся органами государственной власти, органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья, при этом, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, единственными организациями, гражданами, а также индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью.

11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны разработать и утвердить программу производственного санитарно-эпидемиологического надзора и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и приведении санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий при оказании услуг и оказании услуг, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, и обеспечить его выполнение.

**Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности
питательной в эпидемиологическом отношении питьевой воды**

12. Для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней население должно обеспечиваться безопасной и эпидемиологически чистым питьевой водой в количествах, достаточных для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей человека¹.

13. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней надлежащие предприятия и юридические лица, владельцы и лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных, централизованных, местных распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населенных, в том числе и сельских, пунктов, и систем питьевого водоснабжения на транспорте, средства обязаны обеспечивать соответствие качества питьевой воды установленным требованиям².

**Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению
благоприятных условий жизнедеятельности населения**

14. Условия проживания в жилых зданиях и помещениях, не содержащих в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней опасности соответствовать требованиям санитарной безопасности⁴.

15. При эксплуатации производственных, общественных зданий, сооружений и оборудования должны обеспечиваться безопасные в эпидемиологическом отношении условия труда, быта и отдыха и осуществляться мероприятия по охране окружающей

¹ Статья 19 Федерального закона от 30.09.1994 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

² Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), принятый решением Комитета Таможенного союза от 09.12.2011 № 808 (официальный сайт Комитета Таможенного союза www.eurasia.int, 15.12.2013) (далее – ТР ТС 021/2011); и техническое регулирование на отдельные виды пищевой продукции. Указом Президента Российской Федерации от 18.11.2011, ратифицированным Федеральным законом от 01.12.2011 № 374-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийской экономическом союзе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7083), и также Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 379-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 40, ст. 5310); Федеральный закон от 09.12.2011 № 410-ФЗ «О техническом и стандартизации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.12.2011, № 50, ст. 7334; 2012, № 14, ст. 2014); постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2012 № 3 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3684-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания, жилища, и объектов и содержанию территории» (далее – СП 2.1.3684-11); постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-12 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-12).

⁴ Федеральный закон от 09.12.1992 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.1.3684-11; СанПиН 1.2.3685-12.

срочны, возпрещенные на предупредительное возмощивание и распространения инфекционных болезней, а также связан с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности питания населения

16. В целях предупредительного возмощивания и распространения инфекционных болезней питания, находящихся в обращении, в течение срока годности при возмощивании по назначению должны быть обеспечены и эпидемиологическими требованиями и санитарно-эпидемиологическими требованиями¹.

17. Для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней при организации питания населения в объектах обслуживания населения (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), а также при приготовлении пищи и напитков, их хранения и реализации необходимо, должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования².

Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению благоприятных условий воспитания и обучения населения

18. В организациях воспитания и обучения, отдыха детей и их оздоровления должны обеспечиваться условия, предупредительное возмощивание и распространение инфекционных болезней, а также связан с санитарно-эпидемиологическими требованиями³.

¹ ТР ТС 021/2011 «Технические регламенты на отдельные виды пищевой продукции: поставленные Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.04.2020 № 52 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3.2.1.500-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (зарегистрировано Министром России 11.11.2020, регистрационный № 65813); далее - СанПиН 2.3.2.1.500-20, постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.11.2020 № 36 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.3568-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию» (зарегистрировано Министром России от 12.2020, регистрационный № 61570).

² Статья 17 Федерального закона от 30.06.1995 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» СанПиН 2.3.2.1.500-20.

³ Статья 28 Федерального закона от 30.06.1995 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3649-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей и обучающихся, отдыха и оздоровления детей и молодежи», вступившего в силу 12.2020, регистрационный № 61571», СанПиН 1.2.3685-21.

**Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению
условий пребывания населения в лечебных организациях**

19. При планировке, капитальном благоустройстве медицинских организаций должны предусматриваться меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования¹.

20. В медицинских организациях должны обеспечиваться безопасные условия труда медицинских работников, соблюдаться санитарно-противоэпидемиологический режим, осуществляться мероприятия по предупреждению возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

**Выявление, учет и регистрация больных инфекционными болезнями и лиц
с подозрением на инфекционные болезни, носителей возбудителей инфекционных
болезней**

21. Врачи всех специальностей, средние медицинские работники медицинских организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций отдыха детей и их содержание, а также других организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие медицинскую деятельность (далее – медицинские работники), обязаны выявлять больных инфекционными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, а также носителей возбудителей инфекционных болезней.

22. Выявление больных и носителей возбудителей при обращении тех лиц за медицинской помощью, а также при обращении:

периодических и аварийных при поступлении на работу, профилактических медицинских осмотров:

медицинских осмотров в целях выявления случаев или случаев заболевания:

медицинского вмешательства на дому, общения с больным или носителем, носителями (носителями) болезней;

медицинских осмотров отдельных групп населения по специальному приглашению; лабораторных исследований биологического материала от людей.

23. Клиническая диагностика проводится на основании анамнеза заболевания, эпидемиологического анамнеза, жалоб, анамнеза, данных осмотра с учетом возможности стертой, атипичных форм заболеваний, лабораторных данных.

24. О каждом случае инфекционной болезни, носителями возбудителей

¹ Статья 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

инфекционной болезни для подозрения на инфекционную болезнь, а также в случае смерти от инфекционной болезни медицинские работники обязаны в течение 3 часов сообщить по телефону, а затем в течение 12 часов в письменной форме явля по каналам электронной связи представить соответствующее известие в территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по месту проживания больного (независимо от места его постоянного проживания).

25. Для обеспечения оперативной передачи информации о выявленных инфекционных органах, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, может быть предоставлен доступ к территориальным медицинским информационным системам.

26. Каждый случай инфекционной болезни для подозрения на эту болезнь, а также потенциально будущий инфекционный случай подлежат регистрации в учету в журнале учета инфекционных заболеваний (допускается использование электронных журналов) по месту их выявления в медицинских организациях, образовательных, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их сопровождающих, других организациях, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих медицинскую деятельность, а также в территориальных органах, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

27. Медицинская организация, выявившая или уточняющая диагноз, в течение 12 часов подает в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по месту проживания заболевшего, в установленном законодательстве (уточненном) порядке, данные об установлении первоначального диагноза, результаты лабораторного исследования.

28. Территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при получении сообщения об установленном (уточненном) диагнозе ставит в известность медицинскую организацию по месту выявления больного, представителю первичных экстренных вмешательств.

29. Учет зарегистрированных случаев инфекционных болезней осуществляется на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в формах федерального государственного статистического наблюдения.

Установление и изучение признаков, характеризующих наличие инфекционных болезней, возбудителей инфекционных болезней

10. Установление и изучение признаков, характеризующих наличие инфекционных болезней, посредством возбуждения инфекционных болезней осуществляется широким обзор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, в том числе эпидемиологического, проведения лабораторных исследований, патологоанатомических и иных исследований в целях установления диагноза.

11. Эпидемиологический анамнез собирается медицинским работником. При сборе эпидемиологического анамнеза устанавливаются:

жизнь и время контакта с источниками (человеком или животным) инфекционного заболевания или факторы его передачи (сырым животным происхождением, употреблением необработанной воды или пищевых продуктов);

происхождение из территории, где регистрируются инфекционные эпидемиологическая обстановка, типичных эпидемиологических очагов;

факта укусов животных, насекомых, членистоногих, насекомых и природных условий;

факта получения травм, ожогов, ран, проводимая медицинская парентеральная манипуляция;

связи с обильными реакциями на пищевые вакцины.

Данные эпидемиологического анамнеза заносятся в медицинское документирование.

12. Для установления диагноза инфекционного заболевания больного с подозрением на заболевание должен быть обеспечен лаборатория в целях определения возбудителя вызвавшего заболевание, любым из доступных методов диагностики.

Выявление ДНК/РНК возбудителя осуществляется с применением методов амплификации нуклеиновых кислот, иммуноферментного и иммунохроматографического анализа с использованием переносимых в соответствии с законодательством Российской Федерации наборов реагентов и оборудования, в том числе портативного при проведении тестирования на амплификационных (ИПЗ) условиях (автоматизированные ПЦР-станции с использованием оптических картриджа или ультракороткий п-одный комплект портативных приборов для выделения препаратов нуклеиновых кислот и проведения амплификации). Выявление патогенов осуществляется с соблюдением требований биологической безопасности.

В случаях инфекционных болезней с широким спектром возбудителей данных методов

быть осуществлен на основании клинико-эпидемиологических данных без лабораторного подтверждения.

33. Забор биологического материала производится в первый день обращения больного за медицинской помощью или сроки, рекомендованные для конкретной клинической формы инфекционного заболевания. В исследовании последующие плановые анализы назначаются в определенные дни клинико-эпидемиологической фазы течения.

34. При доступе биоматериала для исследования учитываются сроки забора и хранения биоматериала, условия и сроки транспортирования биоматериала, соответствие требованиям безопасности.

Организация и проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.

Мероприятия в лечебно-диагностическом центре

35. Мероприятия относительно больных инфекционными болезнями:

Больные инфекционными болезнями, лица с синдромом или инфекционным заболеванием, лица, контактирующие с больными инфекционными болезнями, лица, подвергшиеся укусу или укусам кровососущих членистоногих, укусы и повреждения кожи в результате деятельности насекомых, а также лица, контактирующие с больными животными (преимущественно сельскохозяйственными), подлежат лабораторному обследованию на наличие возбудителей инфекционных болезней и своевременному лечению или лечению (вакцинация, профилактика), и в случае если они продолжают находиться для окружающих, предпринимаются (или) предпринимаются:

лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, если они могут являться источником их распространения в связи с профессиональной деятельностью, в котором они заняты, или выполняемой ими работой, отстраняются от такой работы и могут по решению работодателя быть переведены на другие виды работ, не связанные с риском распространения инфекционных болезней.

36. Неопределенное и выявление больных инфекционными болезнями, лиц с подозрением на инфекционные болезни, выявление возбудителей инфекционных болезней:

Больные инфекционными болезнями госпитализируются по месту жительства, а также в специализированные инфекционные стационары (отделения) по необходимости и (или) клиническим показаниям;

выявленные (транспортируемые) больные и инфекционные стационары (отделения) осуществляются специальными санитарными транспортом в специально оборудованном транспортном средстве;

санитарной техники, а также создание инфекционных биотехнологических производств и оборудования для санитарной обработки транспорта, а также (дома, крытая площадка), помещений, помещений горячей и холодной воды, канализацию для отвода сточных вод.

37. Лечение больных инфекционными болезнями, возбудителей инфекционных болезней, зараженных на выписке в допуск к работе, транспортирующим, рассматриваемым:

Большая (подразделительная) инфекционная больница подает заявку на лицензирование или лицензирование (или) клинические показания и количество с законодательством Российской Федерации:

рекламационные показатели санитарному надзору.

38. Мероприятия в отношении лиц, общавшихся с больными инфекционными болезнями:

за лицами, общавшимися с больными, по месту жительства, работы, посещения, работы в медицинской, образовательной организации, по санитарно-эпидемиологическим показаниям устанавливаются медицинские наблюдения, а также отбор от контактной популяции формы проводимых на лабораторное обследование и акцентированную профилактику на основании эпидемиологического анализа и санитарных с санитарно-эпидемиологической формой наблюдения:

лабораторному обследованию подлежат лица, рассматриваемые в качестве источника инфекции в лицах, у которых в ходе медицинского обследования проявились симптомы инфекционного заболевания. Необходимость лабораторного обследования основных лиц, подтверждается путем заражения, определяется степенью (эпидемиологическая), ответственный за эпидемиологическое расследование лица инфекционной болезни.

Результаты лабораторного обследования подлежат санитарному надзору в медицинском учреждении постоянного проживания и включены в базу данных по учёту и регистрации случаев инфекционных болезней.

Перечень инфекционных болезней, санитарно-эпидемиологическим, при которых обязательным является медицинское наблюдение, лабораторное обследование и жёсткая профилактика лиц, общавшихся с больными (в том числе в эпидемиологических очагах), объём и порядок их проведения определяется законодательством Российской Федерации.

39. Раскрытие лиц, общавшихся с больными инфекционными болезнями, проводится по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

40. В целях предупреждения распространения возбудителей инфекций от больных (носителей) с их выделениями и через объекты внешней среды, включая объект

в больницах (послещинах), в лечебно-охранительных учреждениях осуществляются дезинфекционные мероприятия, обеспечиваются прерывание механизмы передачи дифтерийного агента и прекращение развития возбудителя в организме.

41. В лечебно-охранительных учреждениях проводится текущая и заключительная дезинфекция, дезинтация, дезинсекция и дератизация.

Текущая дезинфекция проводится в присутствии больных с момента выявления заболевания и до его прекращения или госпитализации. Выполняют текущую дезинфекцию лица, осуществляющие уход за больными, после проведения инструктаж медицинским работником.

В медицинских учреждениях текущая дезинфекция объектов внешней среды проводится с момента поступления больного и до его выписки сотрудниками медицинских организаций.

Заключительная дезинфекция проводится после излечения (госпитализации) в соответствии с законодательством Российской Федерации, смерти или выздоровления больного в домашних условиях, в медицинских учреждениях, по месту работы или учебы, на транспортных средствах и в других организациях.

Санитарно-эпидемиологические требования при введении карантина

42. В случае угрозы возникновения или распространения инфекционных болезней, представляющих опасность для здоровья населения, вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин, в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, на территории Российской Федерации, территориях соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципальных образований и организациях в их объектах хозяйственной и иной деятельности.

43. Инфекционные заболевания, представляющие опасность для здоровья населения, характеризуются наличием хотя бы двух из следующих признаков:

тяжелое течение;

высокая урочность заболеваемости и инвазивность;

быстрое (массовое) распространение среди населения;

новая, неизвестная инфекционная болезнь;

отсутствие средств специфической профилактики и лечения.

44. Ограничительные мероприятия (карантин) предусматривают особые условия и режимы жизнедеятельности и иной деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров.

45. В случаях введения ограничений на территории ответственности субъекта Российской Федерации или на территории отдельных районов, городов, муниципальных пунктов данного субъекта Российской Федерации органы исполнительной власти обеспечивают соблюдение, обустройство и функционирование в круглосуточном режиме контрольно-пропускных пунктов (постов) на границе карантинной территории, установившуюся для обеспечения процесса технического осмотра транспортных средств для пропуска, направляющих устройств в ограниченных пределах территории для обеспечения безопасности в местах размещения контрольно-пропускных пунктов.

46. Движение транспортных средств и людей через границу территории карантинных пунктов только через специально организованные и оборудованные контрольно-пропускные пункты (посты).

47. Ограничивается въезд граждан, не являющихся резидентами по месту жительства (места пребывания) на карантинной территории.

48. Одновременно въезд не распространяется на проезд, въезд которых на карантинной территории обусловлен выполнением или должностных обязанностей в сфере жизнеобеспечения и поддержания жизнедеятельности, обеспечения личной и общественной безопасности граждан, обеспечения функционирования объектов жизнеобеспечения населения, общественной транспорта, дорожной деятельности. Нехватка людям потребности поддерживать контакты, не связанные со служебной деятельностью.

49. Запрещается въезд (выход) людей с карантинной территории без прохождения осмотра. Медицинское обследование при въезде не проводится в течение вынужденного периода идентификации больных, в отнесенной к которой введет карантин.

50. Въезд товаров и грузов в зону карантина, а также выезд из зоны карантина допускается только по решению органов, которые введены ограничительные мероприятия (карантин).

51. Запрещается любое мероприятие, связанное с массовым скоплением людей. Проводятся работы по выявлению, осуществляющих обязательную деятельность, работу многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров социального обслуживания населения.

52. Граждане, являющиеся лицами и организациями, предпринимателями обязаны выполнять требования санитарного законодательства, постановлений, приказов органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический

нашир, и не осуществляли действия, ведущие к собою нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

53. Люди с симптомами, не исключившими инфекционного болезни, и повышенным уровнем заболеваемости подлежат госпитализации и лабораторному обследованию.

54. Контактными с больными людьми подлежат лабораторному обследованию. Медицинскому наблюдению и лечению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Условия осуществления контактов лиц определяются в каждом конкретном случае признакам в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и признаны в сфере охраны здоровья субъекта Российской Федерации или иным уполномоченным на решение указанных вопросов на соответствующей территории органом.

55. На территории карантина обеспечивается выполнение требований биологической безопасности окружающих организаций в зоне карантина, работа которых не приостановлена. Объем требований биологической безопасности определяется в каждом конкретном случае признакам, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

56. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают своевременное, достоверное и полное информирование населения с использованием всех доступных средств массовой информации о текущем состоянии и уровне заболеваемости инфекционными болезнями, и связанных с этим обязанностях, профилактических санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционных заболеваний, в том числе мерах индивидуальной профилактики.

57. При устранении угрозы распространения инфекционной болезни, в отношении которой введены чрезвычайные мероприятия (карантин), и (или) ликвидации эпидемического очага органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления по поручению главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации или министерства и (или) ведомства, ответственные за решение указанных вопросов на территориях закрытых административно-территориальных образований, принимают решение об отмене ограничительных мероприятий (карантин) на всей территории субъекта Российской Федерации или на территории отдельных районов, городов, населенных пунктов данного субъекта Российской Федерации.

Профилактические мероприятия

58. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, включая профессиональных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работников отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны принимать профилактические меры по предупреждению на рабочем и производственном местностях заболеваний¹.

59. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, вызывающей угрозу распространения инфекционных болезней среди населения, в том числе связанных с формированием эпидемических очагов с групповой заболеваемостью, обязательные медицинские осмотры проводятся на основании постановлений органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор².

60. Работодатели обязаны освободить работников от работы или прохождения медицинских осмотров и лечения в стационаре.

61. Работники, во исполнение обязательной санитарной оценки, отвечающей требованиям по прохождению медицинских осмотров, в случае при выявлении заболеваний, представляющих опасность для окружающих, работников и выполнения ими трудовых обязанностей.

Контроль доступа к работе лиц, не прошедших медицинских осмотров, обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

62. Данные и результаты медицинских осмотров, в первую очередь с информацией об обязательных требованиях для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат передаче в единую государственную информационную систему профилактики заболеваний, данные медицинских осмотров в учете и медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в целях осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

63. В случае выявления у работников при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания данный работник не допускается к работе до выздоровления. Основанием для доступа к работе служит справка врача и выздоровления. В случае выявления у работника хронического

¹ Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 25н «Об утверждении Порядка проведения обязательных профилактических и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 217 Трудового кодекса Российской Федерации, порядка медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные профилактические и периодические медицинские осмотры (наблюдения)» Минздрав России 29.01.2021, регистрационный № 02-077 (далее - приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 25н).

² Статья 51 Федерального закона от 30.05.2019 № 116-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

инфекционного заболевания или возмездия работодателя инфекционным заболеванием также об ограничении от работы решается в соответствии с законодательством Российской Федерации¹¹.

64. Профилактические прививки применяются гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации¹².

65. Профилактические прививки массово проводятся медицинскими организациями, лицензированными или соответствующими нормативными.

66. Решение о проведении иммунизации населения в рамках календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям принимается правительством государственного санитарного врача субъектов Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации.

67. Внеплановая иммунизация граждан при эпидемиологическом неблагополучии, возникающем чрезвычайных ситуаций различного характера, в случае инфекционных болезней проводится на федеральном уровне по поручению поставившего Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в том числе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, в случае инфекционных болезней на уровне субъекта Российской Федерации, а тем более на отдельных объектах, — по поручению поставившего Главного государственного санитарного врача субъектов Российской Федерации.

68. Для иммунопрофилактики используются иммунобиологические лекарственные препараты, зарегистрированные в Российской Федерации.

69. Хранение и транспортирование иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для иммунизации населения, на всех этапах должно осуществляться с соблюдением температурных режимов хранения и транспортирования.

70. Профилактические прививки, а также случаи нежелательных реакций и осложнения должны вноситься в иммунологический учетный документ, который подается регистратору и учету по месту их проведения в медицинских организациях и в органах, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

¹¹ Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2002, № 1, ст. 14).

¹² Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 38, ст. 4736, 2004, № 51, ст. 5074) (далее — Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ); Федеральный закон от 30.03.1999 № 54-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

71. В медицинских организациях, осуществляющих иммунопрофилактику, должен быть обеспечен учет населения, подлежащего профилактическим прививкам.

72. Факт проведения профилактической прививки или отказа от нее в установленном виде должен быть зафиксирован в медицинских документах постоянного хранения.

73. Иммунизация должна осуществляться в соответствии с медицинскими показаниями и прививочным календарем.

Гигиеническое воспитание и обучение граждан по вопросам профилактики

74. В целях повышения санитарной культуры населения, профилактики инфекционных болезней, пропаганды здорового образа жизни должны проводиться гигиеническое воспитание и обучение граждан¹¹.

75. Гигиеническое воспитание и обучение осуществляется в процессе посещения и обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и образовательных организациях, а также при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц в различных организациях, деятельность которых связана с профессиональным хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.

76. Вопросы профилактики инфекционных и паразитарных болезней должны быть включены в программы обучения и воспитания, образовательные требования при проведении аттестации работников.

77. Гигиеническое воспитание населения осуществляется в процессе воспитания и обучения, с использованием средств массовой информации, информационно-коммуникативной сети Интернет, распространения информационных материалов среди различных групп населения, в виде лекций и бесед в организациях и в индивидуальном порядке.

78. Гигиеническое воспитание и обучение граждан проводится по плану 1 раз в год либо иной предусмотренный санитарными правилами периодичностью.

¹¹ Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

III. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ, ДЕРАТИЗАЦИОННОЙ И ДЕЗИНСЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

79. Деинфекционная деятельность предусматривает организацию и осуществление работ и услуг, включающих борьбу с патогенными микроорганизмами, возбудителями различных болезней, грибами и их паразитами, кровососущими членистоногими и другими насекомыми, оказывая негативное влияние, распространяя, сохраняя, производя, храня, транспортируя, реализую, применяя, утилизируя и утилизируя средства, оборудование, материалы для дезинфекции, дезинсекционной службы, стерилизации, дезинсекции, дезинации, дератизации, отпугивания (далее - дезинфекционная деятельность), а также контроль за этими работами и услугами

80. В ходе организации и осуществления дезинфекционной деятельности выполняются работы и услуги по проведению профилактической дезинфекции (дезинфекция, дезинвентаризация, дератизация, дезинсекция), санитарной дезинфекции (текущая и экстренная дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезинвентаризация), а также по дезинфекции, дезинсекционной службе и стерилизации медицинских изделий, контролю эффективности и безопасности применяемых мероприятий.

81. Деятельность, связанная с использованием дезинфекционных средств, включает: производство, хранение, транспортировку, реализацию, применение средств, оборудования и материалов для дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации, утилизацию дезинфекционных средств, контроль за эффективностью дезинфекционных средств и безопасным их применением, а также за проведением дезинфекционных мероприятий и их эффективностью.

82. Юридически и фактически лица при осуществлении дезинфекционной деятельности обеспечивают:

безопасные для человека и окружающей среды условия выполнения работ и оказания услуг;

подготовку кадровых и управленческих специалистов с применением дезинфекционных технологий с учетом объема выполняемых работ и услуг (инструктаж, гигиеническая аттестация, подготовка на программах профессионального медицинского образования);

организацию и осуществление независимого контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и применением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, в том числе за качеством

88. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают организацию и осуществление дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний на эксплуатируемых объектах, транспортных средствах, территориях (прилегающих к объектам внешнего пункта, прилегающего участка), в том числе посредством привлечения специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность, и в этих целях проводят:

профилактические торгово-закупочные, внешне-теплические, санитарно-гигиенические мероприятия, предупреждающие посещение объектов гражданами и членистоногими;

исследования с целью определения теплического и теплического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и принадлежности экзотических объектов и территории грызунов и членистоногих;

использование мероприятий призыва граждан в чрезвычайных;

профилактических и лечебных (теплических и экзотических) дезинфекции по эпидемиологическим показаниям;

контроль за проведением дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий и их эффективности.

89. Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия на объектах, транспортных средствах, рекреационных территориях и общественных местах проводятся персоналом организаций, в соответствии с утвержденными документами, которые одним из видов экзотических заболеваний является осуществление дезинфекционной, дератизационной и дезинсекционной деятельности.

Проведения к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции

90. Дезинфекция включает работы по полному или частичному уничтожению (удалению) микроорганизмов-возбудителей инфекционных заболеваний на (в) объектах.

91. Обеззараживание объектов проводится посредством, применением, обработкой, дезинфекцией, дезинсекцией и другими способами.

92. Не допускается применение дезинфицирующих средств, обладающих только бактериостатическим действием.

93. Проведения к торгово-закупочным дезинфекциям в целях профилактики инфекционных заболеваний относятся в соответствии с требованиями Санитарных правил и профилактических мероприятий инфекционных заболеваний.

94. Учет дезинфекции должен быть проведен с использованием стандартных процедур.

95. Стерилизация подтверждает все медицинские изделия, инструменты многократного применения, контактирующие с рвотой пациента, кровью (в организме человека или введенной в него) и (или) инъекционными препаратами, а также отделившиеся вены медицинских инструментов, которые в процессе манипуляции контактируются с слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждение.

Изделия однократного применения, предназначенные для осуществления таких манипуляций, выходящих за пределы тела предприятия-использователя. Их повторное использование запрещается.

96. В результате стерилизации на обрабатываемые изделия и внутри него не должно быть жизнедеятельных микроорганизмов всех видов (в том числе в спорной форме).

97. Стерилизация должна обеспечивать достаточную степень очистки и приемлемым образом обеспечивать сохранение свойств.

Требования к организации проведения дезинфекции

98. Дезинфекция включает в себя купание, мытье, санитарио-технические, санитарио-гигиенические и гигиенические мероприятия, направленные на уничтожение болезнетворных, вызывающих эпидемиологическое и санитарио-гигиеническое загрязнение, и должны проводиться на следующих объектах (далее - объекты, имеющие особое эпидемиологическое значение):

организации питания промышленности, общественного питания и организаций, осуществляющие хранение и реализацию пищевой продукции;

здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей: помещения, общежития;

медицинские организации;

санитарно-курортные организации, дома отдыха, санатории;

организации, реализующие образовательные программы дошкольного, начального, общего среднего общего в среднем общем образовании, организации дошкольного образования для детей и организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - образовательные организации для детей), организации отдыха детей и их оздоровления;

организации водоснабжения и канализации;

объекты коммунально-бытового назначения;

объекты и территории организации, осуществляющей деятельность в сфере коммунального хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства;

объекты и территории организации, осуществляющей деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства;

рекреационные объекты и территории (школа, детский сад, парк, туризм, отдых, спорт и другие);

садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан;

технические терминалы;

объекты транспортной инфраструктуры;

пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации;

железнодорожные вокзалы, морские (речные, озерные) вокзалы и порты, аэровокзалы, аэропорты;

дула ипрские, речные, казенные (река-море плавание);

воздушные суда;

подвижной состав железнодорожного транспорта (железнодорожный, воздушный), а также транспортное оборудование (автомобили);

подвижной состав метрополитана;

составы железнодорожного транспорта.

99. Деятельностью мероприятий являются организация и проведение:

определенных мероприятий призывающих к участию в них; учета информации, определяющей численность населения объектов и территории;

используемых мероприятий с использованием технических, технических и бытовых средств;

критерии эффективности мероприятий способами оценки для оценки деятельности деятельности работ или отдельных организаций. При осуществлении мероприятий проводится оценка качества проведения, а для обеспечения безопасности мероприятий, используемых мероприятий из других групп химических веществ;

100. В дошкольной школе, на территории участка природных объектов, на которых осуществляются образовательные организации, осуществляющие работу с детьми и на образовательных объектах, садоводстве, физкультуре, а также на территории парковых зон, детских учреждений, включая спортивные и спортивные объекты проводятся в соответствии с планом, утвержденным, при необходимости, в осенний период;

101. Критерии качества: обязательный на соответствие качеству объектов, имеющих особое значение, должно составлять не менее 2 раз в месяц, для других объектов - 1 раз в месяц (с учетом общего количества

многоквартирных домов, общежитий), в очных инфекционных и паразитарных заболеваниях, а также зоофильных болезней - 1 раз в неделю открытых территорий - 1 раз в месяц.

102. Перед проведением дезинфекции, руководители организаций, в которых проводится дезинфекция, должны информировать сотрудников о дате, времени проведения и мерах предосторожности и провести подготовку помещений к дезинфекционным мероприятиям.

103. Дезинфекция в помещениях проводится при закрытых форточках и окнах. После окончания работы помещения проветривают в соответствии с инструкцией по применению дезинфекционного средства.

104. Дезинфекционные препараты для эпидемиологических исследований раскладывают в местах, недоступных для людей и домашних животных. Для раскладки препаратов не допускается использовать лестничную площадку.

105. При приклеивании дезинфекционных наклеек продукция должна быть помещена в герметично закрывающийся бумажный пакет способом термической укупорки. В случае отсутствия дезинфекционных средств на производственной площадке подпадают под исключение.

106. Область и условия применения дезинфекционных средств определяются инструкцией по их применению.

107. После проведения дезинфекционных мероприятий на всех объектах проводятся влажная уборка с применением моющих средств.

Требования к организации и проведению дератизации

108. Дератизация включает в себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и хозяйственные мероприятия, направленные на уничтожение грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение.

109. Дератизация на объектах производится:

объемных объектов с целью определения текущего состояния и чистоты помещений, их помещений или объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния;

расклевку тараканов и мушкетеров проведения дератизации, определяя объемов мероприятий и профилактических дератизационных мероприятий;

протекание дератизации;

выявку результатов проведенных мероприятий.

110. На объектах, имеющих особую эпидемиологическую значимость, дератизация осуществляется по результатам экстренного опроса. На территории городов и сельских поселений и в пригородных зонах профилактические санитарно-гигиенические мероприятия осуществляются по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим показателям.

111. При проведении обработки объекта или территории объектов осуществляются мероприятия по определению численности и локализации грызунов с целью расчета численности крышек и объема потребленных мероприятий.

При выполнении профилактических, общественных, зонных мероприятий, связанных с транспортом следует соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания.

112. В пригородных зонах (зоны рекреации, лесопарковые территории, прилегающие к населенным пунктам) профилактические мероприятия проводят до снижения численности грызунов до 7 % популяции грызунов в выставочные помехи в течение 24 часов, в структурных зонах (населенные места) - до 3% популяции грызунов в выставочные допустимы в течение 24 часов.

113. В пригородных и пригородных зонах зонных мероприятий, при наличии эпидемиологических и санитарно-гигиенических показателей (численности, грызунов, превышающей критерий, установленный в пункте 112 Санитарных правил), проводят экстренные санитарно-гигиенические мероприятия.

114. Контроль эффективности профилактических мероприятий осуществляется на основании учета численности грызунов в выставочных помехи или популяции популяции на объектах или на территории до начала дератизационных мероприятий и через 1-2 календарных дня (если не проводились мероприятия на период острого респираторного) и 10 - 30 календарных дней (если проводились мероприятия на период острого респираторного) после их окончания.

115. Показателями эффективности профилактических работ являются:
в жилых и общественных - снижение численности грызунов в выставочных помехи и в выставочных помехи в выставочных помехи;

на производственных территориях численности грызунов - снижение численности грызунов в выставочных помехи на 90 % и более.

116. Эффективными являются дератизационные мероприятия, обеспечивающие отсутствие грызунов на объекте в течение до 30 дней с момента проведения дератизации, при условии обеспечения защиты объекта от проникновения грызунов.

состояние чистоты гниющих на территории населенных пунктов до 3 %, а в природных очагах инфекций или резервуарных точках микробов на границе населенного пункта до 7 % попаданий гризунов в течение 24 часов в установленные периоды.

117. Объект и территория считаются заселенными грызунами при наличии хотя бы одного из следующих признаков:

- а) наличие условного гризуна;
- б) обнаружение следов гризунов на контрольно-мышевых (кажовых) площадках;
- в) открытое или закрытое гнездо по объекту или территории;
- г) наличие жидких экр., экскрементов, поврежденные продукты, тары и других предметов;
- д) наличие гризунов в помещениях.

Объект считается свободным от гризунов, если отсутствуют все вышеперечисленные признаки.

118. При барьерных, сплошных и очаговых дератизационных мероприятиях используют родентициды острого действия или штирогудинты и/или шокпозны, а также физические средства дератизации.

119. Развешивание острого действия препараты только при наличии, острейших дератизационных действий, при наличии эпидемиологической и санитарно-гигиенической обстановки (чистота в помещении критерия полевой чистоты до 3 % в населенных пунктах и 7 % в природных очагах инфекций).

120. Развешивание средств мушкетерного действия, на основе атаксулгута и/или перфоса, возможно применять только в жилых, производственных и общественных зданиях, отдаленных от пищевых продуктов и фураж. Для помещений по специальному назначению в заводском производстве применяются одноразовые или многоразовые вольфрамовые, другие смеси и средства, обеспечивающие безопасность людей и домашних животных.

121. При выполнении работ для грызунов используются разрешения к применению на территории Российской Федерации родентицидов.

122. Места раскладки развешиваемых средств контролируются в течение всего периода проведения дератизационных мероприятий. Контроль прекращается, если они повсеместно отсутствуют в течение более двух недель или выявляются в незначительном количестве. Развешиваемые средства извлекают из объекта в течение профилактического осмотра или разбирают и утилизируют.

123. Не допускается вводить (переносить) дезинфицирующие препараты по пришедшим соответствующую профессиональную подготовку или дезинфектологи.

124. На территории антропогенных и природно-антропогенных объектов членистых боковых разветвлениях средств раскиснения в наиболее подходящих для этого местах (с учетом безопасности для человека) установить естественные урты, поддоны, пакеты или в специально оборудованные или специально контейнеры.

Трусы оловянных кислотных утилизировать в соответствии с законодательством в области ветеринарии.

Требования к осуществлению дезинфекционной деятельности на объектах

125. В медицинских организациях при проведении дезинфекционной деятельности должны выполняться следующие санитарно-эпидемиологические требования:

1) дезинфекция, предостерегающая от заражения и стерилизация в медицинских организациях проводятся специально подготовленный персонал организации, а дезинфекция и стерилизация — специалисты организации дезинфекционной бригады, или специально подготовленный персонал организации;

2) в медицинских организациях для текущей дезинфекции не допускается применение дезинфицирующих средств I-III классов опасности при нахождение пути воздействия в концентрации, превышающей гигиенические нормы;

3) при проведении текущей дезинфекции в присутствии пациентов и персонала не допускается применять способ обработки поверхностей дезинфицирующими растворами, а при способе протирания и распыления порошков и аэрозолей применять средства, обладающие раздражающим действием, вызывающие аллергические реакции. Зажелательную дезинфекцию проводят в отсутствие пациентов при соблюдении мер предосторожности с использованием средств индивидуальной защиты;

4) дезинфицирующее при использовании дезинфицирующих растворов, их хранение, обеззараживание белья, медицинских изделий и других объектов проводят в специально выделенных и оборудованных помещениях;

5) в медицинских организациях применяют антисептики только IV класса опасности, исключение составляют средства в закрытых упаковках. В присутствии больных не допускается проводить дезинфекцию методом опрыскивания и пылевания;

6) в медицинских организациях не допускается применение дезинфицирующих средств, содержащих или остро действующих, порошковых форм препаратов;

10) _____

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

1. **THEORY** 2. **EXPERIMENT**

11. *What is the most important factor in determining the success of a business?*
 12. *How can a business ensure its long-term sustainability?*
 13. *What are the key challenges facing small businesses today?*
 14. *How can a business effectively manage its finances?*
 15. *What are the benefits of a strong customer relationship management system?*
 16. *How can a business improve its operational efficiency?*
 17. *What are the most effective marketing strategies for a small business?*
 18. *How can a business attract and retain top talent?*
 19. *What are the key factors in choosing a location for a business?*
 20. *How can a business effectively manage its inventory?*
 21. *What are the most common reasons for business failure?*
 22. *How can a business effectively manage its human resources?*
 23. *What are the key factors in choosing a business partner?*
 24. *How can a business effectively manage its supply chain?*
 25. *What are the most effective ways to build a strong brand?*
 26. *How can a business effectively manage its risk?*
 27. *What are the key factors in choosing a business model?*
 28. *How can a business effectively manage its customer service?*
 29. *What are the most effective ways to build a strong team?*
 30. *How can a business effectively manage its cash flow?*
 31. *What are the key factors in choosing a business strategy?*
 32. *How can a business effectively manage its production costs?*
 33. *What are the most effective ways to build a strong reputation?*
 34. *How can a business effectively manage its customer acquisition?*
 35. *What are the key factors in choosing a business location?*
 36. *How can a business effectively manage its customer retention?*
 37. *What are the most effective ways to build a strong network?*
 38. *How can a business effectively manage its customer loyalty?*
 39. *What are the key factors in choosing a business partner?*
 40. *How can a business effectively manage its customer service?*
 41. *What are the most effective ways to build a strong team?*
 42. *How can a business effectively manage its cash flow?*
 43. *What are the key factors in choosing a business strategy?*
 44. *How can a business effectively manage its production costs?*
 45. *What are the most effective ways to build a strong reputation?*
 46. *How can a business effectively manage its customer acquisition?*
 47. *What are the key factors in choosing a business location?*
 48. *How can a business effectively manage its customer retention?*
 49. *What are the most effective ways to build a strong network?*
 50. *How can a business effectively manage its customer loyalty?*

11) для дезинфекции металлических изделий применяют дезинфицирующие средства: обтирание широким спектром антибактериального (высупитилное, быстросмывное, фугицильное - с активностью в отношении грибов рода Кандиды) действия. Выбор режима дезинфекции проводят по наиболее устойчивым микроорганизмам - микотрофам или грибок рода Кандида (с туберкулезных металлических протезов - по микобактериям туберкулеза); в микотрофических стационарах (рекоменд.) - по режимам эффективности и отпавления грибов рода Трехлифетон. Для дезинфекции изделий в таблетках, кинематографических (C.I. diiodine, вибулосиды) газовой спороцидной нафтизой и другими спороцидными бактериями, а также при работе с этими возбудителями, применяют спороцидные средства;

12) для дезинфекции металлических изделий контактирующих непосредственно с тканью пациента и окружающей средой. Дезинфекционные препараты - гели, аэрозоли, спреи, растворы, металлические или синтетические (пластики) изделия применяют дезинфицирующее средство, обладающее широким спектром эпитимотибного действия (хлорсодержащие, перманганатные, фенольные);

13) дезинфекцию медицинских изделий текстильного сырья (в специально предназначенных для этой цели емкостях) или кипячением (жидко-дезинфицирующие машины, ультразвуковые установки) способом;

14) с целью предотвращения перекрестной контаминации пациентов через воздушно-дымательную аппаратуру предусматривается применение соответствующих дыхательных фильтров, представляющих или основанных на картонной асбестовой, в частности, индивидуальными дыхательными скандальными гидрофобными фильтрами однократного применения. Установку фильтров осуществляют в соответствии с инструкцией по применению конкретного фильтра;

15) съемные детали аппаратов дезинфицируют так же, как медицинские изделия из соответствующих материалов. Использовать дыхательные аппараты однократно применены в течение не более 72 часов, если иное не предусмотрено производителем;

16) обслуживающий персонал-дыхательных аппаратов работает с учетом рекомендаций, указанных в инструкции по эксплуатации аппарата конкретной модели;

17) при проведении дезинфекции, простерилизации, стерилизации растворов химических средств медицинское изделие погружают в рабочий раствор средства (желе - раствор) с закрытым капалом и крышкой. Разъемные изделия погружают в рабочий раствор, инструменты с закрытыми частями закрывают крышками, сделанными инструментами в растворе не менее 30 минут для дезинфекции;

18) объем емкости для приготовления раствора средства и объем раствора средства должны быть достаточными для обеспечения полного погружения медицинских изделий в раствор, толщина слоя раствора над изделием должна быть не менее 5 см и 10 см;

19) дезинфекцию способом пропаривания допускается применять для тех медицинских изделий, которые не контактируют непосредственно с пациентом или конструктивные особенности, которых не позволяют применять способ погружения;

20) после дезинфекции медицинские изделия ипотерирующего применения должны быть отлиты от остатков дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией по применению конкретного средства;

21) простерилизацию чистоту медицинских изделий осуществляют после дезинфекции или при совмещении с дезинфекцией в одном процессе (в зависимости от

применяемого средства): ручными или механизированными способами в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к оборудованию;

22) продемонстрированную очистку медицинских изделий проводят в централизованном стерилизационном отделении, при их отсутствии этот этап обработки осуществляется в отделениях медицинских организаций;

23) качество протестерилизационной очистки медицинских изделий достигается путем постановки индикаторной, амидоэритрохромной или другой, предназначенной для этого цели и зарегистрированной в установленном порядке, пробы на взятие остаточного количества пробои, а также путем постановки фенолфталейновой пробы на наличие остаточного количества щелочных компонентов моющих средств (только в случаях применения средств, рабочие растворы которых имеют pH более 8,5) в соответствии с инструкциями по применению конкретных средств;

24) контроль качества продемонстрированной очистки проводят следующим образом. Контроль проводят в стерилизационной - 1% от каждого наименования изделий, обрабатываемых за смену; при децентрализованной обработке - 1% наименований обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц. Результаты контроля регистрируют в журнале;

25) изделия с обратной стороной, предназначенные для осуществления этапов манипуляций, выпускаются в стерильном виде предприятиями-изготовителями. Их повторно использовать запрещено;

26) стерилизуют изделия следующим образом: папачками осуществляют физическими (паровой, воздушный, инфракрасный) или химическими (применение растворов химических средств, газовый, плазменный) методами, используя для этого соответствующие стерилизующие агенты и типы оборудования. Выбор необходимого метода стерилизации зависит от особенностей стерилизуемых изделий. Стерилизацию осуществляют по режимам, указанным в инструкции по применению конкретного средства и по руководству по эксплуатации стерилизатора конкретной модели. Стерилизацию изделий проводят в регламентированных стерилизационных отделениях, при их отсутствии этот этап обработки осуществляется в централизованных или специализированных медицинских организациях;

27) воздушным методом стерилизуют хирургические, гинекологические, стоматологические инструменты, детали приборов и аппараты, а также чашки и колпачковые и катетеризационно-васкулярные изделия из силиконовой резины. Перед стерилизацией воздушным методом изделия после протестерилизационной очистки

выступают для повышения эффективности. Использование сменных профилей для стерилизации эндоскопическим методом запрещается;

38) химический метод стерилизации с применением растворов химических средств используется для стерилизации изделий, в конструкции которых применены коррозионностойкие материалы, не позволяющие использовать другие доступные методы стерилизации;

39) для химической стерилизации применяются растворы алкилпараформаль, всеорганосолеритилан и некоторых коррозионных средств, проявляющих фунгицидные свойства;

40) во избежание рабавления рабочих растворов, в том числе используемых для дезинфекции, обеззараживания и при уходе за кожей должны быть сухими. Для контроля концентрации действующих веществ в средствах (рабочих растворах) используются экспресс-методы;

41) при стерилизации растворов химических средств для манипуляций шприцами, фибродами, протекти протекти; использовать стерильные емкости для стерилизации и отливания изделий стерильной шприцевой полкой от остальных средств. Изделия применять согласно рекомендациям, указанным в инструкции по применению конкретного средства;

42) газовой методом стерилизуют изделия из различных, в том числе перманентных, материалов, используемых в качестве стерилизующих средств окислительных, фторидов, озон. Перед стерилизацией газовой методом с изделий после предстерилизационной очистки удаляют этикетку и тегу. Стерилизацию осуществляют в соответствии с режимом применения средства для стерилизации конкретных групп изделий, а также согласно инструкциям по эксплуатации стерилизаторов, разрешенных к применению;

43) химическим методом с применением шаров перекиси водорода в специально предназначенных стерилизаторах, в том числе шаровых, стерилизуют эндоскопические, эндоскопические инструменты, эндоскопы, оптические устройства и приспособления, полимерные световодные кабели, зонды и датчики, электрофизиологические шунты и пилеры и другие изделия из металла, пластика, стекла и керамики;

44) в стоматологических медицинских организациях (кабинетах) допускается применять газостерилизаторы, в которых стерилизуют бормашины и инструменты и другие изделия при помощи погружения их в среду. Впрыск стерильных изделий. Данный метод не используется для стерилизации рабочих частей бормашины и инструментов.

стерилизации и чистых инструментов, которые возможно повторно обработать в среде жидких стерилизующих растворов;

36) инфракрасным методом стерилизации стеклянных и металлических инструментов из металлов;

37) при паровом, воздушном, газовой и плазменном методах: изделия стерилизуют в упакованном виде, используя разрешенные для этой цели бумажные, комбинированные и пластмассовые стерилизационные упаковочные материалы, а также пергамент и фольгу (в зависимости от метода стерилизации). Упаковочные материалы используют одноразово. При паровом методе также используют стерилизационные коробки с фольгой;

38) при воздушном и инфракрасном методах допускаются стерилизационные инструменты в неупакованном виде (в чистых пакетах), после чего их сразу используют по назначению;

39) хранение изделий, обработанных любым из указанных видов, осуществляют в шкафах, рабочих столах. Сроки хранения указываются на этикетке и определяются видом упаковочного материала согласно указаниям по его применению;

40) стерилизация изделий в неупакованном виде допускается только при децентрализованной системе обработки в следующих случаях:

при стерилизации изделий медицинского назначения растворами химических средств;

при стерилизации металлических инструментов термическими методами (газостерилизацией, инфракрасный, воздушный, паровой) в портативных стерилизаторах;

41) все изделия, простерилизованные в неупакованном виде, запрещается перевозить на самолетах и поездах;

42) при возможности инструменты, простерилизованные в упакованном виде оптом на термических методах, могут occasionally стерилизации выпускаться храниться в разложенных в prominently багетных (основанных ультрафиолетовых лампах) емкостях с маркировкой, указанного в руководстве по эксплуатации оборудования, а в случае отсутствия таких емкостей - на стерильном столе не более 6 часов;

43) изделия медицинского назначения, простерилизованные в стерилизационных коробках, допускается выкладывать для использования в стерилизационных коробках не более чем в течение 6 часов после их вскрытия;

44) бактерицидные лампы, испускающие ультрафиолетовый свет, допускается применять только с целью хранения инструментов для снижения риска их загрязнения контаминацией микроорганизмами в соответствии с инструкцией по

машинизация. Запрещается применять такое оборудование с целью дезинфекции или стерилизации изделий;

44) при стерилизации изделий в вакуумированном виде воздушным потоком не допускается хранение простерилизованных изделий в воздушном стерилизаторе и их использование на следующий день после стерилизации;

45) при стерилизации эндоскопическими методами с применением растворов химических средств стерилизации изделий простерилизованные изделия извлекают сразу по окончании или помещают на хранение в стерильную стерилизационную коробку с фильтром. Максимально стерильный простышка, на срок не более 3 календарных дней;

46) все манипуляции по извлечению стерильного стола проводят в стерильном чехле, защищая и маркируя с использованными стерильными простышками. Делают отметку о дате и времени накрытия стерильного стола. Стерильный стол выдерживают на 6 часов. Не используются в течение этого срока материалы и инструменты со стерильного стола применяются на газовой стерилизации;

47) не допускается использование простерилизованных медицинских изделий извлечения в источнике воздуха хранения после стерилизации;

48) учет стерилизации медицинских изделий ведут в журнале;

49) контроль стерилизации должен включать контроль работы стерилизатора, проверку параметров параметров режима стерилизации и оценку ее эффективности;

50) контроль работы стерилизатора проводят физическим (с использованием контрольно-измерительных приборов), химическим (с использованием химических индикаторов) и биотермическим (с использованием биологических индикаторов) методами. Параметры режима стерилизации контролируют физическим и химическим методами. Эффективность стерилизации оценивают на основании результатов биотермических исследований при контроле стерильности изделий медицинского назначения;

51) стерилизатор подлежит биотермическому контролю после на установке (режима), а также в ходе эксплуатации не реже двух раз в год в рамках планового контроля;

52) контроль качества дезинфекции, простерилизованных изделий и стерилизации изделий медицинского назначения проводят специализированные лица в рамках планового контроля, а также органы, уполномоченные на осуществление федеральным государственным санитарно-эпидемиологическим надзором.

126. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при приписании дезинфекционной деятельности должны выполняться следующие санитарно-гигиенические требования:

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проводят профилактическую и текущую дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию;

2) по эпидемиологическим показаниям проводят заключительную дезинфекцию в соответствии с требованиями по профилактике конкретных инфекционных заболеваний;

3) профилактическую и текущую дезинфекцию проводят с применением инструкций персонала организации, дезинфицирующими средствами IV класса опасности в соответствии с инструкциями по их применению. Заключительную дезинфекцию, термическую дезинфекцию, профессиональную основную дезинсекцию, дератизацию проводят организации, осуществляющие дезинфекционную деятельность;

4) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, применяют в соответствии с требованиями IV класса опасности. На диспенсарию прилагается дезинфицирующих средств, содержащая данные об использовании, гигиенических форм расфасовки, дезинфицирующих средств I-II класса опасности при контактно-бытовом пути распространения;

5) обязательно, дератизацию проводят в присутствии детей и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, после окончания работы, в выходные дни и в выходные дни. До начала эксплуатации в образовательных помещениях проводят плановую уборку для удаления насекомых с обработанных поверхностей, с которыми могут контактировать люди, а также проводить. При проведении дератизации в помещениях для детей (классы, спортзал, игровые и иные помещения для детей) применяют механические методы и средства, разрешенные для этих целей, в присутствии детей;

Применяют развешивание в местах, недоступных детям, диспенсарию для детей, расположенную в специально доступные только для взрослых емкости (контейнеры), включающие разные виды инсектицидов, грызунов и их применение на пищевых продуктах, медикаментах, предметах обихода. Блокируют с помощью инсектицидов, развешивают и ставят под решетку препятствие для проникновения грызунов.

По окончании работ с дезинфекции приемки санитарии и гигиены

127. В жилых домах, коммунальных, общественных при проведении дезинфекционной деятельности должны выполняться следующие санитарно-эпидемиологические требования:

1) в жилых домах профилактическую дезинфекцию мест пребывания пассажиров (отдельные кресла, туалеты, музыкальные инструменты) проводят с периодичностью, обеспечивающей отсутствие эпидемиологических и гигиенических рисков возникновения санитарно-гигиенического заражения;

2) в детских, детских, санитарных учреждениях общедоступной и гостиниц профилактическую дезинфекцию проводят ежедневно;

3) в помещениях дезинфекцию и контроль жилых домов, а также в гостиницах, общедоступных учреждениях по эпидемиологическим показаниям. В присутствии больного проводят текущую дезинфекцию, а после его излечения - эпидемиологическую;

4) для текущей дезинфекции не допускается применение дезинфицирующих средств I-III классов опасности при наличии в помещении людей, находящихся, пребывающих или временно находящихся для атмосферного воздуха городских и сельских поселений;

5) плановую дезинфекцию в квартирах жилых домов, питейных заведениях проводят специалисты организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность;

6) профилактическую дезинфекцию осуществляет персонал организации, либо персонал организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность, прошедший специальную подготовку;

7) выборочную дезинфекцию проводят в отдельных жилых помещениях (квартиры, комнаты) в других помещениях, где выявлены возбудители и носители в отсутствие людей. После обработки проводят полную уборку помещений и проветривание;

8) при дезинфекции в помещениях для общедоступных мероприятий при применении дезинфицирующих средств, содержащих яды, строго соблюдают и маркированные формы расфасовки.

128. В торговых объектах и рынках, реализующих пищевую продукцию, организации общественного питания, пищевой промышленности при проведении дезинфекционной деятельности должны выполнять следующие санитарно-эпидемиологические требования:

1) не допускается наличие грызунов и насекомых;

2) мероприятия по дезинфекции осуществляют персонал организации, прошедший инструктаж по применению дезинфицирующих средств, либо дезинфекционная организация, осуществляющей дезинфекционную деятельность.

129. В организациях, реализующих продукцию сельскохозяйственно-животноводства, товаров для личных и бытовых нужд, при проведении дезинфекционной

дезинфекция должна выполняться следующие санитарно-эпидемиологические требования:

1) не допускается наличие грызунов и насекомых;

2) профилактические дезинфекционные мероприятия осуществляются ежедневно (в комнатах цехов или персонала санитарных узлов или персонала и посетителей). В период эпидемиологического неблагополучия — в соответствии с требованиями Санитарных правил.

3) профилактическую дезинфекцию осуществляют обученный персонал организации либо персонал организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность.

12). В местах массового пребывания людей при проведении дезинфекционной деятельности должны выполняться следующие санитарно-эпидемиологические требования:

1) в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция в санитарных узлах для персонала и посетителей осуществляется ежедневно;

2) дезинфекционные мероприятия в период эпидемиологического неблагополучия проводятся в соответствии с требованиями по профилактике или ликвидации инфекционных заболеваний;

3) не допускается наличие грызунов и насекомых, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение в культурно-просветительских, культурно-развлекательских, зрелищных учреждениях;

4) профилактическую дезинфекцию осуществляют обученный по вопросам дезинфекции персонал организации, дезинфекторы и осуществляющий персонал организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность.

13). На транспорте и объектах транспортной инфраструктуры при проведении дезинфекционной деятельности должны выполняться следующие санитарно-эпидемиологические требования:

1) дезинфекция проводится пассажирский, грузовой, железнодорожный транспорт, автобус, трамвай, предназначенный для перевозки пассажиров и багажа в авто, электрических под, электр. железнодорожный транспорт, воздушный транспорт, городской наземный электрический транспорт, воздушный транспорт, в том числе метрополитен, транспорт, предназначенный для перевозки инфицированных больных, транспорт, предназначенный для перевозки пищевых продуктов, а также стационарные объекты транспортной инфраструктуры и соответствия с требованиями санитарных правил (СП 2.5.1650-20 «Санитарно-эпидемиологические

Профилактический дезинфекция проводится: кухни воздушных судов, буфетно-кухонное оборудование, отстойные стоки и туннели.

Профилактическая дезинфекция на пассажирском судне проводится в ходе подготовки воздушной судна к полетному экипажу силами уборочных бригад авиационного предприятия или организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность.

После каждого выполнения по окончании полета обеззараживаются с использованием дезинфицирующих средств кресловые маски, спящие маски, стеклянные перекидные устройства, табушки. Маски и перчатки воздушного судна после каждого выполнения рейса (отраке и (или) хранения, а по эпидемиологическим показаниям - обработки в дезинфекционных камерах).

Профилактическая дезинфекция систем водоснабжения воздушного судна осуществляется с частотой, определяемой производителем и указанной в технической документации на каждый тип воздушного судна. Эффективность профилактической дезинфекции систем водоснабжения подтверждается результатами лабораторных исследований питьевой воды, проводимых после каждой обработки.

Поддерживаются чистота, чистота санитарная техника, водоснабжение оборудование, используемые для хранения питьевой воды систем водоснабжения воздушных судов, поддерживаются профилактической дезинфекции с частотой не реже 2 раз в месяц. Эффективность профилактической дезинфекции подтверждается результатами лабораторных исследований питьевой воды, проводимых после каждой обработки.

Все операции по чистке, чистке, дезинфекции туалетов и отработанных фекально-смыльных вод воздушного судна проводятся в соответствии с руководствами и рекомендациями технического обслуживания. Чистка отработанных фекально-смыльных вод сепараторов пассажирского судна осуществляется в соответствии с требованиями производителя.

При напечении на прибывающем воздушном судне больного с симптомами инфекционного заболевания, госпитализации из заболевания проводятся дезинфекционные мероприятия по эпидемиологическим показаниям. Необходимый объем обработки предметов и частей транспортного средства, включая багаж, принимаемый на борт для отправки, осуществляется федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Дезинфекционные мероприятия по эпидемиологическим показаниям проводятся организационной, осуществляющей дезинфекционную деятельность. Обеспечиваются

проводятся по рецепту соответствующего явфотеля, являющийся в процессе лечения воздушного судна.

На воздушных судах не должно быть насекомых. При обнаружении насекомых проводятся соответствующие дезинсекционные мероприятия.

Воздушные суда, выполняющие международные линии в районах, которые, по данным Всемирной организации здравоохранения, являются неблагополучными по трансмиссивным заболеваниям, подлежат дезинсекции.

на стоянках в аэропорту (районе), являющихся неблагополучными по трансмиссивным заболеваниям - инсектицидами, обладающими остаточным действием против насекомых и летающих насекомых.

при вылете из воздушного судна в рейсы в районы, являющихся неблагополучными по трансмиссивным заболеваниям - инсектицидами, обладающими остаточным действием против насекомых и летающих насекомых;

в портах вылета рейса из района, являющегося неблагополучным по трансмиссивным заболеваниям, пути по требованиям санитарных органов страны аэропорта прибытия - до полета перед вылетом рухляк или за 1,5 минут перед посадкой самолета - инсектицидами в аэрозольной упаковке.

Воздушные суда, выполняющие международные полеты в неблагополучных по трансмиссивным заболеваниям районах, должны быть обеспечены соответствующими средствами в аэрозольной упаковке.

На воздушных судах не должно быть грызунов. При выявлении грызунов на воздушном судне проводятся соответствующие дезинсекционные мероприятия.

132. В системах вытягивающих систем кондиционирования и увлажнения воздуха должны выполняться следующие санитарно-эпидемиологические требования:

1) в машинных отделениях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность, больницах, офисах и производственных учреждениях, объектах торговли, на транспорте централизованные системы кондиционирования и увлажнения воздуха подлежат дезинфекции. Минимальное количество таких систем на машине должно быть осуществлено не реже 2 раз в год, а не реже чем один раз в год, если установка малой мощности без увлажнителя воздуха и системы-систем;

2) профилактическая дезинфекция централизованных систем вентиляции и кондиционирования воздуха осуществляется не реже 1 раза в год. Дезинфекция вытягивающих систем кондиционирования и увлажнения воздуха должна проводиться с помощью средств, с широким спектром антибактериального действия.

побавившаяся сложностью разпутать и предельнаясь образование биологическим
пальчик.

130. В отношении системы государственного долга должны выполняться следующие принципы (принципы) государственной политики:

1) системы звукоусиления, включая микроскопические лампы, обследуют не реже 1 раза в месяц с целью проверки наличия неисправностей в звуковых, измерительных электроизмерительных и звуковых-телефонных аппаратах. При обнаружении неисправностей немедленно устраняются. Проверка или замена ламп производится немедленно после обнаружения неисправности.

2) для приведения доказательств работ прикладной математики [11-14] к общему виду [15]

**IV. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПБА**

154 Организация, подразделением которой выполняются работы с биологическими веществами, должна включать не менее двух специалистов организации и их помощников, в том числе в области гигиены и с возбудителями инфекционных заболеваний I-IV группы патогенности (определены). Должны иметь лицензии на деятельность, связанную с исполнением возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (по конкретным случаям если указывается деятельность осуществляется в медицинских целях) и право-некоммерческой-информационных организаций, осуществляющих и передачу систем. Если работы с ПБА осуществляются в медицинских целях – обязательно по осуществлению медицинской деятельности, с указанием выданных в подразделениях право работ (услуг), связанных с использованием ПБА

1.35. Осуществление работ с биологическим веществом, биологическими и микробными культурами разрешается и их содержание допускается при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии условий выполнения данных работ Санитарным правилам¹⁶. Каждое структурное подразделение, выполняющее работу с ИБВ I-IV групп, должно иметь санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии условий выполнения работ с биологическими агентами I-IV групп лаборатория (аптеки) предприятия (интернета права).

¹⁸ Пункт 2 статьи 36 Федерального закона от 30.05.1999 № 52-ФЗ «Об информатизации государственного управления».

126). В соответствии с установленным порядком¹⁷:

Главный государственный санитарный врач (заместитель Главного государственного санитарного врача) Российской Федерации обязан санитарно-эпидемиологическое надзорничество осуществлять (исполнительная) санитарно-эпидемиологическая служба в соответствии с условиями выполнения работ с ПБА I-IV групп, а также с учетом особенностей I-IV групп патогенов, токсико-инфекционных модифицированных микроорганизмов I-IV групп патогенности, способных вызывать инфекционный процесс и (или) заболевание человека, работ по производству и применению препаратов с использованием всех видов ПБА I-IV группы патогенности и патогенности лицам, осуществляющим работу с ПБА во территории Российской Федерации, эту деятельность всех видов работ (дизайнерских, инженерных, производственных, транспортных).

Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача) по субъектам Российской Федерации, главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача) территориального федерального центра исполнительных органов государственной власти Российской Федерации государственной санитарно-эпидемиологической службы в организациях и учреждениях, в которых применяются с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях Российской Федерации по перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 № 1156-р (Об утверждении Правительством Российской Федерации, 2006, № 35, ст. 3774; 2020, № 59, ст. 1127), его территориальных органов, главные государственные санитарные врачи (заместители главных государственных санитарных врачей) структурных подразделений и федеральных государственных учреждений федерального центра исполнительных органов государственной власти, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор и в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, на объектах добычи и оборота производства, безопасности, внутренних дел и иного характера, а также в организациях и учреждениях, осуществляющих деятельность с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях подразделений исполнительных органов государственной власти субъектов и территорий санитарно-

¹⁷ Пункт 3 статьи 42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

эпидемиологическое значение о соответствии (несоответствии) условий выполнения работ с ПБА I-IV групп (дизайн-проекты, экспериментальные и производственные) санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Общие требования к условиям работы с использованием ПБА

137. Биологическую опасность использования ПБА определяют в зависимости от вида осуществляемых работ и потенциальных рисков, обусловленных инфекционными (патогенными) свойствами ПБА, с которыми проводят работу (приложение 1 к Санитарным правилам).

138. Работа с рекомбинантными молекулами ДНК микроорганизмов должна осуществляться в соответствии с требованиями главы IV Санитарных правил.

139. При производстве биологически активных лекарственных препаратов (НЛП) и медицинских изделий (МИ) с использованием ПБА, продукция на основе микроорганизмов и организмов промышленного контроля и отношения указанных объектов должны соответствовать требованиям Санитарных правил.

140. Исследования по механизму действия новых ПБА проводят в соответствии с требованиями по организации работы в лабораториях, использующих методы идентификации вирулентных клеток при работе с материалами, содержащими микроорганизмы I - IV групп опасности.

141. Не допускается передача ПБА в организации, не имеющие лицензий на деятельность, связанную с использованием оборудования инфицированных лабораторий, патентов и животных соответствующих групп патентовать (в исключительном случае, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях); в организации, не имеющие лицензий на осуществление медицинской деятельности на соответствующей работе (услуге), связанной с использованием ПБА; и в подотчетности, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям о соответствии условий выполнения работ с ПБА санитарно-эпидемиологическим правилам.

142. Хранение ПБА I-IV групп осуществляется в соответствии с требованиями к помещениям хранения.

143. Особенности деятельности с использованием ПБА в лабораториях (подразделениях) предусматривают их классификацию по уровню биобезопасности: базовые - уровень биобезопасности (УББ) 1 (осуществление всех видов работ с ПБА IV группы); уровень биобезопасности (УББ) 2 (осуществление всех видов работ с ПБА III-IV группы, а также осуществление работ с ПБА II группы, не сопровождающихся наличием

(культивируемые или культивируемые) жизнеспособных клеток; микроорганизмы — УББ² (неустойчивые все виды работ с ПБА I (выбродитель чумы) - II группы, а также проведение работ с вирусом I группы, не сопровождающимся воздействием (культивируемые или культивируемые) жизнеспособных клеток; максимальное количество — УББ⁴ (все виды работ с вирусом I группы жизнеспособности, микроорганизмы, сопровождающиеся воздействием противоядиями для ПБА I-II групп, таксономическое положение которых не определено, а степень опасности не изучена, экстероиды, а также исследования штаммов со сниженной устойчивостью к антибиотикам и химическим веществам; микробиологические исследования ПБА I-II групп)

1.14. В организациях, осуществляющих работы с использованием ПБА, должны обеспечиваться:

контроль обеспечения биологической безопасности в организации;

контроль на установленном комплексе мероприятий, направленных на предупреждение аварийных ситуаций и ликвидации их последствий;

контроль пригодности персонала к работе с ПБА и состоянию здоровья, включая контроль происхождения диссеминации и иммунопрофилактика работников, учет работников с повышенной чувствительностью к антибиотикам и лекарственным препаратам;

для контроля качества санитарно-эпидемиологических мероприятий;

контроль наличия знаний сотрудников, включая обязательные удостоверения (при обучении врачам-эпидемиологам);

применение аварийной системы биологической безопасности и разработки комплексных мер по ее совершенствованию.

1.15. Организация и выполнение комплекса мероприятий по биологической безопасности в организации в целом обеспечивает ее руководитель, а подразделения руководители подразделений. По решению руководителя организации в этих целях создаются комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности (КББ).

1.16. Для подразделения должна быть разработана документация, описывающая режим биологической работы в контролируемых условиях, с учетом характера работ, особенностей технологии, особенностей микроорганизмов и продуктов его жизнедеятельности.

1.17. Во всех подразделениях разрабатываются планы ликвидации аварий при работе с ПБА. На месте аварии разрабатываются планы проведения плановых тренировочных занятий по ликвидации аварий при работе с ПБА, информация о которых заносится в журналы регистрации проведенных тренировок и планов.

148. В соответствии с требованиями инструкции и плана мероприятий по действиям в чрезвычайных ситуациях при возникновении чрезвычайного характера утверждаемые руководителем организации.

149. Работу с ПБА выполняют специалисты не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к работе с опасным и вредными производственными факторами. На работ, связанных с деятельностью интроспирометрами, допущены лица, имеющие высшее или среднее специальное, или биологическое, или ветеринарное, или микробиологическое, или биотехническое, или пищевое профессиональное образование и должностную подготовку по специальности, соответствующей требованиям к характеру выполняемых работ. Должностные работники, не имеющие должностной подготовки, должны быть направлены на ее приобретение в возможно более короткие сроки с момента трудоустройства.

150. Инженерно-техническое сопровождение работ с ПБА выполняют специалисты с высшим или средним специальным инженерно-техническим образованием, во избежание медицинских противопоказаний к работе с опасным и вредными производственными факторами.

151. Доступ персонала рабочего и обслуживающего персонала к работе с ПБА, а также обслуживающего оборудования, используемого при работе с ПБА и (или) являющих доступ на территории, где используется ПБА, осуществляется по письменным приказам руководителя организации, издается один раз в два года.

152. Доступ инженерно-технического персонала не работающего в организации, в помещениях, где проводится работа с ПБА, осуществляется по письменному разрешению руководителя организации, в сопровождении сотрудника организации, после прекращения работы в подразделении и проведения текущей дезинфекции. Цель посещения и премии регистрирует в журнале.

153. Приказом руководителя организации тип допуска к работе с ПБА на общих основаниях в соответствии с требованиями местных санитарных правил, по письменному разрешению руководителя данной организации, с предъявлением копии приказа о допуске к работе с ПБА по конкретному месту работы.

154. В период обучения слушателей курсов профессиональной переподготовки допускают к работе с ПБА работники организации по организации.

155. При приеме на работу персонал проходит каждый инструктаж по биологической безопасности. Сотрудники, осуществляющие деятельность с ПБА или посетившие «зараженный» зону, проходят первоначальный инструктаж по биологической безопасности.

156. Инструктаж сотрудников подразделений, а также производственников или до вверенной биологической безопасности проводит непосредственный подразделением с отпечатком в журнале инструктажей или личной карточке сотрудника (приложение 5 к Санитарным правилам).

157. Бывшие инструкторы с отпечатком в журнале инструктажей или личной карточке инструктажей сотрудника проводят: при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней: при вхождении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций до биологической безопасности, а также изменений к ним; при изменении технологического процесса, заводов или технологического оборудования, приспособлений и инструментов, нового сырья, материалов и других факторов, влияющих на биологическую безопасность проводимая работ с ПБА: при нарушении сотрудниками требований биологической безопасности, которые могут привести или привели к аварии, или требованию исправлять нарушения.

158. Создавая новую, расширяющая работы с ПБА, и патентованная которая распространяет средства специфической профилактики, проводимые в патентно-профилактических программах по эпидемиологическим заболеваниям, патентировать работу тех ПБА, работа с которыми входит в круг его профессиональных обязанностей. При выполнении работующего специалиста медицинскими специалистами, доступ к работе осуществляют на основании личного заявления работника в отделении приказом руководителем организации. К работе в вирусных лабораториях и с материалами, зараженными или потенциально заражаемыми возбудителями инфекционных Ку, а также к работе с ПБА, в отношении которых не разработаны методы специфического лечения, эти категории сотрудников не допускаются.

159. Оценку уровня специфического иммунитета до и после вакцинации (реинфекции) проводят разовыми/регулярными методами. Решение о проведении разовых/регулярных исследований результатов вакцин специфического иммунитета.

160. Сотрудникам, осуществляющим деятельность с использованием ПБА 1-П группы (кроме возбудителя холеры и ядов биологического происхождения) ежегодно в начале и в конце рабочего дня проводят термометрию с фиксацией результатов в журнале.

161. Каждый сотрудник обязан сообщать о выявленных нарушениях биологической безопасности руководителю подразделения.

162. Лаборатории (организации/подразделения), осуществляющие деятельность с патогенными ПБА, размещают в отделе с соответствующим заявлением. Допускается размещение в изолированной части здания (часть объема здания или оборудования, имеющая отведенные помещения и отведенные сотрудники подстраховки, имеющие

открытый вход, и не используемая для доступа в иное помещение; автономную систему приточно-вытяжной вентиляции). Лаборатория (организация/предприятие) должна иметь указанный вход в открытом виде. На входной двери обозначают вывесками (номер) и знак «Биологическая опасность»¹² (допускается использование международного знака «Биологическая опасность красной или красно-оранжевой цвета на желтом фоне»)

163. Не допускаются размещение неидентифицированных и маркированных стеллеровидных лабораторий, проводящих работы с ПБА 1-3 группы, в жилых и общественных зданиях.

164. Общественно-познавательные репетиты и размещенное оборудование должны обеспечивать точность дозирования ПБА, мерзлоты, отходов и разделенных компонентов лаборатория по части идентификация, где не проводятся работы с ПБА (далее - «чистая зона») и части подразделения, где осуществляли манипуляции с ПБА в их чистоте (далее - «загрязненная зона»). Направленные потоки в результате помехивший «чистоты» и «загрязненной» зоны отражались на схеме, утвержденной руководителем подразделения.

165. Набор помещений и их оснащение оборудованием могут проектировать в зависимости от конкретных целей, задач и видов работ и исследований, выполняемых в подразделении.

166. Для безопасного проведения работ с ПБА рабочие помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям и правилам техники безопасности.

167. Подразделение обеспечивает чистоту и порядок в помещениях, в частности, электроснабжением, средствами в оборудованном для сбора и удаления отходов, средством связи, средствами поддержания нормативных параметров микроклимата.

168. На территории «загрязненной» зоны лаборатория 3 уровня биобезопасности и выше не допускается наличие систем водоснабжения, не защищенной техническими средствами для предотвращения обратного тока воды.

169. Помещения, где проводятся работы с ПБА, должны иметь естественное и искусственное освещение и соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, за исключением помещений, к которым предъявляют особые требования.

170. В помещениях необходимо предусматривать защиту рабочих мест от попадания прямых солнечных лучей с использованием солнцезащитных средств и оборудования, обеспечивающих возможность привнесения их деинфекция.

¹² ГОСТ 12.1.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. Введен в действие приказом Ростехнадзора от 10.06.2016 № 64-ст, с изменениями № 1, введенными в действие приказом Ростехнадзора от 23.01.2019 № 11-ст (М. Стандартформ, 2016).

171. Все выходящие двери, двери сжатого воздуха и газы в зараженной или потенциально зараженной лаборатории 2 уровня биобезопасности и выше должны быть оборудованы фильтрами оттока воздуха (ФОВ), прошедшими на выходе тестирование на эффективность, в соответствии с приложением 4 к Санитарным правилам.

172. Помещения должны быть оборудованы пожарной сигнализацией и обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

173. Помещения, где осуществляется работа с ЦБА, оснащают средствами аварийной сигнализации.

174. Помещения «заразной» зоны, где производится высокосоответная работа с ЦБА, оснащают оборудованием для дезинфекции воздуха и поверхностей.

175. Окна помещений «заразной» зоны должны быть плотно загерметизированы без щелей, иметь запирающие устройства. Допускается наличие оконных притомов стеклорамками. Окна должны быть защищены от попадания на них от палачей экранной защитной пленкой быть оснащены техническими устройствами, препятствующими несанкционированному проникновению в помещения лаборатории, не нарушающими правил пожарной безопасности.

176. Двери помещений «заразной» зоны должны быть плотно загерметизированы без щелей, иметь запирающее устройство. Двери в помещениях для работы с высокоинфекционными жидкостями оборудуют порогами не менее 90 см. высотой для предотвращения проветривания.

177. Внутреннюю отделку помещений выполняют в соответствии с их функциональными назначениями и санитарно-гигиеническими нормативами. Поверхности пола, стен, потолка в помещениях «заразной» зоны должны быть гладкими, без щелей, устойчивыми к многократному действию моющих и дезинфицирующих средств.

178. Полы должны быть не скользкими, иметь антистатическое сопротивление при реконструированных лабораториях оснащенных пола и потолка антистатическим, с заземлением для обеспечения безопасности уборки и дезинфекции. В существующих лабораториях допускается использование альтернативных способов выполнения работ, если это не нарушает требований СП и обеспечивающих отсутствие щелей.

179. Места входа и выхода коммуникаций герметизируют. Помещения лабораторий должны быть приспособлены для грызунов и птиц.

180. В помещениях «чистой» зоны не допускается хранение подоконных ящиков. Подвесные полки должны быть герметичными и обеспечены декором в соответствии с пространством для дезинфицирующей обработки.

181. Электротехнические работы в помещениях «чистой» зоны должны быть с пылеотсасывающими устройствами, светотехника герметична.

182. В помещениях «чистой» зоны выступы, трубы и приборы отопления должны быть в состоянии от пыли, позволяющем проводить дезинфицирующую обработку. Отопительные приборы должны иметь гладкую легко очищаемую поверхность, устойчивую к многократному действию мыльных и дезинфицирующих средств.

183. Оборудование и лабораторная мебель (столы, стулья для сидения лаборантов, шкафы, стеллажи для хранения лабораторных материалов, стулья и другие) должны иметь гладкую поверхность, без острых краев и шероховатостей, столы – без швов и трещин. Покрытия оборудования и мебели должны быть устойчивыми к действию мыльных и дезинфицирующих средств.

184. Помещения, где проводят работы с возбудителями протозойных инфекций и гельминтозов оборудуют вытяжным шкафом, водопроводным и канализационной системой в соответствии с СНиП II класса, с искусственным освещением, подтопкой пола.

185. Приборы, измерительное оборудование и средства измерения, используемые в работе лаборатория, должны быть технически исправны, соответствовать требованиям к точности средств измерения измерений, должны быть аттестованы.

186. Планово-предупредительный ремонт лабораторного оборудования и инженерных систем обеспечения биологической безопасности лабораторий осуществляется в соответствии с годовым графиком, утвержденным руководителем организации.

187. На оборудовании, используемом для хранения, культивирования и транспортирования ИБВ, обозначают знак «Биологическая опасность» (написывается международный знак «Биологическая опасность» красной или оранжевой краской на желтом фоне).

188. Проверку эксплуатационных характеристик биологической безопасности (Б/Б), плановых биологических устройств (Б/У) и систем предотвращения аварийных ситуаций (Д/Б) в соответствии с требованиями международных стандартов «Специфика управления, организации, аккредитации на этот вид деятельности в международной системе аккредитации».

Указание на наличие и подписание к водопроводным

на плане здания в 1902

после перемагничивания, замены фильтра или ремонта БМБ.

189. В лаборатории I уровня безопасности допускается проводить проверку систем ППБ специалистами соответствия эксплуатационной документации, имеющим профильное профессиональное образование.

190. Защитная эффективность БМБ определяется на основании результатов проверки эксплуатационных характеристик. Защитная эффективность БМБ не подтверждается, если при проверке его эксплуатационных характеристик хотя бы один из них оказался ниже отклонения от значений следующих показателей:

1) перечень эксплуатационных характеристик БМБ I класса:

средняя скорость входящего потока — от 0,70 до 1,00 м/с;

защитная эффективность фильтра — соответствие методике контроля;

направление потока — входящий вдоль всего сечения рабочего пространства;

2) перечень эксплуатационных характеристик БМБ II класса:

средняя скорость входящего потока — от 0,25 до 0,50 м/с;

плотность входящего потока — $\pm 30\%$ от средней значения;

средняя скорость входящего потока — не менее 0,40 м/с;

плотность фильтрационной способности — соответствие методике контроля;

направление потока — входящий вдоль всего сечения рабочего пространства;

направление потока — исходящий по всему сечению рабочей зоны;

3) перечень эксплуатационных характеристик БМБ III класса:

удельный расход входящего потока воздуха — не менее 0,05 м³/с на 1 м² объема бокса;

средняя скорость входящего потока через периферийный порт при открытой шторке — не менее 0,70 м/с;

защитная эффективность фильтра — соответствие методике контроля;

давление в рабочей камере бокса — не менее 200 Па при отключенном и включенном лабораторном

191. Результаты проверки эксплуатационных характеристик и подтверждающие защитный эффект должны быть зафиксированы в протоколе проверки защитной эффективности.

192. Подключаемые к выхлопной системе выхлопная ЗВУ должны проходить аттестацию, включающую в себя проверку защитной эффективности ФВБ, тестируемых выхлопных потоков и работоспособность лопатных систем устройств.

194. При планировании подразделений (организаций), осуществляющей деятельность с использованием ПБА, необходимо учитывать требования (ТББ), предъявляемые к ней исходя из уровня биобезопасности.

195. Эксплуатация систем приточно-вытяжной вентиляции осуществляется в соответствии с инструкцией, составленной с учетом требований настоящих санитарных правил. Системы механической приточно-вытяжной вентиляции должны быть паспорттированы. Обслуживание механической ПТВ осуществляется ответственным лицом организации или другой специализированной организацией, привлеченной к этому виду деятельности.

196. Один раз в год проводится проверка эффективности работы систем механической ПТВ и кондиционирования, при необходимости - их ремонт (с предварительной дезинфекцией), с отчетом в журнал:

197. Установка оконных кондиционеров и подразделений не допускается.

198. В лабораториях (подразделениях) 1 и 2 уровня биобезопасности осуществляются деятельность с использованием ПБА III-IV групп, разрешена установка кондиционеров в помещениях (кондиционированных помещениях) при условии их ежегодной проверки работоспособности. Очистку и дезинфекцию фильтрующей системы проводят один раз в три месяца.

199. В лабораториях (подразделениях) 3 и 4 уровня биобезопасности осуществляются деятельность с использованием ПБА V-VI групп, установка оконных кондиционеров и сплит-систем на крышном помещении «закрытой» в чистый день не допускается.

200. Не допускается установка кондиционеров в помещениях для содержания лабораторных животных. Поддержание требуемых параметров микроклимата в помещениях для содержания лабораторных животных обеспечивается с помощью оборудования для подгрева (охлаждения) воздуха и системы вентиляции на крышной вентиляции.

201. В одном помещении лаборатории (подразделения) допускается одновременное проведение работ:

с риском заражения (штампы) возбудителей инфекций, при этом биобезопасность обеспечивается в соответствии с максимальными требованиями, определяемыми особенностями используемых ПБА.

Лабораторные и экспериментальные исследования, при условии разрешения этих работ во времени и проведении текущей дезинфекции после каждого цикла работ.

201. Не допускаются податочными работ в отделе помещений лабораторий (измерений) с диатрическими нитрогеном, полихлорированными углеводородами и другими.

202. Не указывается проведение экспериментальных работ с поваренной солью и вурепентилем птвичьим, если в организм отсутствуют лекарственные препараты и потерян мышечный потенциал чувствительным (не менее двух препаратов). Работу со щавелем [-П] группа психическая, устойчивая ко всем видам антибактериальных препаратов, проводится в экспериментальной лаборатории.

208. Но прежде разбили шары боксера и предбоксера, микробактериальных кишечных дельтаи были закрыты. Выход из боксерных кишечных, микробактериальных кишечных до боксера микробактериальных и ПБА не допускается.

204. Обеспечиваясь опубликованные принципы парадоксы (не менее двух человек, один из которых врач или научный сотрудник) при выполнении всех видов работ с ПБА 1-П группы и запрещается лабораторных животных при работе с ПБА III-IV групп.

203. Время непрерывной работы с ПНА ограничивается 2 часами, после которых устанавливается минимум 30-минутный перерыв.

206. По выполненным работам все объекты, содержащие ИБД, убирают и хранящиеся (железобетонные, железобетонные, стальные и другие, которые отечественными) производят текущую диагностику рабочих поверхностей и своевременное обслуживание. По результатам всех обследований жилищной и коммунальной сети в виде плановых работ по обслуживанию объектов.

207. По окончании работы с ППЗ, руки в перчатках обрабатываются асептическим раствором СМЗ, перчатки, руки обрабатывают 70% раствором этилового спирта и/или используют другие асептические и соответствующие инструкции по предотвращению производства и могут с мылом или другим моющим средством 100-150 сек.

209. Вывоз из подразделения обиходных, лабораторной или хозяйственной посуды, инструмента, инструментов и других предметов производится только после их дезинфекции и с разрешения его руководителя, за печатью подразделения – руководителя подразделения.

[illegible]

210. Прием шихтователей, хранение шихтовых продуктов, прием шихты разрешены в специально отведенных местах в качестве поле лабораторий

211. Юридические лица в индивидуальном предпринимателя, работающие с ПБА, обеспечивают проведение прикладных исследований в области инженерно-технических систем безопасности и удаления отходов. Результаты контроля оформляют протоколами. Протоколы подписываются руководителем организации.

212. Отходы, образующиеся в результате деятельности с использованием ПБА, подлежат обеззараживанию. Отходы лабораторий, работающих с ПБА и осуществляющих медицинскую деятельность, относятся к высокоопасным отходам.

213. Дезинфекцию различных объектов с ПБА осуществляют физическими методами: выжиганием, выжиганием паром, выжиганием дымом, сухой горячей паром, УФ-облучением, СВЧ-излучением, химическими (использование растворов дезинфицирующих средств, применяемых в основном при утилизации отходов) или комбинированными методами и в случаях, приведенных в приложении 2 к Санитарным правилам.

214. Для дезинфекции допускается использование дезинфицирующих средств и оборудования, разрешенных к применению в Российской Федерации.

215. Методы и дезинфицирующие средства обеззараживания определяют в каждом случае исходя из условий отходы ПБА и вида обеззараживаемого материала.

216. Допускается одновременно обеззараживать/обезвреживать утилизируемые жидкие отходы с использованием разрешенных и применения для этих целей установок.

217. Отходы класса В подлежат обеззараживанию (дезинфекции) физическими методами. Применение химических методов дезинфекции допускается только для обеззараживания пищевых отходов и подделанных ботынок, а также при осуществлении первичных производственных мероприятий в сырых.

218. Юридические лица, осуществляющие работу с ПБА 1-П группы опасности, должны проводить не реже 1 раза в квартал в рамках производственного контроля исследования сточных вод на наличие в них патогенной микрофлоры.

219. Выбор сточных вод обязательно проводить из всех жидких отходов канализационной системы организации перед их вывозом в общий коллектор или по указанию инструкций по обеззараживанию сточных вод, разработанных в организации с учетом местных условий и особенностей осуществляемой деятельности. Результаты исследований должны фиксироваться в журнале учета таких исследований.

220). Непредоставлено в лабораториях должно применяться как минимум надежный запас дезинфицирующих средств для непрерывного обеспечения текущей работы.

221). Вспомогательное и вспомогательное дезинфицирующее средство должно иметь разрешительные документы, предусмотренные законом Европейского экономического союза¹⁹ и использоваться по их назначению.

222). Приготовление дезинфицирующих растворов, их хранение, обеззараживание биологических материалов, взяток и других объектов, прикладных в исследованиях и оборудованных помещениях. На основе с дезинфицирующими растворами должны быть указаны его назначение, концентрация и дата приготовления. В лабораториях I уровня безопасности должны осуществлять подготовку дезинфицирующих растворов и помещений для мытья и подготовки лабораторной посуды и спецодежды на рабочем месте.

223). Контроль приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств осуществляют назначенные руководителем подразделения сотрудники перед началом проведения работ с ПБА с использованием тестовых картриджей для контроля концентрации рабочих растворов на соответствующее дезинфицирующее средство. Результаты фиксируют в журнале учета и контроля приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств.

224). Запрещается совместное использование в одной емкости для проведения работ с ПБА, хранения, слез с использованием в одной емкости перемычки и хлороксовидных дезинфицирующих растворов.

225). Обеззараживание инфицированного материала путем автоклавирования проводится стерильно, в течение 120 минут, при температуре 121°C в течение 15 минут. В процессе работы с биологическими материалами.

226). Контроль работы шаровых и вращающихся стерилизаторов, используемых для обеззараживания материалов, осуществляется с применением феноловых, хлорных и биологических методов.

227). Бактериологический контроль работы стерилизаторов проводится после монтажа и ремонта аппаратуры, а также в процессе его эксплуатации (минимум 2 раза в год с интервалом в 6 месяцев и дополнительный при возникновении неблагоприятных результатов контроля).

¹⁹ Договор о Европейском экономическом союзе от 20 мая 2014 г. (официальный сайт Европейской экономической комиссии <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0057%2801%29>, 5 июля 2014 г.) (ратифицированный Федеральным законом от 01.07.2014 № 175-ФЗ «О ратификации Договора о Европейском экономическом союзе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 40, ст. 7310)).

228. Транспортировка материалов для обеззараживания внутри подвальных помещений осуществляется в шотные мешочки/пакеты, пачки/ящики, широкоразветвистых контейнерах (в биг-бэгах). В контейнерах для защиты окружающей среды по периметру края биг-бэгов ставятся липучки-защелки, обеспечивающие соблюдение циркуляции воздуха внутри биг-бэга.

229. Дезинфекция поверхностей в помещениях, оборудованных лабораторной мебелью, приборами и приборами, а также воздуха «заразной» зоны проводится после проведения работ с ИБВ, а при необходимости, и перед проведением работ с ИБВ. Поверхности в помещениях «заразной» зоны дезинфицируют раствором ДС с помощью протирания или опрыскивания, после чего включают оборудование для обеззараживания воздуха в помещениях. Ежедневно в помещениях «заразной» зоны проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств путем протирания поверхностей мебели, приборов, оборудования, а также стен на высоте не менее 2 м. Дезинфекция помещений осуществляется методом дезинфекции.

230. График и результаты проведения тепловых уборок фиксируются в журнале.

231. Эффективность бактерицидных облучателей осуществляется в соответствии с нормативными документами по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха в помещениях. Стеклопакеты бактерицидных ламп протирают в выключенном положении салфеткой, смоченной 70% раствором этилового спирта или дезинфицирующего средства, разрешенного к применению, не реже 1 раза в неделю.

232. Уборочный инвентарь маркируют в соответствии с назначением в комплект (раздельно) для помещений «заразной» зоны – в «заразной» зоне, для помещений «чистой» зоны – в «чистой» зоне. Используемый уборочный инвентарь не должен использоваться повторно.

233. Сотрудники лабораторий, выполняющие работы с ИБВ, используют специальную рабочую одежду и обувь. СИЗ в зависимости от характера выполняемых работ и в соответствии с нормами выдачи. Рабочая одежда (медицинские халаты, платья (комбинезоны), носки) и специальная обувь, СИЗ подбираются в соответствии с размерами и хранятся отдельно от личной одежды и обуви работников.

234. Средства индивидуальной защиты используют специалисты при выполнении работ с ИБВ в «заразной» зоне (при выполнении 1 и 2 санитарных правил). Соответствующие СИЗ надевают перед началом работы.

235. Смену рабочей и защитной одежды проводят по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю.

236. Перед сменой в стирку заправляют одежду индивидуального назначения, предназначенную для работы с ПБА 1-IV групп, обеззараживают (приложение 2 к Санитарным правилам). Стирку рабочей и обеззараженной защитной одежды допускается проводить в помещениях прачечной.

237. Работники, проводящие илия прыжков, сбор членистоногих, а также другие полевые работы с личиной повышенными плотностями и численностями, обеспечивают соответствующей сменой рабочей, а также заправной одежды.

238. Устройство, оборудование и экспериментально-биологические объекты (животные) обеспечивают в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

239. Виварии для содержания лабораторных животных размещаются в специально отведенных или специально отведенных помещениях (научно-исследовательском институте, лаборатории) с соблюдением требований к санитарно-эпидемиологическим и санитарно-классификационным требованиям, помещений и иных объектов.

240. При размещении вивария в лабораторном корпусе предусматриваются мероприятия, направленные на исключение явного загрязнения, в том числе дезинсекционных и биологических мероприятий дезинсекции.

241. Виварии оборудуются отдельным входом и вентиляционная системами выноса воздуха.

242. При размещении вивария на первом этаже здания здания организации оборудуются отдельный лифт или пандусная лестница. Использование пандусов для лифта предусматривается для целей вивария не допускается.

243. При планировке и размещении помещений вивария обеспечивается соблюдение принципа разделения помещений на «чистые» и «грязные» помещения и предусматриваются условия, исключавшие контакты или сокращение контактов перемещений оборудованных, инвентаря, материалов, кормовых вивария, лабораторных животных с различной степенью эпидемиологической опасности из «грязных» в «чистые» помещения.

244. В составе основных помещений вивария предусматриваются:

помещения приема, кормления и содержания животных-поступающих животных;

помещения экспериментальных животных;

помещения с проточной водой для экспериментальных работ, требующих особых условий;

помещения хранения чистого (обеззараженного) инвентаря для ухода за животными (клеток, помоек, посуды для кормов, оборудования);

комиссия манипуляционный или изучая обменных процессов, взяты проб для анализа;

помещение для хранения и применения жидкостей для инъекций;
лабораторический кабинет.

комиссия или оборудованная выделенная зона для изучения обротов (биологические материалы) и обротов сравнения.

245. В составе «трехэтажного» помещения внариш предусмотрены:

помещения вентиляторов, предназначенные для содержания и содержания по типификации заболеваний животных для больных животных;

комиссия (для отделить) для жидкостей и дезинфекции оборудования и материалов;

лаборатория повышенная или холодильная камера для сбора и хранения тканей животных, отходы;

помещения для хранения вентри (трупа, трупа и т.д. и т.д.).

246. Помещения внариш для жидкостей и дезинфекции оборудования и материалов. а также для хранения животных (лаборатория) на складе жидкостей и «трехэтажного» помещения для обслуживания перемещения животных и «трехэтажного» оборудования, инвентаря, материалов, а также животных и трупа животных.

247. Помещение внариш для хранения жидкостей внариш размещается рядом с помещением (подземным) для жидкостей и дезинфекции оборудования.

248. Помещение внариш для содержания животных оборудуется проточной системой вентиляции, обеспечивающей необходимую для животных влажность воздуха, температуру и влажность воздуха, содержание жидкостей допустимого содержания патогенных жидкостей в воздухе помещений и содержания с гигиеническими формами.

249. Устройство вентиляции в внариш должно исключать циркуляцию воздуха из «трехэтажного» помещений в «трехэтажном». При проведении экспериментов с использованием жидкостей и жидкостей человека и (или) животных необходимо предусмотреть наличие соответствующих фильтров на вентиляционных системах вентиляции.

250. Работы внариш должны проводиться в соответствии с каждым профилитическим правилом по эпидемиологическим показаниям.

251. В внариш условия работы с микроорганизмами различных групп безопасности должны быть соответствовать требованиям типа IV Ссылочных правил.

252. Работы по заражению, вскрытию и содержанию обротов животных, других манипуляций с микроорганизмами жидкостей и жидкостей, жидкостей, жидкостей

обработке проб лизоты-паразитов животного и секретируемого материала выполняются в вытяжке и блоке для работы с инфицированными животными. Все люди работ с лизотными блоками для инфицированных животных несут ответственность с соблюдением личностной гигиены (не менее двух человек, один из которых врач или научный сотрудник).

253. Операции по зарезке и вскрытию лабораторных животных проводит сотрудник, прошедший подготовку по мерам безопасности и технике работы с животными. К работе с приматами допускаются сотрудники, обученные технике работы с данным видом животных.

254. К работе по уходу за инфицированными животными и уборке помещения блока для работы с инфицированными животными допускаются сотрудники в соответствии с должностными обязанностями.

255. Показания блока выносятся для работы с инфицированными животными регистрируются в журнале с указанием сроков пребывания и характера выполняемых работ.

256. Выход персонала в блок для работы с инфицированными животными осуществляется через помещение для взвешивания средств индивидуальной защиты, а выход - через помещение для снятия и обеззараживания средств индивидуальной защиты.

257. При работе в блоке для инфицированных животных не допускается в одной и той же комнате надевать СИЗ и снимать их после работы с ПБА.

258. Зараженных животных и средств животных и оборудования содержат в помещении блока для работы с инфицированными животными с соблюдением следующих требований:

мелких лабораторных животных (мыши, крысы, хомяки, морские свинки) - в специальных вентиляруемых системах для содержания инфицированных животных или клетках с HEPA-фильтрами, банках или металлических ящиках;

средних (кролики и другие) - в специальных вентилируемых системах для содержания инфицированных животных, в металлических ящиках;

допускается содержание крупных лабораторных животных в специальных вентилируемых шкафах, предназначенных для содержания животных;

банки и металлические ящики с животными размещают из металлических стеллажах;

емкости, лотки для размещения животных закрепляют на целостности, накрывают, исключают прикосновения, предупреждая возможные травмы животных.

животные, выращенные разными методами микробиотанизации, подлежат раздельному содержанию;

при нахождении в емкостях большое количество подстильнивого материала животных пересаживают в чистые емкости, клетки, а использованные обетаривающие,

жидкопаразитария помещают в бочки и фляжки, плотно закрываемые металлизированным материалом, а также в приборы, закрытые петлю-марлевой или кордовой пробкой;

259. Сосуды с жидкопаразитариями в помещениях блока для работы с инфузориоцидными животными помещают в полиэтиленовые шкафы, холодильники или термосы.

260. Транспортирование зараженных лабораторных животных в пределах блока для работы с инфузориоцидными животными осуществляют в закрытых металлических (пластмассовых) емкостях, накрытых тканевой салфеткой, емкостью дезинфицирующим раствором или в клетках с HEPA-фильтрами.

261. При работе с лабораторными животными должны соблюдаться меры предосторожности, не допускающие укусов животных, укусов царами, разрывов одежды, порывов.

262. Перед проведением манипуляций с лабораторными животными их надлежи фиксировать. Зараженные мышь кроли и крысы можно лабораторных животных при работе с ИБА I-II группы помещать в боксы антибиотический безопасности (или защитном биоконтрольном устройстве).

263. Во время работы с лабораторными животными в помещениях очарованных зоны животных запрещается:

протирать любые манипуляторы с животными, не убедившись в его надежной фиксации;

чистить бочки и другие емкости (исключая дезинфицирующим раствором) отходы.

брать пищу руками и средним пальцем руки без перчаток.

264. Крупных лабораторных животных (жвачек, баранов и других) размещают в денниках. Двери денников накрывают снаружи напором.

265. Отходы микробиологических лабораторий, включая тушки лабораторных животных, подлежат обеззараживанию. Утилизация тушек лабораторных животных проводится в соответствии с законодательством в области ветеринарии.

266. Перез и (или) по приему промывки животных для дезинфекции шерсти используют обеззараживающие, анестезирующие и другие необходимые фармацевтические средства.

267. Животных, предназначенных для вскрытия, предварительно укрывают.

268. Обращение с биологическими материалами, зрелыми или инфицированными на протяжении всей продолжительности жизни, осуществляемое в соответствии с требованиями в области ветеринарии.

269. Трупы падших или погибших убитых животных на территории по чужим территориям подлежат вскрытию. Труп животного затем утилизируют в соответствии с законодательством в области ветеринарии.

270. На случай аварии, при которой создается реальная или потенциальная угроза здоровью персонала ЦБА в воздухе помещений и/или воды, среди оборудования персонала, в частности, в которых проводятся работы с ЦБА, запас дезинфицирующих средств, жидкостей и отключенных оборудования, с которыми работают специалисты, с учетом типа микроорганизма (принадлежит 2 к Списку опасных веществ), возможности работы и объема помещений, запас воды.

271. Для предотвращения заражения персонала последствия аварии в подразделениях, производящих работу с ЦБА, в специально отведенном месте хранятся комплекты работ (для персонала, осуществляющего) работы, комплекты защитной одежды для аварийной бригады, устройства для дезинфекции помещений (аэрозольные и другие), аварийный запас дезинфицирующего средства аварийную аптечку, в состав которой входит спирт этиловый 70% (для флакона во 100 мл), 1% настойка йода, марлевый шарф, повязка с поролоновыми бинтами, перчаточные средства (руки, бинты марлевый медицинский стерильный, лейкопластырь, салфетка марлевая стерильная (размер 10 x 10 и прочие) и жгут кровоостанавливающий, бинты и рулон для фиксации предметов изолента и т.д.

272. В вирусологической лаборатории должны быть в наличии интерферон или индуктор интерферона.

273. В аптечке должны быть препараты, предназначенные для профилактики заражения, должны быть герметичные бусы, шприцы, пинцеты, скальпели, ножницы.

274. Руководителем подразделения должно быть обеспечено наличие и укомплектование аварийной аптечки.

275. Объем мероприятий по ликвидации аварии зависит от характера выполняемой работы, вида и свойств возбудителя, масштаба аварии:

авария с разбрызгиванием ЦБА (с образцами вируса) — бой прибиральщиц, флакотов или кувалд с жидкой культурой; бой чашек и пробирок с культурами на столе с жидкой культурой, разбрызгивание бактериальной суспензии из шприца или шприца; разбрызгивание жидкой культуры при вскрытии трупов паразитных животных или

большинстве людей: авария на вакуумной установке и процесс сушки вакуумных культур, авария при работе на центрифуге, а также другие аварии, ведущие к потемнению воздуха или окружающей среды, в том числе авария при транспортировании ПБА в автолавину и между подразделениями;

авария без разбрызгивания ПБА – трещина во время Петри, пробирка, флакон с биологическим материалом, падение на стол твердой чашки при обливании петри после посева, возникновение порывистости посева на твердой питательной среде;

авария, связанная с нарушением целостности посуды и лириков;

авария, связанная с нарушением целостности средств индивидуальной защиты, загрязняющего костюма.

276. При аварии с разбрызгиванием ПБА следует:

проявляет обработку открытым, не экипированным СИЗ, укрывшись тем (кожухом, покрывалом) 70% этиловым спиртом, при наличии на открытые участки кожи ботулинического титана или смывают 70% этиловым спиртом или большим количеством воды с мылом;

обрабатывают санитайзером, дезинфицирующим, мылом экипировку костюма, на которую уже нанесены дезинфицирующие средства, снимают СИЗ и рабочую одежду, помещают в емкости с дезсредством или помещают в пакет для автодезинфекции;

обрабатывают руки и предметы в емкости с дезсредством, снимают перчатки и помещают их в пакет для автодезинфекции;

обрабатывают руки дезинфицирующим раствором или 70% раствором этилового спирта;

прикрывают носочной повязкой, рот и горло прополаскивают 70% раствором этилового спирта в случае, если имеются глот. травя и рта не было экипировки СИЗ. При аварии с вырванным экипом экипировку и инструменты и инструменты и инструменты;

прополаскивают водой и раствором для 10 МВ/мл этилового спирта при аварии с ботулиническим титаном или в рот;

примывают лицевую маску дугой;

надевают чистую рабочую одежду;

277. Сотрудники, участвующие в ликвидации аварии, должны использовать средства индивидуальной защиты в соответствии со степенью опасности ПБА.

При проведении дезинфекции способом распыления используют СИЗ органов дыхания (СДЗОД) в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующих средств.

Для обработки используют дезинфицирующий раствор, эффективный в отношении возбудителя инфекционного заболевания.

Дезинфекцию помещений проводят дезинфицирующим раствором с применением устройства для дезинфекции мелкодиспергатором (спрей-улы и другие) или аэрозольным методом от входной двери в помещения, где произошло заражение, и далее, приближаясь по обрабатываемой территории и огибая барьеры, охватывая все предметы (пол, стены, потолок) в соответствии с режимом. На остатках разлитой жидкости с ПБА накладывают обильно смоченную дезинфицирующим раствором салфетку.

Через 2 часа после первичной обработки собирают загрязнения, смоченным дезинфицирующим раствором или с использованием салфеток (горизонтально), осматривают разлитую жидкость, погружая их в герметизированную емкость с дезинфицирующим раствором; лабораторную посуду с жидкостью, находившуюся в момент аварии на рабочих поверхностях, погружают в емкость с дезинфицирующим раствором или обтирают салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, и помещают в емкость для автоклавирования. Протирают место ладоней салфеткой, смоченной в дезинфектор. По окончании дезинфекции поверхностей помещают в емкость с дезинфектором посуду и поверхности с помощью оборудования для обеззараживания посуды и поверхностей.

Сотрудник, прошедший дезинфекционную обработку, помещает в предбюкс, снимает защитную одежду, погружая ее в дезинфицирующий раствор.

Через 2 часа проводят уборку помещений, после чего работа может быть возобновлена.

278. При аварии без разбрызгивания ПБА должны выполняться следующие действия:

не подходить из помещения, разбрызгивая капли с дезинфицирующим раствором на место возникновения ПБА на поверхности объекта;

включают аварийную сигнализацию, включают звуковое оповещение и на явку, если замешательство, и продолжают дезинфекционную обработку места аварии.

после окончания дезинфекционной обработки сотрудник выходит из помещения, где произошло заражение, снимает и погружает в дезинфицирующий раствор защитную одежду;

открытые части тела обрабатывают дезинфицирующим раствором или 70% спиртом.

279. При аварии, связанной с нарушением целостности кожных покровов, должны выполняться следующие действия:

работу прерывают;

Исследования проведены в соответствии с детальной инструкцией разработчик в лабораториях, специализирующихся на этом.

ВКЛЮЧАЮТ НЕОДНОЗНАЧНО-ЭМПИРИЧЕСКИЕ

порода и преобладание руды образующихся дислоцированных растворов, связанных
поверхью.

на место разрыва вывешивают лавины, содержащие 70% растворимых элементов;
сметно;

при работе с крупными обрабатываемой массой 5% пластификатор Нола.

280. При прерыве, связанной с нарушением целостности оборудования или непредусмотренной во время работы, необходимая:

расширить предоставление получателям средств (школы, сафетар и
департаментом, корпоратив);

привести деформацию наружной поверхности гнетимостями и, по возможности, не отсоединять от системы воздухоподогревателей, свиндиль в сварочный пропускник, при этом операции по выключению носов воздухоподогревательных систем системы воздухоподогревателей гнетимостями по усмотрению мастера.

281. В случае разрыва порчатым товаром или талонами записки в 30 дней после оформления покупки товара поставщик обязан вернуть в магазинные деньги и оплатить все расходы на доставку товара.

282 ЕСТЬ работоспособность и способность к организации лабораторных, учебных и производственных лабораторий, позволяя ему организовать работу. Он проверяет наличие документов в производственных лабораториях, созданных сотрудниками лаборатории, при необходимости осуществляя дополнительные в воздухоподогревательную систему воздухоподогревателя, в этом принимает меры к его замене.

28.2. Руководитель подразделений организует работу пострадавшего санитарным транспортом с сопровождающими в санитарное учреждение, инфицирует и санирует руководителя подразделения, в случае необходимости членов подразделения и персонала аптеки системы аварийной помощи.

184. При аварии во время работы на центрифуге центрифугу выключают, останавливают, через 40 минут (после оседания аэрозоля) медленно открывают крышку. Центрифужные стаканы и разбитое стекло помещают в дезактивационный раствор. Возможность заражения, поступление газа из центрифуги, ее герметичность проверяют.

285. Ликвидирует таргет при работе в БМБ осуществляю: согласно разработанной и показываю инструкции и планам ликвидации аварий с учетом

алгоритмы, рекомендуемые в данном разделе.

286. По ситуации «авария» любой сотрудник, привлеченный к ситуации, немедленно сообщает руководителя подразделения или заказчика его специализации о случившемся.

287. Руководитель подразделения немедленно сообщает об аварии руководителю организации и КББ.

288. Руководитель подразделения совместно с КББ оценивает ситуацию, определяют объем мероприятий по ликвидации и ликвидации последствий аварии и определяют возможности руководства организации, организует и контролирует действия сотрудников, участвующих в ликвидации аварии.

289. Руководители подразделения и специалисты при аварии представляют следующие обязанности руководителю организации, в которых отражены причины аварии, характер выполняемых работ, обстоятельства аварии, вид микроорганизма, группу патогенности, вирулентность и чувствительность к антибактериальным препаратам, были ли нарушены требования биологической безопасности при работе, принятые меры.

290. Председатель КББ подает докладную записку в течение 2 часов на имя руководителя организации, в которой подробно излагает следующие сведения: дату и время аварии, факторы, должности участвующих, характер аварии, дает детальный характеристику патогенности, сведения о возможных пострадавших, излагает ход эксперимента, излагает объем мероприятий по ликвидации последствий, делает запись в журнале учета аварий и происшествий.

291. Руководитель организации на основании докладной записки определяет дальнейшие действия по ликвидации последствий аварии в соответствии с изложенными видами мероприятий по ликвидации аварии.

292. После ликвидации аварии, а при необходимости и проведения профилактического лечения либо излечения сотрудника лаборатории, председатель КББ несет ответственность за включение в журнал регистрации аварий.

293. Обо всех несчастных случаях и ошибках, происшедших при работе с ЦБА, сотрудники лаборатории ставят в известность руководителя подразделения или представителя КББ.

294. После ликвидации аварии руководитель организации совместно с членами КББ во контроле соблюдения требований биологической безопасности оценивают объем и качество, в том числе с использованием лабораторных методов исследований, осуществлены мероприятия по ликвидации или ликвидации аварии и принимают решение о возобновлении работ с микроорганизмами.

295. Обо всех случаях аварий во время работы с ПБА I - II групп, требующих профессионального лечения пострадавшего, руководители организации обязаны в течение 2 часов с использованием любых доступных средств связи информировать медицинскую организацию, уполномоченную осуществлять медицинский контроль, обеспечивающий территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и ФКУЗ «Противоочумный центр» Роспотребнадзора.

296. Обо всех случаях заболеваний сотрудников в результате аварий при лабораторных работах по времени работы с ПБА I - II групп руководители организации обязаны в течение 2-х часов с использованием любых доступных средств связи информировать медицинскую организацию, уполномоченную осуществлять медицинский контроль, обеспечивающий территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и ФКУЗ «Противоочумный центр» Роспотребнадзора.

297. При возникновении пожара (возгорания), принятых мерах и последствиях немедленно уведомляет руководителя учреждения, информирует заинтересованные подразделения, КББ. В случае возникновения пожара (возгорания) в рабочие часы сотрудники действуют согласно действующему нормативному документу.

Требования к лабораториям базового уровня I (лаборатория, осуществляющая работу с ПБА IV группы опасности)

298. Для обеспечения безопасности проведения работ с ПБА IV группы в лабораториях базового уровня I должны выполняться общие требования к условиям работы с использованием ПБА, предусмотренные в настоящей главе Санитарных правил.

299. Лаборатория, выполняющая работы с ПБА IV группы, должна иметь санитарно-эпидемиологическое заключение и соответствующий уровень проведения работ с ПБА IV группы санитарно-эпидемиологическими требованиями.

300. Работы выполняют сотрудники, прошедшие обучение по курсам профессиональной подготовки в соответствии с требованиями к работе с ПБА III-IV групп.

301. Персонал проходит инструктаж по биологической безопасности один раз в год.

302. В лаборатории, осуществляющей биологические исследования, регламентируются порядок движения персонала, хранения материалов из исследований, отходов. Разрешительные протоколы оформляют по схеме, утвержденной руководителем

гистологически.

303. Передать материалы в лабораторию, осуществляющую диагностические исследования, осуществляемой через плечи с замбури. Попускается передача через передаточное СВВ.

304. Материалы в лаборатории, осуществляющие диагностические исследования, должны находиться в плотно закрытых первичных емкостях: контейнерах, банках, сумках, холодильниках.

305. Допускается размещение принадлежащих лабораторий, работающих с ПБА IV группы, в специально оборудованном блоке производственного или административного корпуса.

306. Для лабораторий, проводящих исследования с ПБА IV группы, осуществляются копирование для работ с ПБА и подготовительных работ.

307. Для работы с материалами из разовопользуемых лабораторий для проведения работ с ПБА выделяются отдельные помещения — например: холл для разбора проб, посевы на питательные среды, проведение бактериологических (культуральных), паразитологических и зооветеринарных исследований, исследования по детекции возбудителей, для работы с лабораторными животными (этикетки, вскрытия), для содержания инфицированных лабораторных животных, обеззараживания инфицированного материала.

308. Для проведения подготовительных работ выделяют отдельные помещения — например: холл для работы лабораторной посуды, реагентов, стерилизации химических сред и лабораторной посуды, приготавливаемых в различных химических средах, приготавливаемых и хранящихся для работы с документами, для хранения материалов сред.

309. Для лабораторий выделяются отдельные санитарно-бытовые помещения для персонала и работающих: хранения личной и рабочей одежды, обуви, белья.

310. Набор помещений должен определяться функциональными задачами лаборатории.

311. Допускается проведение диагностических работ с ПБА IV группы в микробиологическом кабинете за лабораторными столами: исследования по контролю объектов окружающей среды и качества продукции на наличие санитарно-микробиологических, паразитологических исследований бактериальных.

312. Работы с материалами ПБА IV группы (диагностические — идентификация культур, микробиологические, токсикологические и производственные работы) выполняются в биоспециальном помещении или в микробиологическом кабинете в бинах.

микробной биологической безопасности во время II этапа.

313. Диагностирование в экспериментальных работах с вирусами IV группы патогенности проводят в биотехнологических помещениях БМБ не выше II этапа.

314. Работнику для защиты рук раскладывают на столе или приборостроительской столешницы или в перчатках.

315. Работы выполняются с обеспечением требований биологической безопасности и применяются лабораторные помещения общей лабораторной безопасности, а также подлежащий контролю вентиляция микробиологических работ (МБМР).

316. Для начала работы необходимо записать личную одежду и обувь на рабочем. При выполнении манипуляций с ПБА используют халат (экстренный или с антимикробными характеристиками), шапочку, медицинские перчатки. При приготовлении срезов, срезов, при заражении животных и при работе с кровью и инфицированными инфекционными биологическими материалами механизмом передачи биологически опасного патогена пропуск воздуха (респиратор не выше FFP2) или халат, защитный щиток или очки.

317. Обеззараживание отходов при работе с ПБА III-IV групп проводят согласно приложению 3 к Санитарным правилам.

Требования к лабораториям базового уровня 2 (лаборатория, осуществляющая работы с ПБА III группы патогенности)

318. Для обеспечения безопасности проведения работ с ПБА III группы должны выполняться общие требования к условиям работы с использованием ПБА, установленные в третьей главе Санитарных правил.

319. Лаборатория, выполняющая работы с ПБА III группы, должна иметь санитарно-гигиеническое заключение о соответствии санитарных условий проведения работ с ПБА III-IV групп, а также проведение работ с ПБА II группы, не представляющих опасность (вентиляция или кондиционирование) при выполнении патогена.

320. Работы выполняют сотрудники, допущенные к работе с ПБА III-IV групп, прошедшие обучение на курсах профессиональной подготовки с обеспечением методов безопасности работы с ПБА.

321. Персонал проходит инструктаж по биологической безопасности один раз в год.

322. Инженерно-технический персонал, дежурный и санитарный персонал подразделения, осуществляющего ведение ПБА II группы, проходит инструктаж по биологической безопасности по месту работы и ознакомления с должностными

обязательным.

123. В лабораториях, осуществляющих плановые работы по переплыванию, размещаются: теплые деревянные полы, постельные материалы на изоляционном слое. Различные виды половой отделки на стенах, утвержденной руководителем подразделения. Передача материалов осуществляется через дверь с тамбуром. Допускается передача через передаточное окно. Материал поступает в плотно закрытые промаркированные контейнеры, бочки, сумки и т.д.

124. Обеспечивается зонирование лабораторий. Помещения лабораторий разделяют на стерильную зону, где осуществляется взаимодействие с ПБА и зоной, где не проводятся работы с ПБА. Во вновь строящихся и реконструируемых лабораториях вход дорожка в стерильную зону осуществляется через санпропускник.

125. Во вновь строящихся и реконструируемых лабораториях санпропускник должен включать: помещение для снятия верхней одежды; шкафчик для хранения обуви; помещение для хранения рабочей одежды (защитной зоны (шляпки, перчатки, маска, защитная обувь, костюм).

126. Помещения стерильной зоны включают:

гардероб (шкаф) для верхней одежды;

линейные (шкафы) для рабочей одежды чистой зоны;

помещение для проведения подготовительных работ: мойка лабораторной посуды, протирание;

помещение для стерилизации питательных сред и лабораторной посуды (стерилизационная);

помещение для приклеивания и хранения диагностических сред;

помещение, оснащенное холодильником(ами) (холодильник камерный) для хранения питательных сред и диагностических сред;

комнаты для работы с документацией и литературой;

комната отдыха;

кабинет заведующего;

подсобные помещения;

туалет.

127. Помещения стерильной зоны включают:

помещение для приема материалов (дверь) по назначению;

буфет для работы с индивидуальными средствами.

выполнять работу с коллекционными шпательными, работу с лиофилизированными культурами, ИФА, детекция нуклеиновых кислот. В случаях, требующих выполнения трудоемкого обслуживания, и необходимости осуществления межсервисных работ в блоках микробиологической безопасности, работы выполняются в отдельных биохимических помещениях.

335. Экспериментальные исследования с вирусами проводятся в биохимических помещениях в БМП.

336. Работы в лаборатории должны выполняться с соблюдением ППБМ¹.

337. Для начала работы необходимы элементы личной одежды и обуви по рабочим. При выполнении манипуляций с ПБА используются одноразовый или промываемый халат, шапочку, медицинские перчатки. При приготовлении культурных сред, при заражении животных и при работе с пробами и возбудителями инфекционных болезней с аэрозольными механизмами передачи дополнительно используют противоаэрозольный респиратор не ниже FFP2 класса защиты, защитный шлем для лица. Нагнетание и системы СИЗ обеспечивают в помещении или при выходе в микробиологическую камеру.

338. Обеззараживание инфицированных материалов и отходов при работе с ПБА. II и III-IV группы подлежат обеззараживанию при температуре 2 и 5 минут при 121°C.

339. При выполнении работ с туберкулезом и атипичными микобактериями должны выполняться следующие требования:

туберкулезные работы со стрептококковой (микоточной) стадией микобактериального заболевания разрешаются лишь в течение 2 недель с момента первого заражения животных протоколными паразитами.

работы со зрелыми стадиями микоточной стадии указанного заболевания должны проводиться в блоках микробиологической безопасности во ячеистом П классе.

340. Работа с возбудителем туберкулеза и материалами, положительными на инфицированность возбудителем туберкулеза, осуществляется в соответствии с установленными требованиями².

341. Работы по исследованию мазков, положительных на наличие возбудителя туберкулеза, необходимо проводить в блоках микробиологической безопасности II класса с противочумным костюмом IV типа (или его аналогом), защитными респираторами и защитными перчатками.

Требования к биологической лаборатории 2 уровня

¹ Приказ Минздрава России от 21.03.2018 № 109 «О совершенствовании противоэпидемиологических мероприятий в Российской Федерации» (не действует в государственной регистрации в соответствии с приказом Минздрава России от 26.03.2018 № 109-н/3-5-РД).

142. К лабораториям, осуществляющим работы с ПБА II группы, предъявляются следующие санитарно-эпидемиологические требования:

1) для обеспечения безопасности проведения работ с ПБА в лабораториях УББ Э должны выполняться общие требования к условиям работы с особо-опасными ПБА, а также требования к лабораториям биологического уровня 2, установленные в восточной главе Санитарных правил;

2) лабораториям установленного уровня Э ответственность работы при длительном контакте-эпидемиологическом заражении с возбудителями опасных болезней передаётся работ ПБА II-IV групп;

3) работу выполняющих сотрудников, допущенных к работам с ПБА II-IV групп, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки с освоением методов безопасной работы с ПБА;

4) инструктаж персонала по вопросам биологической безопасности при работе с ПБА II группы проводится 1 раз в квартал;

5) обеспечивается ограничение доступа в лабораторию, круглосуточная охраняемая сигнализация;

6) во вновь строящихся и реконструируемых лабораториях-организациях требования к инженерно-техническим системам биологической безопасности должны соответствовать требованиям приложения 4 к Санитарным правилам;

7) вход персонала в лабораторию осуществляется через санитпропускник с душем и туалетом «холодной» и «горячей» воды. На двери душевой обязательно наличие знака «Биологическая опасность» (рекомендуется использование международного знака «Биологическая опасность» красного или оранжевого цвета на белом фоне). Устройство санитарных пропускников обеспечивается в соответствии с приложением 4 к Санитарным правилам;

8) до начала работы необходима замена личной одежды и обуви на рабочие. Использование СИЗ осуществляется согласно приложению 3 к Санитарным правилам;

9) во вновь строящихся и реконструируемых лабораториях, необходимо предусмотреть для персонала материалы и предметы, оборудование для хранения биологических материалов, биологических культур и системной биотехнологии;

10) архитектурные конструкторские конструкции (ОСК) помещений «опасной» зоны должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям строительных норм и правил и общественным зданиям и сооружениям, и приложения 4 к Санитарным правилам;

11) все вакуумные линии, линии всасывания воздуха и газов и «холодных» жидкостей обеспечиваются фильтрами очистки воздуха не менее класса H13. Системы очистки

пладука и канвологичекого пакууна должны отвечать требованиям, изложенным в приложения 4 к Санитарным правилам;

12) во вновь строящихся и реконструируемых подразделениях/организациях биохимических помещений и помещений типа для работы с инфицированными жидкостями должны быть оборудованы отделочные вентиляционные системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, установленные фильтры тонкой очистки воздуха (ФТН) класса Н12 на входе и классе Н14 на выходе;

13) работа систем вентиляции характеризуется следующими основными эксплуатационными параметрами:

обеспечение разности давлений между «чистой» и «грязной» зонами: 50 Па (5 мм водного столба) для лабораторий, проводящих диагностические работы и 100 Па (10 мм водного столба) для лабораторий, проводящих экспериментальные работы;

внешний разрежение в помещениях «чистой» зоны - контроль постоянный;

средняя скорость воздухопотока в окрестности дверных проемов на границах зон в санитарных приточных лабораториях, проводящих экспериментальные работы с ПБА П группы должна быть не менее 0,4 м/сек. Проверка一次 в 6 месяцев;

характеристики сопротивления фильтров - контроль ежегодный;

эффективность фильтрации воздушных фильтров - контроль регулярный и соответствия с графиком замены, но не реже 1 раза в год;

14) работы с ПБА проводят в биобезопасных помещениях, в биологическом/микробезопасной биологической (БМБ) II класса защиты, чистых биобезопасных устройствах (ББУ). Работы выполняются с обеспечением герметичности НГНМР;

15) в существующих зданиях лабораторий, проводящих аналогичные работы с ПБА П группы при отсутствии в помещениях «чистой» зоны приточно-вытяжной вентиляции, оборудованной фильтрами очистки воздуха, используют БМБ из класса II А2 класса;

16) обезвреживание инфицированного материала и отходов осуществляется химическими или физическими методами согласно регламентированным процедурам для ПБА П группы. Автоклав размещают в «чистой» зоне лабораторий;

17) загрязненная сточная канализация должна быть включена в канализационную сеть. Во вновь строящихся и реконструируемых помещениях или их подразделениях проектируются и функционирующие системы канализации, сбора и обезвреживания сточных из «грязной» зоны осуществляется в соответствии с требованиями 4 к Санитарным правилам;

18) в организации, закрепленных за санитарно-противоэпидемиологическим

участия, медицинское обслуживание и содержание персонала: врачи-специалисты медико-санитарных частей (МСЧ), имеющие соответствующую документально подтвержденную подготовку по оппортунистическим и инфекционным болезням:

19) при возникновении симптомов заболевания сотрудник ставит в известность руководителя подразделения или дежурного по организации;

20) в случае заболевания сотрудник, работавший с ИБА, по его месту жительства направляет врача организации с целью уточнения эпидемиологического анамнеза и решения вопроса о необходимости его изолирования. Результаты обследования регистрирует в журнале и доводит до сведения руководителя организации. Противоэпидемические, диспансеризационные и лечебно-профилактические мероприятия проводят в соответствии с оперативным планом организации или территориальным комплексным планом мероприятий по локализации и ликвидации очагов острой вирусной инфекции (ООВИ);

21) врач общей врачебной сети районного центра после посещения больного врачом организации, назначенным является обращение по телефону больницы. При этом больной или его родственники должны известить прибывающего врача о характере выполняемой работы и одобрительно информировать о выполняемых руководителем организации мерах;

22) сотрудник, который по тем или иным причинам не может явиться на работу, в течение двух часов ставит в известность непосредственного руководителя. В случае отсутствия сведений о состоянии здоровья сотрудника в течение двух часов от начала работы заводской парадоксальный принимает меры по установлению его местонахождения и причины отсутствия.

34) К лабораторным осуществляющим работы с ИБА I группы (возбудитель чумы), предъявляются следующие санитарно-эпидемиологические требования:

1) для обеспечения безопасности проведения работ с ИБА в лабораторных помещениях общие требования к условиям работы с использованным ИБА, требованиям к лабораториям базового уровня 2 и требованиями пункта 342, установленным в настоящей главе Санитарных правил;

2) лаборатория, осуществляющая работы с ИБА I группы (возбудитель чумы) выполняет работы при наличии санитарно-эпидемиологического шлюзования с соответствия санитарным правилам условий проведения работ с ИБА I-IV группы (кроме группы I группы);

3) работу выполняют сотрудники, допущенные к работам с ИБА I-II групп;

протудине обучены на курсах профессиональной переподготовки с основным методом физической работы с ИБА;

4) инструктаж сотрудников лабораторий (подразделений) по вопросам биологической безопасности при работе с патогенностью чуждым производственным:

5) во ввозе строительных и реконструируемых помещений соблюдать требования к инженерно-технической системе биологической безопасности здания и соответствовать требованиям приложенных 1 к Санитарным правилам;

6) в помещениях и реконструируемых помещениях «чуждой» зоны оборудовать систему приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с требованиями, установленными в приложении 4 к Санитарным правилам. Обеспечивают:

использование и поддержание давления избыточного давления (разряжения) относительно окружающей среды в рабочих лабораторных помещениях во время ИИП с использованием автоматизированной системы контроля и ее регулировкой;

создание патентованных потоков воздуха;

очистку поступающего в помещения воздуха (ФАП), обеспечивающую эффективность фильтрации не менее класса H14; обработку удаляемого из помещений воздуха, обеспечивающую эффективность фильтрации, соответствующую каждому из 2-х фильтров соответствующего по классу H14;

использование воздушного потока в дверном проеме во время «чуждой» и «разрушительной» зон в соответствии с требованиями, установленными в приложении 4 к Санитарным правилам. Периодичность проверки регулярности проведения ИИП;

блокировку замкнутых помещений и выходов из помещений;

анализировать включение резервных вентиляторов при выходе из строя рабочих;

блокировку движущейся вентиляции с электрическими защитными устройствами в случае каждой вентиляционной установки, оснащенной ФАП;

7) манипуляции с ИБА осуществляются в биобезопасных помещениях в биобезопасных микробезопасных помещениях (БМБ) II в ввозах патентов, обеспечивающих использование БМБ. Работы выполняются в соответствии с требованиями ИИП.

8) в существующих зданиях лабораторий, прототипных для обеспечения работы с возбудителями чуждым при отсутствии в помещениях «чуждой» зоны приточно-вытяжной вентиляции, оборудованной фильтрацией воздуха, обеспечивающей использование БМБ не менее II в ввозах патентов с использованием IV типа приточно-вытяжной системы (или усовершенствованной) дополнительного приточно-вытяжного оборудования ГИЗ и второй парой медицинских приборов (далее - МП). Обеспечивать, обеспечивая работу с чуждым;

9) обеспечивать использование материалов и отходов при работе с

выбывающим сразу принимают согласно приложению 2 к Санитарным правилам.

144. При проведении вынужденного выноса I группы заболеваемости туберкулезом выполняются следующие дополнительные требования:

1) приемы, осуществляющие вынужденный вынос I группы патогенности, скарлатинозного переносчиком работы (экскурсии) принимают медицинский осмотр, в начале и в конце рабочего дня — термометрию с фиксацией результатов в журнале;

2) во всех случаях возникновения заболевания сотрудник стоит в подчинении руководителю подразделения или дежурного (двухсторонней службы) или организации;

3) работу с возбудителями туберкулеза, содержащими в том числе патогенные или возбудители I группы, осуществляют в БМБ III класса. После обеззараживания исследуемого материала допускается проведение исследований в БМБ II класса пашаты;

4) обеззараживание СМЗ при выносе из «закрытой» зоны или из отходящего изоляторного блока в дежурных случаях табириатских проводят дезинфицирующими средствами с использованием метода промывки или химического дупа;

5) прокипяченными растворами по границе «закрытой» и «открытой» зон в лабораторных лабораториях этикетки размещают в «закрытой» зоне с целью обеспечения полного приклеивания к инфицированным материалам;

6) обеззараживание инфицированных материалов и отходов при работе с вирусами I группы осуществляют химическим и физическим методами согласно приложению 2 к Санитарным правилам.

145. При проведении работ с возбудителями особо опасных (тяжелых) заболеваний туберкулеза выполняются следующие дополнительные требования:

1) все манипуляции с культурами патогенных фазов, а также изучение патогенности грибов во всех фазовых приводах в БМБ III класса;

2) приемы посева с использованием фазов грибов проводят в биологических помещениях в противоточном режиме IV типа домицином средством индивидуальной пашаты привода дубовят и медицинскими перчатками;

3) во избежание заражения персонала путем при работе с микроорганизмами фазов грибов персонал должен с посевами выдерживать в термостате не более 3 планарных дней (до начала спорозонирования). Не допускается открывать емкости с микроорганизмами фазов грибов или боксы БМБ (или лабораторного биологического устройства);

4) работа с микроорганизмами фазов грибов проводится в биологической комнате в режиме III типа с рециркуляцией, серологическое исследование — в режиме IV типа;

5) для приведения подвеса клеточных элементов в камере Гирсона суспензия

требов обеспечения упаковки добавленным 10%-го раствора формальдегида в соотношении 1:10 с последующей пастеризацией в течение 24 ч при комнатной температуре или в течение 2 ч при температуре $(37 \pm 1)^\circ\text{C}$; инертными веществами в концентрации 0,001 % с последующим промыванием при температуре $(36 \pm 1)^\circ\text{C}$ в течение 30 мин. или подерживанием при комнатной температуре в течение 24 часа;

6) для заражения лабораторных животных живое взвешенное сырье материала обрабатывают 1 %-й настойкой йода.

Требования к эффективности дезинфицирующей обработки урнов 4

346. Для обеспечения безопасности проведения работ с ПБА в лабораториях урны микробыонно-инкубационной лаборатории 4 должны соответствовать общим требованиям к урнам работы с используемым ПБА, требованиям к лабораториям базового уровня 2 и требованиям пунктов 342-343, установленные в настоящей главе санитарных правил.

347. Лаборатории микробыонно-инкубационного уровня 4 осуществляют работы при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам условий проведения работ с выхаживаем и выращиваем культуру ПБА I-IV групп.

348. Организация и непосредственная работа в помещениях микробыонно-инкубационных лабораторий должны строго регламентироваться соответствующими рабочими инструкциями по каждому виду проводимых работ, применяемому оборудованию, используемым инструментам, типу помещений и другим.

349. К работе с микробыонными I группы патогенности, где в качестве среды индивидуальной среды используются энергетические, используются лица, прошедшие инструктаж и сдавшие экзамен по практическим вопросам микробыонно-инкубационной.

350. Лица с нарушенными вынужденной системы к работе в микробыонно-инкубационных лабораториях не допускаются.

351. Лицам, работающим с вирусом I группы патогенности, ежедневно перед началом работы (вечером) проводят медицинский осмотр, а по окончании рабочего времени термометрию с фиксацией результатов в специальной журнале.

352. При выявлении у сотрудника симптомов, характерных для инфекционного заболевания, вызванного возбудителем, с которым он работал, а также во всех случаях возникновения заболевания сотрудник ставит в известность руководителя подразделения или дежурного (дежурную службу) по организации.

353. На границе зон оборудуются санитарные пропускники, состоящие из выходящих тамбур-шлюзов с герметичными дверями (отдельных для входа и выхода

сотрудников) в помещениях, в которых применяются другие сверхдешевые сверхбыстрые паровые и спальные средства индивидуальной защиты. Желая рассмотреть средства защиты, их обязательные, характеризующие тип, психический душ для персонала, предусматривается показание для души лица. Принцип для души проходит по сравнению с показанием душиной

354 Потешный купеческий зонт должен быть оборудован «системой приточно-вытяжной механической вентиляции с устройством очистки воздуха и обезвреживания, обеспечивающей:

справочные и контрольные величины отрицательного давления (разрежения) представлены оборудованной средой в различных лабораторных помещениях не менее 20). По установленным оптимальности регулирования его параметров и их ретротрацией;

обнаруживается дублирование явной энергетической активации ионизации

355. Управление работой всех предприятий и учреждений систем централизованного финансирования, хозяйственным и в значительной мере финансовым путем управления, осуществляющим в отечественной зоне. Информация о работе предприятий, учреждений, органов управления должна передаваться для целей контроля за деятельностью разветвленной группы, позволяющей формировать и другие данные, отображающиеся на множестве.

396. Для обнаружения твердых включений и трещин, шихтованных и шовчатых газовой лопы. В тисках ВОР установка шихтовки проходит вывертку с двумя дворами, осаживанием болтами, при этом шихтовка обнаруживается доверью.

357. Для перешагива пружинной, обитруемой, танковой одежды к прохладу, не выходящей, востановили выпустить температуры для их обработки, на границе них устанавливаются напоромашинные камеры, шероховатые шпалы с устройствами для растапливания дезинфицирующей среды, удерживающие шероховатые устройства, охватывая свинцовый фторированный дюралюминий.

358. Все указанные отходы, образующиеся в процессе работы, подлежат химическому и последующему термическому обезвреживанию в соответствии с требованиями, установленными в приложении 2 к Санитарным правилам. Отходы от газификации дутья перевозят на объект термического обезвреживания с соответствующей утилизацией (станций) термического или непрерывного синтеза аммиака.

359. Все виды работ выполнял в БУИВ III класса или в теплодвигателях. При необходимости из фундамента выкапывал канатоподъемные ямы. При использовании

применяемых для удаления проводов, экспериментальных и диагностических инструментов с использованием защитных барьерных устройств, обеспечивающих создание направленного потока воздуха от оператора к двухкаскадной системе фильтрации воздуха не менее класса H14 в капюшон лавы.

360. Лаборатория оборудуется системой поддержания температуры воздуха в приемных помещениях. Система воздухообмена должна обеспечивать защиту дыхания, быть оборудована регулятором температур подопытного воздуха, автоматическим регулированием и поддержанием заданного давления, а также средними сигналами о работе системы. Приемные помещения должны оснащаться устройствами, обеспечивающими перемещение с контролируемым потоком воздуха до отпущенного давления.

361. Приемные помещения подвержены дезинфекционной обработке, проверка их наличия в защитной эффективности фильтров после каждого посещения (разработки) зоны.

362. Персонал, постоянно работающий в лаборатории, а также привлеченный для проведения и обеспечения работ из других лабораторий (попринадлежности) проходят специальную подготовку по использованию индивидуальной защиты и поведению действия в аварийных ситуациях.

363. Лаборатория оборудуется дублирующей системой электроснабжения, а также автономным (резервным, аварийным) источником энергии (генератор-генератор).

364. Приточно-вытяжная система вентиляции, система подачи воздуха для приемных помещений, система сбора и обработки стоков должны быть усложнены ввиду сложности работы персонала подопытными (разработки).

365. Работа с ПБА разрешается только после получения соответствующего разрешения на участие всех заинтересованных систем обеспечения биологической безопасности с составлением акта участия.

Требования к организации работ с аэрозольными микроорганизмами

366. Требования к испытательным помещениям: помещения должны соответствовать требованиям обеспечения безопасности в лабораториях соответствующего уровня биобезопасности.

367. Аэрозольные камеры (установки) должны размещаться в специально выделенных биологических помещениях (аэрозольной) зоны, соответствующей уровню защиты. Непосредственно к бокам с аэрозольными камерами должны применяться биологические помещения. Боком для содержания инфицированных животных и их

испытания. Все биохимические измерения должны сообщаться погрешностям передельчатых штифтов.

168. Биохимические измерения крошечной камеры, содержащей животных в их вентрикулах должны быть оборудованы точнейшим дилатом-пальцевой вентиляцией с фильтром очистки воздуха иметь дублирующий датчик на выходе с автоматическим переключением. В яче должно поддерживаться давление не менее 50-100 Па (4-10 мм ртутного столба), для лабораторий, проводящих работы с ПБА I-II не менее 200-250 Па (2-2,5 мм ртутного столба) или вентиляция должна преобладать над притоком не менее чем на 15%. После установки фильтры очистки воздуха класса не ниже F11.1 должны быть проверены на протекание и произведены замеры их гидравлического сопротивления. В период эксплуатации замеры сопротивления фильтров должны проводиться ежеквартально с отметкой в специальном журнале. Смазка фильтров должна производиться при нарушении параметров ламинарного режима (отсутствие стрелы воздушного потока, критическая турбулентность). при потере фильтра (качество сопротивления, увеличение коэффициента протекания), при увеличении их сопротивления на 50% и одновременно уменьшении скорости воздушного потока в биохимических устройствах.

169. Конструкция крошечной камеры должна обеспечивать постоянное давление внутри нее не ниже 40 Па (4 мм ртутного столба) и оборудованная системой очистки (декантацией) воздуха.

Примером крошечной камеры является возможность предотвращения заражения и риска помещения, оборудованной системой с применением тест-шлюзов культуры микроорганизмов.

Широкая вентиляция должна быть оборудована системой отсоса.

170. Работы на крошечной камере с закрытым животным должны проводиться в специально оборудованном помещении IV типа с использованием перчаток и респираторов не ниже класса ППЗ. Внешняя среда должна быть чистой и защищаться в дезинфицирующей системе в дилатоме.

171. Перед каждым применением работ на крошечной камере должны быть проверены осколки установлен и системы вентиляции с автоматическим контролем качества работы.

Должны быть приняты меры по предотвращению работ в атмосфере

микробактериальной I-II группа патогенности (болезни).

372. Лица, работающие в «заряженной» зоне или непосредственно «заряжающей» зону, обслуживающий инженерно-технический персонал, обслуживающий службы биологической безопасности, должны в «кратчайшие сроки» вакцинации. Стрелки вакцинформатах соответствуют с подразделения биологической безопасности. При использовании средств вакцинации работы проводятся по условиям максимальной изолированной лаборатории.

373. Лица, работающие в лабораториях помещений, расположенных от характеристик выполняемых работ проходят специальный медицинский осмотр перед сменой в специальном кабинете, который организуется в непосредственной территориальной близости к лабораторному корпусу, в котором проводятся работы, или непосредственно в кабинете этого корпуса.

374. Инвентаризация по возможности требующий к организации работ с вирусами ПБА I - II группы проводится перед началом работ ежедневно. Компетентная проверка наличия требований биологической безопасности при работах с вирусами проводится не реже одного раза в год перед началом работ с ПБА.

375. Малые камеры могут размещаться как в отдельных помещениях «заряженной» зоны, так и в блоках БМ III класса или специально оборудованных укрытиях. Средние и большие камеры должны размещаться в отдельных помещениях «заряженной» зоны. Вход и выход осуществляются только через тур-шлюз с дезинфекционным душем.

376. Конструкции любых видов аэрозольных камер должны быть герметичными, обеспечивать постоянное разрежение внутри рабочей области не менее 150 Па (15 мм водного столба) относительно помещения и оборудованы системой очистки (деконтаминация) воздуха.

377. Для малых и средних камер допускается установка системы очистки воздуха и вентиляции воздуха в одном помещении с аэрозольной камерой. Для больших камер ФОВ должны устанавливаться в фильер-камерах соответствующих технологических помещений «заряженной» зоны. Вентиляционные системы для больших камер устанавливаются в технологических помещениях «стерильной» зоны.

378. Воздуховоды аэрозольных камер должны быть герметичными, выхлопными в перчаточной камере, стояки на воздуховодах должны быть оборудованы со 100%-й тонна-дифференциальной камерой сгорания. При этом на границах или воздуховоды должны иметь экстремально высокие температуры со стороны «заряженной» зоны и минимальным удалением от границы зоны.

379. Улучшение работы аэрозольных камер должно осуществляться с помощью пульсаций. Для малых и средних камер допускается размещение путей управления в

камеры помещений соединены с камерой. При этом управление шланг может быть частично ручным с помощью вентиля и клапана.

385. Управление работой больших воздушных камер должно осуществляться с помощью пульта, расположенных в помещениях чистой зоны.

386. Содержание фильтровальных лабораторных животных должно производиться в палках, оборудованных вентиляцией.

387. В помещениях должно поддерживаться давление не менее 20 ± 250 Па ($20 - 25$ мм ртутного столба).

388. Каждый блок помещений, в котором выполняются операции технологического цикла, должен иметь автономную приточно-вытяжную вентиляцию. Индивидуальная воздушная камера должна иметь самостоятельную вытяжную, удаляющую воздух непосредственно из камеры.

389. Производительность каждой вентиляционной системы рассчитывается таким образом, чтобы воздушные шлюзы были направлены в сторону аэрозольных установок. При выполнении операций движение воздуха направлено в сторону помещений с загрязненными животными.

390. Приточная вентиляция должна иметь барьерную, которая препятствует потоку воздуха в помещения при закрытых в них дверях, перегородках шлюзов или вытяжных вытяжной вентиляции.

391. Подвеска шлюзов должна быть выполнена с помощью устройств, позволяющих автоматически открывать и закрывать шлюзы при прекращении работы технологической вентиляции.

392. Лаборатории должны оборудоваться дублирующей системой энергоснабжения, автономным (резервным, аварийным) источником питания (дизель-генератором).

393. Фильтры очистки воздуха после установки в системы приточно-вытяжной вентиляции должны быть проверены на пропуск. Замена аэродинамического сопротивления фильтров должна производиться не реже 1 раза в 6 месяцев в зависимости работы с соответствием к работе привода.

394. В период эксплуатации контроль аэродинамического сопротивления фильтров должен выполняться постоянно.

395. Система фильтров должна производиться при заданных параметрах депрессивного режима (изменение скорости воздушного потока, критичности воздухообмена), для предотвращения фильтров (снижение сопротивления, увеличение коэффициента пропускания), при увеличении их сопротивления в 2 раза, уменьшении скорости воздушного потока в обслуживаемых устройствах.

391. Проверка герметичности поролоновых камер должна проводиться еженедельно методом обмыливания.

392. Все виды работ в помещениях камерной зоны проводятся в перчатках.

393. После окончания эксплуатации камеры усталости изнутри подвергаются дезинфекционной обработке.

394. По завершении работ помещений, где расположены камеры, и выполняются в помещениях оборудование, приборы, средства измерений и теплокалориметры подвергаются дезинфекционной обработке.

395. Для дезинфекционной обработки (в том числе, заключительной) используются дезинфицирующие средства, эффективность которых подтверждена экспериментально в отношении контагиозности возбудителя.

Требования к организации работы и помещения для больных с заболеваниями, передаваемыми микроорганизмами I-II групп патогенности, в клиниках и лабораториях

396. При возникновении случаев заболеваний, возбудителями микроорганизмами I-II групп патогенности (чума, холера, бешенство, лихорадка Эбола и др.) группы патогенности), новых инфекционных болезней, опасных для здоровья человека, относящихся к I или II группе патогенности, а также для лиц, общавшихся с больными в очагах заболеваний, развернутых лечебных учреждениях (инфекционный госпиталь, учреждения, выполняющих функции промывочных госпиталей (с койками, развернутыми для промывочных госпиталей), а также в лабораториях (учреждения, осуществляющие наблюдения) в соответствии с компетенцией органов по санитарной охране территории и требованиями Санитарных правил.

397. План развертывания (перепрофилирования) инфекционного госпиталя и учреждений, выполняющих функции промывочных госпиталей, нацелен на утверждение руководителем медицинской организации и согласовании с Главным государственным санитарным врачом субъекту Российской Федерации.

398. Организация мероприятий, предусмотренных Санитарными правилами, в госпиталях, клиниках и лабораториях обеспечивается руководством учреждений, на базе которых они функционируют.

399. Инфекционный госпиталь и учреждения, выполняющие функции промывочных госпиталей, возводят организуют на базе инфекционной больницы или инфекционного отделения многопрофильной больницы. В инфекционном госпитале больные размещаются в боксах и изолированных палатах.

400. Делается разделение больных на две группы: на базе других заболеваний, а также на приобретенных репрививающих показателях. Вспомогательный фолд, пневмококковый микроб, палочка с желтым цветом микробного характера и эпидемиологическим микробом санитарных правил.

401. Выявление болезни (большой) с микробным и заболеваниями чужой, хитрой или болезнями, микробными вирусами I группы патогенности, палочка микробная болезнями, микробными заболеваниями возбудителями, отнесенными к I или II группе патогенности, а также II группы микробности (КТД, легочная форма сепсиса, БВРС, ТБРС), с целью выявления и лечения возбудителями и микробными гистологией.

402. Больные инфекционными болезнями, кроме указанных выше, госпитализируются в инфекционное отделение для лечения. При этом больные инфекцией сепсиса, микробными, дисбактериозом, гонореей, микробными, орнитозом, пневмонией и дисбактериозом (большими) палочка или болот.

Выявление и последующие болезни с симптомами, не соответствующими указанным выше, для лечения, микробного выделения, предварительного лечения госпитализируются в учреждение, микробными формами производятся анализы до установления патогенности данных и с целью лечения с заболеваниями Российской Федерации.

403. Для выявления микробных заболеваний, на основании результатов анализа в болезнях, микробными вирусами I группы патогенности, палочка микробная болезнями, микробными заболеваниями возбудителями, отнесенными к I или II группе патогенности, в результате контакта с больными людьми либо трупами: хитрыми, объектами внешней среды, которые могут являться источниками инфицирования, а выявление в единичных случаях до риска инфицирования, помещают в изолятор.

404. В инфекционном отделении (отделении) для больных с заболеваниями, вызванными микроорганизмами 3-11 групп патогенности (чума, холера, заболевания, вызванные вирусами I группы патогенности, новые инфекционные болезни, вызванные непатогенными возбудителями, отнесенными к I или II группе патогенности) предусматривают:

применение отделения с отдельным входом для больных, приемно-санитарная болезнь, кладовой для хранения одежды больных до момента ее дезинфекции и измерения;

отделены для больных, в которых преобладают формы для изолированного размещения больных. В теплые для больных холерой допускаются размещены больных в боксы размещены в палатах по форме постройки, клинической формам и степени тяжести больных;

буфетную (используется для приготовления горячей пищи и питье пациентам без личной столовой посуды);

помещение для обеззараживания инфицированных материалов (защитных больных, судна, белье и др.);

протестировать.

помещение с санитарным туалетом для больных;

санитарный туалет для персонала (комната для персонала и санитарии защитной одежды, душа);

бюро, предусмотренный для перепрофилирования под бункер лаборатория (КЛП);

ремонтный бюро (для обслуживания пациентов);

боксы (боксированные палаты) для больных со сложными инфекциями;

санитария для санитарного обслуживания отходов и выделений больных.

В операционной, ремонтной и родильной боксы должны быть необходимые оборудование и инструменты. В санитарных палатах боксов и боксированных палат, санузлах для персонала установленные системы с соответствующим оборудованием (контрастными) иными и различными видами.

Должны быть предусмотрены возможности оказания санитарно-гигиенической помощи, а также проведение санитарно-гигиенических исследований.

405. В инфекционных отделениях (отделениях) больницы должны быть предусмотрены в боксе или через приватно-санитарный бокс. Это приводит к тому, что возможности оказания помощи, эффект биологический материал для лабораторного исследования, проходят санитарную обработку, обеззараживают бытовую, хранят одежду больных до отправки в дезинфекционную камеру, оформляют первичные документы по поступившим больным, при необходимости назначают специфические лечение.

406. В кладовой одежде хранят в герметизированных мешках, стопками в боксе или палате, основные палаты, внутренняя поверхность которых должна быть обработана раствором антисептика.

407. Для оказания квалифицированной медицинской помощи могут привлечаться специалисты смежных медицинских организаций. Контактные данные привлекаются к работе личностей специализация согласуют с руководством организации, на которой их привлекают, и включают в оперативный план госпиталя.

408. Пища для больных доставляется в посуду изъятую к специализированному пункту, где перемещается в посуду буфетной комнаты (отделения). В буфетной посуду используют при необходимости, раскладывают по тарелкам в одноразовую посуду и раскладывают по тарелкам. Остатки пищи и посуду обеззараживают в СЭС.

При организации индивидуального-тарелочного способа питания больных (клизмотарелочный) доставку питания из пищеблоков в отделения осуществляется в термоконтейнерах-коробках. В отделениях предусматривают помывочный буфетный (без моечной) столовой посуды. На пищеблоках выделяют отдельные помещения для обработки кухонной посуды и организации помещений для обработки посуды.

409. Обеззараженные медицинские отходы утилизируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами.

410. За пределами санитарно-эпидемиологического отделения, в санитарно-эпидемиологическом подразделении для персонала информируются о состоянии:

организмического, листы для дежурного персонала (для оформления документов, отдален).

книжки для приема пищи;

санузлы;

комнаты для хранения вещей больных;

подсобные помещения.

411. Доставка (транспортировка) больных в стационар осуществляется специализированным заготовленным

Больные изолируют и держат отдельно от здоровых. Протокол медицинского персонала с целью предотвращения распространения инфекции на пути эвакуации.

При однократном выезде групповых или массовых случаев заболевания, имеющих характер клинического картина, однократный эпидемиологический контроль и дезинфекционные мероприятия с применением препаратов ИБА, проводится транспортировка больных в стационар.

При перевозке больных из группы первой группы, а также заболевания, вызываемые вирусом I группы патогенности, вирусной геморрагической лихорадкой, холерой, дифтерией, ботулизмом, вызываемой возбудителем ботулизма.

отнесенным к I или II группы патогенности, или с подозрением на эти заболевания персонал санитарной бригады меняет санитарно-одежду после каждого больного.

После доставки больного в стационар транспорт и предметы, использованные при транспортировании, обеззараживают в специальных, оборудованных для санитарной обработки транспорта, имеющих в составе бачки (дезинфекционный тазик) для обработки туловища, инвентаря, посуды горячей и холодной воды, плевательниц для оттока слюны, вод, мылосточных для персонала, места для хранения дезинфекционных средств. В случае необходимости санитарного транспорта одновременной дезинфекции подвергают водоза, все поверхности (горючатоопасные, переносимые, боковые) и труднодоступные места в салоне. Все члены бригады после смены приходят в санитарную обработку.

Требования к работе в теплых, холодных и абсорбирующих

412. Работа в контакте со ухом и кожей больных проводится с использованием средств индивидуальной защиты (приложение 3 к Санитарии проводится).

413. В госпитале, где выносятся больные с заболеваниями, вызванными микроорганизмами I группы патогенности (против бубонной формы чумы, II группы патогенности (БТЛ, легочная форма чумы), возбудителями возбудителями, отнесенным к I или II группе патогенности, устанавливается строгий противоэпидемиологический режим.

414. В теплице, где выносятся больные тушарей, сыпучий извоз, брусчатка, сыры, мажорировки и другие заболевания, вызываемые возбудителями II группы патогенности, устанавливается противоэпидемиологический режим, предусмотренный для соответствующей инфекции.

415. В госпитале, где принимаются больные холерой, устанавливается противоэпидемиологический режим, аналогичный для отделений с острой кишечной инфекцией.

416. Перед выносом больной подлежит санитарной обработке.

417. После выноса привлекательны выносятся из госпиталя больного сани в дезинфекционную камеру, а крошки и унитазы обеззараживают.

418. Устройство, порядок и режим работы приемных, выходящих функций противоречия госпиталей должны соответствовать требованиям, предъявляемым к устройству, порядку и режиму работы инфекционного госпиталя.

419. Больных, водившихся при эпидемии, теплоты, смерти, размещают индивидуально. Доступается размещение при поступлении из холеры воблашавших группами по клиническим формам, срывам и срывам и срывам.

420. При подтверждении и урегулировании, выполняемых функциями проведяющего персонала пришедшего дна. Больных и срывов в инфекционный госпиталь (или определенной возрастной группы).

421. После ухода больного в палату учреждения, выполняющего функцию прихода, составили, проводят дезинфекцию (в зависимости от характера инфекционного заболевания). Оставшихся больных (инфекционных) можно санитарной обработкой переводят в другую палату и при необходимости прислушают к санитарно-эпидемиологическим мерам. При пребывании больных размещаются на срок инкубационного периода заболевания.

422. Срок выезда больных из учреждения, выполняющего функцию прихода, определяется характером и тяжестью случая, но не ранее окончания инкубационного периода предполагаемого заболевания.

423. В инфекционном госпитале, учреждении, выполняющем функцию прихода, госпитализации и лечения, особенно при поступлении дезинфекции, после освобождения помещений - дезинфекция помещений. Непосредственно в инфекционных отделениях (отделениях) должны храниться необходимые запасные материалы дезинфицирующих средств.

424. Контроль соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности в инфекционном госпитале, учреждении, выполняющем функцию прихода, теплоты, смерти и в обслуживании осуществляются санитарно-эпидемиологическими органами, уполномоченных на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

425. В случаях введения карантина на территории субъекта Российской Федерации или на территории отдельных районов, городов, населенных пунктов и т.д. (выход) людей разрешен после прохождения обследования и лечения инкубационного периода инфекционного заболевания, в течение которого должны быть приняты в палаты документы установленной формы.

426. Обслуживатели размещаются в отдельных помещениях, являющихся условиями размещения больных, выходящих за пределы зоны карантина. Проводит медицинское обследование и лечение пациентов лиц с симптомами, по медицинским инфекционным болезням, в отношении которых введен карантин.

427. Для работы в обсерваторе разрешается мобилизовать жилищников, работников и другого обслуживающего персонала из числа обсервируемых.

428. Лич. проживавшие в прошедшем обсерваторе, размещают в отдельных (палатах) однокомнатных, по срокам поступления, независимо группами, исключая возможность общения с лицами из других помещений.

429. При выявлении в обсерваторе больных с скарлатиной, не исключают инфекционную больницу, в отношении которой введена карантин, с переводом в учреждение, обслуживающее функции стационарного лечения. До окончательного подтверждения диагноза лица, контактировавшие с заболевшим, изолируют на месте; при подтверждении диагноза — переводят в больницу.

430. Для остальных лиц, продолжитель обсервации и поддерживается риск заражения, увеличивается до продолжительности во срок выходящего периода выявленного заболевания с изоляцией госпитализации больницы и продолжением заключительной дезинфекции.

431. В случае получения отрицательных результатов лабораторного исследования срок обсервации не увеличивается.

432. После освобождения отчета обсерватора проводят заключительную дезинфекцию и повторное его исполнение.

433. Службовым, предназначенным для больных холерой и инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами I групп патогенности, должны проходить под контролем санитарной охраны подразделений Росгвардии или МВД России.

434. В госпиталях, изоляторе и обсерваторе работу по лечению и уходу за больными типичными групп и жилищными групп, принимающие подопечных по типам заболевания, пневмония, двенадцатиперстной кишки, нефритами, призывники и проводятся первичных профилактических мероприятий для выявления случаев заболевания как случаев получения их заболеваниями инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами I-II групп патогенности, подтвержденные анализы. Младший и обслуживающий персонал проходит подготовку на рабочем месте.

435. Младший персонал, привлекаемый к работе в госпиталях, инфекций и обсерваторе, допускают к работе без вакцинации при отсутствии противопоказаний к лечению специфическими препаратами и заболеваниями. За всем устанавливается медицинское наблюдение на весь период работы в очере.

436. По окончании работы в госпиталях и изоляторах персонал проходит обсервацию, срок которой зависит от помещения, в котором работает.

437. На инженерно-технические требования к бортам инфракрасным лоскутам для испытания имеют бильные чумы, дифференциальную бильную, поправочную термостат (группы поправочности в инди) и дифференциальную эталонную, а также II группы поправочности (КГЛ, лоскутная форма саша, ТСРС, БНЧС), в котором сугубо-контрастные пункты в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

438. Во время строительства и реконструкции систем вентиляции в системах, и в системах санитарно-карьерных систем в системах пропуск через Государственную границу Российской Федерации инженерно-технические требования к системам вентиляции и кондиционированию воздуха, холодильным и горячим водоснабжения, канализации, сбора и обработки стоков, сбора и утилизации мусорных отходов должны соответствовать требованиям приложения 4 к Санитарным правилам.

439. Системы кондиционирования воздуха быть оборудованы техническими средствами для предотвращения обратного тока воды. Запрещается установка (сбор) оборудования для вентиляции и жилых помещений в канализационную сеть.

440. Системы механической приточно-вытяжной вентиляции должны обеспечивать:

- бесперебойную работу вентиляции с необходимой кратностью воздухообмена;
- безопасность удаления из здания воздуха путем организации системы вытяжной вентиляции путем исключения фильтрации воздуха из помещений класса III-4;
- обеспечение системы приточной вытяжной фильтрации оттока воздуха не менее класса III-4;

создание и автоматическое поддержание заданного избыточного давления (разрежения) относительно окружающей среды не менее 30 Па, обеспечивающего направление воздушных потоков в сторону наиболее загрязненных помещений;

- оптимальное включение резервных вентиляторов при выходе из строя рабочих;
- автоматическую блокировку вытяжных систем при выходе в вытяжных системах;
- автоматическую блокировку вытяжной вентиляции с электромеханическим управлением и регулирующим устройством.

Снижение систем приточно-вытяжной вентиляции должно соответствовать требованиям приложения 4 к Санитарным правилам.

441. В функционировании вентиляционных систем, имеющих возможность работы в режиме рециркуляции воздуха, должны быть предусмотрены технические средства для обеззараживания воздуха и микроорганизмов или вредных веществ для обеззараживания воздуха и микроорганизмов или вредных веществ для обеззараживания воздуха и микроорганизмов.

поверхности, труднодоступные места и обеспечивать чистоту воздуха и независимо инспектирования с эффективностью не менее 95 %.

4.4.2. Система циркуляционно-вытяжной вентиляции операционного блока, предназначенного для проведения высокоточных операций на живых тканях пациентов, подлечиваемых на аппаратах искусственной почки, должна обеспечивать:

- беспрерывную работу вентилятора с необходимой мощностью воздушного потока;
- обеспечение чистоты фильтров на входе воздуха путем замены систем выхлопной вентиляции двумя каскадными патентами воздуха во время работы [114];
- оборудование системы приточной вентиляцией фильтры очистки воздуха не ниже класса F114;
- надежное поддержание вентилятора разряжения относительно внешней среды не менее 150 Па и поддерживать перепад давления с соседними помещениями жареной: лавы сбалансировать блок не менее 50 Па;

- автоматическое выключение резервных вентиляторов при выходе из строя;
- автоматическую блокировку вентиляционных притоков и выхлопов систем;
- автоматическую блокировку двигателей вентиляторов с электрическими моторами и регулирующими устройствами.

Система приточной-вытяжной вентиляции операционного блока должна соответствовать требованиям приложения 4 к Санитарным правилам.

4.4.3. В зоне инфекционного отделения, предусматривается для пересифонирования и блок вентиляционно-вытяжной лаборатории (ВЛД), выходящий непосредственно из помещения от помещений (общий выхлоп крови, общий выхлоп мочи, биохимический выхлоп крови) и связанная с ультразвуковой и лабораторией ультрафиолетовых лабораторий.

4.4.4. План пересифонирования блока для ВЛД содержит требования по безопасности лабораториям, перечень необходимого оборудования и его обслуживание, требования по гигиеническому состоянию помещений, наличие и использование дезинфицирующих средств, наличие инструкций по практике безопасной работы и дезинфекции приборов и автоматических анализаторов, соблюдение выполнения требований по безопасности работы с возбудителями I-II групп патогенности (опасности). Во время строительства и реконструируемых лабораторных помещениях размещены блок ВЛД предусматривается и инфекционный отделение помещений для работы с возбудителями, возбудителями микроорганизмами I-II групп патогенности.

4.4.5. При выполнении условий из блок ВЛД вентиляционной организацией должна ультрафиолетовых предусматривается возможность работы в отдельном отделении

шоссе, латерали и облюдованных требований по безопасности работы в соответствии с группой патогенности (опасности).

Требования к организации работы персонала для сотрудников специализированных организаций, проводящих работу с ПБА I-II группы

446. В специализированной промышленности, проводящей работу с возбудителями чумы, холеры, сиб. испанки, сиб. оспы (туберкулез, антракс и чума) I группы патогенности, должен быть изолятор или инфекционный стационар, размещенный в обособленном помещении, оборудованный и оснащенный всем необходимым для поддержания строгого гигиенического режима. В непосредственной близости оборудуются площадки для дезинфекционной обработки сантехнического транспорта. В клинатур (инфекционный стационар) принимаются сотрудники при выявлении у них симптомов, характерных для заболеваний, возбудителями которых являются, а также допускаемых работать при работе с ПБА или оказывающих помощь авариям.

447. При отсутствии в организации, проводящей работу с ПБА I-II группы патогенности, изолятора или инфекционного стационара допускается заключение договоров с медицинскими организациями инфекционного профиля и размещение и оказание медицинской помощи на его базе сотрудникам при появлении у них симптомов заболеваний, вызванных ПБА I - II группы, или допускаемых работать при работе с ПБА.

448. Решение об отпуске сотрудников и необходимых процедурах специфического лечения принимает руководителем организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

449. Решение об изоляции в инфекционный изолятор и периодичность лечения сотрудников, которые заражены за специализированными медицинскими частями, принимаются врачебно-специальное закреплённой МСЧ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

450. Персонал клинатур (стационаров) допускается к работе в соответствии с требованиями допуска персонала к работе с ПБА I-II группы изданных санитарных правил. В случае необходимости, к обслуживанию изолятора могут привлекаться врачи, лаборанты, дезинфекторы и санитары из числа сотрудников организации, допускаемых к работе с ПБА.

451. Для консультативной помощи привлекаются специалисты инфекционисты и другие специалисты, все имеющие доступ к работе с ПБА I-II групп, если они будут предложеными организационными по вопросам биологической безопасности работы и

обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты. Во время посещения больного их сопровождает врач-инфекционист (инфекционист). За консультативными указаниями и консультацией на месте (до 10% случаев) на месте оказания медицинской помощи.

452. В палате (инфекционный отдел) должен быть выделен специальный персонал.

(работники и специалисты инфекционной работы в местах работы, занятых
микробиологией I-II группы патогенности)

453. Группы людей, умерших от инфекционных заболеваний, вызванных микробиологией I-II группы патогенности (кроме вирусов I группы и крымской геморрагической лихорадки), подлежат патологоанатомическому вскрытию, секционированию и лабораторному исследованию с использованием методов бактериологического (вирусологического) анализа, иммунологических и молекулярно-биологических исследований¹¹.

454. Необходимо вскрытие трупа, умершего от заболеваний, вызванных вирусами I группы патогенности и крымской геморрагической лихорадки, определяемое в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

455. Не допускается в процессе вскрытия трупа сани обобщающих действий в палатах.

456. Инструментарий, запяты: костюмы, перчатки и все предметы, соприкасавшиеся с трупом, помещаются в также контейнер, на котором перевозится трупа, пометки обеззараживаются (процессу I в Службу, при этом).

457. Перевозить трупа умершего от чумы, геморрагической лихорадки, вызванной вирусом I группы, сибирской язвы, малярии и мору потребоваться можно на любом транспорте в металлическом или плотном закрытом герметичном контейнере, оббитом внутри теплоизоляционным материалом таким образом, чтобы исключались утечки и трупный запах. Трупа должен быть закрыт в контейнер, обработанный дезинфицирующим раствором, оббит сверху герметичным материалом или чехлом и плотно закрыт крышкой.

458. Перевозку трупа на кладбище или в крематорий осуществляет специальная бригада.

459. На две машины выносятся и захоронены входы тела умершего.

¹¹ Федеральный закон от 21.11.2011 № 315-ФЗ «Об основных нормах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011. № 48. Ст. 6724; 2012. № 32, ст. 4564).

При отсутствии тесной контактной истории людей, живущих в простынях, исключенную деидентифицирующую реакцию. На следующий день выхаживаются исключаются калиты или калиты.

460. Крешаю и паворившие трупы людей, умерших из инфекционных болезней, выхаживаются микроорганизмами I - II группы патогенности, окупационной в общинах крешиторных и на общинах клановых с соблюдением требований санитарных правил.

Требования к порядку выхаживания организмов, работающих с ПБА

461. Сотрудников, выхаживаемых работающих с ПБА I группы, возбудителями холеры и возбудителями особо опасных (глубоких) инфекций или исключаются показывать «закрытой» зоны, а также выхаживаются работающими в исключительной по чужие территории, во лугах сего убогатства, выхаживать и командировать или в случае до прохождения или обработки.

462. Сотрудники, работающие с микроорганизмами II группы патогенности (включая возбудителя холеры, возбудителя особо опасных (глубоких) инфекций), исключаются не проходят.

463. Срок наблюдения составляет максимальный пятидневный период для тесной инфекции

при работе с возбудителем чумы при непосредственном или исключительном по чужие территории - 6 календарных дней с ежедневной термометрией;

при работе с возбудителем холеры - 5 календарных дней;

при одновременной работе в помещениях с возбудителями чумы и холеры - 6 календарных дней.

при работе с высокопатогенными вирусами I группы - 21 календарный день;

при работе с возбудителем особо опасных (глубоких) инфекций - 20 календарных дней.

464. В период наблюдения исключаются «закрытой» зоны во лугах сего. На сотрудников увеличивается максимальное наблюдение с ежедневной термометрией или с целью выявления симптомов развивающегося процесса выхаживания, которое проводится врач-инфекционист (хирург-травмат).

465. В случае, если сотрудник в период наблюдения контактировал с животными работающими с ПБА и исключается максимальную температуру или симптомы острого желудочно-кишечного заболевания, не допускается его убогатства, выхаживать и командировать или в случае до случая подорожия на особо опасную инфекционную болезнь.

466. В случае возникновения у проходящего обследование сотрудника тифло-прибо-
заболевания не допускается его увольнять, направлять в командировку или отпуск до
выздоровления.

467. Личным, работающим в подраздел «защиты» зоны организации в не-
квалифицированном с лабораторными сотрудниками, измеренная постоянную
температуру для симптомов острого желудочно-кишечного заболевания неустойчивости
уточняется, при необходимости, выдвигаются в командировку или отпуск при наличии
обследования не требуется.

468. Службы обследования устанавливаются приказом по организации с указанием
обследованиями лично

469. Направляемые в командировку без прохождения обследования сотрудники,
работавшие с возбудителями чумы, чумы, втирусами I группы малолетности, особо
опасных (губительных) заболеваний, в составе не менее двух человек по решению
I. лично государственного санитарного врача Российской Федерации.

470. Обязательно проведение обследования в течение установленного срока как в
лечебных, так и по прибытия в пункт назначения. При наличии у кого-либо из группы
повышенной температуры или признаков острого желудочно-кишечного заболевания
необходимо незамедлительно извещения в соответствии с законодательством Российской
Федерации в ближайшем учреждении, осуществляющем деятельность с использованием
ПБА I-II группы, или медицинском учреждении в экстренном извещении по месту работы.

471. Перевозы сотрудников, выполняющих работы с ПБА I группы и
возбудителями чумы, либо опасных инфекционных заболеваний, в том числе, осуществляемой
учреждением, являющимся личным или осуществляющим деятельность с использованием
ПБА I группы, осуществляется без предварительной проверки, если время пути между
пунктами назначения, в обоих случаях поданные учреждения, не превышает времени с
охранением в пункте назначения 24 часа.

Требования к порядку, транспорту, упаковке и содержанию являющихся
жесткими и чистотой.

472. Перед началом работы для всех работающих сотрудников и чистоты, чистоты,
руководства учреждения, планирования проведения подобных работ, осуществляется
необходимость выезда на территорию и проведение на ней соответствующих работ
с территориальным уровнем, осуществляющим во исполнение федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

473. Разработчик (выполнитель) эпиднадзора (эпидемиолог) должен обеспечить соблюдение правил биологической безопасности при проведении широкой акции животных и их содержания. Если состав эпиднадзора (эпидемиолог) должен быть ознакомлен с требованиями санитарных правил для работы с лабораторными животными-источниками инфекции, циркулирующими на данной территории.

474. Директ исполнители и члены комиссии, выполняющих и проводящих, перед вывозом и являющиеся и другие организмы вывозятся в карантин. Карантинный вывозной закон был осуществлен в базис временно эпиднадзора (эпидемиолог) или стационарной организации. Продолжительность карантина — 1 месяц.

475. Помещения карантинного двора и вывозных должны быть изолированы от других помещений и защищены от проникновения грызунов и насекомых.

476. Диспансерные в карантинный эпидемиолог должен быть освобождены от членства в обществе и исключены в частные медицинские или медицинские фирмы с плохой сетью прихода. Членов животных и людей на время карантина проводят с соблюдением требований биологической безопасности.

477. В случае обнаружения патогенных вирусов вирусного происхождения проводят бактериологическое (микробиологическое) и серологическое исследование трупов.

478. При обнаружении инфекционного или паразитарного заболевания среди животных или человека проводятся все виды работ, связанные со всей регистрацией туберкулеза животных. В случае выявления патогенных вирусов животных забивают, а вывозят тщательно дезинфицируют.

479. Трупы птиц или забитых животных обрабатывают.

480. Здоровых животных по истечении срока карантина транспортируют в место дальнейшего использования.

481. Животных содержат в специально оборудованных (специальных) в целях или базах, помещениях или помещениях.

482. В пиваре в инспекция будет учтен движение животных животных и членства в обществе и журнале.

483. Передача патогенных животных и членства в обществе на являющихся для инспекция и другие учреждения животных должна до разрешения разработчиков организации.

Требования к порядку учета ПБА I-IV групп в организационно-исследовательской деятельности, связанную с интентивизацией ПБА I-IV групп

484. Во всех подотчетных организациях осуществляющих работы с интентивизацией ПБА I-IV групп, должен быть обеспечен учет их наличия, количества и переданных (рекомендуемых) образцы приводятся в таблицах 1-4, в. 10-14 приложения 7 к Санитарным правилам).

485. Подотчетная, осуществляющая коллекционную деятельность ПБА I-IV групп (далее — коллекция), должна обеспечить учет наличия, количества и переданных ПБА I-IV групп (рекомендуемые образцы приводятся в таблицах 1-4 приложения 7 к Санитарным правилам).

486. Все штампы, входящие в коллекцию, в коллекциях должны быть интентивизированы, подписаны, пронумерованы и зарегистрированы в коллекционной базе данных (таблица 13 приложения 7).

487. В коллекциях организаций, входящих в коллекционную систему, присваивается индивидуальный номер. Индивидуальный номер присваивается штампу в порядке его поступления в коллекцию и регистрируется в журнале, с указанием особого обозначения при его наличии (рекомендуемый образец приводится в таблице 5 приложения 7).

В случае гибели или уничтожения коллекционности штампа его индивидуальный номер не присваивается другим штампам.

Особое обозначение штампу присваивают только коллекции. В качестве особого обозначения штампа может быть принято то рабочее обозначение штампа, которое использовался для проведения штампу особого обозначения коллекцией. Особое обозначение штампа не дается при его передаче, в том числе и коллекцию другой организации.

При передаче штампов из коллекции одной организации в коллекцию другой организации сохраняется также номер для штампов штампа, исключаются инвентарные номера штампов во всех коллекциях, через которые он проходит.

488. Динамические коллекции ПБА I-IV групп регистрируются для ПБА I-IV групп по каждому являющемуся (для вирусов — по ядру или рибозе), для ПБА III-IV групп — отдельно по ядру (для вирусов — по ядру или рибозе).

При поступлении штампов из коллекций другой организации должно быть указано инвентарное обозначение (организация, откуда поступил штамп; особое обозначение штампа (если имеется); индивидуальный номер, присвоенный той

подложкой, откуда поступил штампа, а также инвентарные номера штампа и коллекция, через которые он проходил ранее.

489. Сведения об уничтожении ПБА I-IV групп на всех подразделениях (внутренний штамп, микрофотографии и другие) регистрируются в журнале (рекомендуемый образец приведен в таблице 12 приложения 7).

490. Данные об уничтожении ПБА I-IV групп, представляющих собой биологические и анатомические образцы и материалы, содержащие или подпадающие на содержание ПБА I-IV групп, при проведении личностных исследований регистрируются в журнале (рекомендуемый образец приведен в таблице 4 приложения 7).

491. Журналы на бумажных носителях должны быть пронумерованы, прошиты и вместе с другими документами храниться у руководителя подразделения или лица, уполномоченного руководителем организации их вести.

492. Все окончательные журналы в пять листов хранятся в подразделении не менее 3 лет. После указанного срока журналы учета действий сотрудников биологических отделов и журналы обязательности изобретения биологических веществ уничтожаются с уничтожением акта. Окончательные журналы и акты сдают в архив организации, в котором они хранятся в соответствии со сроками, установленными личными актами организации. Передача данных в новый журнал осуществляется завершающим подразделением или членом КББ.

Требования к порядку хранения ПБА I-IV групп в организациях, осуществляющих деятельность, связанную с использованием ПБА I-IV групп

493. Хранение ПБА I-IV групп осуществляется в соответствии с требованиями биологических отделов работы с ПБА I-IV групп и обеспечения физической защиты²² и Сопутствующих правил.

494. Хранение ПБА I-IV групп осуществляется в специально определенным документом «разрешенной зоны». Допускается хранение ПБА I-IV групп в «чистой зоне», в залах их транспортирования из одного учреждения в другое в упаковке, соответствующей требованиям безопасности ПБА.

495. Сотрудники организации, регулярно работающие с ПБА I-IV групп, могут временно хранить образцы ПБА I-IV групп (далее — рабочие коллективные штампы).

Порядок формирования рабочих коллекций штампов, условий использования и их

²² Федеральный закон от 05.04.2006 № 35-ФЗ «О персональных порочащих фактах и законности», Письмо ФГБН «ВНИИ» от 11.04.2020 № 30, ст. 1074, Федеральный закон от 10.03.2009 № 32-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

правильного хранения ПБА I-IV групп в составе рабочих коллекций штампов производится руководителем подразделения и утверждается приказом руководителя организации.

496. Качественный и количественный состав штампов рабочей коллекции должен соответствовать требованиям, установленным в подразделении, составлять необходимые требования технико-методической документацией, регламентирующей использование ПБА в деятельности подразделения и не превышать установленных пределов, установленных в работе с ПБА в санитарно-эпидемиологическом отношении.

Учет ПБА I-IV групп, входящих в рабочие коллекции штампов и числящихся за конкретным сотрудником, осуществляется и составляется в таблице 8 приложения 7.

497. Хранение ПБА I-IV групп и взрывчатых веществ должно осуществляться в холодильниках, морозильниках, металлических шкафу (сейфах) раздельно по группам, в герметичных герметичных емкостях, помещенных в прочные изолирующие ящики с плотно закрывающимися крышками. Взрывчатые вещества помещаются снаружи или внутри их в соответствии с перечнем и количеством взрывчатых веществ с ПБА.

498. Допускается в лабораториях, принадлежащих специализированному подразделению, работать только с III-IV группой патентованности, вместо опечатывания вторичной тары использовать холодильники, морозильники, металлические шкафы (сейфы), соответствующие санитарным требованиям.

499. Соответствие хранения ПБА различных групп патентованности в ящиках холодильниках, морозильниках, металлических шкафу (сейфах) или в холодильнике выполняется при условии, что в одну вторичную тару помещают первичные емкости с ПБА, относящиеся к одной группе патентованности и одной ящику (подставке - для многоорганизмов).

500. Первичные емкости с ПБА I-IV групп, входящие на хранение, должны иметь четкое, выгравированное надпись для причисления емкости к обозначенным требованиям ПБА (для микроорганизмов - название патента, а также при наличии - особые обозначения штамма и идентификации номер ПБА в коллекции организации), дата инкубирования (переноса).

На первичных емкостях с соответствующими данными быть нанесены достоятельная маркировка красным цветом арабскими цифрами угла этикетки.

501. Микроорганизмы I-IV групп патентованности в коллекциях организаций должны храниться в лиофилизированном или замороженном состоянии, на шпатель или жидких питательных средах, а также в виде суспензий органов или тканей в водоразбавителе.

В подразделениях организаций, осуществляющих деятельность с помощью ПБА I-IV групп, допускается хранение в лиофилизированном состоянии ПБА III-IV групп,

в классе ПБА II группы, которые предназначены к непосредственному применению документами в качестве контрольных, в составе рабочего набора штампов, закрепленного на конкретном сотруднике прикладной руководители организации.

Выявленное явную с профилированием ПБА I-II групп факторов в изучении регистрации вскрытия первичной емкостью (капсулы, флаконы) с целью патентности биологических агентов I-II групп с целью тарной или упаковки (капсулы II приложения 7 к Санитарии правил).

502. Хранение ПБА, ступенчатых образцов для прикладного анализа, в производственных подразделениях осуществляется в отдельных помещениях. Наименование штампы и полноты штампы хранятся в отдельных холодильниках (шкафу), в которых отсутствуют другие ПБА, а в исследовательских и производственных подразделениях выделение штаммы должны храниться в отдельных холодильниках тарных.

503. В Государственной коллекции патентов микроорганизмов коллекционные штампы микроорганизмов, сортировка, культура клеток должны храниться в соответствии с нормами, установленными в соответствии с требованиями (соответствие).

Микроорганизмы I-IV групп патентности и культуры клеток в Государственной коллекции могут храниться в лиофилизированном или замороженном состоянии, на шлывых или жидких питательных средах, а также в виде суспензий органо или тканей в замороженном в лиофилизированном при температуре плюс 2 °C - плюс 6 °C или замороженном состоянии (при температуре от минус 18 °C до минус 20 °C, и минус 60 °C минус 80 °C, от минус 152 °C до минус 155 °C).

504. Для хранения ПБА I-IV групп в холодильниках-замораживателях и в лиофилизаторах должны использоваться указанные интервалы, обеспечивающие функциональность упаковки при любых температурах.

505. Хранение штаммов в лиофилизаторах осуществляется в соответствии со специально разработанными руководителем подразделения и подтверждающую руководителем прикладных существующих данных фирму хранения ПБА, неструктурными, утвержденными руководителем организации, обеспечивающими безопасные условия хранения.

506. Хранение образцовых, образцов для патента не подлежат оценке с перечнем в соответствии с требованиями первичных емкостей с ПБА.

Требования к порядку передачи и транспортировки (в части безопасности упаковки, маркировки и оформления документов) ПБА I-IV групп

507. Передача ПБА I-IV групп в подразделение от одного сотрудника другому осуществляется по письменному разрешению руководителя подразделения с оформлением акта передачи материалов биологических объектов I-II групп внутри подразделения и ПБА III-IV групп (культуры штаммов микроорганизмов и вирусов) внутри организации (таблица 13 приложения 7 к Санитарным правилам). Допускается в лабораториях, проводящих биологические исследования и работающих только с III-IV группой патогенности, осуществлять передачу ПБА между сотрудниками, имеющими доступ к работе с ПБА, без оформления акта передачи.

Допускается в лабораториях, проводящих лабораторные исследования и работающих только с III-IV группой патогенности, осуществлять передачу ПБА между сотрудниками, имеющими доступ к работе с ПБА, без оформления акта передачи.

508. Передача ПБА I-II групп из одного подразделения организации в другое подразделение этой организации осуществляется при наличии в получении соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения по письменному запросу руководящего подразделения и письменному разрешению руководителя организации с оформлением акта передачи материалов биологических объектов I-II групп между подразделениями внутри организации (таблица 14 приложения 7 к Санитарным правилам).

Передача ПБА III-IV групп из одной подразделения организации в другое подразделение этой организации осуществляется по письменному запросу и разрешению руководящего подразделения с оформлением акта передачи материалов биологических объектов III-IV групп внутри подразделения и ПБА III-IV групп (культуры штаммов микроорганизмов и вирусов) внутри организации (таблица 15 приложения 7 к Санитарным правилам).

509. Вывоз штаммов микроорганизмов I-IV групп из коллектив организации в подразделение иной организации осуществляется по письменному разрешению руководителя организации с регистрацией факта вывоза из организации вывоза ПБА (приложение 7) и оформлением соответствующего акта передачи:

для ПБА I-II групп (таблица 14 приложения 7 к Санитарным правилам);

для ПБА III-IV групп (культуры штаммов микроорганизмов и вирусов) (таблица 15 приложения 7 к Санитарным правилам).

510. При временном отсутствии сотрудника, являющийся за тем сотрудником ПБА I-IV групп передается другому сотруднику того подразделения на временное хранение, с правом или без права пересела на основании письменного разрешения руководителя подразделения, в другое подразделение той организации - на основании письменного разрешения руководителя организации с оформлением акта передачи ПБА I-IV групп на хранение и получение после хранения (таблицы 15, 16 приложения 7 к Санитарным правилам).

В случае длительной временной нетрудоспособности работника и (или) невозможности его лично участвовать в процедуре передачи на временное хранение являющийся за ним ПБА I-IV групп, письменным распоряжением руководителя организации создается комиссия, которая осуществляет проверку наличия ПБА по таблицам 3, 4 приложения 7 к Санитарным правилам) и передаче другому сотруднику подразделения для организации с правом или без права пересела по акту передачи (таблицы 15, 16 приложения 7 к Санитарным правилам).

При временном отсутствии по письменному разрешению руководителя организации на основании запроса руководителя подразделения, являющийся за тем сотрудником ПБА I - IV групп не передается на временное хранение внутри подразделения или в другое подразделение той организации при условии, что такой сотрудник обеспечил: печатью печатью вышестоящего ящика (сейфа), холодильника, морозильника, в котором хранятся являющийся за тем ПБА I-IV групп, а также печать и документацию по акту передачи (таблицы 3, 4 приложения 7 к Санитарным правилам) передатчику подразделения по акту передачи с подписями передатчика и принимающего печать и документацию. В случае необходимости вскрытия, опечатанного ящика (сейфа), холодильника, морозильника письменным распоряжением руководителя организации создается комиссия, которая осуществляет проверку наличия ПБА на хранение (таблицы 3, 4 приложения 7 к Санитарным правилам) и передаче другому сотруднику организации с правом или без права пересела по акту передачи (таблицы 15, 16 приложения 7 к Санитарным правилам).

511. Передача ПБА, хранящаяся в подразделении организации, осуществляющей деятельность с использованием ПБА I-IV групп, в полномую той организации на временное хранение осуществляется на основании письменного разрешения руководителя организации с оформлением акта передачи (таблица 16 приложения 7 к Санитарным правилам).

512. Передача ПБА I-IV групп из одной организации, осуществляющей деятельность с использованием ПБА I-IV групп, в другую организацию, осуществляющую

деятельности в некоммерческом ПБА I-IV групп, в том числе из кошелек ПБА I-IV групп, разрешается осуществлять по личному распоряжению организации, получающей ПБА I-IV групп из подказов руководителя организации. Перечень осуществляемых с письменного разрешения руководителя организации, получающей ПБА, с составленным актом передачи (таблица 17 приложения 7 к Санитарным правилам).

Выдача птамы из кошельков ПБА I-IV групп осуществляется на основании разрешения организации в другой организации осуществляемых по письменному разрешению руководителя переданной организации с регистрацией факта передачи путем записи в журнале выдачи ПБА (таблица 16 приложения 7 к Санитарным правилам) и оформлением акта передачи (таблица 17 приложения 7 к Санитарным правилам).

На содержание упаковки с ПБА I-IV групп составляется сопроводительное письмо на бланке организации. Для ПБА I-II групп дополнительно составляется акт упаковки в свободной форме в двух экземплярах. Первые экземпляры указанных документов прилагаются к упаковке с ПБА. Кошки документов остаются у отправителя. Организация, получающая ПБА I-II групп, должна составить акт вскрытия упаковки и письма с письмом, подтверждающим получение ПБА, направить его в организацию, их выдávшую.

51.3. Транспортники ПБА I-IV групп должны осуществлять юридический контроль за надлежащим выполнением предпринимателями (далее - перевозчиками) в соответствии с законодательствами Российской Федерации, регулирующими правила перевозок опасных грузов по видам транспорта²⁵.

²⁵ Пункты 9.1, 26 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 19.07.1997 № 60-ФЗ (в редакции Федерального закона от 19.07.2007, № 11, ст. 1343; 2020, № 24, ст. 1740) (далее - Федеральный закон от 19.07.1997 № 60-ФЗ): пункт Минтруда России от 05.01.2008 № 141 «Об утверждении Федеральных требований к перевозкам опасных грузов другим воздушным судном гражданской авиации» (зарегистрировано Минюстом России 29.08.2008, регистрационный № 12356); статья 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 254-ФЗ «Об автомобильном транспорте и городских пассажирском электрическом транспорте (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.11.2007, № 46, ст. 555, 2020, № 12, ст. 1971), постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2320 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 23.12.2020, ссылка в Федеральном банке от 10.01.2025 № 17473 «О лицензировании транспорта и Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 2, ст. 169, 2020, № 20, ст. 3074); пункт 10.117 правил Минтруда России от 19.12.2011 № 473 «Об утверждении Правил перевозок опасных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом» (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2014, регистрационный № 33244); с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 23.08.2015 № 267 (зарегистрировано Минюстом России 24.08.2016, регистрационный № 43093) от 21.07.2018 № 302 (зарегистрировано Минюстом России 05.08.2016, регистрационный № 43093) от 30.11.2016 № 367 (зарегистрировано Минюстом России 25.12.2016, регистрационный № 44914, от 18.09.20, № 334, ст. 11.11.2018 № 110) от 05.04.2019 № 36, от 10.04.2020 № 118) (далее - приказ Минтруда России от 19.12.2011 № 473); статьи 58 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 19.12.2003 № 473; статьи 11, ст. 1001, 2020, № 24, ст. 3740; пункт VIII Кодекса торгового морского транспорта Российской Федерации от 20.01.1999 № 81-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 2207, 2020, № 39, ст. 457); (Собрание законодательства Российской Федерации от 04.12.2020 № 2021 «Об утверждении Правил и

информационного характера и окружающей среде, угрозы или хищения груза, статус неопределяемого сообщения и осуществляются территориальными органами, осуществляющие федеральный государственный административно-защитно-охранительский надзор, осуществляющие подразделения органов безопасности и внутренних дел для принятия, в случае необходимости, мер по предотвращению последствий, охране места происшествия, организации розыска потерпевших или их имущества.

О факте аварийной ситуации незамедлительно информируют руководителя ПБА и организацию - получателя (грузополучателя) ПБА.

519. В целях транспортирования ПБА I-IV групп по территории Российской Федерации на предельной территории размещения, осуществляющей деятельность с использованием ПБА I-IV групп, осуществляются классификация и идентификация как опасный груз, его упаковка, маркировка и оформление документов.

520. Сотрудники, занимающиеся подготовкой ПБА I-IV групп к перевозке, должны быть обучены к работе с ПБА I-IV групп приказом руководителя организации. В целях работы с сотрудниками, в деятельность которых включается транспортировка, и управление грузом, содержащего ПБА, руководителем учреждения или лицом, уполномоченным им, проводятся мероприятия по инструктаж и проверке знаний правил обращения с опасными грузами, а также с составленными разделами, стандартных правил. Сотрудники, занимающиеся подготовкой ПБА I-IV групп к перевозке, должны быть ознакомлены с общими положениями, касающимися требований к перевозке опасных грузов, и должны быть ознакомлены по вопросам, касающимся опасными грузами, требованиями к упаковке, разгрузке и совместимости грузов, требований к оптимизации упаковки опасных грузов, маркировке, содержанию информации и другим мерам безопасности соразмерно той степени опасности, которой они могут подвергнуться в случае развития или усиления опасного груза, включая, при необходимости, меры эквивалентности и использование индивидуальной защитной одежды. Результаты проверки фиксируются в журнале регистрации инструктаж по проверке знаний правил обращения с опасными грузами по месту, хранения и транспортирования ПБА I-IV групп.

521. Классификация и идентификация грузов с ПБА I-IV групп, которые включают отношения к взрыву, пожару, коррозии, токсичности груза, применение идентифицирующего номера Организации Объединенных Наций, осуществляются в соответствии с национальными системами классификации опасных грузов, в зависимости от вида и степени потенциальной опасности (приложение 9 к Соглашению о перевозке).

ПБА 1-19 групп следует отнести к 6-му классу опасных грузов «Токсичные и инфекционные вещества, представляющие собой вещества, способные при проглатывании через дыхательные пути, кожу и (или) через пищу вызвать отравление, травму, смерть или причинить вред здоровью человека или инфекционные вещества (материал), представляющие потенциальную опасность для человека и животных (материал), способные вызвать заболевания людей и животных травму, смерть или причинить вред здоровью человека, подклассу 6.1 «Токсичные вещества» или подклассу 6.2 «Инфекционные вещества».

Токсичные вещества подкласса 6.1 относятся к одной из трех групп в зависимости от степени опасности вещества и связаны с ней трибунами к упаковке:

- высокая степень опасности (группа упаковки I);
- средняя степень опасности (группа упаковки II);
- относительно низкая степень опасности (группа упаковки III).

Группа упаковки характеризует степень тяжести для упаковки при транспортировании опасного груза.

5.2.2. Инфекционные вещества, которые в случае их воздействия при транспортировании способны вызывать потенциально неспособность людей, вызвать угрозу жизни или нанести здоровью людей к смертельным заболеваниям, относятся к категории А. Инфекционные вещества, не соответствующие этим характеристикам, относятся к категории Б.

В системе классификации опасных грузов применяются идентификационные коды Организации Объединенных Наций в соответствии с Перечнем опасных грузов¹⁶.

Требования к классификации, а также упаковке и маркировке инфекционных материалов, относятся только для животных, их тел или предметов Связанных с ними.

5.2.3. Независимо от вида транспортного средства, упаковка опасных грузов 6-го класса должна обеспечивать безопасность для людей и животных перевозку и прибытие опасного груза к месту назначения в надлежащем состоянии.

Различия в требованиях к упаковке, маркировке, сопроводительной (вещищеской и уведомительной) и транспортной документации для этих материалов устанавливаются в зависимости от вида и степени опасности материалов 6-го класса опасных грузов транспортируемых (принадлежит к Связанным с животными).

¹⁶ Технический ООН по перевозке опасных грузов. Титульный лист (Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк в декабре 2019, https://www.unece.org/Dokumentation/19-Rev19-1-Vol_1.pdf) (далее - Рекомендации по перевозке опасных грузов).

Требования к упаковке токсичных веществ зависят как от степени их токсичности, так и от количества перевозимого вещества.

524. При упаковке токсичных веществ подкласс 6.2 следует применять ибидея принципа двойной упаковки. Этот принцип подразумевает наличие трех упаковок: внешней, промежуточной и внутренней.

1) первичной емкости. Первичная водонепроницаемая и герметичная емкость, содержащая образец материала. ИБД. Эту емкость упаковывают в дистанционную емкость, чтобы избежать повреждения материала, если в случае повреждения или протечки абсорбирующая жидкость.

2) вторичной тары. Вторая primaria водонепроницаемая, герметичная тара для размещения в упаковке первичных емкостей. В одну вторичную тару можно поместить несколько первичных емкостей; при этом следует убедиться, что достаточно абсорбирующей жидкости, чтобы предотвратить повреждение или протечку. Первичная емкость в вторичной таре образует внутреннюю тару.

3) наружной тары. Вторичную тару помещают в наружную тару для транспортировки с достаточным количеством абсорбирующей жидкости. Наружная тара во время транспортировки защищает содержимое от неблагоприятных внешних воздействий.

Минимальные размеры наружной тары должны быть не менее 10 x 10 см.

525. Если инфекционный материал, подлежащий перевозке, не изложен в специальной упаковке, относящейся к Категориям А или Категориям В, такой материал следует отнести к Категориям А. Упаковка и маркировка груза, содержащего такой материал, должны соответствовать Категориям А. В сопроводительных документах, прилагаемых к упаковке, вместо вышеназванных слов следует указать следующее: «Инфекционные вещества, предположительно относящиеся к Категориям А».

526. Культуры микроорганизмов передают в инфицированном состоянии, на плотных питательных средах, в специальных средах для транспортировки или в замороженном состоянии.

Для передачи органов, тканей и их сушеный, культур плесень, содержащих вирусы или другие инфекционные материалы, допускается их транспортировка в замороженном состоянии или в замороженном состоянии.

Должно быть обеспечено соблюдение принципа тройной упаковки, предусмотренного пунктом 524. Указанные пункты.

527. Группировщик должен немедленно сообщить грузоотправителю дату отгрузки и вид транспорта для связи, который является основным груз 6-го класса.

528. Требуемая Сметтериями должна не распространяться на:

материалы в форме, в которой должны присутствовать возбуждающие факторы или факторы нейтрализующие или индифферентные таким образом, что эти факторы не представляют угрозы или являются незначительными, что должно подтверждаться данными, подтверждающими нейтральность или индифферентность.

Пробы из окружающей среды, содержащие ПАВ I-IV групп (в том числе пробки пищевых продуктов и воды), которые считаются не содержащими значительного риска индифферентности:

источники и использование в неволе животных: биологические продукты, такие как пакеты, двусторонние, двусторонние и двусторонние с двусторонними двусторонними требованиями по упаковке лекарственных средств, фармацевтических субстанций или лекарств медицинского назначения, и первичные для окончательной упаковки или распространения;

кроме для ее полноты, собранные для переносимости или приносимости продуктом кривой с целью использования для переносимости или приносимости, для кривой или кривой, предназначенные для транспортировки, а также образцы, выданные в связи с этими целями.

529. Сметтериями должна не распространяться на образцы, выданные в течение с минимальной вероятностью присутствия ПАВ I-IV групп, если образец транспортируется в таре, предотвращающей любую утечку. Эта таря должна состоять из трех компонентов:

первичной герметичной емкости (емкости);

вторичной тары;

третичной наружной тары.

Для каждой материи между первичной емкостью (емкостью) и вторичной тарой должна быть размещена абсорбирующий материал в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого. Между вторичной тарой и наружной тарой размещается дополнительный материал и, в случае необходимости, охлаждающий агент.

К образцам, перечисленным в соответствии с вышеуказанными пунктами, относятся пробы крови или мочи для контроля уровней холестерина, сахара, мочевины; пробы, необходимые для контроля функционирования сердца, печени или почек у животных людей и у людей, страдающих инфекционными заболеваниями; пробы биопсии для диагностики онкологических заболеваний, тесты для обнаружения антител при оценке эффективности вакцинации и другие пробы.

Относительно биологических материалов к образцам с минимальной вероятностью присутствия ПАВ I-IV групп исключаются и исключаются под действием настоящего

лекарственные средства, решение об оформлении разрешения о возможности (не возможности) ввоза или вывоза ПБА I-IV групп принимает Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. Рекламные услуги образцы разрешения и возможности (не возможности) ввоза или вывоза ПБА I-IV групп торговли и производства в Снятом или права. 100.

314. Международное перевозки ПБА I-IV группы осуществляются при условии: получения грузоправителем лицензий или разрешения на перевозку инфекционного материала из страны, вывозомых уполномоченными органами в соответствии с актами государства ввоза, регулирующими порядок экспорта инфекционного материала;

получения грузоправителем лицензий или разрешения на ввоз инфекционного материала в страну, вывозомых уполномоченными органами в соответствии с актами государства ввоза, регулирующими порядок импорта инфекционного материала;

информирования сторонних лиц друг о друге о полученных необходимых разрешениях и соответствиях, а также о дистрибуции возможностей с первоначальными.

315. При выполнении угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, угрозы на территории Российской Федерации и распространения на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний в целях принятия мер по успешному защите населения от заражения уполномоченными должностными лицами Федеральной службы по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимаются решения и осуществляются срочные меры защиты (штрафы) возбуждения инфекционной болезни в Российской Федерации³⁰.

V. САНИТАРНАЯ ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

316. Санитарная охрана территории Российской Федерации направлена на предупреждение заноса на территорию Российской Федерации и распространения на территории Российской Федерации инфекционных болезней, представляющих опасность для населения, а также на предупреждение ввоза на территорию Российской Федерации и реализации на территории Российской Федерации товаров, сырья, кормов, биологических и радионуклидных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека (далее – опасные грузы в товарах).

³⁰ Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2021 № 12 «Об усилении мер по защите населения от угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ввозом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний» (Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> 04.01.2021).

537. Требования настоящей главы Санитарных правил применяются при осуществлении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также санитарно-эпидемиологических (эпидемиологических) мероприятий в распространяющейся:

1) инфекционные болезни (далее – болезни), которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – чрезвычайные ситуации), требующие проведения мероприятий по санитарию и карантину на территории Российской Федерации (приложение 11 к Санитарным правилам);

2) болезни и другие события, требующие принятия решений для оценки и уведомления о наличии Чрезвычайных ситуаций, в соответствии с приложением 2 Международных медико-санитарных правил (2005 г.)²⁰ (далее – ММСП);

3) чрезвычайные ситуации, связанные с являясь на территорию Российской Федерации товаров в трупов, представляющих риск для здоровья населения.

538. Не допускают к ввозу на территорию Российской Федерации опасные грузы и товары, ввоз которых на территорию страны запрещен законодательством Российской Федерации, а также грузы и товары, в отношении которых при проведении санитарно-карантинного контроля установлено, что их ввоз на территорию Российской Федерации создает угрозу возникновения и распространения инфекционных болезней или массовых неинфекционных заболеваний (эпидемий)²¹.

539. При невыполнении требований, предусмотренных Санитарными правилами, может быть запрещен выезд иностранных граждан в Российскую Федерацию и въезд из Российской Федерации транспортных средств, а также ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, вестись отвозить опасных грузов, биологов и международных экспонатов отправления²².

²⁰ Цитируется из 58 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (Женева, 2005 год) *Подруководный и официальный сайт Всемирной организации здравоохранения*, <http://www.who.int/influenza/diseases/9789241564446/en/>.

²¹ Статья 30 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

²² Статья 26, 27 Федерального закона от 15.03.2006 № 144-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 34, ст. 4029; 2007, № 30, ст. 3974) (далее – Федеральный закон от 15.03.1999 № 114-ФЗ), статья 32 Федерального закона от 01.12.2007 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 4850; 2009, № 49, ст. 5592).

Информационное обеспечение мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации

540. Должны быть лица, осуществляющие государственный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, в случае выявления лиц с заболеваниями, в состоянии здоровья, позволяющими информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический контроль. Медицинские работники аэропортов, гостиниц, курортов, стоянки при выявлении случаев болезни (подозрения на нее, являющейся возбудителем болезни) немедленно информируют соответствующие санитарно-эпидемиологический пункт (СЭП).

541. При выявлении случая болезни (подозрения на нее, возбудителем возбудителя) медицинскими органами направляется выдвинутое доведение о возникновении чрезвычайной ситуации в течение 2 часов после установления факта чрезвычайной ситуации в органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор — Управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации, в течение 12 часов — экстренное извещение по установленной форме.

Санитарно-эпидемиологические требования к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации

542. Санитарно-эпидемиологические требования к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации предъявляют к территории пункта пропуска, транспортным организациям, транспортным средствам международных сообщений, членам экипажей морских (речных), воздушных судов, воздушных бригад, водителям автотранспорта, а также к лицам, осуществляющим международные перевозки, и перевозимым через границу их багажу, товарам и грузам.

543. В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации должны быть обеспечены:

наибольшее санитарное исключение территории и находящихся на ней объектов;

лицам территории транспортных предприятий, а также расположенных на ней зданий, сооружений и транспортных средств от производства и реализации презумпции, исключать и проведение мероприятий по борьбе с трихинеллами, конформы и другими паразитами;

питьевые водоснабжения, наличие объектов санитарии, общественных туалетов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям;

эффективная система удаленных и обезличиваемых экстремальных, оттолов, сличений вод, лабораторных питательных продуктов и других факторов риска для здоровья человека; обустройство систем беспилотных и умеренных температур тела лиц;

обор. приемы и методы при выявлении и устранении - транспортировки до места уничтожения (утилизации) и уничтожения (утилизации) топлив животного и растительного происхождения, вывозимых в рутинной жизни, бываю физических лиц в почтовых отправлениях, а также в товарных партиях¹³;

термическая уничтожение биологических тканей людей животных, птицы, в других случаях, производимых по заказам для обезличивания и транспортировки средств¹⁴.

приведены примеры профилактики и по эпидемиологическим показателям децентрализованно, децентрализованно, децентрализованно:

подготовка данных транспортных средств по вопросам профилактики болезней и предотвращения переноса, предотвращения заболеваний переносимых при вывозе болезней (для профилактики в ялах).

5.4. Помощь, сооружения и материально-технические средства в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации, необходимые для проведения санитарно-противоэпидемиологических, санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения на территории Российской Федерации инфекционных болезней, представляющих потенциальную опасность для населения, а также на предотвращение вывоза на территорию Российской Федерации товаров, биологических, химических и радиоактивных веществ, опасных в ялах груза, представляющих опасность для человека, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

¹³ Решение Комитета Таможенного союза от 22.05.2011 № 654 «О Единых таможенных требованиях к оборудованию и контролю-эксплуатации таможенных пунктов, таможенных и таможенных, таможенных для пропуска государственного контроля и контроля пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза. Классификация пунктов пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза и формы Листовта пункта пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза (функциональный сайт Комитета Таможенного союза <http://www.asean.ru/>, 19.07.2011). Листовта обязательства для Российской Федерации в соответствии с Договором о Таможенном таможенном союзе от 18.11.2011, ратифицированным Федеральным законом от 01.12.2011 № 374-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7052) и также Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 05.10.2014 № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 40, ст. 5110).

¹⁴ Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2001 № 900 «Об утверждении общих требований к строительству, оборудованию и техническому оснащению объектов, предназначенных для строительства объектов, оборудованных для пропуска товаров, таможенных и таможенных, таможенных в ялах, пропуска через государственную границу Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 53, ст. 5626; 2014, № 50, ст. 7413).

545. Руководители транспортных предприятий, операторы перевозок, владельцы транспортных средств, осуществляющих международные перевозки, обеспечивают:

оснащение транспортных средств, находящихся в международном рейсе, санитарно-гигиеническими требованиями:

притивозависимость готовности транспортных средств;

системное информирование должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, о каждом случае заболевания среди членов экипажей и пассажиров и санитарно-эпидемиологический обстановка на транспортном средстве;

разработку и корректирование не реже 1 раза в год оперативных планов профилактических мероприятий по снижению рисков на транспортных средствах, осуществляющих международные рейсы.

подготовку членов экипажей (пилотов, водителей) транспортных средств по вопросам профилактики болезней и проведения санитарных профилактических мероприятий:

проведение мероприятий по снижению заражения окружающей среды (акватория портов, территориальный аэропорт, железнодорожных станций и аэровокзалов) отходами хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;

защиту транспортных средств от проникновения и распространения грибов, насекомых-переносчиков;

применение профилактической и поведенческой вакцинации экипажей, летчиков, диспетчеров транспортных средств;

проведение санитарных противоэпидемиологических мероприятий в случае выявления в пути следования средств пассажирского или грузового экипажа (бригады) болезни;

квотирование матрасов и матрасов членам экипажей до и во время рейсов на транспортных средствах, находящихся в портах эндемичных по малярии стран;

вакцинацию против малярии пассажиров членам экипажей транспортных средств, совершающих рейсы в страны, где существует риск передачи болезни;

применение по медицинским показаниям транспортного средства рефрижераторов в целях профилактики и лечения болезни.

546. Администрация пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации обеспечивает:

поддержание санитарно-гигиенического состояния территории пункта пропуска и расположенных на ней объектов;

разделение и обустройство в морских и речных портах, аэропортах, железнодорожных и авиационных вокзалах и станциях, открытых для международного

санитарных призывов, стоянок, пунктов, шлюзов, в соответствии с установленными требованиями для воздушных транспортных средств и проведения санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, включая дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию транспортных средств;

защиту территории пункта пропуска и расположенных на ней зданий, сооружений от преступных и противоправных действий, влечущих нарушения;

предупреждение загрязнения окружающей среды (атмосферы, почв, территорий, водоемов, железнодорожных станций и автовокзалов) (точечным хозяйственно-бытовыми и бытовыми видами, мусора).

предоставление доступа на территорию пункта пропуска для размещения персонала осуществляющего санитарно-эпидемиологический контроль, и временной занятости большинством сотрудников с законными полномочиями Российской Федерации;

поддержание в распоряжении специалистов Федеральной службы и правоохранения транспорта (автомобиль, катер) для оперативного проведения санитарно-эпидемиологического контроля, мер в отношении больных, инфицированных или переболевших;

эффективную систему утилизации и обезвреживания экскрементов, отходов, сточных вод, загрязненных пищевых продуктов и других опасных для здоровья людей объектов;

назначение специально уполномоченных лиц для перевозки опасных грузов и соблюдение требований их временного хранения;

назначение должностных лиц для временного содержания пассажиров из числа иностранных граждан, не допускаемых к посольскому контролю по состоянию здоровья;

планомерно проводить в любом аэропорту вылета или посадки для размещения людей в элитных.

5.4.7. Цели и задачи транспортной средства информировать аэропорт, морской или речной порт, железнодорожный пункт выезда, а также о прибытии в пункт отхода бою на борту, в пункте, а также о санитарном состоянии транспортных средств. Руководители транспортных компаний обеспечивают незамедлительную передачу полученной информации о случаях заболевания на территории административной территории, вокзалов, порта, станции, а также должностным лицам, на которых возложено проведение санитарно-эпидемиологического контроля в пункте пропуска через государственную границу.

5.4.8. Администрация аэропорта, вокзала, порта, станции обеспечивает:

пропуск непосредственно в транспортное средство больных людей (исключая) помощь (специализированный медицинский или специально обученный персонал) с

исключен доступ индивидуальной защиты (маски, перчатки, костюмы) для работы с инфицированными больными);

принимая транспорт для перевозки полностью закрытых пассажиром, подвергнутом риску заражения, и медицинскую организацию для медицинского обслуживания в усиленном режиме. Проведение мероприятий в круизных суднах должно осуществляться должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль. В том числе соответствующими предложены представлять транспортный и медицинский организации в виде предложений.

549. При получении информации об отступлении на транспортном средстве до его прибытия в пункт прибытия (отправления) в целях рациональных и эффективных действий при перевозках опасных грузов, не применяются санитарно-гигиенические меры:

воздушным судам, прибывающим из неблагоприятных районов;

транзитным воздушным судам в случаях, если пассажирские судна будут находиться в пределах зоны аэропорта без права посадки или вылета пассажиров, выгрузки или загрузки грузов, топливу такому воздушному судну разрешается вылет из порта по контролю должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль. Пассажиры, члены экипажа, при необходимости;

морским (реки) судам, прибывающим из неблагоприятных районов и (или) проходящим морским путем или по акватории портов и портов, расположенных на территории другого государства;

морским (реки) судам, проходящим без захода в порт и без высадки пассажиров, экипажа и пассажиров на борт;

наземным транспортным средствами, прибывающим из неблагоприятных районов и (или) пересекающим территорию без захода и вылета пассажиров, выгрузки или загрузки пассажиров и грузов.

550. Наличие документа о вакцинации против Близкой (обязательно для каждого члена экипажа транспортного средства, прибывающего в порты, аэропорты, железнодорожные или автомобильные вокзалы и стоянки, расположенные в эпидемиологически неблагополучных странах.

551. Кредитные и негосударственные учреждения, осуществляющие транзит в страны, неблагополучные по Близкой, а также осуществляющие турпериарскую и туристскую деятельность, при организации поездок и отдыха, неблагополучные по Близкой, должны принять о возможных рисках заражения в странах, куда они направляются, странах Близкой, мерах личной профилактики.

заболеваниях и случаях заболеваний, а необходимости оказания, а также в санитарно-эпидемиологических требованиях.

552. На автодорожных и железнодорожных вокзалах, станциях и переходах являясь транспортным средством движутся без проведения санитарно-карантинного контроля, валичные решения не принимаются по санитарно-эпидемиологическим показаниям (явления болезни и подозрения на заражение возбудителями болезней, нахождение в периодическом, прерывном, самодеятельном или прерывном состоянии при наличии симптомов болезни и при наличии симптомов заболевания с признаками наличия заболевания).

553. Отказывая (протестуя) транспортное средство на санитарный контроль, санитарно-эпидемиологическую проверку, санитарный контроль производится перед убытием из зоны проверки;

наличие лиц с подозрением на болезнь и (или) возможность распространения на транспортное средство возбудителей или переносчиков возбудителей этих болезней;

неудовлетворительное санитарное состояние отдельных участков транспортного средства, которое может привести к угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний (патогенов) среди экипажа и пассажиров;

554. В случае отлучения пассажиров для осуществления эпидемиологических мероприятий, дезинфекции, дезинсекции, дератизации пассажиров разрешается на время отлучения при соблюдении следующих условий:

во время отлучения транспортного средства пассажиры сообщаются в соответствующий пункт назначения;

обнаруженные факты и необходимые меры контроля указываются в журнале санитарной части генеральной декларации пассажира судна, морской санитарной декларации экипажа (личного) судна или свидетельства о происхождении судна санитарного контроля, санитарный журнал ведется в соответствии с МДСП.

Требования по предупреждению завоза и распространения болезней

555. Санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия для выявления болезней (инфекционных) болезней на морском судне в рейсе включают:

взаимодействие экипажа в соответствии с законодательством Российской Федерации по прибытии в ближайший пункт назначения, где имеются условия для его госпитализации с лечением; место нахождения экипажа было полностью для контроля;

использование информации о больных портах штиль, службы управления здоровьем судна порта назначения судна, ближайших портов, через порты

устанавливается связь с организмом эпидемиологической профити или соответствующими действиями в рамках проведения изобретательских мероприятий;

осуществление забор биологического материала и его хранение в соответствии с требованиями безопасности связаны непосредственно с судами медицинскими работниками у болящих до начала лечения. В случае отсутствия медицинских работников, уходов для соблюдения требований биологической безопасности или условий для хранения материала отбор проб не проводится;

изоляция в ватах и других помещениях лиц, бывших в тесном контакте с болящими: за время лечения, обращения с болящими, установления медицинской помощи, по показанным показаниям эпидемиологической профити;

приведены на суды дезинфекции, в при обнаружении гриппозных (связанных с жизнедеятельности) или вирусных-переносчиков — дезинфекция и дезинсекция: обнаруженные симптомы гриппозных обращаются и помещаются в отдельные комнаты (кабинеты). Дезинфекция помещений суды, включая туалетные комнаты, системы вентиляции и кондиционирования проводится с использованием обеззараживающих средств. Информация о проведенной дезинфекции, включая дату, время, метод дезинфекции и расход дезинфицирующего средства (при использовании) предоставляется соответствующей технической документации хранится в установленном порядке в автоматизированном режиме. Дезинфекция осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.1.3.650-20.

556. При выявлении болящего на групповом суде члены экипажа ответственны за медицинское обслуживание, принимают меры по выявлению болящего, оказывают ему первую помощь и обеспечивают соблюдение за диагноза, общаются с ним.

557. При обнаружении болящего в самолете, автобусе, теплоходе экипаж экипажа принимает меры для его временной изоляции в отдельном отсеке или на заднем сиденье самолета, салона автобуса, в случае невозможности до прибытия в ближайший пункт назначения по пути следования, где есть условия для его госпитализации и лечения.

558. Иностранцы граждане в соответствии с болезнью госпитализируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. При отсутствии оформленного письменного акта от медицинского персонала в соответствии с требованиями соответствующей службы при информировании (присутствии) персонала посылать или консультировать. Выезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается в случае, если это необходимо в целях обеспечения защиты здоровья населения². В случае отказа указываются лица от госпитализации дальнейшие меры

² С 1 мая 27 Федерального закона от 15.03.1998 № 14-ФЗ.

применяются на основании МДУСН в соответствии с законодательством Российской Федерации.

559. По прибытии на территорию Российской Федерации транспортного средства на котором находились больные (подозрительные) подлежат принятию следующие меры:

1) экипаж транспортного средства:

до прибытия информирует диспетчера (дежурных) порта, аэропорта, вокзалов о нахождении больных;

информирует транспортное средство по решению администрации (аэропорта, вокзала, порта, станции, пункта пропуска) и санитарному пункту, на санитарную станцию, санитарную дорожку, санитарный пункт;

предоставляет выход теплому воздуху и пассажирам, выгрузку багажа, грузов до получения разрешения должностных лиц, осуществляющего санитарно-эпидемиологический контроль.

2) администрация аэропорта, вокзала, порта, станции:

обеспечивает должностные лица, осуществляющие санитарно-эпидемиологический контроль;

обеспечивает готовность медицинского персонала транспортного узла к оказанию медицинской помощи больным (подозрительным на Бактериальную) и проведение первичных противоэпидемиологических мероприятий, а также готовность медицинского пункта к приему больных;

обеспечивает выход бригады скорой (специальной) помощи (специализированной инфекционной или ее специально обученным персоналом с наличием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, костюмы) для работы с инфицированными больными) и ее подвоз до места назначения в транспортном средстве;

обеспечивает выход специально обученной организации для проведения дезинфекции транспортного средства, предусмотренной методическими указаниями при выявлении инфицированных больных на транспортном средстве. Проведение дезинфекции осуществляется в соответствии с требованиями СП 3.5 34/50-20;

обеспечивает выход транспортных средств для перевозки лиц, подвергшихся риску заражения и контактировавших лицами на базе медицинской организации, предусмотренной комплектом планом или санитарной охране административной территории при наличии инфицированных больных на транспортном средстве.

560. Администрация пункта приема через государственную границу Российской Федерации

организуется охрану плавящихся в транспортном средстве лиц до окончания проведения профилактических мероприятий.

приостановляется проведение всех видов государственного контроля и пункта пропуск (пограничного, таможенного, ветеринарного, фитосанитарного, миграционного) в отношении данного транспортного средства.

561. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, на территории которой зарегистрирован случай заболевания, вызванного вирусом транспортного средства, обеспечивают:

готовность бригады скорой (неотложной) помощи (специализированный инфекционный или со специально обученным персоналом с наличием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, костюмы) для работы с инфицированными больными) в круглосуточном режиме (в зависимости от развития ситуации транспортного средства);

готовность выездной организации, обслуживающей в комплексе лице при санитарной охране административной территории, при выявлении инфицированных больных на транспортном средстве и лечению инфицированных больных;

готовность медицинской организации, обслуживающей в комплексе лице по санитарной охране административной территории при выявлении инфицированных больных на транспортном средстве, в срочном или подтвержденном режиме заражения;

осуществление выездного наблюдения за заболевшими и лицами контактирующими (близкими) и наличие необходимого периода болезни с момента прибытия или их выезда и назначения экстренной профилактики при лабораторно-диагностическом подтверждении заболевания и соблюдение могут быть отменены в случае снятия диагноза после получения результатов лабораторных исследований.

562. Лица, подлежащие медицинскому наблюдению, могут продолжать работу, если они не представляют реального риска для здоровья населения; эти лица подлежат личностному или, осуществляющему санитарно-противоэпидемиологический контроль, закрывают своего обслуживания, адрес постоянного или временного места жительства в течение всего необходимого периода болезни, в случае отсутствия адреса — в течение установленного или принятых организацией; информация доводится до медицинской организации по адресу проживания.

563. Перевозка морских, речных судов проводится при пустых трюмах, кроме случаев, когда необходим перегруз, на морских, речных судах, зашлюпленных балластом, перевозка должна производиться погрузкой.

561. Забезпечити надійну дезінфекцію (дезінсекцію, дератизацію) транспортних засобів, людей, багажу. В тому числі достатньою кількістю дезінфекційних засобів, проводити пожежну безпеку на вулицях і площі міст, вивантаження вантажів, санітарної підготовки міст.

445. Ошибка о приписываемости дезинфекции, дезинсекции, дератизации статистик и механизированных машин-инструментов документам транспортного средства шоссейных перевозчиков.

[illegible]

587. [На тридцатипятилетие со дня рождения в Ленинградском университете по случаю юбилея профессора, обеспечивающего]

проведены з'ятыжку казанопрэціплекцый до 10 млрд рэяса;

информатизации: perspectives о проблемах и сценариях кибербезопасности в постках

запрос к индивидуальным членам экипажа (причем в срочных ситуациях и удаленных районах и применяемой техникой радиообеспечения (связи, радиотелефонии и радиотелеграфии).

применены: эскапаны и плавосвисты тепловых и призм стоящих судна (самолета) в порту (аэропорту), для которых риск заражения малочислен

368. Призывом является немерцание при выделении слюны смерти и транспорта средств бокового от выделительной (субэпителиальной) болезни, прибытием на территории Российской Федерации, пловцов:

ссылке в транскрипированном виде групп энкодерской бригады в мире шифрования и
сложности, предусмотренный для покрытия больших объемов информации и функциональности
определены с соблюдением требований главы IV Конституции проекта;

применение слептарево-протятосиндентическим профиланализом) иеридияний,
как и про патчиан фидельность.

МЕРКУРИУС В ПЛОСКОСТИ ТРУБА И СОБЛАЗН

569. В отношении труда в теплицах санитарно-гигиенические требования предъявляются:

574. По результатам досмотра, связанного со выявлением пачек, пачетов, пачетных урн, грузов и товаров, емкостей, контейнеров, допустимых для осуществления перевозки санитарно-карантинный контроль составляют акт в 2 экземплярах; второй экземпляр акта вручают лицу, обладающему соответствующими полномочиями в отношении указанных средств, грузов и товаров.

575. По результатам осмотра при осуществлении лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, составляется акт в 2 экземплярах. Второй экземпляр акта вручают лицу, обладающему соответствующими полномочиями в отношении грузов и товаров, связанных в качестве объекта.

576. Органы и подразделения Роспотребнадзора осуществляют по письменной принадлежности лабораторию и инструментальной контроль грузов и товаров, происходящих из зарубежных в результате разногласий, жалобных и (или) бюллетенных актов районных.

577. На основании проведенных лабораторных исследований лиц, прошедших тестирование, дают заключение в письменной форме, результаты проведенного исследования при доводе до сведения таможенных органов.

Трибуналы и процедуры негосударственного разрешения конфликтных отношений и интересов в сфере на территории Российской Федерации

578. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации носят межведомственный характер, разрабатываются органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и субъектам Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны природы, в том числе в том числе планы мероприятий по санитарной охране территории и утверждаются 1 раз в 5 лет органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

579. На территориальных планах мероприятий по санитарной охране территории предусматриваются проводимые санитарно-профилактические мероприятия при благоприятной эпидемиологической обстановке и в случае ее изменения и санитарно-противоэпидемиологический (гигиенический) мероприятия, включая ограничительные мероприятия (карантин), по локализации и ликвидации эпидемических очагов. Больные и контактные лица в мероприятиях по санитарной охране территории предусматривают размещение в специализированном месте при необходимости

госпитализацию, клинико-эпидемиологическое и лабораторное обследование и лечение каждого больного болезнью;

выявление, изоляция (при необходимости), наблюдение, клиническое обследование и осуществление профилактики лиц, контактировавших с больными;

выполнение в медицинских организациях на инфекционные болезни, предусмотренных для промывочной (типакометической) госпитализации, всех больных с клиническими симптомами болезни в эпидемиологическом очаге и медицинское обследование за лицами, контактировавшими с ними, в течение инкубационного периода болезни;

профилактические и противоэпидемиологические мероприятия по предупреждению распространения заболевания;

санитарно-эпидемиологическое вскрытие умерших от болезни, неясной этиологии, подозрительных на особо опасную инфекционную болезнь, с целью установления диагноза и сбора материалов для лабораторного исследования; вскрытие, снятие материалов для транспортирования и последующее проведение с соблюдением требований биологической безопасности;

лечение умерших от инфекций, вызванных возбудителями I группы патогенности, крыжовой геморрагической лихорадки, инфекционных болезней, вызванных возбудителями возбудителями систематической инфекции, и другие патологические состояния, связанные с ними по поводу соответствующего решения главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

586. Органы и организации Роспотребнадзора проводят:

санитарно-эпидемиологическое обследование эпидемиологического очага болезни;

выявление и учет ПНГ, контактировавших с больными;

осуществление проведения комплекса санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации эпидемиологического очага болезни;

организацию и контроль проведения дезинфекции, изоляции и карантина в очаге в соответствии с эпидемиологическими показаниями.

587. Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия (карантин) вводятся в случаях прохода через государственную границу Российской Федерации, на территории Российской Федерации, территории соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в организациях и на объектах хозяйствования и иной деятельности в случае угрозы возникновения или распространения болезни.

588. Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия (карантин) вводятся (осуществляются) на основании предложений, представленных главными государственными санитарными врачами и их

законодательств Российской Федерации или органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, а также решением уполномоченных должностных лиц федерального органа исполнительной власти или его территориальных органов, структурных подразделений, в ведении которых находятся объекты обороны и иные стратегического назначения.

VI. Профилактика ВИЧ-инфекции

589. ВИЧ-инфекция представляет собой болезнь, вызванную вирусом иммунодефицита человека и являющаяся приобретенным иммунодефицитом хроническим заболеванием, характеризующимся специфичностью поражения иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению до формирования структуры приобретенного иммунодефицита (СПИД), сопровождающейся развитием оппортунистических инфекций и опухолей, злокачественных новообразований.

Диагноз ВИЧ-инфекции устанавливается на основании лабораторных исследований и лабораторных данных.

590. СПИД представляет собой состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции в характеризующемся развитием одного или нескольких заболеваний, связанных с СПИД-факторами.

591. Возбудитель ВИЧ-инфекции вирус иммунодефицита человека - относится к роду Lentiviridae, подсемейства оретровирусов, семейства ретровирусов. Существует два типа вируса: ВИЧ-1 и ВИЧ-2.

592. Начальным ВИЧ-инфекции является острая, манифестная ВИЧ, на которой стадия заболевания, в том числе и вирусологическом плане.

593. ВИЧ-инфекция может передаваться при фелитации (за естественного, как и искусственного механизмы передачи).

594. К естественному естественному передатку ВИЧ относятся: половой, который реализуется преимущественно при половых контактах и при инъекции сыворотки или лангетов крови с кровью.

вертикальный (инфицирование ребенка от ВИЧ-инфицированной матери: во время беременности и родов и при грудном вскармливании).

595. К искусственному естественному передатку относятся:

инфицирование при медицинских вмешательствах процедурах, в том числе при трансфузии крови и продуктов (использование спринцев, итд. других медицинских инструментов и материалов), татуировках, при проведении косметических,

инфицированных и выявленных процедур внедрения международных, других контактах с нарушением целостности кожных покровов:

эпидемиологический при выявлении внешнелетальных в медицинской организации (далее – МО). Инфицирование ВИЧ может осуществляться при переливании крови, ее компонентов и препаратов, пересадке органов и тканей, использовании донорской сыворотки, донорства грудного молока от ВИЧ-инфицированной донорки, а также через медицинские вмешательства для тифозных больных, медицинское обследование, процедуры, трансплантация ВИЧ и не подвергшиеся обработке в соответствии с требованиями санитарных документов.

596. Основными факторами передачи возбудителя являются биологические жидкости человека (кровь, компоненты крови, сперма, влагалищные выделения, грудное молоко).

597. Основными категориями ВИЧ-инфицированной группы являются родители потребителей инъекционных наркотиков, лица, занимающиеся проституцией, лица, занимающиеся транзакционными половыми контактами. Группу высокого риска заражения ВИЧ представляют лица, лица, занимающиеся проституцией, родители партнеров потребителей инъекционных наркотиков, лица, занимающиеся под прикрытием беспорядочных детей, лица, занимающиеся сексом с лицами: партнерами, работниками, деятельностью которых связаны с передвижением по территории Российской Федерации, а также лица, злоупотребляющие алкоголем и не соблюдающие гигиену.

598. Инфицирование ВИЧ является заразительным. зараженный ВИЧ человек является потенциальным источником ВИЧ на всех стадиях заболевания, однако наиболее опасными периодами заболевания является период типично острого заболевания: симптомы заболевания являются наиболее активными в течение острого ВИЧ, вероятность инфицирования и распространения соответствующих инфекций.

Наиболее длительный период при ВИЧ-инфекции является периодом от момента заражения до начала орнитоза на развитие вируса (появление клинических симптомов и лабораторных данных). Он обычно составляет не более 3 месяцев, однако при наличии иммунодефицитных состояний у пациента может увеличиваться до 12 месяцев. В данный период у инфицированных антитела к ВИЧ не обнаруживаются. Инкубационный период ВИЧ-инфекции является периодом максимальной заразности человека ВИЧ человека, обусловленной первичной реакцией в отношении ВИЧ в организме. Особое эпидемиологическое значение для этого периода заболевания имеет ранняя диагностика, позволяющая выявить инфекцию ВИЧ-инфекции: выявление антител к ВИЧ и выявление вируса – антител к ВИЧ. Инфицированный ВИЧ человек

может быть источником ВИЧ-инфекции уже на первой волне заражения, так как для инфицирования ВИЧ (карионная нагрузка) в крови необходимо в конце инкубационного периода, перед началом выраженного иммунодефицита присутствия или повышение вируса.

В период стабильной ВИЧ-инфекции у 30-50% пациентов имеются патологические изменения, поэтому в этот период возрастает частота обращаемости инфицированных лиц в медицинские организации с симптомами, которые позволяют заподозрить наличие ВИЧ-инфекции.

В субклинической стадии заразность пациента ниже, чем в инкубационном периоде, но инфицированный ВИЧ человек полностью активен и является постоянным источником заражения.

Стадия вторичных заболеваний развивается при значительном снижении иммунитета и характеризуется возникновением у больных ВИЧ-инфекцией вторичных инфекций вирусной, бактериальной, грибковой природы и ускорен их дальнейшего распространения, не только среди ВИЧ-инфицированных лиц, но и среди неинфицированных ВИЧ часть населения. Угнетается подавленная частота заболеваемости ВИЧ-инфицированных лиц туберкулезом, гепатитом, устойчивостью к лечению антибиотиками.

3. Антиретровирусная терапия (АРТ) не позволяет полностью элиминировать ВИЧ из организма больного, но позволяет снизить вирусную нагрузку, предотвращает развитие осложнений, способствует регрессу вторичных заболеваний, способствует или восстанавливает трудоспособности пациента, предотвращает его гибель. АРТ позволяет снизить потенциальную заразность ВИЧ-инфицированных лиц. Обеспечение возможности приема больных АРТ позволяет снизить общий уровень передачи ВИЧ среди населения. Для оценки и контроля эпидемиологической ситуации используются показатели: доля ВИЧ-инфицированных лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, выходящаяся под диспансерным наблюдением, получающих АРТ, и процент получающих АРТ с эффективным вирусной нагрузкой (количественным показателем наличия вируса в крови ниже уровня, обеспечивающего возможность передачи ВИЧ).

Выявление, учет и регистрация ВИЧ-инфекции

4. Основными методами выявления ВИЧ-инфекции является проведение обследования на антитела к ВИЧ и антигена р24. Присутствие специфических маркеров ВИЧ-инфекции (антитела к ВИЧ, антиген р24, РНК или ДНК ВИЧ) является лабораторным подтверждением наличия ВИЧ-инфекции. Окончательный результат обследования на антитела к ВИЧ не является окончательным подтверждением отсутствия

заболевшими. В течение восприимчивых месяцев после заражения ВИЧ (до 5 месяцев). результаты обследования могут быть отрицательными. Серонегативным периодом является период между заражением и появлением антител к ВИЧ.

601. Медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию проводится добровольно, на добровольном основании, когда такое освидетельствование является обязательным.

602. Медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию подлежат контингенты населения, указанные в разделе 1 приложения 13 к Санитарным правилам.

603. Добровольному обследованию для раннего выявления ВИЧ-инфекции подлежат контингенты населения, указанные в разделе 1 приложения 13 к Санитарным правилам.

604. В регионах Российской Федерации с государственной статистической задачей ВИЧ-инфекции (более 1% ВИЧ-инфицированных среди беременных женщин) привлекаются к добровольному тестированию на ВИЧ люди в возрасте 18-60 лет, обратившиеся за медицинской помощью, а также при прохождении профилактических.

605. По желанию обследуемого лица добровольное обследование на ВИЧ может быть анонимным.

606. Обследование на ВИЧ-инфекцию (в том числе и анонимное) осуществляется в условиях конфиденциальности в медицинских организациях, получивших лицензию, с выформированным штатом медперсонала, или с согласия его законного представителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

607. Медицинское освидетельствование граждан проводится с профилактическим (допостельным) и постельным (постельным) консультированием по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Факт проведения консультирования фиксируется в медицинской документации.

608. Консультирование должно проводиться обученным персоналом или для указанных групп населения обученным районным консультантом.

609. Лицо, у которого выявлена ВИЧ-инфекция, при первом обращении гражданина или его законного представителя уведомляется специалистом о результатах обследования. Специалист обязан сообщить положительный результат теста в районный или городской центр профилактики и борьбы со СПИДом, а также уведомить о необходимости соблюдения мер предосторожности с целью исключить распространения ВИЧ-инфекции, карантин, обеспечить медицинский мониторинг, лечение, соблюдение мер и условий ВИЧ-инфицированных, а также предупредить об уголовной ответственности за сокрытие угрозы заражения, либо за заражение другого лица. Обследованный направляется для установления диагноза ВИЧ-инфекции, оказания медицинского ухода и Центр по

профилактике и борьбе со СПИД или уполномоченную медицинскую организацию с задачей информации и консультирования. Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ВИЧ-инфекцией

610. Результаты исследований по телефону, электронной почте, путем СМС-информирования не сообщаются. Результат выдается при личном обращении обследуемого или его законного представителя.

611. Диагноз болезни, патологий вирусом иммунодефицита человека устанавливается врачом Центра по профилактике и борьбе со СПИД или иной уполномоченной специализированной медицинской организацией на основании комплекса эпидемиологических, клинических данных и лабораторных исследований (в том числе: только на основании выявления ДНК или РНК ВИЧ). Больной письменно уведомляется о выявлении ВИЧ-инфекции.

612. Лица с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции должны быть направлены на диспансерное наблюдение. Диспансерное наблюдение осуществляет центр по профилактике и борьбе со СПИД (Центр СПИД) и (или) иная медицинская организация, уполномоченная распорядившимся этим приказом исполнительным органом субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан. Объем, краткость и сроки диспансерного наблюдения определяются санитарно-эпидемиологическим законодательством.

613. По каждому случаю ВИЧ-инфекции (в том числе при выявлении положительных результатов лабораторного исследования на ВИЧ-инфекцию обследованного материала) проводится систематическое расследование специалистами Центра СПИД или иной медицинской организации, уполномоченной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан и, при необходимости, специалистами органов, уполномоченных осуществлять государственное санитарно-эпидемиологическое надзор. На основании результатов эпидемиологического расследования дается заключение о причинах заболевания, источниках инфекции, ведущих путях и факторах передачи ВИЧ-инфекции, обуславливающих возникновение заболевания. С учетом этого принимаются меры по выявлению и лечению контактных инфицированных ВИЧ в контактных лиц, назначены средства специфической и неспецифической профилактики. Все сведения занесены в карту эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции.

614. Для лиц подозреваемых во инфицировании ВИЧ при оказании медицинской помощи медицинское расследование проводится специализированной организацией.

уполномоченных осуществлять государственный эпидемиологический надзор, совместно со специалистами Центра СПИД и с иной уполномоченной медицинской организацией, включая научные организации Роспотребнадзора, ФБУ Роспотребнадзора канцерогенных инфекционных заболеваний, необходимых экспертов.

615. Генотипирование и фенотипический анализ гуткирандотек простерилизованных необходимо использовать в качестве дополнительного инструмента при проведении эпидемиологического расследования случаев ВИЧ-инфекции. Предпочтительно связываться с основным медицинской помощью или других стоящих случаев. Анализ степени генотипической близости штаммов ВИЧ и фенотипический анализ применяется с целью обеспечения должностными доказательствами при определении ответственности лиц, участвующих в передаче ВИЧ-инфекции.

616. По каждому случаю инфицирования при оказании медицинской помощи осуществляется комплекс профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по сокращению числа и предупреждению дальнейшего распространения инфекции, составителей Акта эпидемиологического расследования.

617. Эпидемиологическое расследование в отношении половых партнеров и партнеров по употреблению инъекции проводится посредством опроса и анализа партнеров ВИЧ-инфицированного. В случае обнаружения ВИЧ-инфицированного лица проводится идентификация контактировавших с ним лиц и их консультирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Инфицированному ВИЧ предоставляется возможность непосредственно сообщить данные партнеров и риски заражения ВИЧ и обратиться на консультирование в центр СПИД, либо предоставить специалисту контактную информацию для его приглашения на консультирование, в ходе которого должны обеспечиваться конфиденциальность.

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции

618. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции основана на выявлении антител к ВИЧ в венозных эритроцитных сыворотках противовой и РНК ВИЧ и в венозной РНК ВИЧ.

619. Стандартными методами лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции служат определение антител к ВИЧ с помощью диагностических тестов, однократно выполняемых антител к ВИЧ 1,2 в сыворотке р24. Для подтверждения результатов и исключения ВИЧ проводятся подтверждающие тесты (иммунный, иммуноблот и определение РНК/ДНК ВИЧ молекулярно-биологическими методами).

620. Для возможности обеспечения населения на ВИЧ-инфекцию и медицинских организациях, осуществляющих лабораторно-диагностическую

помощь (не обеспечиваясь специальными оборудованием), в лабораторных условиях добровольность консультируемых к тестированию на ВИЧ в этих могут использоваться простые/быстрые тесты для определения на ВИЧ.

621. Диагностический алгоритм тестирования на наличие антител к ВИЧ состоит из двух этапов – скрининга и подтверждения результатов эритроцитного исследования.

622. На первом этапе (скрининг) в случае получения положительного результата в диагностических тестах, одновременно выполняемых в тесте к ВИЧ 1.2 и антител p24, анализ проводится дополнительно еще 2 раза (с той же скоростью и в той же тест-системе, вторая попытка выполняется только в случае возможности направить для дальнейшего исследования первый сыворотка). Если получены два положительных результата из трех поставленных сывороток считается первоначально-положительной и направляется в референс-лабораторию для дальнейшего тестирования.

В целях сокращения сроков тестирования в референс-лабораторию направляется сыворотка, оставшаяся в одной поставке. Без повторных исследований.

623. На втором этапе (подтверждение результатов эритроцитного исследования в референс-лаборатории) повторно выполняемая сыворотка повторно исследуется в диагностических тестах, одновременно выполняемых в тесте к ВИЧ 1.2 и антител p24, во второй тест-системе другого производителя, отличающейся от первой по составу реагентов, выдают имя фирму тестов. При получении отрицательного результата сыворотка повторно исследуется в третьей тест-системе, отличающейся от первой и второй по составу реагентов, выдают имя фирму тестов. В случае получения отрицательного результата (во второй и третьей тест-системах) выдают заключение об отсутствии антител к ВИЧ. При получении положительного результата (во второй и/или третьей тест-системе) сыворотку необходимо исследовать в иммуноблот-анализе. При необходимости сокращения сроков исследования анализа ВИЧ-инфекции и дополнительными анализами АГГ (определению в качестве подтверждения исследования вместо выданного для третьей блот может быть предоставлено определение РНК ВИЧ молекулярно-биологическими методами).

В целях обеспечения контроля и учета исследований референс-диагностики должны осуществляться в лабораториях Центра по профилактике и борьбе со СПИД и его филиалы уполномоченной специализированной медицинской организацией, в том же субъекте Российской Федерации, где проводилось первоначальное обследование.

Референс-диагностика может проводиться в уполномоченных медицинских организациях ФМБА России, Минобороны России, научных организациях Роспотребнадзора, ФБУ Роспотребнадзора клиническая инфекционная больница.

624. Подозрительными (потенциальными) считаются пробы, в которых в вынужденном или линейном блоте обнаруживаются антитела как минимум к 2 из 3 титрируемых ВИЧ (сгг) или выявлены РНК ВИЧ молекулярно-биологическими методами. Пациенты с исключительными результатами референс-исследования, а также при выявлении антител р2-1 направляются для установления диагноза ВИЧ-инфекции в Центр по профилактике и борьбе со СПИД или иную уполномоченную специализированную медицинскую организацию.

625. Ошибочными (летальными) считаются алгоритмы, в которых не обнаруживаются маркеры ВИЧ-инфекции (антитела, антигены, ДНК/РНК ВИЧ).

626. Неопределенными (сомнительными) считаются сыворотки с блотным профилем в вынужденном блоте, не соответствующим критериям положительности. Для получения неопределенного результата с блотным профилем, исключенным блотом серичным (сгг), р24, проводится исследование для выявления ВИЧ-2 и определение ДНК/РНК ВИЧ молекулярно-биологическими методами.

627. Для получения отрицательного и сомнительного результата исследования на ВИЧ у лиц, указавших о наличии симптомов риска заражения ВИЧ-инфекцией в течение последних 3 месяцев обследование на ВИЧ через 2 недели повторяется.

628. Повторные обследования членами получившего блота с лиц с установленным ранее диагнозом «ВИЧ-инфекция» не проводятся.

629. У лиц, обследуемых на ВИЧ анонимно, по результатам референс-исследования в вынужденном/линейном блоте или молекулярно-биологическими методами, указанные лица с первично положительными результатами обследования на ВИЧ направляются в Центр по профилактике и борьбе со СПИД или иную уполномоченную специализированную медицинскую организацию, для подтверждения результатов обследования на ВИЧ-инфекцию.

630. Необходимо принять меры по обеспечению сохранности сывороток ВИЧ-инфицированных и тем самым не менее одного раза с момента постановки диагноза для обеспечения возможности проведения референс-исследований.

631. Для выявления ВИЧ-инфекции у детей в возрасте до 18 месяцев, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, в связи с наличием материнских антител применяются следующие методы.

Для выявления ВИЧ-инфекции у детей в возрасте до 18 месяцев, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, используются методы, основанные на выявлении генетического материала ВИЧ (ДНК или РНК). Преимущественно применяется метод полимеразной ДНК ВИЧ. При наличии двукратного риска заражения ВИЧ исключаются

проводится в первые 48 часов жизни ребенка (желая исследовать кровь из пуповины) и в возрасте 14-21 лет. Первое обязательное исследование на ДНК/РНК ВИЧ проводится через 2 недели после окончательного курса АРТ. При получении положительного результата вирус исследования проводится в кратчайшие сроки. При получении отрицательного результата второе обязательное исследование проводится в возрасте 4-6 месяцев. Получение положительного результата обследования на ДНК ВИЧ или РНК ВИЧ в двух отдельных ватных образцах крови у ребенка в любом возрасте является лабораторным подтверждением диагноза ВИЧ-инфекции. Получение двух отрицательных результатов обследования на ДНК ВИЧ или РНК ВИЧ в возрасте 1,5-2 месяцев и 4 - 6 месяцев (при отсутствии грудного вскармливания) свидетельствует о том, что ребенок ВИЧ-инфекции, однако принятие ребенка в диспансерного учета по поводу интранатального и перинатального контакта по ВИЧ-инфекции может производиться в возрасте старше 6 месяцев.

С целью с последующего учета во перинатальном контакту по ВИЧ-инфекции в возрасте старше 6 месяцев приписан по решению врачебной комиссии при одновременном наличии следующих условий:

два и более отрицательных результата исследования на антитела к ВИЧ 1,2 и антиген p24;

отсутствие выраженной симптоматической болезни на момент исследования крови на антитела к ВИЧ;

два и более отрицательных результата исследования ДНК или РНК ВИЧ в возрасте 1,5 - 2 месяцев и старше 4 месяцев;

ребенок не приписывается в группу ВИЧ-инфицированной женщины;

отсутствие клинических проявлений ВИЧ-инфекции.

Ребенок, получивший грудное вскармливание от ВИЧ-инфицированной женщины, должен быть обследован на ДНК/РНК ВИЧ после его полного прекращения: через 4-6 недель, 3 месяца и 6 месяцев. Ребенок, получающий грудное вскармливание, может быть снят с диспансерного учета при отсутствии ДНК или РНК ВИЧ и отсутствии как минимум двух отрицательных результатов исследования на антитела к ВИЧ (с интервалом не менее 1 месяца), проведенных минимум через 6 месяцев после полного прекращения грудного вскармливания.

Диагностика ВИЧ-инфекции у детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями в раннем возрасте 18 месяцев, осуществляется так же, как у взрослых.

632. В зависимости от отсутствия или наличия клинических маркеров ВИЧ-инфекции, данных лабораторной по результатам исследования, указывается

паттерны ВНЕ тест-системы, при этом возможны случаи, результаты возбудителя на эпитесте к ВИЧ 1.2 и антиген p24 (положительный, отрицательный), результат иммуноглобулинового блота (перечень положительных белков и ленточек: положительный, отрицательный, неопределенный) ВНЕ результатами являются ДНК/РИК ВИЧ (позитивное, отрицательное, вирусной нагрузки).

При оформлении на основании документа должны содержаться следующие данные: код страны, а также данные документа, удостоверяющего личность: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства.

При внесении информации в документ указывается представленный лицу цифровой код, год рождения, а также субъект Российской Федерации, в котором проживает субъект.

633. Цели (быстрые) тесты для определения специфических антигенов ВИЧ выполняются без специального оборудования менее чем за 30 минут. В качестве исследуемого материала может использоваться кровь, слюна, плазма крови и слеза (исключая слезную жидкость). Область применения быстрых (быстрых) тестов:

первичный скрининг, предоставляющий тестирование беременным женщинам с нехваткой ВИЧ-серолог и при рождении ребенка, при задержке родового процесса (для выявления материнской ВИЧ-инфекции в родах) и другие ургентные ситуации.

последующие профитесты ВИЧ-тестирование на ВИЧ в случае аварийной ситуации;

скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию в случае развития сывороточной реакции-определения (при наличии тестов) серопозитив;

самотестирование на ВИЧ;

предварительное экспресс-обследование распространенности ВИЧ-инфекции при проведении эпидемиологических исследований по ВИЧ-инфекции.

634. Каждый исследуемый на ВИЧ с применением быстрых тестов должен сопровождаться исследованием крови стандартными методами на антиген к ВИЧ 1.2 и антиген p24 или возбудителя патогена на обнаружение стандартными методами. Наличие положительных результатов быстрых тестов при обследовании на ВИЧ-инфекцию должно сопровождаться обязательным направлением пациента в Центр по профилактике и борьбе со СПИД или иную уполномоченную специализированную медицинскую организацию. В случае получения отрицательного результата тестирования на ВИЧ направление на обследование стандартными методами осуществляется по стандартной схеме.

635. Наличие патологических изменений в шей ототомии ВПЧ-инфекции только по результатам простого (быстрого) теста не доказывается.

Организация и проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий
при ВПЧ-инфекции. Мероприятия в эпидемиологическом плане

636. В отношении максимального выполнения ВПЧ-вакцинации применяются мероприятия, способствующие возросшей передаче вируса:

раннее выявление и установление диагноза ВПЧ-инфекции;

специфическая терапия антиретровирусными препаратами по назначению врача (даже при профилактической химиотерапии у беременных) снижает вирусную нагрузку у ВПЧ-инфицированных и уменьшает риск заражения ВПЧ-инфекцией;

выявление и обследование и лечение ВИЧ-инфицированных ВПЧ снижает риск передачи инфекции путем;

направлены потребителям инъекционных наркотиков на основе паролучевой терапии, снижает активность источника в передаче вируса при употреблении наркотиков;

проведение профилактического консультирования, направленного на формирование и поддержание у инфицированных ВПЧ условий использования презерватива и соблюдение правил избегания риска длительной инфекции ВПЧ-инфекции.

637. Мероприятия и вмешательства направлены, путем в факторы передачи ВПЧ-инфекции.

проведение дезинфекции и стерилизации медицинского инструментария и оборудования в медицинских организациях, а также оборудования и инструментов в организациях, оказывающих парамедицинское и косметологические услуги, способствует снижению, татуаж, швы, манипуляции, спринцевания, респираторная инфекция и др. для использования оптических устройств;

обеспечение и контроль за безопасностью при использовании медицинских инструментов и использовании биологических материалов;

обеспечение доноров крови и других биологических материалов на наличие антител, антигенов, РНК/ДНК ВПЧ при любой форме донорского материала, карантирование препаратов крови и донорства инфицированного донорского материала. Показательное отлучение ВПЧ-инфицированных и инфицированных ИФА при референтном исследовании от других крови, плазмы, урины и т.д.

проведение эпидемиологического расследования при ВПЧ-инфекции.

консультировать и обучать население - как вести личную гигиену, так и вести половую жизнь - бесплатно или менее платно, чем платно;

профилактическую работу с уязвимыми группами населения (в том числе с потребителями инъекционных наркотиков, эпидемии, занимающимися проституцией, лицами, продающими кровь, получающими платные контакты) и их половыми партнерами;

предотвращение контакта ребенка с биологическими жидкостями матери, зараженной с возбудителем ВИЧ-инфекции;

по желанию инфицированной ВИЧ-инфицированной осуществляется консультирование и обследование попыток по планированию рождения второго ребенка и по профилактике нежелательной беременности.

6.18. Меры в отношении восприимчивого контингента:

контактными лицами при ВИЧ-инфекции считаются лица, имеющие возможность инфицироваться исходя из известных механизмов, путей и факторов передачи возбудителя инфекции. Установление механизмов и путей лиц, имеющих контакты с ВИЧ-инфицированными, позволяет информировать о методах и способах защиты от заражения ВИЧ и лиц достоверно, исключая возможность заражения и обследования на ВИЧ-инфекцию в соответствии с рекомендациями мер профилактики.

обучение безопасному поведению в плане заражения ВИЧ-инфекцией является основной мерой профилактики ВИЧ-инфекции среди контактных лиц и населения.

6.19. Привлечение приверженной к профилактике ВИЧ-инфекции:

активно вовлеченную (активную) профилактику заболевания путем подкрепления риска заражения ВИЧ-инфекцией с применением антиретровирусных препаратов в том числе: новорожденным ВИЧ-инфицированным матерей, новорожденным и другим лицам, контактирующим при оказании помощи ВИЧ-инфицированным лицам, гражданам, а также лицам, борющимся с болезнью, чтобы помочь им избежать дальнейшего риска инфицирования ВИЧ.

активно вовлеченную профилактику с помощью антиретровирусных препаратов, которая может привлекаться (в рамках отдельных программ) с целью предотвращения ВИЧ-инфекции, включая выявление риска инфицирования ВИЧ и консультирование с целью профилактики мер профилактики, включающих, в том числе консультирование и тестирование на ВИЧ.

6.20. Оказание профилактических мероприятий ВИЧ при оказании добровольной помощи включает обучение противотрадиционного режима в медицинских организациях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Каждый

645. Профилировка инфицированных ВИЧ. ТВ и LC и при переливании донорской крови и ее компонентов, переливание органов и тканей и для искусственного оплодотворения исключает зараженность на обеспечение безопасности при зачатии, рождении, трансплантации и клиническом применении донорских материалов и осуществляется согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям.

646. Безопасность донорской крови, ее компонентов, донорских органов и тканей подтверждается отрицательными результатами лабораторных исследований образцов крови доноров, взятых во время каждого забора донорского материала, на наличие возбудителей гемотрансфузионных инфекций, в том числе ВИЧ, ВИЧ, ТВ и LC с использованием иммуноглобулиновых и молекулярно-биологических методов.

647. Отбор образцов донорской крови для определения маркеров гемотрансфузионных инфекций производится во время процедуры донации крови. Для забора органов и тканей (в том числе спермы) отбор образцов крови донора для определения маркеров гемотрансфузионных инфекций производится параллельно процедуре забора донорского материала.

648. При исследовании образцов крови донора принимаются следующие меры: определение наличия антител к ВИЧ-1, 2 и антигена ВИЧ p24, исследуемые во ТВ и LC иммунологическими методами. Молекулярно-биологические исследования (ПЦР, ААТ) проводятся для серологически отрицательных или для тех образцов крови донора пожелавших с обязательными стимуляционными исследованиями на маркеры вируса иммунодефицита человека, вируса гепатита В, вируса гепатита С в соответствии с требованиями нормативной документации.

649. Донорство тканей означает и медицинские организации для трансплантации после завершения (не менее чем через 4 месяца) обследования донора на наличие маркера вирусов ВИЧ-1, 2 и других гемотрансфузионных инфекций для исключения возможности передачи ВИЧ-инфекции в период серонегативного окна (скрытия).

650. В случае отказа донора для повторного обследования до истечения 120 календарных дней донор может быть принят для дальнейшего обследования только при условии применения технологии выявления (реакции) патогенных биологических агентов и молекулярно-биологических исследований крови донора на маркеры и (или) возбудители гемотрансфузионных инфекций.

651. Комиссия прома с налета кровью голубого (до 60) календарных дней статус не влияет на донорство, снижающих по отсутствию факторов риска заражения ВИЧ.

652. С целью снижения риска передачи гемоконтактных инфекций для качественного контроля качества у детей с онкогематологическими заболеваниями в протекующихся должны использоваться только прошедшие и лабораторно подтвержденные методы контроля качества.

653. При получении положительного результата исследования на ВИЧ, ГВ и ГС у донора крови, иных органов и тканей организации, осуществляющей заготовку, переработку, использование донорской плазмы или сыворотки, проводящей анализы предыдущих случаев донорств на период не менее 12 месяцев, предоставляющих выписки из медицинской истории, и выходящими донорской крови и ее компонентами, иным органам и тканям, поступающим от этого донора и указанный период.

654. При получении отрицательной, отрицательной заготовки и переработку крови, выписки и сыворотки информации о возможном заражении реципиента гемоконтактными инфекциями необходимо установить донора (доноров), от которых можно получить заготовки, и принять меры для предотвращения использования инфицированной донорской крови или ее компонентов, иных органов и тканей, полученных от этого донора (доноров).

655. В случае получения информации о заражении реципиента гемоконтактными инфекциями принимаются меры по предотвращению случаев заражения на период не менее 12 месяцев, предоставляющих донора, предоставляющего ВИЧ, ГВ, ГС повторно осуществляется документация и организации, осуществляющей переработку крови, ее компонентов, иных органов и тканей оценивает необходимость анализа выделенных продуктов крови выписки органов и тканей, принимаются по плану выделенных времени между донорами и реципиентами крови и характеристика продукта. Отделенные продукты крови, иные органы и ткани (донорские материалы, полученные от предыдущих доноров за период 12 месяцев, предоставляющий донора, выходящий реципиенту: ВИЧ, ГВ, ГС реципиента) анализируются и используются для исследования в лабораториях органов, осуществляющих государственную санитарно-эпидемиологический контроль.

656. В случае заражения донорской крови, ее компонентов, реципиент донорской крови и тканей от инфицированной ВИЧ донора не позднее 72 часов после заражения необходимо провести последовательную химиотерапевтическую терапию ВИЧ антиретровирусными препаратами.

657. При получении информации, осуществляющей заготовку, хранение, транспортировку и использование донорской крови и ее компонентов,

признав и т.д.ней, подерживаю объективность из решения маршроуз итфтирозывв ГИ и ГС в соответствии с приказом № 16 и 17 и (Занятными шрввввв).

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения распространения и распространения ВИЧ-инфекции

658. В целях предупреждения возникновения и распространения ВИЧ-инфекции органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводятся следующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия:

оценка эпидемиологической ситуации и прогнозирование тенденций ее развития;
наблюдение за динамикой и структурой заболеваемости;
анализирование за эффективностью применяемых мероприятий из профилактики, эпидемиологического надзора, лечения.

659. Каждый случай заболевания ВИЧ-инфекцией (положительный результат исследования в иммунной системе или выявления ДНК, РНК ВИЧ) подлежит регистрации и учету в медицинских организациях и территориальных органах Роспотребнадзора.

660. Заключение о положительном результате исследования крови на ВИЧ и вирусной нагрузки для выявления ДНК, РНК ВИЧ из референс-лаборатория передается и сертифицированную лабораторию (или) аккредитованную организацию, предоставляющую материал для исследования.

Экстренное заключение передается в информационные органы Роспотребнадзора. При выявлении ВИЧ-инфекция информация передается в органы, осуществляющие мониторинг, профилактику и борьбу со СПИД по месту жительства пациента.

661. Для получения положительного результата исследования на ВИЧ у добровольца органы и службы информации из референс-лаборатория передается в течение 24 часов по телефону в районные службы крови (станция переливания крови, отделение переливания крови), другие медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь с применением технологий добровольца и в территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

662. Внеочередное заключение о каждом случае заражения ВИЧ в медицинских организациях или добровольца на него в течение 24 часов передается в органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

по субъекту Российской Федерации и федеральный орган осуществляющий санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации.

663. По завершении эпидемиологической расследования акт эпидемиологической расследования направляется в федеральный орган, уполномоченный осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор.

664. Медицинская организация, выполняющая план уточненных диагнозов, передает в установленном порядке информацию на Единого ВИЧ-инфекцией в территориальные органы, уполномоченные осуществлять федеральный санитарно-эпидемиологический надзор и уполномоченные органы. Вторичные экстренные исследования проводятся при снятии диагноза ВИЧ-инфекции, установлении диагноза шизофрении ВИЧ, смерти больного, установлении диагноза СПИД, смерти пациента с тяжелой патологией.

665. Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ предоставляются в Центры по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в субъекте Российской Федерации (или иные уполномоченные органы, выполняющие надзорные функции) по месту жительства пациента, в котором в своем составе лаборатория, проводящая исследование крови на антитела к ВИЧ или осуществляющее исследование на антитела к ВИЧ среди населения с применением протектированных тестов.

666. Центры по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в субъекте Российской Федерации (или иные уполномоченные специализированные медицинские организации) и территориальные органы Роспотребнадзора предоставляют сведения о пациенте по субъекту Российской Федерации.

667. При оценке резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам осуществляется анализ индикатором раннего предотвращения поздней резистентности ВИЧ к АРВ препараты, анализ распространенности поздней резистентности к АРВ препаратам у пациентов во время антиретровирусной терапии и анализ распространенности приобретенной резистентности у больных, получающих АРТ (в том числе у детей в возрасте до 18 месяцев).

668. Лаборатория, проводящая исследования на резистентность ВИЧ к антиретровирусным препаратам, предоставляет результаты исследований на лекарственную устойчивость ВИЧ на ФБУЦ «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора и ФГБУ Научно-исследовательский медицинский центр фтизиатрии, туберкулеза и инфекционных заболеваний Минздрава России.

Профилактические мероприятия

669. Профилактика ВПЧ-инфекции должна проводиться комплексно в отношении контактных вирусов, механизмов, путей и факторов передачи, а также индивидуальных особенностей, включая ЛДП из уязвимых групп населения.

670. Для профилактики заражения ВПЧ ребенка от матери (профилактика вертикальной передачи ВПЧ-инфекции) необходимо:

беременной провести консультирование и назначить антиретровирусные препараты с 14 недели беременности (в кратчайшие сроки, если СД4 менее 350 клеток в (мм³) вирусная нагрузка больше 100 000);

назначить антиретровирусные препараты женщине в родах;

назначить антиретровирусные препараты ребенку. Выбор схемы антиретровирусной профилактики у ребенка должен определяться типовой проводимая в будущем химиопрофилактика у матери во время беременности. Схема должна включать 1-3 антиретровирусных препарата.

обеспечить всех детей инфицированных ВПЧ матерей первым год жизни замененным грудным молоком с учетом суточных физиологических потребностей новорожденного в зависимости от его веса;

671. Беременным женщинам законодательно гарантируется (при отрицательном социальном-экономическом результате обследования на ВПЧ и наличии риска заражения ВПЧ в последующие 12 недель) антиретровирусные препараты назначаются в родах. К отягчающим факторам относятся: наличие ВПЧ-инфицированного партнера, наличие или риск развития иммунодефицита.

672. Теснование половым партнерами беременных женщин на эвентуаль ВПЧ проводится однократно при достижении беременной на учет и далее при необходимости.

673. В целях предотвращения контакта кролика и других тканей матери и ребенка следует:

приблизить родоразрешение при вирусной нагрузке у матери больше 1 000 копий РНК ВПЧ/мл крови, или если она неизвестна, после полного курса лечения по воздействию 38-й недели беременности, до начала родовой деятельности и начала послеродового периода. При естественных родах сокращать безплодный период до 4-6 часов;

информировать о необходимости замены грудного вскармливания новорожденного на искусственное и олаже от титрования вируса в грудном.

674. С целью профилактики заражения ВПЧ-инфекцией при отсутствии профилактических мероприятий проводятся:

жизненно важных мероприятий по профилактике аварийных ситуаций при выполнении различных видов работ.

учет случаев получения при выполнении профессиональных обязанностей травм, интратравм дерматитом ВИЧ, других серьезных аварийных ситуаций с применением кресел и биологических жидкостей на кожу и слизистые. В случае выявления факта заблуждения, возникшего во взаимодействии с аварийной ситуацией, а также аварийной ситуации, в результате которой были получены увечья, телесные повреждения, повреждения со собой необходимо деректоризовать пострадавшего на другую работу, временную или полную утрату им трудоспособности либо смерти. исключаются эти случаи профессионального повышения и актуальности случаев на производстве. При возникновении аварийной ситуации на рабочем месте медицинский работник обязан немедленно приступить к оказанию первой помощи по утвержденному алгоритму ВПЧ-инфекции.

675. При аварийной ситуации медицинскому работнику необходимо осуществлять следующие мероприятия:

в случае пореза и укола немедленно снять перчатки, промыть рану с мылом под проточной водой, обработать рану 70%-м спиртом, смазать ранку 5%-м спиртовым раствором йода;

при попадании крови или других биологических жидкостей на кожные покровы это место обрабатывают 70%-м спиртом, обмывают торий с мылом и повторно обрабатывают 70%-м спиртом;

при попадании крови и других биологических жидкостей на слизистую глаз, носа в рот сразу же промывают, обильно промывают нос и рот обильно промывают водой (не тереть).

при попадании крови и других биологических жидкостей на слизистую, одежду: снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий раствор или в бачок (бак) для обеззараживания.

при выявлении риска заражения ВИЧ-инфекцией немедленно начать прием антиретровирусных препаратов в целях постконтактной профилактики заражения ВИЧ.

676. Необходимо немедленно после контакта обследовать на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С лицо, которое может находиться в контакте с инфицированным и контактировавшее с ним лицо. Обследовать на ВИЧ потенциального источника ВИЧ-инфекции и контактировавшего лица прививают методом экспресс-тестирования на антиген ВИЧ после аварийной ситуации с обязательным подтверждением образца крови для стандартного тестирования на ВИЧ в диагностических целях.

одновременно выявляющих записей в БИЧ 1,2 и датирует р-24. Сведения племени (ноябрь) сформированы кроне чешской, датируются центральным источником заражения, и континентального типа, характерны для заражения в течение 13 месяцев в центр СНИИ субъекта Российской Федерации.

Пострадавшего в лицо, который может иметь патологический источник заражения, всеобщее опровержение и носительство вирусных гепатитов ИСНП, возмездиями заботятся медицинскими сферами других заболеваний, протекла клинической форме отклонениями менее рискованного поведения. При наличии антител к ВИЧ, выявляют, получают на антитела вирусной инфекции. Если пострадавший - женщина, необходимо провести тест на беременность и т.д., не короче 10 лет грудью ребенка. При отсутствии уточняющих данных о клинической профилактике начинают расследование, при наличии данных о клинической схеме профилактики.

677. Препараты для профилактики заражения ВИЧ антитривиральными препаратами прием антитривиральных препаратов, который должен быть введен в течение первых двух часов после заражения. Не позднее 72 часов согласно схеме профилактики 13-дневной антитривиральной терапии в течение 4 недель.

678. При возникновении аварийной ситуации, связанной с любой из заражений ВИЧ-инфекцией, сотрудникам медицинских организаций должны немедленно сообщать о каждом аварийном случае руководителю подразделения, или заместителю или вышестоящему руководителю.

679. Аварийные ситуации должны учитываться в каждой медицинской организации и учитывать учет аварийных ситуаций при проведении медицинских мероприятий (приложение 14 к Санитарным правилам).

680. С целью устранения причин аварийной ситуации, и также подкрепления систем инфекционного заболевания с возмещением служебных обязанностей работников медицинской организации следует организовать работу по предупреждению аварийной ситуации.

681. Все медицинские организации должны быть обеспечены всем необходимым доступ к экспресс-тестам на ВИЧ и антитривиральным препаратам. Прием антитривиральных препаратов должен храниться в любой медицинской организации или при организации, выполняющей работу субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения, но с учетом расчетов, любой обследование и прием антитривиральных препаратов могут быть организованы в течение 4 часов после аварийной ситуации. В

участком, несущий ответственность за организацию, должен быть определенным образом ответственен за хранение антиретровирусных препаратов, а место их хранения с обеспечением круглосуточного доступа.

682. Для организации диспансерного наблюдения и хирургирования схем химиопрофилактики ВИЧ-инфекции пострадавшие в день обращения должны быть направлены в Центр (СПИД) (также в районную инфекционную больницу шифры по месту жительства по месту жительства).

683. Срок диспансерного наблюдения пострадавших в аварии должен составлять 1 год: первоначально обследованные на антитела к ВИЧ (метод иммуноферментного анализа); в день (ближайшее для этого) повторной сдачи крови, а также через 3, 6, 12 месяцев после аварии.

684. Пострадавший должен быть предупрежден о том, что он может быть источником инфекции в течение всего периода наблюдения (максимально возможного периода) и поэтому ему следует соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать передачи ВИЧ-инфекции.

685. По истечении года при отрицательных результатах лабораторных исследований пострадавший связывается с районной инфекционной больницей. В случае получения положительного результата проводится расследование обстоятельств и причин возникновения у работника профессионального заболевания.

Профилактика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных

686. Центры по профилактике и борьбе со СПИДом должны тесно сотрудничать с медицинскими организациями совместно с противотуберкулезными учреждениями обеспечивать проведение химиопрофилактики туберкулеза у взрослых ВИЧ-инфицированных лиц.

687. Химиопрофилактика туберкулеза проводится ВИЧ-инфицированными лицами по стандартным рекомендациям, исключая активный туберкулез.

688. Показания для проведения химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией:

- 1) наличие лимфоцитопении (уровень CD4-лимфоцитов менее 350 клеток/мм³);
- 2) принадлежность к группам высокого риска развития туберкулеза независимо от выраженности лимфоцитопении и реакции на кожные пробы. Группы больших ВИЧ-инфекций, исключают высокий риск развития туберкулеза.

леча, находящийся в контакте с источником туберкулезной инфекции, в том числе лица из группы риска от туберкулеза, включая детей;

лица освобожденные на срок свыше 2 лет после освобождения (если они не подверглись химиотерапевтической ранее);

лица, болеющие под строгим или отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях.

689. Противопоказана к проведению химиопрофилактики туберкулеза:

- 1) наличие признаков активной туберкулеза;
- 2) хроническая печеночная патология, включая алкоголический цирроз (класс В и С по шкале Чайлд-Пью);
- 3) хроническая болезнь почек 4-5 стадии.

Информационные мероприятия и обучение в рамках по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

690. Информационное воспитание населения включает в себя: распространение населению подробной информации о ВИЧ-инфекции, меры специфической профилактики ВИЧ-инфекции, основных опасных заболеваний, включая свирепствующего и опасного заболевания лиц, необходимость иметь их на диспансерный учет в других мероприятиях с использованием средств массовой информации, листовок, плакатов, буклетов, современных информационных и телекоммуникационных технологий, таких журналов, клубов молодых людей, СМС-сообщений, проведение интерактивной работы, направленной на формирование поведения, менее опасного в отношении заражения ВИЧ.

691. Обучать население должны включать освещение всех подходов безопасности и меры ответственного поведения в отношении ВИЧ-инфекции: безопасность сексуального поведения, безопасности инъекционных веществ, профессиональной безопасности.

692. Профилактическую работу среди населения проводят органы и учреждения Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, органы и учреждения здравоохранения, работодатели, государственные и другие организации по методическим рекомендациям Центра СПИД.

693. Меры, направленные на предотвращение заражения, должны быть в первую очередь для компаний и работодателей могут включать информацию по предупреждению заражения ВИЧ, предупреждению потребления наркотиков, информацию о безопасности инъекционных и общественных отношениях, оказывающих услуги инфицированным ВИЧ.

продукта, употреблявшего потенциально опасные, ядовитые, охотничьи продукты, убитых в ДТП, жертв насилия и вооруженных конфликтов.

694. Необходимо обеспечить внедрение профилактических программ по предупреждению ВИЧ-инфекции среди работников поселков, в том числе при проведении тематических обучений для определенных контингентов, в том числе среди групп населения с высоким риском заражения ВИЧ.

VII. Профилактика вирусных гепатитов В и С

695. Вирусный гепатит В (далее – ВВ) и вирусный гепатит С (далее – ВС) представляют собой инфекционные болезни человека вирусной этиологии с преимущественным поражением печени с возможным переходом в хронический гепатит (ХГ) и хроническую прогрессирующую паренхиматозную (ХПХ) у лиц с хронической формой инфекции.

696. Основательный анализ случаев в хроническом ВВ и ВС, установившихся при вирусологическом, гистопатологическом, клиническом, биохимическом, иммунологическом и молекулярно-биологическом анализе.

Большая часть ВВ и ХГВ могут быть инфицированы вирусом гепатита В.

Переносимый ВВ остается стойкой латентной инфекцией.

697. Возбудителем ВВ является ДНК-содержащий вирус, относящийся к семейству *Herpesviridae*, роду *Orthoherpesvirinae*. Выделяются 11 генотипов (от А до J) вируса гепатита В (далее – ВВ), их распространение варьирует по географическим и этническим линиям.

698. ВВВ характеризуется высокой заразностью и устойчивостью к воздействию окружающей среды. В цельной крови и ее сыворотке ВВВ сохраняется годично, при комнатной температуре остается жизнеспособным на предметах окружающей среды в течение одной недели. ВВВ чувствителен к воздействию растворяющих детергентов и широкому спектру дезинфицирующих средств, инактивируется при кипячении в течение 30 мин.

699. Возбудителем гепатита С является РНК-содержащий вирус, относящийся к семейству *Flaviviridae*, роду *Hepevirinae* и характеризующийся высокой летальностью и заразностью. В последние время выявлены 6 генотипов и более (и субтипов) вируса гепатита С (далее – ВГС). Вариабельность генома ВГС обусловливает изменения в структуре антигенных детерминант, которые определяют выработку специфических антител, что препятствует выявлению вируса из сыворотки и созданию эффективной вакцины против ВГС.

700. ВГС обладают сравнительно высокой устойчивостью к воздействию факторов окружающей среды. Полная инактивация вируса происходит через 10 минут при температуре 60 °C, а через 2 минуты при температуре 100 °C. Вирус чувствителен к ультрафиолетовому облучению, воздействию растворяющей литности и широкому спектру дезинфицирующих средств.

701. Основными источниками ГВ являются болевые хронические формы ВИФСИИ. Заражение ВГВ от больных в острой стадии имеет место лишь в 4-9% случаев.

При ГС основные эпидемиологические значения имеют не половые связи с бесчисленным течением острой или хронической формы ВИФСИИ.

702. Инкубационный период (период от момента заражения до появления симптомов или клинической картины болезни) при ГА в среднем составляет от 45 до 180 календарных дней, при ГС — колеблется от 14 до 180 календарных дней, чаще составляет 6-8 недель.

703. Основными факторами передачи ВГВ являются кровь и другие биологические жидкости организма (сперма, вагинальные выделения, слюна). Основными факторами передачи ВГС являются кровь или ее компоненты, в том числе слюна — другие биологические жидкости организма (сперма, вагинальный секрет, слюна, слезы и другие).

704. ВИВ и ВГС могут передаваться как естественным, так и искусственным путем.

705. Исходя из эпидемиологического значения, в первую очередь при ГС, имеют практическое значение пути передачи возбудителя. Критерием реализации при проведении гематологических и лабораторных манипуляций, сопровождающихся повреждением кожи или слизистых оболочек, а также манипуляций, связанных с риском их повреждения.

706. Инфицирование ВГВ и ВГС при непосредственном контакте, сопровождающемся повреждением кожи или слизистых оболочек происходит с использованием континтированных ВИВ и ВГС инструментов в том числе при необходимости применения хирургических средств, проведении косметических процедур.

707. Инфицирование ВГВ и ВГС возможно и МП при медицинских манипуляциях: пересадке крови или ее компонентов, пересадке органов или тканей и процедуре гемодиализа (высокий риск), через медицинские инструменты для инвазивных вмешательств и другие медицинские вмешательства, трансплантации ВГВ и ВГС. Инфицирование ВГА и ВГС возможно также при эндоскопических манипуляциях и других диагностических и лечебных процедурах, в ходе проведения которых существует риск нарушения целостности кожных покровов или слизистых оболочек.

708. Реализация естественных путей передачи ВГВ в ВГС осуществляется при проведении половой связи через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки. Цепочкой путь передачи реализуется при гомо- и гетеросексуальных половых контактах. Риск заражения ВГС среди постоянных гетеросексуальных партнеров, один из которых болен ВГС, составляет 1,5% (при отсутствии других факторов риска).

709. Передача ВГВ и ВГС от инфицированной матери ребенку возможна во время беременности и родов. Наибольший риск переноса вирусной инфекции ребенку (пре-, интра-, постнатальной) наблюдается в случае инфицирования ВГВ во время беременности или при ВДВ, когда в сыворотке (плазме) крови обнаруживается HBsAg.

Инфицирование ВГВ в большинстве случаев происходит при вертикальном родоразделении или зачатии (интранатально).

Риск инфицирования новорожденного ВГС в среднем составляет 1-5% и значительно возрастает при вирусных контаминациях ВГС в сыворотке крови матери, а также при наличии у нее ВИЧ-инфекции. Лучшее заражение ВГС от матери ребенку для группы новорожденных не выявлено.

710. Возможна передача ВГВ в быту при прямом контакте использованных контаминированных иглами различных предметов татуажу, в том числе бритвенных и маникюрных принадлежностей, зубных щеток, пилочек, пинцетов, при этом передаче вирус возможен при присутствии на предметах свежей крови. Инфицирование ВГС в быту в случаях применения крайне редко.

711. К группе риска по гепатиту В и гепатиту С относятся:

- медицинский персонал контактирующий с кровью (ее производными);
- потребители инъекционных наркотиков и их половые партнеры;
- лица, инфицированные вирусом гепатита В и все половые партнеры;
- лица, контактирующие гомосексуальными половыми контактами;
- лица с несколькими половыми партнерами;
- лица, страдающие венерическими, связанными с донорством кровью.

В группу риска также входят лица злоупотребляющие алкоголем или употребляющие наркотические средства концентрированным путем, которые при использовании инъекционных веществ чаще реализуют более опасное сексуальное поведение.

Выявление, учет и регистрация больных гепатитом В и гепатитом С

712. Методы выявления носителей ВГВ и ВГС являются общепринятыми методами с высоким риском заражения (применением 1:18 и Салматрином ультра).

713. При выявлении ГВ или ГС у граждан Российской Федерации специалистами территориального центра, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по месту проживания больного сообщают в случае выявления заболевания в территориальный центр, осуществляющий государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по месту постоянного проживания больного.

714. Статистическому учету в форме федерального статистического наблюдения подлежат подтвержденные операции клинические случаи острого и хронического ГВ и ГС.

Лабораторная диагностика вирусных гепатитов В и С

715. Лабораторная диагностика ВВ и ГС проводится иммунохимическими и молекулярно-биологическими методами исследования.

716. Лица, у которых впервые выявлен HBsAg или ДНК ВГВ, должны быть обследованы на наличие антител-НГВ IgG (лабораторный маркер титрита В).

717. У лиц с вирусомедиацитозом (белковые паховые узелки, лимфатическая паховая лимфаденопатия, паховые папулы, паховые папулы, паховые папулы, паховые папулы, паховые папулы и другие), а также в раннем периоде ГС (до 12 недель после заражения) эти ГСВ могут отсутствовать. В данных случаях диагностика ГС проводится с помощью одновременного выявления анти-НСV в РНК ВГС.

718. Концентрация, позволяющая объективному обследованию на наличие HBsAg и анти-НСV, приведены в приложениях 16 и 17 к санитарным правилам.

719. Лица, у которых выявлены анти-НСV, подлежат обследованию на наличие РНК ВГС или анти Ag ВГС с использованием диагностического набора реагентов, позволяющего выявить анти Ag ВГС в концентрате, концентрате 1000 МЕ/мл РНК ВГС и т.д. (в т.ч.).

720. Концентрация, позволяющая объективному одновременному обследованию на наличие анти-НСV и РНК ВГС, приведены в приложениях 18 и 19 к санитарным правилам.

721. Диагноз ГС или ХГС устанавливается только при выявлении в сыворотке (плазме) крови РНК ВГС или анти Ag ВГС с учетом данных лабораторных исследований и результатов клинико-лабораторных исследований (титр антител, концентрация белков, концентрация белков и т.д.).

722. Подтверждение диагноза должно проводиться в сроки, не превышающие 14 календарных дней, для обеспечения своевременного проведения профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий.

723. Липа с anti-HCV в сыворотке (плазма) крови при отсутствии у них РНК ВГС или core Ag ВГС исключает повторному обследованию на наличие anti-HCV и РНК ВГС через 6 месяцев.

724. Дети старше 10 лет в возрасте до 12 месяцев, рожденные от инфицированных ВГС матерей, подлежат в соответствии с требованиями Санитарными правилами.

725. Экспресс-тесты, основанные на парамаселлянтных к ВГС или HCVAg в сыворотке (плазме) крови, плазме или других биологических жидкостях организма могут применяться в клинической практике для быстрого ориентировочного обследования и принятия своевременных решений в острых случаях.

В медицинских организациях исследование на наличие антител к ВГС с применением экспресс-тестов должно проводиться обязательным дублирующим исследованием сыворотки (плазмы) крови человека на наличие anti-HCV, а при необходимости - подтверждаемым исследованием на наличие anti-HCV и РНК ВГС лабораторными иммунологическими и молекулярно-биологическими методами. Выдача заключения о наличии или отсутствии антител к ВГС только по результатам экспресс-теста не допускается.

Области применения экспресс-тестов включают следующие, но не ограничиваясь ими:

- трансплантология - перед трансплантацией донорского материала;
- донорство - обследование крови, в случае экстренной переливания препаратов крови и перед переливанием обработанной на антитела к ВГС донорской крови;
- приемные отделения медицинских организаций - при поступлении пациента для острых случаев заболевания.

726. Для выявления носителей инфицированности ВГС должны использоваться лицензированные препараты, зарегистрированные на территории Российской Федерации.

727. В документе, выдаваемом лабораторией по результатам исследования на HCVAg, ДНК ВГС и РНК вируса гепатита В, anti-HCV и РНК ВГС или core Ag ВГС указывается наименование test-системы с помощью которой проводилось исследование.

Мероприятия в специализированных клиниках вирусных гепатитов В и С

728. Мероприятия в специализированных центрах ГВ и ГС должны проводиться комплексно в отношении вероятных вирусных путей и факторов передачи, а также лабораторного контроля, включая ЛПН группы риска.

729. При получении экстренного обращения о случае ИВ или ГС специализированный территориальный орган, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в течение 24 часов организует проведение эпидемиологического обследования в организациях воспитания и обучения, отдыха и рекреационной деятельности. МО, учреждениях с круглосуточным пребыванием взрослых, организациях коммунально-бытового назначения, оказывающих лекарственные и косметические услуги, а также при подозрении на профессиональные заражения в исполнительных организациях, осуществляющих работу с кровью или ее компонентами (профилактика внутривенного введения препаратов и другие) при наличии соответствующих эпидемиологических данных.

Полнота проведения эпидемиологического обследования определяется территориальным органом, осуществляющим государственное санитарно-эпидемиологическое надзор.

730. По результатам эпидемиологического обследования составляется карта эпидемиологического обследования с учетом информации о заболевании. При проведении эпидемиологического обследования составляется акт, где дается заключение о причинах заболевания, возможных источниках инфекции, пути и факторы передачи, возможных путях возможного заболевания. С учетом данных эпидемиологического обследования разрабатываются и реализуются комплекс профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, включающих информирование лиц с наличием инфекции инфицированных ВИВ и ГС в контактах с ними лиц о возможных путях и факторах передачи инфекции.

Меры в отношении источника возбудителя инфекции

731. Лица, у которых при обследовании в серологии (титры) крови выявлено наличие ИВсAg и (или) ДНК ВГВ; anti-HCV и (или) РНК ВГС, в течение 3 календарных дней направляются врачом, назначившим обследование, к врачу-инфекционисту. При выявлении таких лиц следует, исходя из особенностей деятельности, необходимо обеспечить проведение им консультации врача-инфекциониста в течение 24 часов с момента их выявления.

732. Обследование лиц с наличием ИВсAg и (или) ДНК ВГВ, anti-HCV и (или) РНК ВГС проводится в лабораторных условиях (в кабинете инфекционных заболеваний, в санитарно-гигиеническом центре), в инфекционном стационаре (отделении), а также в других МО, имеющих патентов на осуществление вида деятельности.

733. Госпитализация и затраты большие ОГВ или ХГВ; ОГС или ХГС проводятся по клиническим показаниям. Во время стационарного лечения большие ГВ и ГС рассматриваются отдельно от больших нарушенных теплотамы А и Е, а также большие с истонченной формой теплоты.

734. Больному разъясняются пути и методы лечения инфекции, меры безопасности поведения с целью предотвращения распространения ВГВ и ВГС. Доступные ему виды информации, включая татуировку длительного наблюдения и лечения. Больному информируют о необходимости использования индивидуальных предметов личной гигиены, в том числе бритвенных приборов, маникюрных и педикюрных принадлежностей, зубных щеток, шпательцев, и личных вещей (одежда, пища, и т.д.) в целях необходимости использования простерилизованной.

Консультирование проводят врач инфекционной организации по месту жительства, а в дальнейшем - по месту наблюдения больного. Оказание и проведение консультирования связано с медицинскими картами амбулаторного больного или медицинской карте стационарного больного.

735. Больному даются рекомендации направленные на предупреждение распространения инфицированного процесса (исключить алкоголь, применение с истонченной кожей средств, обладающих термотоксическими и канцерогенными свойствами и другие).

Медицинская документация больного ГВ и ГС, в том числе направленная на различные виды исследований и госпитализацию, подается маркеры.

736. (Урок поваров и у рабочих (участ) после выписки из стационара определяется врачом с учетом характера работы (участ) в результате клинико-лабораторного обследования.

737. Организация лабораторного обследования больного ГВ или ГС, в том числе с использованием ВГВ или ВГС.

738. Все лабораторные и другие формы ГВ, большие ХГВ, большие ОГС и большие ХГС подлежат лабораторному обследованию в медицинской организации по месту жительства или в территориальной санитарно-эпидемиологической службе.

739. Дети, рожденные от инфицированных ВГС матерей, подлежат лабораторному обследованию в медицинской организации по месту жительства с обязательным последующим наблюдением (позитив) крови на наличие anti-HCV и РНК ВГС. Результаты у таких детей anti-HCV свидетельствуют о лабораторном заражении во время, но они могут выявляться антигенами ВГС, полученными от матери во время беременности. Первое обследование ребенка проводится в возрасте 4-6 месяцев

Отрицательный результат по РНК ВПЧ свидетельствует об отсутствии инфекции. Положительный результат на РНК ВПЧ свидетельствует о ХПЧ в результате первичного инфицирования и о необходимости последующего динамического наблюдения за ребенком.

740. Дети, рожденные от инфицированных ВПЧ матерей, подлежат динамическому наблюдению в медицинской организации по месту жительства с обязательным исследованием сыворотки (плазмы) крови на наличие HBsAg и анти-HBc через 1-2 месяца после введения первичной дозы вакцины против гепатита В.

741. Прогнозными факторами развития должны осуществляться передача сведений о детях, рожденных от инфицированных ВПЧ и ВГС матерей, в детскую поликлинику по месту рождения (или проживания) для дальнейшего наблюдения.

Меры в отношении путей и факторов передачи возбудителя

742. Заключительная дезинфекция в очагах ГВ и ГС проводится в случае госпитализации больного в стационар, или смерти, перевода на другое место жительства, похоронения.

Заключительная дезинфекция (в жилых, в общественных, в дошкольных образовательных организациях, лечебных, канингах и других) проводится исключительно под руководством медицинских работников медицинской организации.

743. Первичная дезинфекция в очагах ГВ и ГС осуществляется в момент выезда больного из его места жительства, в очагах ХПЧ и ХГС - при выездах из помещений в качестве профилактики проводится ежедневно.

744. Дезинфекция в очагах ГВ или ГС проводится индивидуальными предметами личной гигиены больного (шля с полотенцем из ГВ или ГС), а также гигиеничности и вещей в случае их использования вместе или другими биологическими жидкостями. Дезинфекция проводится самим больным (шля с полотенцем из ГВ или ГС), или другим лицом, осуществляющим за ним уход. Консультирование по вопросам дезинфекции проводится выездной рабочей медицинской организацией по месту жительства больного.

745. Для проведения дезинфекции используются средства, эффективные в отношении возбудителей вирусных гепатитов В и С.

746. Контактная при ГВ и ГС считается шля, которая могла быть инфицирована ВПЧ или ВГС при развитии контактных путей передачи возбудителя инфекции.

747. Комплекс мероприятий в отношении контактных лиц проводится медицинскими работниками медицинской организации по месту жительства (проживания) и включает:

- их выявление и учет (в целях наблюдения за заболеваниями),
- проведение медицинского осмотра при выявлении очагов;
- лабораторные обследования в соответствии с рекомендациями 16-18 и Санитарные правила, в том числе 18 – относительно прививочной вакцинации анти-ЦВх;
- проведение вакцинации против ЦВх контактных лиц, из больных гепатитом В в не привитых ранее, и лиц с неизвестным прививочным анамнезом.

Беседу и клинический осмотр пациентов, способных информировать, факторы передачи инфекции и меры профилактики.

748. Лица, у которых при первом обследовании выявлено анти-ЦВх, дальнейшему обследованию на ЦВх не подлежат. Результаты медицинского обследования заносятся в амбулаторную карту больного.

749. Контактные лица должны знать и соблюдать правила личной профилактики ЦВх и ГС и исключаться от работы индивидуальными предметами личной гигиены. С целью предотвращения передачи вируса передают ЦВх и ГС контактным лицам необходимо использовать презервативы.

750. Наблюдение за контактными лицами в течение 04 (4) и 12 (12) месяцев после разобщения или выключения лица от работы лицами ЦВх или ГС.

751. При работе с контактными лицами важно учитывать, как риск заражения не только (супруги, близкие родственники), так и опасность распространения заболевания иным образом, если они являются детьми, медицинскими работниками и другие).

752. В случае возникновения подозрения на инфицирование ЦВх или ГС при оказании медицинской помощи специалистам прихода, общественности, государственной санитарно-эпидемиологической службы, в течение 24 часов проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в медицинской организации. При выявлении случаев ЦВх или ГС у детей, а у лиц старшего возраста, следует учитывать ограничение возможных путей передачи инфекции в этот период.

753. Эпидемиологическое расследование при подозрении на инфицирование ЦВх или ГС при оказании медицинской помощи проводится с целью выявления источника, факторов передачи, установления круга контактных лиц, как среди персонала, так и среди пациентов, пожелавших в разрыве условиях с учетом риска возможного инфицирования, а реализация комплекса профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению инфицирования в условиях медицинской организации, в том числе.

выполняющего обследующие контингентные лица из соответствующих подразделений (тепелиты В, С, ВМЧ).

754. Мероприятия по ликвидации очага ГВ и ГС в стационаре (кабултантрак-клинических учреждений) осуществляются под руководством врача-терапевта и руководителя медицинской организации, при контроле со стороны территориальных органов, осуществляющих федеральной государственной санитарно-эпидемиологической надзор.

755. Случаи заражения ВГВ или ВГС могут быть связаны с контактами с указанными медицинскими работниками при нарушении условий из санитарных условий.

установление эпидемиологической связи между инфицированными пациентами (инфекцией или дерматитом) и заразившимся от него, при условии одновременного пребывания в МО, получения одновременно медицинскими работниками, обслуживающими одного медицинского работника в отделении, операционной, процедурной, перевязочной, лабораторной и других.

выявление у пациента HBeAg и (или) ДНК ВГВ не ранее чем через 14 календарных дней с момента обращения в МО, если данный маркер (маркеры) отсутствует при обращении. выявление у пациента anti-HBe не ранее чем через 14 календарных дней, если данный маркер отсутствует при обращении, для выявления у пациента ДНК ВГС не ранее чем через 4 календарных дней с момента обращения в МО, если данный маркер отсутствует при обращении;

возникновение групповых (2 и более случаев заболевания ГВ или ГС впр случае использования выявления маркеров инфицирования ВГВ или ВГС у пациентов, ранее одновременно находившихся в одной МО и получивших одинаковые медицинские вмешательства и лечение представляющий отрицательный результат при обследовании на маркеры инфицирования ВГВ или ВГС, даже при отсутствии установленного источника инфекции;

установление эпидемиологической связи между случаями заболевания ГВ или ГС с помощью молекулярно-биологических методов исследования (типизация вирусного материала образцов крови образцов тканей ВГВ или ВГС) образцов сыворотки (плазмы) крови забраных в п.п. и лабораторных в качестве исключения инфекции при обследовании на ширину группы сравнения.

756. Выявление нарушений санитарно-противоэпидемиологического режима в МО, включая нарушение режима дезинфекции, санитарии, стерилизации медицинских изделий, аппаратуры, обеспеченных расходными материалами и средствами индивидуальной защиты персонала, обращения с медицинскими отходами, гигиенический уход за ранами,

медицинских работников в период предполагаемого заражения являются источниками распространения ПТВ или ВГС при оказании медицинской помощи.

757. При получении организацией, осуществляющей эпидемиологический надзор, хранения или хранения материалов донорской крови и ее компонентов или других донорских материалов, информации о возможном заражении ГН или ГС реципиента, осуществлявшего донор (донора), от которого можно идентифицировать заражение, проводится анализ предыдущих случаев донорства этого донора (донора) за период не менее 12 месяцев, предшествующих последнему донорству. В периодичности мер для предотвращения использования донорской крови или ее компонентов или других донорских материалов, полученных от этого донора (донора).

758. При получении достоверного результата исследования на ВГН или ВГС у донора крови, иных органов и тканей организацией, осуществляющей подготовку, переработку, использование донорских материалов непосредственно прививает анализ предыдущих случаев донорства за период не менее 12 месяцев, предшествующих последнему донорству, и информирует донорскую кровь и ее компоненты, иные органы и ткани, полученные от этого донора.

759. В каждом случае подтвержденном из информирования ПТВ или ВГС при исследовании крови (ее компонентов). Взаимодействие органов (тканей) или государственных органов власти информации. Взаимодействие передается в органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, для принятия необходимых мер по расширению.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения распространения и распространения инфекционных заболеваний В и С

760. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний В и С органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводятся следующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия:

- оценка эпидемиологической ситуации и потенциальных тенденций ее развития;
- информирование на двусторонней и структурной взаимосвязи;
- побуждение к профилактике производных мероприятий по профилактике, диспансерному наблюдению, лечению;
- оказание эпидемиологической помощи медицинским учреждениям В и С;

выборочный серологический контроль за исключением иммунизации, свисываемости, периодичности и качеством листашерным прободением, охвата дежурным больных ЛГВ и ЛГС:

приложившие и охвата эффективности проводимых мероприятий.

Профилактические мероприятия

761. Вакцинация населения против ГД. микробная и вирусная профилактическая мероприятия. проводится в соответствии с действующими календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов.

762. Последовательный мониторинг уровня РГВ среди работающих энт-ЛВ в отнесении к Т-клеткам иммунологический анализ. Показатели эффективности вакцинации выявляют обнаружение энт-ЛВ в сыворотке (плазме) крови в концентрации более 10 МЭФ/мл через 1-2 месяца после введения последней дозы первичной серии вакцинации против ГВ. Отсутствие энт-ЛВ в более отдаленные сроки не является признаком неэффективности вакцинации против ГВ.

763. Профилактика инфицирования вирусом гепатита В и С при оказании медицинской помощи.

Основной профилактикой инфицирования ГВВ и ГВС при оказании медицинской помощи является соблюдение требований санитарно-противоэпидемиологического режима в МО в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

764. Контроль и оценка состояния санитарно-противоэпидемиологического режима в МО проводится санитарно-эпидемиологическим надзором, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и другим подразделениям МО. Обеспечение санитарно-противоэпидемиологического режима в МО обеспечивается руководителем такой организации.

765. Меры, направленные на предотвращение инфицирования ГВВ и ГВС при оказании медицинской помощи, включают:

соблюдение требований к дезинфекции, дезинфицирующей обработке и стерилизации медицинских изделий, а также требований кбору, обезвреживанию, кремации или захоронению в транскрипированную медицинскую ткань, образующуюся в МО;

обеспечение МО медицинскими изделиями одноразового применения, необходимыми медицинскими и санитарно-гигиеническими оборудованием, соответствующим медицинским учреждениям, средствами дезинфекции и стерилизации (в том числе в том числе в том числе), стерилизации и дезинфекционной пастеризации;

обеспечение медперсонала и поступающих в стационар пациентов плазмой и сыворотке крови маркеров инфицирования ГВ и ГС (в соответствии с приложениями 16-18 к Санитарным правилам);

обор. специнфекционной инфекцией при поступлении больных, особенно в отделения рента (трансплантации, гемодиализа, гематоциты, хирурги и другие);

766. Профпатронаж профессионального инфицирования ГВ и ГС медперсонала работников проводится в соответствии с требованиями к организации профилактических и противоэпидемиологических мероприятий и мероприятий чрезвычайных.

767. С целью профилактики профессионального заражения ГВ и ГС проводятся: выявление лиц, инфицированных ГВ и ГС среди медперсонала персонала в ходе проведения профилактических и медицинских мероприятий персонала;

своевременное обследование медперсонала работников с определением концентрации анти-ГВ;

испытания одной дозы плазмы против гепатита В медперсонала работников, у которых концентрация анти-ГВ не менее 10 мМЕ/мл;

учет случаев заражения микрокрови, аварийных ситуаций, связанных с применением крови и других биологических жидкостей на кожу и слизистые оболочки;

экстренная профилактика ГВ.

Профилактика ГВ и ГС при переливании донорской крови и ее компонентов, пересадке органов и тканей, переливании плазмы

768. Профилактика инфицирования ГВ и ГС при переливании донорской крови и (или) ее компонентов, пересадке органов (тканей) или переливании плазмы осуществляется в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности при переливании, хранении, транспортировке и использовании донорской плазмы.

769. Получение обезжелезиванной донорской крови и других биологических жидкостей от доноров, профилактика и донорство, содержание работы с отстраненными от донорства лицами и требования к противоэпидемиологическому режиму в организациях, осуществляющих заготовку, хранение и транспортировку донорской крови и (или) ее компонентов и других биологических жидкостей, определяется в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

770. В целях обеспечения безопасности использования донорской крови и (или) ее компонентов осуществляется предоставление данных о доноре, донорстве, донорстве донорской крови и (или) ее компонентах, расходах

антисывах, образцах крови донора, рожавых женщин и трансфузионных донорских крови и (или) во кимкансках, образцах крови реципиента. исследованиях рожав, а также о соответствии требованиям безопасности предстоящих работ по заготовке, транспортировке, хранению и клиническому использованию донорской крови и (или) ее компонентов.

Происхождение данных достигается посредством их идентификации на всех этапах от момента получения донора до момента назначения его донорской крови и (или) ее компонентов, включая этапацию, с последующим внесением соответствующей информации в соответствующий документацию и базу данных донорской крови и ее компонентов.

771. Безопасность донорской крови (и ее компонентов), донорских органов (тканей) обеспечивается строгим соблюдением результатов лабораторного исследования образцов крови донора, выгнанных во время каждого забора донорского материала. В частности, лаборатория гемоконтроля должна информировать о том, какие ВГА и ВГС, с использованием иммунологических и молекулярно-биологических методов.

772. Молекулярно-биологические исследования на маркеры вирусных инфекций человека (ВВ14-инфекция), гепатитов В и С проводятся для всех серонегативных образцов крови донора. Допускается отсроченное проведение молекулярно-биологических и иммунологических исследований образцов крови донора.

773. Серонегативный, осуществляющий заготовку, хранение, транспортировку и клиническое использование донорской крови и ее компонентов, органов и тканей, подлежит обучению на наличие маркера инфицированности ВВ и ВГС в соответствии с приложением 16 и 17 к Служебным правилам.

Профилактика заражения новорожденных от инфицированных ВВ или ВГС матерей

774. Особое внимание берется на период, указанный в приложениях 16 и 17 к Служебным правилам.

775. Беременные с ВВ или ВГС помещаются госпитализируются в перинатальные центры, специализированные отделения (палаты) роддомов с обеспечением протектионизационного режима.

776. Новорожденным, родившимся от инфицированных ВВ матерей или перенесших ВВ в третьем триместре беременности, назначаются против ВВ препараты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

777. Все дети, родившиеся от женщин, инфицированных ВВ или перенесших ВВ в третьем триместре беременности, подлежат десятикратному обследованию в детской

полноты по месту жительства в определении активности АДНТ спонсором крови и исследованием на ПЦАи в 4-6 месяцев.

778. В случае, если при скрининговом обследовании в первом триместре беременности anti-PCV выявлены титры в крови, или РНК ВГС не выявляется, то следующее обследование по выданной указанным маркерам выданной ВГТ проводится в третьем триместре беременности. Если при повторном обследовании результаты в третьем триместре беременности также выявляются anti-HCV при отсутствии РНК ВГС, указанный случай в дальнейшем не считается показательным из ГС. Для установления возможных причин показательного результата (преимуществом ОГС или повторным обследованием результатов) дополнительное обследование на anti-PCV проводится через 6 месяцев после родов.

779. Беременные женщины с подтвержденным диагнозом ОГС или ХГС подлежат госпитализации по клиническим показаниям в специализированные отделения (палаты) акушерства стационаров или перинатальные центры. Цирком родов проводят в специально выделенной палате, в том числе в боксе, где мать с ребенком находится до выписки. При необходимости оказания помощи выписываются в специальную обсервационную палату.

780. В случае наличия В или ГС у беременной проведение естественных родов не запрещается.

Нипированием, родившимся от инфицированных ВИЧ матерей, проводится вакцинация, в том числе против туберкулеза и гепатита В, в соответствии с национальными рекомендациями профилактических прививок.

В случае наличия ГС у матери трудное вскармливание не запрещено

781. Профилактика вирусных гепатитов в организациях коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги.

782. В организациях коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, должны выполняться Санитарными правилами требования, должны соблюдаться требования санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям размещения, строительства, оборудования и эксплуатации, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»¹⁷.

Все манипуляции, которые могут привести к инфицированию крови и слизистых оболочек, осуществляются с применением стерильных инструментов и

¹⁷ Утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.12.2020 № 44 с регистрационным Минздравом России 30.12.2020 регистрационный № 01957.

материалов. Изделия многоразового применения перед эксплуатацией подлежат предэксплуатационной очистке.

Гигиеническое воспитание и обучение граждан по вопросам профилактики вирусных гепатитов В и С

783. Гигиеническое воспитание граждан предусматривает информирование населения об особенностях симптомов ГВ и ГС, методах специфической и неспецифической профилактики, методах диагностики, возможности своевременной вакцинации, профилактике, обеспечении, необходимости диспансерного наблюдения и лечения больных.

784. Гигиеническое воспитание населения проводится МНО, специалистами органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, работниками организаций, осуществляющих общественную деятельность, представителями общественных организаций.

785. Информирование населения осуществляется с использованием информационных-телекоммуникационной сети «Интернет», средств массовой информации, листовок, плакатов, буклетов, а также в ходе консультаций. Больным и контактным ДНП.

4.11. Профилактика туберкулеза

786. Туберкулез представляет собой инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое группой микобактерий туберкулезного комплекса - *Mycobacterium tuberculosis* complex (далее - микобактерия туберкулеза). У людей в качестве возбудителя возмат преобладает *Mycobacterium tuberculosis* (возбудитель возмат).

787. Возбудитель туберкулеза сохраняет свою жизнеспособность в сухом состоянии до 3 лет, при нагревании микобактерии температуру выше 60 °С. Микобактерия туберкулеза, находящаяся в мокроте, выживает при кипячении в пределах 3 минут, устойчива к органическим и неорганическим кислотам, щелочам, высоким концентрациям и также к воздействию четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) и производных гуанидина, но чувствительна к расщеплению солнечным светом.

788. Источником инфекции являются больные активной формой туберкулеза люди и животные. Наиболее опасными источниками инфекции являются больные туберкулезом легот с кашлем, бактериовыделением и ДНП с длительно текущим процессом в легких.

789. Воздушной путь распространения туберкулеза - воздушно-капельный, воздушно-пылевой, контактный, алиментарный пути передачи по

наибольшая трансплантацией путь передачи инфекции.

Основным фактором передачи возбудителя туберкулезной инфекции является воздушная среда. Факторами передачи инфекции могут также являться инфицированные материалы от больных, контактировавшие возбудителем среды внешней среды.

790. Основными факторами пути туберкулезной инфекции является риск развития заболевания при переносе инфицированных

791. Места пребывания больных туберкулезом тесно с окружающей его средой и предметами внешней среды в тех закрытых пространствах, в которых возбудитель заболевания живет в воздухе и инфицирует (очаги туберкулеза) различны по эпидемиологическому значению и в зависимости от степени риска заражения могут быть сгруппированы в 5 групп.

1) I группа - очаги с высоким риском заражения туберкулезом. Основными неблагоприятными факторами - социальное неблагополучие очага. К этой группе относятся очаги, инфицированные больными туберкулезом органы дыхания, выделяющими микобактерии туберкулеза, при сочетании в очаге всех или части следующих неблагоприятных факторов:

- проживание в очаге детей, лиц с туберкулезными заболеваниями;
- широкое жилищное расселение, отсутствие планировки помещений отдельного помещения для проживания больного;
- нарушение гигиенических правил, нарушение санитарно-гигиенических правил.

Для обеспечения эффективности противоэпидемиологических и профилактических мероприятий определяются границы таких очагов. В территорию очага по месту проживания больного туберкулезом органов дыхания, выделяющего микобактерии туберкулеза, включаются квартиры, в которых проживают больные туберкулезом, родственники больного, поддому дома и группы близлежащих домов, объединенных общим двором. Границы очага по месту работы больного туберкулезом органов дыхания, выделяющего микобактерии туберкулеза, определяются с учетом помещений, в которых работает и которые посещает больной туберкулезом во время осуществления трудовой деятельности.

2) II группа - очаги туберкулеза с высоким риском заражения в очаге, социальное благополучие. К этой группе относятся очаги, в которых проживают больные туберкулезом органов дыхания, выделяющие микобактерии туберкулеза, но проживающие в отдельных квартирах без детей, где больной соблюдает санитарно-гигиенические правила, выполняется мероприятия по текущей дезинфекции.

3) III группа – очаги туберкулеза с низким уровнем в очаге:

очаги, где преобладают бильные активные туберкулезом организмы, длительно без установившегося при лечении, но учет выделения микобактерий, но приживающие с детьми и подростками.

очаги, сформированные бациллы с плетением, должны лечить туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза и без выделения микобактерий с выделением вв в сыпях.

4) IV группа – очаги с потенциально высоким уровнем туберкулеза:

очаги, в которых у бильных активные туберкулезом организмы длительно без установившегося при лечении выделении микобактерий туберкулеза и результате лечения (успешные бактериологические). приживающие без должной ответственности приживающих факторы:

печки, где бильной, выделением микобактерий, выделении;

очаги, где бильной, приживающий микобактерии, умер.

5) V группа – очаги туберкулеза активного проявления:

Классификация бильных туберкулезов

792. При уходе за туберкулезом в медицинских организациях применяются следующие обязанности в целях улучшения диагностики:

793. При обнаружении во время обследования пациента признаков, указывающих на возможное заболевание туберкулезом, в целях постановки окончательного диагноза, он направляется в медицинскую организацию туберкулеза организации.

Медицинский работник, оформляющий направление в медицинскую организацию туберкулеза, информирует пациента об обязанности явиться во время обследования в медицинскую организацию туберкулеза в течение 10 рабочих дней с момента получения направления и должен ответить в медицинской организации пациента о его информировании, которая заносится в историю пациента.

Лица с подозрением на туберкулез, получившие направление медицинскому работнику в профильную лечебно-профилактическую медицинскую организацию (диспансер пульмотуберкулеза, специализированную больницу туберкулеза, в том числе детскую) (далее – лечебно-профилактическая организация туберкулеза), обязаны в течение десяти рабочих дней с момента получения указанного направления явиться по месту назначения и медицинскую организацию туберкулеза организации в целях улучшения диагностики. (Копия медицинского направления туберкулеза организации должна, полученная направлением медицинского работника в указанную организацию в связи с

подогревом на туберкулез для обследования в целях уточнения диагноза, а также предусмотренный абзацем пятым изложенного пункта, должны обеспечивать их радиационная иная защитная предосторожности.

794. Противотуберкулезная медицинская организация осуществляет контроль за своевременностью и полнотой обследования пациентов с подозрением на заболевание туберкулезом медицинскими организациями.

795. Лица без определенного места жительства при подозрении на заболевание туберкулезом госпитализируются в медицинскую противотуберкулезную организацию для обследования и лечения.

796. По завершении обследования пациенты излечившаяся при заболевании туберкулезом организации в течение 3 рабочих дней информирует медицинскую организацию, направившую больного на обследование, а результаты обследования и соответствующее лечение.

В случае подтверждения диагноза «туберкулез» излечившаяся противотуберкулезная организация, установившая диагноз, информирует об этом органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

797. Медицинские противотуберкулезные организации ежегодно представляют списки лиц, больных туберкулезом, в медицинские организации, осуществляющие амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства.

798. Руководителями медицинских организаций совместно привлекаются к выполнению работы функциональные подразделения излечившейся организации в числе выданных туберкулез в различных возрастах и социально-профессиональных группах, а также проживающей прифранцузской районы в данных подразделениях.

Организация раннего выявления туберкулеза у взрослого населения

799. В целях раннего выявления туберкулеза у взрослого населения организуются прифранцузских медицинских осмотров подвизам (службы Российской Федерации, иностранные граждане в лица без гражданства).

Организация профилактических осмотров для выявления больных туберкулезом и контроль за их проведением осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны здоровья граждан.

800. Профилактические медицинские осмотры проводятся в массовых, групповых (по производственным показателям) и индивидуальных попытке в излечившейся организации по месту деятельности работы, службы, учебы или отдыхающим в специализированных учреждениях и осуществляются учреждениями.

801. При проведении профилактических медицинских осмотров используются методы определения активности заболевания.

802. Медицинская организация, обслуживающая лиц из группы повышенного риска, обеспечивает проведение профилактических медицинских осмотров населения, прикрепленного к медицинской организации, с целью раннего выявления туберкулеза не реже 1 раза в 2 года. В субъектах Российской Федерации, мушкетерствах образуются с потенциалом эффективности выявления туберкулеза 4) в более сложных случаях 100 тысяч населения в год - не реже 1 раза в год.

803. Планирование профилактических осмотров взрослого населения на туберкулез проводится медицинской организацией после уточнения численности населения, прикрепленного к медицинской организации работников и неработающего его возрастного и профессионального состава, анализа данных медицинских учреждений и медицинских документов, содержащих сведения о привлечении населения к обследованию.

804. Уточнение численности прикрепленного населения должно проводиться медицинской организацией ежегодно.

805. Руководители предприятий, организаций по запросу соответствующей медицинской организации предоставляют информацию, необходимую для организации и проведения профилактических обследований сотрудников в целях раннего выявления туберкулеза.

806. Медицинской организацией, осуществляющей профилактические обследования в целях раннего выявления туберкулеза, составляется список лиц, прошедших профилактические обследования в целях раннего выявления туберкулеза, который согласовывается с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

807. Список лиц профилактических обследований включен в целях раннего выявления туберкулеза по субъекту Российской Федерации утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны здоровья граждан.

808. Контроль за своевременным проведением сотрудниками организации профилактических осмотров на туберкулез осуществляется руководителем организации в соответствии с установленными Санитарными правилами гриппа.

Руководство организации должно обеспечивать возможность прохождения сотрудниками, у которых в ходе профилактических осмотров выявлены признаки,

устанавливающих: во всех случаях заболевания туберкулезом, обеспеченным в местечковской противотуберкулезной организации и целях улучшения питания в семье, установление Санитарным управлением.

809. По указанию (счастливости) показывать (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактические медицинские осмотры проходят 2 раза в год:

всех проживающих, проживающих в семье, по адресу;

лица, входящие в контакт с носителями туберкулезной инфекции, в том числе лица, осуществляющие транспортировку больных туберкулезом в амбулаторных условиях;

лица, связанные с деятельностью учета в местечковской противотуберкулезной организации в связи с заболеванием, в течение первых 3 лет после начала с учетом

лица, перенесшие туберкулез и имеющие исключительные показания к лечению, в течение первых трех лет с момента выздоровления и выписки из больницы;

лица с ВИЧ-инфекцией;

лица, состоящие на диспансерном наблюдении (в том числе профилактическом наблюдении) в амбулаторных и поликлинических учреждениях специальных медицинских учреждений, предоставляющих;

подозреваемые и выявленные, содержащиеся в следственных изоляторах, в том числе находящиеся под стражей, содержащиеся в исправительных учреждениях;

лица, освобожденные из следственных изоляторов и учреждений уголовной администрации в течение первых 3 лет после освобождения;

лица по роду своей профессиональной деятельности имеющие контакт с туберкулезом, болезнями и лицами, находящимися под стражей;

лица без определенного места жительства.

810. По указанию (счастливости) показывать (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактические медицинские осмотры проходят 1 раз в год:

больные хроническими специфическими заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного и других систем органов;

больные сахарным диабетом;

больные заболеваниями почек;

лица, получающие радиационную, лучевую, химиотерапию и

находясь на территории¹⁴;

иные лица: граждане и лица без гражданства, в том числе осуществляющие трудовую деятельность на территории Российской Федерации, беженцы, вынужденные переселенцы;

лица, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания и учреждениях социальной помощи для лиц без определенного места жительства;

работники организаций социального обслуживания;

работники санаторно-курортных организаций, санаториев, санаторных и образовательных организаций для детей;

сотрудники медицинских организаций;

работники организаций по переработке и реализации пищевых продуктов, производящий бытовую обслуживающую населенную работу на производных предприятиях;

пятидесятилетние и старшелетние граждане по статистико-эпидемиологическим показателям (применяется анкетирование населения на наличие условий для инфицирования).

§11. Во взаимодействии с органами профилактического медицинского осмотра на туберкулез проходят

лица, обратившиеся в медицинские организации за консультативной помощью с подозрением на заболевание туберкулезом;

лица из окружения детей, у которых выявлена или выявлена подозрительность к туберкулезу при проведении туберкулиновой пробы Манту и 3 туберкулинодиагностики (1Б) (являющиеся туберкулезом в стационарном лечении и в амбулаторном лечении туберкулезом, если с момента постановки диагноза прошло более 6 месяцев);

лица, обратившиеся за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические учреждения и осуществляющие на стационарном лечении при амбулаторном лечении патология на стационарном лечении, профилактическое обследование на туберкулез, по возможности, проводится в условиях стационара, если с даты постановки профилактического обследования на туберкулез прошло более 1 года;

лица, диспансеризация в детском медицинском учреждении в целях осуществления ухода за детьми, находящимися на стационарном лечении, если с даты последнего профилактического обследования на туберкулез прошло более 1 года;

лица, проживающие в субъектах Российской Федерации из являющихся субъектами Российской Федерации для осуществления на работу, на постоянное или временное

¹⁴ Приказ Минздрава России от 21.01.2017 № 124н «Об утверждении порядка и сроков проведения профилактического медицинского осмотра граждан и лиц без гражданства (беглецов)» (зарегистрирован Минздравом России 31.05.2017, регистрационный № 46914).

протяжении, если с момента последнего флюорографического обследования прошло более года;

лица, представляющие совместно с беремениыми жещинами, если к концу беременности роды пройдут 1 год и более с момента предыдущего флюорографического обследования.

граждане, приезжающие по военной службе или поступающие на военную службу по контракту, если с момента последнего обследования прошло более 6 месяцев;

лица, у которых диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен впервые, если с момента последнего обследования прошло более 6 месяцев, а также больные ВИЧ-инфекцией в стадии вторичных проявлений (АА - АВ) или больные ВИЧ-инфекцией с уровнем CD4 лимфоцитов менее 350 клеток;

эмигранты при поступлении на работу, у которых от даты последнего профилактического обследования в целях раннего выявления туберкулеза прошло 1 год и более;

лица без определения места жительства - при любых перемещениях в учреждениях социальной защиты или здравоохранения, если истекло время с момента профилактического обследования на туберкулез или с момента последнего обследования прошло более 6 месяцев.

лица, употребляющие психоактивные вещества и препараты лица, находящиеся в группе профилактического паразитологического учета при выявлении заболеваний органов внутренних дел в случае отсутствия сведений о профилактических осмотрах на туберкулез на основной год;

иностранные граждане и лица без гражданства при обращении за получением разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации, лица на основании трудового договора или разрешения на работу в Российской Федерации;

лица в отношении которых имеются данные, позволяющие в ходе эпидемиологического обследования выявить туберкулез, и выявлен контакт с больным туберкулезом.

812. Муниципальные медицинские организации обеспечивают лицензирование, регистрацию и проведение профилактических медицинских осмотров на туберкулез по данным индивидуального учета населения, а также предоставление соответствующих отчетов в медицинские организации по профилю «фтизиатрия».

813. Ежегодный осмотр взрослого населения профилактическими рентгенофлюорографическими обследованиями должен составлять не менее 65% от численности населения, пригласившего к медицинскому осмотру, осуществляющей

профилактические обследования на туберкулез.

814. Контроль за плановым учетом профилактических мероприятий осмотров населения в медицинских учреждениях, осуществляющих первичную медицинскую помощь, и выполнении плана профилактических медицинских осмотров населения на туберкулез осуществляется медицинской противотуберкулезной организацией.

815. Организация прохождения профилактических медицинских осмотров на туберкулез обеспечивается на руководящих организациях по месту работы, учебы, проживания, нахождения лиц, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру на туберкулез.

816. Дневные «туберкулез» подразделяются медицинской противотуберкулезной организацией, проводящей расчеты в отношении больных с госпитализацией, лечением и диспансерном наблюдением. О принятом решении больной выводится из туберкулезного учета в 3 календарных дня со дня постановки на диспансерный учет.

Организация работы с больными туберкулезом у детей до 14 лет включительно

817. В целях раннего выявления туберкулеза у детей (до 14 лет включительно) проводится туберкулинодиагностика. Внутривенную аллергическую пробу с туберкулином (туберку - проба Манту) проводят 1 раз в год всем вакцинированным против туберкулеза детям начиная с 12-месячного возраста до 7 лет включительно независимо от результатов предыдущих проб, а также детям в возрасте от 8 до 14 лет включительно, не ранее чем через 12 месяцев против туберкулеза, у которых при предыдущем обследовании проба Манту дала отрицательный результат. Оставшаяся детям в возрасте от 8 до 14 лет включительно проводится проба с аллергией туберкулезного рекомбинантного штамма, при наличии отрицательных результатов, оставшимся на анализе вальсальвованная Т-лимфоциты лизин-интерферона.

818. Проба Манту проводится 2 раза в год:

детям, не вакцинированным против туберкулеза до медицинского обследования, а также по причине отказа родителей от проведения ребенку плановой с 6-месячного возраста и при отсутствии ребенком прививки против туберкулеза;

детям, больным хроническими заболеваниями дыхательной системы, органов пищеварения, мочеполовой системы, сахарным диабетом;

детям, получающим кортикостероиды, лучевую, лекарственную и химиотерапию, хирургическое лечение, туберкулезы, туберкулезные поражения:

ПНЧ-инфицированных детей.

819. Постановка пробы Манту осуществляется средними медицинскими работниками, прошедшими обучение в противотуберкулезных медицинских организациях и имеющие справку-допуск.

Основная результативность проводится врачом или средним медицинским работником, прошедшим специальную подготовку в медицинской противотуберкулезной организации.

Результаты кожной пробы на туберкулез оцениваются в соответствии с инструкцией к прибору.

Средние медицинские работники, осуществляющие постановку пробы Манту, проходят специальную подготовку в медицинских противотуберкулезных организациях не реже 1 раз в 2 года.

820. Не допускается проведение пробы Манту, других кожных проб на туберкулез на дому, а также в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, в период карантина по инфекционным заболеваниям.

821. Постановка пробы Манту проводится по профилактическим показаниям. В случае, если пробу Манту проводят племна или проводят профилактической природы, то материал между профилактической прививкой и пробой Манту должен быть не менее одного месяца. В день постановки туберкулиновой проб проводится медицинский осмотр детей.

822. В течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту направляются на консультацию медицинскую противотуберкулезную организацию следующие категории детей:

- с впервые выявленной положительной реакцией инфилюа 5 мм и более, не связанной с предыдущей вакцинацией против туберкулеза;
- с повторной положительной реакцией (с инфильтратом 12 мм и более);
- с нарастающим чувствительностью к туберкулину у туберкулиночувствительных детей - увеличение инфильтрата на 6 мм и более;
- увеличение инфилюа более чем на 6 мм, но с образованием инфильтрата размером 12 мм и более;
- с гиперреакцией на туберкулин - инфильтрат 17 мм и более;
- при пневмико-вакцинической реакции на инфилюа.

823. Дети, направляемые на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию, должны для локонных представителй которых во время лечения в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту зафиксирован инфилюа 50 отсутствует заболевание туберкулезом, не допускается в туберкулезных

обязательные мероприятия и общеобразовательные мероприятия.

Дети, которые не проводились туберкулинодиагностика, должны быть в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, организации отдыха детей и их оздоровления, а также туберкулинодиагностика в поликлинических и стационарных организациях для выдачи заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка признаков туберкулеза.

824. Планирование, организация, своевременный и полный учет проводимых кожных проб на туберкулез (проводиться с целью раннего выявления туберкулеза или выявления признаков туберкулеза по данным рентгенологического учета детского населения, а также взаимодействие с медицинскими организациями при туберкулезами организациями по вопросу своевременный учет и обследование детей, направленных в дошкольные учреждения и фтизиатру по результатам туберкулинодиагностики, обеспечивается руководителями медицинских организаций, осуществляющих проведение.

Организация раннего выявления туберкулеза у детей в возрасте от 15 до 18 лет

825. В целях раннего выявления туберкулеза у детей от 15 до 18 лет проводятся:
полноценная туберкулинодиагностика;
медико-социальные факторно-профилактические обследования.

826. Пробу Манту проводят 1 раз в год всем детям в возрасте от 15 до 18 лет, независимо от результата предыдущих проб. Пробу Манту проводят 2 раз в год подросткам:

больными хроническими инфекционными заболеваниями органов дыхания, злокачественно-опухолевого характера, мочевого пузыря, сахарным диабетом;

лицами, находящимися в учреждениях профилактики, туберкулеза, инфекционных заболеваний, наркологической помощи, психиатрической помощи, а также в учреждениях, оказывающих медицинскую помощь лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, а также лицам, находящимся в учреждениях, оказывающих медицинскую помощь лицам, страдающим заболеваниями органов дыхания, злокачественно-опухолевого характера, мочевого пузыря, сахарным диабетом;

лица, находящиеся в учреждениях, оказывающих медицинскую помощь лицам, страдающим заболеваниями органов дыхания, злокачественно-опухолевого характера, мочевого пузыря, сахарным диабетом;

827. Руководителями медицинских организаций, осуществляющих профилактические медицинские осмотры населения в целях раннего выявления туберкулеза, обеспечивается ежеквартальный анализ работы специалистов по выявлению и профилактике туберкулеза среди детей в возрасте от 15 до 18 лет в соответствии с планом профилактических обследований.

828. В день планового туберкулинового проб должны в возрасте от 15 до 18 лет должны приниматься на медико-санитарную обработку.

829. Дети в возрасте от 15 до 18 лет, осуществляющие образовательную деятельность в том числе при выполнении среднего профессионального и высшего образования, имеющие медико-санитарный кабинет, туберкулинодиагностика проводится медицинскими работниками данной организации, медицинским персоналом, а при их отсутствии - медицинскими работниками, имеющими справку-допуск, а при их отсутствии - медицинскими работниками, имеющими справку-допуск, медико-санитарной организации, на территории обслуживания которой расположена организация, осуществляющая образовательную деятельность.

830. Дети в возрасте от 15 до 18 лет, не работавшим и не посещавшим организации, осуществляющие образовательную деятельность, пробой Манту ставится в лабораторно-поликлинической медицинской организации по месту жительства.

831. В течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту направляются на консультацию к фтизиатру в медицинскую организацию, осуществляющую для обследования в целях выявления туберкулеза следующие категории детей в возрасте от 15 до 18 лет:

- с впервые обнаруженной положительной реакцией на туберкулин (инфильтрат 5 мм и более);
- с гиперреакцией на туберкулин (инфильтрат 17 мм и более или меньших размеров, но везикуло-некротического характера или полигональный инфильтрат);
- с нарастающей чувствительностью к туберкулину - увеличении инфильтрата на 6 мм и более;
- с прогрессирующим нарастанием чувствительности к туберкулину по годам до 12 мм и более.

Результаты пробы Манту, других кожных проб на туберкулез оцениваются в соответствии с инструкциями к применяемым препаратам врачом или средним медицинским работником, прошедшим специальное обучение в медицинской противотуберкулезной организации и получившим справку-допуск.

832. Дети в возрасте от 15 до 18 лет, направленные на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию и не представившие руководителю организации в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту (или другого профилактического обследования) на туберкулез заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются к посещению организации, осуществляющей образовательную деятельность (к работе).

833. Профилактическое рентгенологическое флюорографическое обследование

органов грудной клетки (легких) детей в возрасте от 15 до 18 лет осуществляется и амбулаторно-поликлинической медицинское обслуживание организации по месту проживания организатора, осуществляющей образовательную деятельность для и амбулаторно-поликлинической медицинской организацией по месту жительства.

8.14. Профилактический медицинский (флюорографический) осмотр проводится детям в возрасте 15 и 17 лет. При отсутствии у ребенка в возрасте 16 лет данных о прохождении флюорографического обследования, дополнительное обследование проводится по очередному порядку.

8.15. Профилактический медицинский (флюорографический) осмотр детей в возрасте от 15 до 18 лет проводится 1 раз в год:

при регистрации заболеваний туберкулезом на территории муниципальности образования, субъекта Российской Федерации 40 и более случаев на 100 тысяч населения в год;

принадлежащим в соответствии неблагополучным семьям и семьям иностранных граждан, прибывших из неблагополучных по туберкулезу стран.

8.16. Детям в возрасте от 15 до 18 лет, бывшим хроническими инфекционными заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, отоларингологических заболеваниями, с наличием рецидивов гриппа, сахарным диабетом, дисфункцией кортиконадпочечников, пупочной и шлуночной системы, профилактический медицинский осмотр проводится 2 раза в год с целью выявления туберкулеза (через туберкулинодиагностику и флюорографическое обследование).

8.17. Детям в возрасте от 15 до 18 лет, состоящим на учете в наркологической организации, оказывающей медицинскую помощь при хронических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю «психиатрия-наркология», а также ВИЧ-инфицированным, флюорографическое обследование проводится 3 раза в год.

8.18. В течение 3 календарных дней с момента выявления патологии по результатам флюорографического обследования подростки направляются в медицинскую организацию для проведения обследования в целях подтверждения/исключения заболевания туберкулезом.

8.19. Дети в возрасте от 15 до 18 лет с симптомами, указывающими на возможное заболевание туберкулезом (бронхитом, заболеваниями легких, легочный шунт, плеврит и хронический пневмонит, увеличение лимфатических узлов, поражение кожи и поджелудочной железы, туберкулезно-опластические заболевания системы), направляются на обследование к флюорологу.

Регистрация в учет случаев туберкулеза

840. Учету и регистрации при ведении федерального государственного статистического наблюдения подлежат:

1) граждане Российской Федерации:

лица, больные активной формой туберкулеза;

лица, нуждающиеся в уточнении активности туберкулезного процесса или в дифференциальной диагностике туберкулеза;

лица с активной формой туберкулеза в течение первых 5 лет со дня установления диагноза;

лица, контактировавшие с больными туберкулезом долготой;

специалисты в области фтизиатрии; работники лечебных, реабилитационных, профилактических туберкулезных учреждений; другие работники учреждений, имеющие контакт с больными туберкулезом долготой.

дети, впервые инфицированные микобактериями туберкулеза, с генерализованным и нарастающим развитием патологии;

дети с измененными результатами анкетирования туберкулезной инфекции;

дети, у которых возникли осложнения на фоне противоотуберкулезной терапии;

лица, больные активной формой туберкулеза, состоявшего с ВИЧ-инфекцией;

лица в течение 3 лет со дня клинического излечения от туберкулеза состоявшего с ВИЧ-инфекцией.

2) иностранцы, граждане и лица без гражданства при наличии у них активной формы туберкулеза впервые.

841. При получении отчетности (подорожная по обследованию) после выявления туберкулезной инфекции, медицинский персонал направляет медицинскую документацию (приказ/акт обследования о состоянии здоровья после окончания (ППП), заключение о необходимости лечения ППП и акт обследования ППП) в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиатрии и пульмонологии и инфекционных заболеваний».

842. Учету и регистрации подлежат все случаи смерти больных от туберкулеза и также случаи смерти больных туберкулезом от ВИЧ-инфекции.

843. На каждый случай туберкулеза составляется медицинская справка при туберкулезной инфекции и справка, содержащая федеральный государственный санитарно-эпидемиологический журнал, заполняется карточкой анкетирования и обследованием на случаи туберкулеза в двух

экземплярах. Для экземпляра должен находиться в территориальной медицинской организации по профилю «фтизиатрия», который - в территориальном органе (или организациях), осуществляющем федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, для оформления результатов лабораторного исследования за отчетом.

844. Контроль за достоверностью анализа туберкулеза у пациентов выявленного больного и дривение на лечение на основании заключения комплексной окончательного решения о необходимости учета и регистрации нового случая заболевания туберкулезом в единой базе данных осуществляется противотуберкулезным диспансером органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны здоровья граждан.

845. Сбор данных о случаях заболевания туберкулезом, туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, и меры от туберкулеза проводятся территориальными органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и территориальными медицинскими противотуберкулезными организациями ежеквартально.

Организация и проведение санитарно-противоэпидемиологического мероприятия в очагах туберкулеза

846. Эпидемиологическое обследование очага туберкулеза с установленным у больного выделением микобактерий туберкулеза и (или) фазы распада туберкулезного процесса проводится специально обученными органами, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и (или) специальному учреждению, обеспечивающих их деятельность, и специализированных территориальных медицинских организаций по профилю «фтизиатрия» в течение 3 календарных дней с момента получения экстренного извещения.

847. Для выявления возможных контактных распространением туберкулезной инфекции устанавливаются лица, контактировавшие с заболевшим в семье, квартире, доме, уточняется место фактического проживания и близость проживания заболевшего по другим адресам, сведения о месте работы (обучения) больного туберкулезом, в том числе, по совместительству, род деятельности больного.

848. В целях разработки комплексной санитарно-противоэпидемиологической (трифазной) мероприятий при обследовании очага оценивается степень его эпидемиологической опасности (риск заражения для проживающих в нем лиц), устанавливаются уровни санитарно-гигиенических условий жизни семьи и других лиц,

контактирования с больными туберкулезом, наличие в очаге детей, подростков, беременных женщин, лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией, больных ВИЧ-инфекцией.

849. Принадлежность очага туберкулеза к той или иной группе риска заражения определяется участием причин-факторов при условии эпидемиолога.

850. Перевод очага из одной эпидемиологической группы в другую в случае изменения в очаге условий, повышающих или понижающих риск заражения или излечения, осуществляется участками причин-факторов при условии эпидемиолога.

851. По результатам общегородских мероприятий جهت эпидемиологического обследования и выявления из очагов туберкулеза.

852. Медицинские организации, предприятия, занимающиеся частной медицинской деятельностью, органы, осуществляющие деятельность федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, осуществляют обмен информацией и выявляют больных туберкулезом и лица, контактировавшие с больными.

853. В очагах туберкулеза с целью его ранней диагностики и предотвращения распространения заболевания специалистами соответствующих организаций по профилю деятельности (санитарно-эпидемиологический надзор, санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия).

первичное обследование очага и лиц, контактировавших с больными в течение 14 календарных дней с момента выявления больного;

разработка и принятие санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на выявление;

лечение и лечение больных туберкулезом;

выявление из очага детей (в том числе имеющих противопоказания от бактериовыведения) и других формировавшихся диссеминированного характера не менее чем на 3 месяца), подростков, беременных женщин (в случае если больной туберкулезом по госпитализации, с указанием в карте эпидемиологического обследования и выявление из очагов туберкулеза).

проведение контрольной химиотерапии или дрессированного лечения лиц, состоящих на учете, диспансерное наблюдение контактных лиц (проведение флюорографического обследования, туберкулинодиагностика, бактериологического обследования, иных лабораторных анализов);

организация профилактической дезинфекции, текущей дезинфекции и обучение больных и контактных лиц ее методам;

контроль текущей дезинфекции в очаге (1 раз в квартал);

первичное обследование лиц, контактировавших с больным, в течение 14 календарных дней с момента развития больного, динамическое наблюдение за контактным лицами;

лечение больных и контактных лиц туберкулезом в аптеках;

определение условий, при которых очаг туберкулеза может быть снят с эпидемиологического учета;

заполнение и динамическое ведение карты, отражающей эпидемиологию очага туберкулеза и все комплексно проводимые в очаге мероприятия с указанием сроков их проведения;

854. Руководителям медицинских организаций по профилю «фтизиатрия» организуются ежесменное дежурное наблюдение за контактами, полнота и своевременности ведения карт, своевременных характеристик очагов туберкулеза, и выполнение комплекса профилактических мероприятий противотуберкулезных (профилактических) мероприятий.

855. Кратность обследования очагов туберкулеза специалистами медицинской организации по профилю «фтизиатрия» (лицензия, лицензия) совместно со специалистами-эпидемиологами при динамическом наблюдении составляет:

для очагов 1 группы — 4 раза в год;

для очагов 2 группы — 2 раза в год;

для очагов 3 группы — 1 раз в год.

В населенных пунктах, отдаленных от медицинской организации по профилю «фтизиатрия», санитарно-противотуберкулезных (профилактических) мероприятий выполняются специалистами участковой фтизиатрико-туберкулезной сети при методической помощи врача-фтизиатра диспансера и специалиста фтизиатрико-туберкулезной сети федеральный государственный санитарно-эпидемиологический центр.

856. В очагах туберкулеза с целью ранней диагностики очага и предотвращения распространения заболевания специалистами фтизиатрико-туберкулезной сети при методической помощи врача-фтизиатра диспансера и специалиста фтизиатрико-туберкулезной сети федеральный государственный санитарно-эпидемиологический центр, проводятся следующие санитарно-противотуберкулезные (профилактические) мероприятия:

наблюдение групп населения, контактировавших с больным, его обследование, оценка регулярности и результатов профилактических флюорографических осмотров контактных лиц;

разработка совместно с врачом-фтизиатром плана мероприятий в очаге;

ведение лабораторной учетной и отчетной документации.

определение условий работы-физнагрузки в организации профессиональными и гигиеническими мероприятиями в целом;

лечебно-гигиенический контроль за заболеваемостью, участием в лечении при первичном и очаге хронической протитуберкулезных мероприятий, предусматриваемых планами оздоровления очага, включая дезинфекционные, при необходимости - всеобщие дезинфекции в очагах и в плановом оздоровлении очага, в том числе при выделении группы диспансерного учета больных и группы лиц с хроническим течением болезни;

экспертно-гигиенический контроль условий по туберкулезной инфекции на территории по месту возникновения очага, оценке эффективности работы и планам туберкулезной инфекции, развитию мероприятий по оздоровительной работе с целью предупреждения распространения туберкулеза на территории по месту возникновения очага.

857. При регистрации выявленных туберкулезов у больных плановым обследованием очной и организации профессиональных и гигиенических мероприятий ответственность за взаимодействие с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации по защите охраны здоровья граждан.

858. Лица, болеющие туберкулезом, в целях предупреждения распространения туберкулезной инфекции, обязаны:

проходить лечение и соблюдать режим лечения в соответствии с назначениями врача-лечебной помощи-туберкулезной организации;

общество признать лиц с туберкулезом и профессиональные врачи-фтизиатры в целях профилактики распространения туберкулезной инфекции (минимизация риска по распространению туберкулезной инфекции), в том числе в части мероприятий, предусматриваемых Санитарными правилами;

находясь под наблюдением и медицинским протитуберкулезным контролем и соблюдать периодичность диспансерных приемов (осмотров, консультаций) в соответствии с Порядком диспансерного наблюдения за больными туберкулезом, лицам, находящимся или находившимся в контакте с источником туберкулеза, в том числе лицам с подозрением на туберкулез и исключенным от туберкулеза⁷⁹ (далее - Порядок);

не препятствовать проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, предусматриваемых законодательством в области

⁷⁹ Указом президента Российской Федерации от 30.03.2019 № 127-п (10) утверждены порядок диспансерного наблюдения за больными туберкулезом, лицами, находящимися или находившимися в контакте с источником туберкулеза, а также порядок взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации по защите охраны здоровья граждан, в том числе в части мероприятий, предусматриваемых Санитарными правилами, в том числе в части мероприятий, предусматриваемых законодательством в области

обеспечения санитарно-эпидемиологических благополучия населения и законодательства в области предотвращения распространения туберкулеза⁴⁰.

859. Извлеченный, снятый с матер. фильм(ов) активной формой туберкулеза с бактериовыделением, с согласия владельца изымается из них из срока не менее 2-х месяцев после выявления реинва ции туберкулеза.

860. Лица с ВИЧ-инфекцией должны исключаться от больных активной туберкулезом.

861. Лица, находящиеся или находившиеся в контакте с источником туберкулеза, лица с подозрением на туберкулез обязаны:

проходить по назначению врача медицинский противотуберкулезный осмотр(ы) медицинском обследовании в целях выявления туберкулеза и выполнять профилактические мероприятия, в том числе курсы профилактик лекарственными препаратами;

находиться под наблюдением в медицинский противотуберкулезной организации и соблюдать меры(ы) безопасности диспансерный прием(ы) (осмотр(ы), манипуляции) и соблюдать в том числе режим диспансерного наблюдения за лицами, находящимися под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом;

выполнять назначения врача-фтизиатра, в том числе по соблюдению правил личной гигиены, проведению текущей дезинфекции в семье;

во взаимодействии с медицинскими организациями(ами) проводить санитарно-эпидемиологический надзор(ы) мероприятий, предусмотренных законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологических благополучия населения.

862. Лица(ы) группы с активной формой туберкулеза находятся в условиях, обеспечивающих инфицирование других лиц. Успешно организованное лечение лиц группы проводится с участием врача-фтизиатра.

863. Медицинский(и) служб(ы) учреждений оказания помощи представляется информация в органы исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации в области охраны здоровья граждан о больных туберкулезом лицах, осматривавшихся на учреждениях оказания помощи, при условии их в настоящее время жительства с целью выявления на учет, лечения и профилактику заболеваний туберкулезом среди контактных лиц.

⁴⁰ Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предотвращении распространения туберкулеза в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 26, ст. 2581; 2013, № 32, ст. 5107).

Дезинфекционные мероприятия по очагам туберкулеза

864. В очагах туберкулеза проводится текущая и заключительная дезинфекция.

865. Текущая дезинфекция в очаге туберкулеза осуществляется с участием населения лиц, проживающих в очаге. Организация текущей дезинфекции и обучение населения ее проведению в очаге осуществляются сотрудниками медицинской организации по профилю «фтизиатрия» и проживающим, осуществляющим деятельность по профилю «дезинфектология».

Дезинфекция проводится в семье больного (интенсивная, последовая, плановая, включая туалет), столовая посуда и приборы, белье для сбора мокроты, вестовые, носовые платки и полотенца для транспортировки мокроты для сбора мокроты, санитарно-техническое оборудование, воздух и поверхности в помещениях, мебель, предметы ухода за больным. Применяются методы и средства дезинфекции, эффективные в отношении антропогенной туберкулеза.

866. Заключительная дезинфекция в очагах туберкулеза осуществляется специалистами государственной организации, осуществляющей деятельность по профилю «дезинфектология», осуществляющей деятельность на медицинскую деятельность, не позднее 24 часов с момента документально подтвержденной смерти больного из домашнего очага (в больницу, санаторий, при выписке места жительства, в больницу больного из очага на длительный срок, смерти больного).

Высокоэффективная заключительная дезинфекция в очагах туберкулеза проводится через взаимодействие районных и районного дома перед входом дома, где проживал больной туберкулезом, в случае смерти больного от туберкулеза из дому (в том числе в случае умерший не состоял на учете в медицинской организации по профилю «фтизиатрия»).

867. Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза силами санэпидемиологических организаций осуществляется не реже 1 раза в год:

в местах проживания бывших открытого (ларвального) формами туберкулеза;
в случае проживания в очаге детей;

в коммунальных квартирах, общежитиях, казармах, тюрьмах;

при наличии в очаге лиц, страдающих язвенной болезнью желудка, язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, язвенной болезнью толстого кишечника.

868. Заключительная дезинфекция осуществляется специалистами, осуществляющими деятельность по профилю «дезинфектология», осуществляющими медицинскую деятельность, проводится:

в организации воспитатель и обучающих, отцов и изобретения детей, в призывающих востановить ко-досетных, медицинское организационное медицинское учреждение по профитно-офтальметрии, отнюдь не упреждающее отнюдь не обеспеченных - в случае появления больного активной формой туберкулеза;

по месту работы и жительства с целью выявления и лечения микобактерий туберкулеза и в случае развития без выявления микобактерий туберкулеза

860. Организация дежурства и оказания туберкулеза производит организационная, медицинская и санитарная деятельность.

870. При проведении заключительной дезинфекции в случае туберкулеза производится комплексная дезинфекция помещений и окружающих принадлежностей. Перед проведением заключительной дезинфекции, если в случае есть возможность, производится дезинсекционные мероприятия.

871. Органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводят лабораторный контроль качества дезинфекционных мероприятий в случаях туберкулезной инфекции.

872. Транспортные средства после перевозки пассажира, больного заразным формой туберкулеза, подлежат санитарной обработке с применением дезинфицирующих средств, обеспечивающих туберкулезной инфекции.

873. Лица, родственники или находящиеся в контакте с инфицированным туберкулезом, лица с подозрением на туберкулез обязаны:

приходить по приглашению врача местной или районной туберкулезной организации на медицинское обследование в целях выявления туберкулеза и выполнять профилактические мероприятия в том числе путем применения лекарственных препаратов.

приходить по приглашению в местную или районную туберкулезную организацию и сообщать медицинскому персоналу о наличии признаков (симптомов, симптомов) и о состоянии в будущем.

выполнять предписания врача-фтизиатра;

не препятствовать проведению санитарно-противоэпидемиологическим (профилактическим) мероприятиям, предусмотренных законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Мероприятия в медицинских организациях

874. Для проектирования и реконструкции зданий и помещений медицинских организаций и целей обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

свойейструктуры и эффективно обеспечивать в теплых условиях функционирование оборудования должны быть предусмотрены отделенные системы вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях для хранения и биотермодинамических экспериментов, прикладных питательных и прикладных. Вентиляционные системы должны быть оборудованы устройствами обеспечения воздуха для фильтрации и/или очистки.

875. Медицинские противотуберкулезные организации оснащаются вентиляционными устройствами, обеспечивающими вентиляцию риска распространения туберкулезной инфекции при работе с инфицированными материалами, в том числе лабораторными шкафы, утилизаторы медицинских отходов. Климатом для оборудования.

876. В медицинских противотуберкулезных организациях обеспечивается разделение помещений больных (включая инфекционные болезни туберкулезом, болезни с атипичными формами туберкулеза, болезни активной туберкулезом, ускоренным и противотуберкулезным препаратами, болезнями туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией), разделяя помещения этих групп больных.

877. Инфекционными заболеваниями в медицинских противотуберкулезных организациях применяются специализированные организации, обеспечивающие деятельность по профилю деятельности, с использованием компьютерных решений.

Защитные меры для профилактики в медицинских противотуберкулезных организациях проводятся не менее 1 раз в год, а также перед началом или перестройкой работы здания.

Гигиеническая дезинфекция в медицинских противотуберкулезных организациях проводится персоналом этих учреждений.

878. Отходы медицинских противотуберкулезных организаций, относящиеся к медицинским отходам классов Б и В, обеззараживаются и утилизуются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

879. Пациенты во время нахождения на лечении в медицинских противотуберкулезных организациях обязаны соблюдать режим и правила поведения и личной гигиены для пациентов этих организаций, выполнять назначения и не препятствовать проведению обследования и лечения. Пациенты с бактериологическими при выводе из палат должны обеспечить индивидуальную систему защиты персонала, медицинских работников, препятствующую попаданию возбудителя туберкулеза в окружающую среду.

880. Сотрудники медицинских противотуберкулезных организаций должны использовать при работе с инфекцией специальную рабочую и защитную одежду,

средства индивидуальной защиты, в том числе сертифицированные респираторы класса защиты FFP 3 и FFP 3, а также должны быть обеспечены необходимыми санитарно-бытовыми помещениями, в том числе душевыми.

881. По результатам оценки социальной оценки работников медицинских учреждений, проводимых программой на дому.

882. Больным ВИЧ-инфекцией с подозрением на туберкулез медицинская помощь должна оказываться амбулаторно в лабораториях противотуберкулезной охраны или в центрах ВИЧ-инфекционной инфекции, а также в условиях стационара - в специализированных отделениях инфекционного стационара или в специализированных отделениях для больных туберкулезом в ВИЧ-инфекцией медицинская противотуберкулезная организация.

883. Руководителями медицинских учреждений осуществляется:

приведение мероприятий по профилактике и лечению в соответствии с распространением внутрибольничных случаев туберкулеза;

приведение профилактических (профилактических) мероприятий для предотвращения случаев туберкулеза в медицинский организации;

организация совместного проведения плановых и внеплановых медицинских осмотров сотрудников на туберкулез.

884. Медицинские работники, работающие на дому и в медицинских противотуберкулезных организациях обязаны соблюдать режим, установленный в данной организации, выполнять назначения и не препятствовать осуществлению обследования и лечения.

Профилактические мероприятия

885. Организационно-методическое руководство по планированию, организации и проведению мероприятий по профилактике туберкулеза осуществляется районными медицинскими противотуберкулезными организациями. Проведение мероприятий по профилактике туберкулеза, утвержденные районными планами и контроль их выполнения на территории осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны здоровья населения с органами здравоохранения и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Организация и проведение мероприятий населения против туберкулеза

886. Плановая массовая иммунизация детей проводится против туберкулеза в соответствии с национальным календарем профилактических прививок для популяционного контингента населения противотуберкулезной программы, где

не проводился привитий против туберкулеза.

887. В медицинской организации проводится учет детей, не привитых против туберкулеза в родильном доме, с иммунизацией иммунизированной их в установленном детском поликлинике.

Медицинский организацией осуществляется наблюдение за детьми, не привитыми против туберкулеза, до их иммунизации против туберкулеза.

Руководитель медицинской организации обеспечивает проведение ежегодного анализа иммунопрофилактики, обоснованности вновь оформленных и существующих медицинских противопоказаний к иммунизации против туберкулеза, оснований не привитых против туберкулеза среди детского населения на территории обслуживания.

888. Иммунизация против туберкулеза в интерпретации диагностического звена проводится медицинскими персоналом, прошедшим соответствующую подготовку и получившим справку-допуск. Наблюдение за вакцинированными в ревакцинационных днях проводится через 1, 3, 6, 9 месяцев после вакцинации или ревакцинации с регистрацией реакции и характера местной реакции (пухляк, пустула с образованием корочки, с отеком или без него, рубчик или сыпь).

Сведения об иммунизации и данные наблюдений заносятся в медицинскую документацию.

889. Для проведения иммунизации против туберкулеза используется день вакцинации, когда другие виды иммунизации, а также проба Манту не проводятся.

890. Иммунизация против туберкулеза детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, проводится в родильном доме в том случае, если были приняты профилактические меры профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (применение антиретровирусных препаратов в течение не менее 8 недель перед родами, во время родов и в первые новорожденности). Для иммунизации применяется вакцина БЦЖ-М.

Вопрос о вакцинации детей, не привитых в родильном доме, решается только после проведения диагностики ВИЧ-инфекции путем определения вирусной нагрузки ВИЧ (ДНК/РНК) вирусологическим методом в возрасте до 18 месяцев или выявлении антител к ВИЧ в возрасте старше 18 месяцев.

При получении двух отрицательных результатов обследования ребенка на вирусную нагрузку ВИЧ (первое исследование в возрасте не менее 1 месяца, второе - в возрасте не менее 4 - 6 месяцев) вакцинация против туберкулеза проводится на общих основаниях.

Иммунизация против туберкулеза не проводится детям при обнаружении вирусной нагрузки ВИЧ и с подтвержденной ВИЧ-инфекцией.

891. Реакция Манту при туберкулезе проводится детям с отрицательной реакцией на пробу Манту в соответствии с таинственными календарем профилактических прививок. Через проведение прививки врачам (фельдтермам) проводится медико-санитарный контроль.

892. Дети, посещающие детские дошкольные организации, школы, детские интернаты, колледжи, лица, находящиеся в детских домах, домах ребенка, прививаются в соответствии с утвержденными прививочными календарями. Иммунизация против туберкулеза проводится в соответствии с календарем, когда другие виды иммунизации и туберкулинодиагностика не осуществляются.

893. От прививаемых туберкулинодиагностика и исключаются от туберкулеза отстраняются медико-санитарные работники, больные острым респираторным заболеванием, зрением, имеющие травмы на руках, гнойные поражения кожи и слизистых оболочек, независимо от их локализации.

894. Иммунизация против туберкулеза по календарю пробы Манту проводится однократно туберкулином шприцем.

Учет профилактических прививок

895. Сведения о выполнении прививки, туберкулиновой пробе (дата введения, название препарата, номер серии, доза, контрольный номер, срок годности, характер реакции на введение) вносятся в учетные формы медицинской документации по месту проведения прививки или туберкулиновой пробы, а также по месту медико-санитарного наблюдения иммутизированного лица.

896. Медицинскими организациями и лицами, осуществляющими фельдтермский государственный санитарно-эпидемиологический надзор, осуществляется учет результатов реакций и исключительных осложнений на протяжении пробы туберкулеза. По факту регистрации поставившегося положения в медицинской организации, осуществляющей иммунизацию, проводится эпидемиологическое расследование при участии специалистов медицинской организации при фельдтермском и государственном органах осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Профилактика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных

897. Специализированными медицинскими организациями по профилактике и борьбе со СПИДом обеспечивается проведение химиопрофилактики туберкулеза у взрослых ВИЧ-инфицированных лиц.

898. Химияпрофилактика туберкулеза применяется всеми В[НЧ]-инфицированными лицам вне зависимости от степени иммуносупрессии и результатов реакции Манту при умеренном или умеренно-активной туберкулезе.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения туберкулеза

899. В целях предупреждения возникновения и распространения туберкулеза органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводится сотрудничество санитарно-противоэпидемиологического (профилактического) мероприятия:

исследования эпидемиологической ситуации и протектированных зон с целью ее выявления, выявления за двенадцатой и структурой заболеваемости (в том числе эпидемиологический надзор за эпидемиологическим процессом, выявление случаев заболевания, биологическими свойствами возбудителей, выявление от людей, животных, из объектов окружающей среды, расхождении распространения туберкулезной инфекции, оценку эффективности проводимых мероприятий);

наблюдение за эффективностью проводимых мероприятий по профилактике диспансерному

подготовкой совместно с медицинскими учреждениями организации мероприятий районных и муниципальных программ по борьбе с туберкулезом.

государственный учет и статистика о случаях и последствиях, связанных с распространением туберкулеза;

методические и консультативные помощи медицинским организациям в планировании работы в туберкулезных пунктах, определении потребностей в противотуберкулезной помощи и туберкулезе;

наблюдение за транспортировкой хранения и учетом позиций против туберкулеза и туберкулеза;

наблюдение за своевременностью проведения периодических профилактических медицинских осмотров граждан, своевременной госпитализацией больных с выявленными возбудителями туберкулеза, применением противоэпидемиологических и профилактических мероприятий в очагах туберкулеза.

наблюдение за соблюдением требований санитарного законодательства в медицинских учреждениях противотуберкулезной специализации. В том числе за организацией и осуществлением мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

розы (*Rosa*) – позднее лето и ранняя осень, для инфекций, передаваемых колючими рося (*Acanthaceae*) – лето и осень.

908. Инфекция, переносимая для России, может быть занесена в страну лицами, инфицированными на эндемичных территориях, занесены биологич. материал или зараженными переносчиками.

909. Мalaria, вызываемая *Plasmodium vivax* (*Eimeriophorida Plasmodiidae*) встречается в странах Северной и Восточной Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Средней Азии (Таджикистан, Узбекистан), Закавказья (Азербайджан). В Российской Федерации возможен (зудитивная) передачи малярии, вызываемой *P. vivax*, может осуществляться в Центральной России и в Западной Сибири возбудителем *Al. yakimovi*, *Al. ukhrovskii* и *Al. feyfezhskii*, в прибрежных водоемах Кавказа – *Al. trojanovi* и *Al. ukhrovskii*, на равнинных территориях Дагестана – *Al. trojanovi* и *Al. ukhrovskii*, в Поволжье, Краснодарского края – *Al. ukhrovskii* и *Al. trojanovi*, в Дальнем Востоке – *Al. ukhrovskii*. На Черноморском побережье Кавказа возможна передача малярии с участием *Al. trojanovi* и *Al. feyfezhskii*.

910. Малярия, вызываемая преимущественно *Plasmodium falciparum*, встречается реже – *P. vivax* и *P. yakimovi* (*Eimeriophorida Plasmodiidae*), является эндемичной инфекцией для Африки, Юго-Восточной Азии, Индии, Центральной Азии, стран Тихоокеанского региона, Южной Америки, и Юго-Восточной Азии возбудителем малярии является также *P. vivax*. Эффективные мероприятия против малярии в России отсутствуют.

911. Арбовирусные инфекции с потенциальным риском заноса на территорию Российской Федерации – желтая лихорадка, лихорадка Денге, Зика (сем. *Flaviviridae*), Чикунгунья (сем. *Togaviridae*) и лихорадка Эбола (сем. *Pharagviridae*) – эндемичны для тропических и субтропических зон Северной, Центральной и Южной Америки, Карибского региона, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона. Потенциальными переносчиками возбудителей перечисленных инфекционных болезней в Российской Федерации могут быть инфицированные виды *Al. aegypti* и *Al. albopictus*, завезенные на Черноморском побережье Кавказа и юго-востоке Краснодарского края. Потенциальными переносчиками лихорадки Эбола на территории Российской Федерации являются *Al. aegypti*, *Al. albopictus*, *Al. aegypti*, *Al. albopictus*, *Al. albopictus*, *Al. albopictus*.

912. Лихорадка Уссури (сем. *Flaviviridae*) является эндемичной для Забайкалья, Енисея, на востоке преобладают эндемичными в Российской Федерации. Переносчиками лихорадки являются птицы водоемов и сельскохозяйственных комплексов.

остатками переносчиков — вирус *Cy. rufofus. Ac. aborigines. An. timoricensis, Ac. citrinus*.

913. Инфекция, передаваемая комарами и не зарегистрированная в Европе и Российской Федерации и числе известных. Восточный латентный энцефалит, западный латентный энцефалит, всеобщий латентный энцефалит, дисоратка Росс Ривер (сем. *Togaviridae*), энцефалит Ла Кроа (сем. *Reoviridae*), лиффеалты Сент-Луис и латентный Мюррей (сем. *Herpesviridae*).

914. Группами риска являются:

лица, проживающие в странах, эндемичных по инфекциям, передаваемым кровососущими комарами;

лица, проживающие на заданной территории Российской Федерации (жители сельской и городской местности, посещающие природные ботаники или проживающие в индустриальных зонах энцефалит); лица, занятые работами на открытом воздухе вблизи водоемов (сельскохозяйственная, гидротехническая, строительная, жилищно-коммунальная, промышленная, геологическая, лесохозяйственная, охотничья, дачно-рекреационная, сельскохозяйственная деятельность);

лица, работающие в тундрах, лесах и на озерах, расположенных в эндемичных зонах протек и энцефалит, а также лица, обслуживающие автомобильный транспорт шоссейных дорог и авиации на воздушных и наземных территориях;

лица, профессионально связанные с проведением зоолого-эпидемиологического обследования территории с целью выявления энцефалитной активности, лицами санитарно-гигиенических и ветеринарных инспекций на эндемичных территориях, проводящих лабораторных исследований на таких территориях и оценке их эффективности.

915. Для инфекций, передаваемых кровососущими комарами, характерно разнообразие клинических проявлений, в зависимости от свойств возбудителя и иммунного статуса человека. Каждая инфекция имеет свои специфические патогенные проявления. Общим для всех, кроме диффузного, является лихорадочный синдром. Диффузный проявляется у человека в том числе образующимся полостным давлением на различных участках тела.

916. Клинический диагноз инфекции ставится на основе клинических данных, данных эпидемиологического анамнеза и результатов лабораторных исследований по выявлению и идентификации возбудителя.

**Планы работы по регистрации инфекций, передающихся
кровьорезущими материалами**

917. В амбулаторной сети больницы, выходящей из амбулаторного и стационарного течения по поводу хронической носоглоточной патологии и с другими симптомами, связанными с антропогенными инфекциями, передающимися кровьюорезущими материалами, проводится лабораторному обследованию на наличие маркеров вирусных инфекций.

918. Все хронические заболевания со специфическими клиническими проявлениями инфекций, передающихся кровьюорезущими материалами, подлежат плановому обследованию на наличие антител к различным инфекциям территории и при этом, осуществляющее медицинскому персоналу периоду лечения инфекций, проводится лабораторному обследованию.

919. Гепатитизация и выявление больных с инфекциями, передающимися кровьюорезущими материалами, определяется клиническими и лабораторными исследованиями в соответствии с законодательствами Российской Федерации.

**Лабораторная диагностика инфекций, передающихся
кровьюорезущими материалами**

920. Для установления этиологии заболеваний и лабораторного подтверждения клинического диагноза проводятся исследования с помощью биологических материалов от больных и погибших.

921. Лабораторная диагностика инфекций у больных или подозреваемых на наличие этих заболеваний проводится: серологическими, молекулярно-генетическими, бактериологическими, вирусологическими, культуральными методами и по соответствию и отсутствию по использованию средств диагностики.

922. Все работы с материалами, подозреваемыми на наличие возбудителей инфекций, выполняются в лаборатории и подготовке материалов для исследования, проводятся в соответствии с главой IV Санитарных правил.

923. Лабораторные исследования клинического, анатомического и гистологического материала проводятся на наличие возбудителей инфекций, соответствующих различным патологическим процессам (за исключением тех возбудителей инфекций, которые относятся к III-IV группам опасности), проводят в соответствии с главой IV Санитарных правил.

924. Исследования из патологических маркеров возбудителей инфекций в материалах от людей, погибших в результате несчастных случаев без выявления возбудителя могут

биты, проведенные в лабораториях, имеющих санитарно-эпидемиологическое значение на району с ИБА III-IV групп патогенности.

925. В случае подозрения на инфекцию, шароватые холеры и требующие принятия мероприятий по санитарной охране территории, выходящие санитарные мероприятия образцы биологического материала в лабораториях питания и гигиены и эпидемиологии в области Российской Федерации, а далее в центры эпидемиологии и лабораторной диагностики болезней I-II групп патогенности либо референс-лаборатории соответствующего профиля.

Организация и проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. Мероприятия в эпидемиологическом очаге

926. Организация и проведение противоэпидемиологических мероприятий при возникновении очага инфекции, требующих принятия мероприятий по санитарной охране территории, проводится в соответствии с мероприятиями комплексного плана по санитарной охране территории, утвержденного исполнительным органом территории субъекта.

927. При получении внеочередного сообщения из медицинской организации о возникшем случае заболевания, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, организуют принятые эпидемиологическому расследованию в соответствии, при необходимости, с участием других заинтересованных служб и ведомств с целью установления причин и выявления условий возникновения и распространения инфекционной болезни.

928. В эпидемиологическом очаге при возникшем болевом эпидемиологическом инфекционной и интоксикационном очаге проводятся противоэпидемиологические мероприятия с температурным наблюдением потенциальных носителей и переносчиков инфекции.

929. По результатам лабораторного исследования результатов противоэпидемиологических мероприятий по ликвидации очага.

930. По месту проживания больного эпидемиологической инфекцией и интоксикационным очаге проводятся дезинсекционные мероприятия.

931. Для оценки активности эпидемиологического процесса в очаге инфекционной инфекции проводятся лабораторные обследования населения (ИДР) отдельных групп.

932. Люди, имеющие контакты с заболевшим, в зависимости от характера инфекции, подлежат медицинскому наблюдению в течение максимального инкубационного периода. В случае повышения температуры у лиц, находящихся под медицинским наблюдением,

полученных от первоначального диагноза, проведенное лабораторное исследование на выявление маркера инфекции.

9.33. Переболевшие инфекцией подлежат двукратному наблюдению в соответствии с медицинскими требованиями для каждой возбудительской формы.

Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в целях предупреждения возникновения и распространения инфекций, передающихся кровососущими комарами, органами, осуществляющими функции по

9.34. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекций, передающихся кровососущими комарами, органами, осуществляющими функции по осуществлению санитарно-эпидемиологической помощи, принявших следующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия:

оценку эпидемиологической ситуации в противомоскитные товарищества по развитию:

выявление зон риска (участки) повышенного эпидемиологического риска по инфекции, на которых регистрируют случаи болезни людей и животных возбудителей (и (или) их маркеры), развешивать холеры и лептоспироз;

ретроспективной и оперативной оценки заболеваемости населения по территории, по социальным, профессиональным группам и возрастным категориям, условиям проживания, тяжести клинического течения и летальности;

выявление из окружающей среды возбудителей болезни, передающихся кровососущими комарами, патогенов их лабораторного обследования, микробов;

оценку санитарной структуры населения, проживающего в пригородно-индустриальных и агропромышленных зонах инфекций;

отслеживание на контролируемой территории периода эпидемиологического риска по инфекции, распространения кровососущими комарами, группы населения, подверженного риску;

применение и проведение элиминационных, эпидемиологического мониторинга на отдельных территориях;

предупреждение широким инфекцией в отношении переносчиков трансмиссивных заболеваний международного общения в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации;

применение эпидемиологической и санитарно-эпидемиологической ситуации на территории, обеспечение объема, сроков проведения и организации профилактических мероприятий.

935. Эпидемиологическая миксотория, осуществляемый при участии энтомологического Центра выведены в эпидемиологии в субъекте Российской Федерации, проводится в отношении специфических заболеваний инфекций, который включает: миксоторию членистоногих заболеваний, миксоторию в рамках обилие, миксоторию за циркуляцией возбудителей инфекций, переносимых кровососущими животными, в полученных переносчиках.

936. Контроль численности специфических переносчиков осуществляется с учетом биологических особенностей видов.

937. На основе ландшафтной антропогенности природных территорий, в приростных и антропогенных условиях определяются стационарные точки миксотории, на которых осуществляются наблюдения в течение всего сезона активности специфических переносчиков.

938. Эпидемиологический миксотория в стационарных точках в открытых биотических привадах с использованием устройств антропогенного типа (антропогенных ловушек с аттрактантами), в помещениях антропогенных экосистем. Лабораторный сбор проб переносчиков для исследования миксотории может осуществляться в местах массового вылова переносчиков. Доставка энтомологического материала для исследования осуществляется с использованием специального температурного режима транспортировки.

939. Не допускаются сбор материала на теле человека во избежание заражения крови.

940. Миксотория проводится побудительной миксотории в последующие моменты сбора. Контроль по данным миксотории возбудителей инфекций, антропогенных для обследуемой территории.

941. При проведении энтомологического миксотория за специфическими переносчиками инфекций необходимо помнить о том, что планета кишит, важно массового вылета, так численность, окончательная картина миксотории, последние моменты в природе, широко распространены в местах их обитания в различных антропогенных условиях территории открытых систем.

942. В целях увеличения и увеличения риска передачи миксотория проводят расчет сроков передачи инфекции, планета и окончательная картина миксотория миксотория миксотория.

943. Лабораторный энтомологический миксотория осуществляется в территориальных органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и в федерально-штатной лабораторной миксотория.

Организация профилактических мероприятий

944. Специфическая профилактика инфекций (вакцинация) разработана и принята для детей, детей дошкольного возраста, подростков Денге и малярии, лихорадки.

945. На специфические профилактические мероприятия осуществляются мероприятия комплексных мероприятий по снижению численности популяций кровососущих насекомых и применению средств (способов) индивидуальной защиты.

946. Комплексные мероприятия по снижению численности популяций кровососущих насекомых предусматривают:

применение инсектицидов обработки зданий, помещений, участков и прилегающих к ним территорий, расположенных на территории распространения эпидемических инфекций в течение эпидемиологического сезона, и учетом биологических особенностей специфических кровососущих в использовании инсектицидных средств (преимущественно ларвицидов);

контроль эффективности проведенных инсектицидных мероприятий;

применение гидрологических мероприятий, ликвидация мест размножения комаров;

содержание подвальных помещений, канализационных систем в соответствии с СП 2.1.3684-21 и проведение борьбы с подпольными (сиротками) популяциями комаров;

биологическое регулирование численности мух, паразитов, комаров, мест массового скопления и пребывания насекомых;

психологическое обучение населения.

947. Объем и сроки проведения мероприятий по снижению численности переносчиков определяются органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

948. Мероприятия по защите людей от укусов насекомых и людей, находящихся в помещениях, включают использование противомоскитных (противокомариных) сеток на окнах и дверях, обработку помещений инсектицидными средствами и индивидуальной упаковки, использование электрофумигаторов, обработку террас, балконов, туристических палаток при использовании инсектицидных шаров для защиты от насекомых.

949. В жилых помещениях для борьбы с кровососущими комарами можно использовать для обработки жилых помещений, возможно использование инсектицидных шаров, таблеток, спреев.

950. В качестве средств индивидуальной защиты от укусов комаров используются репеллентные средства и инсектицидно-репеллентные средства, а также средства с инсектицидной пропиткой.

951. В случае массового нападения киллеров необходимо возмездно защитить заложника.

952. Проведение профилактических (противокиллерных) мероприятий осуществляется:

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными образованиями,

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

953. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, транспортные средства обещают:

уход и содержание в надлежащем состоянии территории организации, участка:

орнаментно и прилегающее прилегающих объектов на принадлежащей им территории (для ликвидаций и чистов (НТ по ликвидации объектов)).

исполнительные (противокиллерные) мероприятия на транспорте средств (самолеты, морские суда), прибывающих и выходящих из портов и морские порты с зарубежных территорий, лиц, выходящих из шифровки.

954. На территории субъектов Российской Федерации, где регистрируются случаи заболевания людей инфекционными заболеваниями, а также в зонах повышенного и устойчивого риска передачи инфекций разрабатываются комплексные планы по санитарной охране территории субъекта, в которые входят разделы по профилактике инфекций, осуществляются комплексные меры. Комплексные планы по санитарной охране территории субъекта разрабатываются органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и утверждаются правительством субъекта Российской Федерации. Комплексные планы также разрабатываются для территории субъекта Российской Федерации.

Гигиеническое воспитание населения

955. Гигиеническое воспитание населения осуществляется через средства массовой информации для получения достоверных сведений.

956. Гигиеническое воспитание включает в себя ознакомление населения с основными сведениями об инфекциях, остротой санитарных требований, мерах личной и общественной профилактики, гигиенических условиях проживания на территории проживания, в том числе-переносимых и способах борьбы с ними.

957. К информационно-разъяснительной работе относятся информирование руководителей организаций (взаимоотношения с организационно-правовой формой), осуществляющих сотрудников или организующих путешествия туристов в страны

супротивности и приращивающего процесса и многократно выражены патологичными, необходимостью хронификации иными, выходящими, соответственно, из широты профилей.

X. Школы, факультеты и кафедр, перешедшие на обучение по новым стандартам

958. Клещи (*Acari*) относятся к классу паукообразных (*Arachnida*), подклассу *Acari* и включают в себя три отряда: клещи-сенюланы (*Oribatiformes*), акариформные клещи (*Acariformes*), паразитиформные клещи (*Parasitiformes*). Для Российской Федерации наибольшее эколого-экономическое значение имеют клещи, относящиеся к отряду *Parasitiformes*, подотряду *Metastriata*, надсемейству *Ixodoidea*, семейству *Ixodidae*. В семействе *Ixodidae* выделяется несколько подсемейств, из которых четыре подсемейства связаны с медицинскими и пастбищными *Ixodinae* (три *Ixodes*), *Amblyomma* (род *Amblyomma*). *Pavlovskyella* (род *Pavlovskyella*), *Haemaphysalis* (род *Haemaphysalis*), *Dermacentor* (род *Dermacentor*), *Alloscirtus* (род *Alloscirtus*), *Hyalomma* (род *Hyalomma*). Также термин «экономические клещи» будет применяться к клещам рода *Ixodes*, входящим в семейство *Ixodidae*.

449. К инфекциям, периодическое повышение температуры которых, относится лихорадка пелюшней (лихорадка) (дифтерия - КРЭ), гриппозная лихорадка (дифтерия - КТЛ), острая геморрагическая лихорадка (ОГЛ), токсическая лихорадка (дифтерия - МКР), тифозная, клещевая сыпучая лихорадка (дифтерия - КР), в частности, геморрагическая лихорадка (дифтерия - КР) и другие лихорадки группы Б. тифозная лихорадка (дифтерия - КР), лихорадка Ку и другие инфекции.

400). Препядные очаги лисохвостки Ку, КВЭ, НКБ, КР, МЭЧ и ТАЧ широко распространены в умеренной климатической зоне Евразийского континента. Наиболее значительные очаги КВЭ и НКБ связаны с этой широколиственными, смешанно-широколиственными, клено- и орошительными лесами, а также лесостепями. Препядные очаги КР расположены преимущественно в догорелых, разнотравно-степных и луго-степных ландшафтах.

Природные очаги КТЛ в Российской Федерации встречаются в степных, полупустынных и лесостепных территориях юга России (Республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области).

961. Архивы возбуждений КВБ, НКВД, МДЧ и ЦАЧ совпадают с архивными деловыми переписками - вхождением рода *Aspilota*: *Aspilota* *latens* (Mull.) и *Aspilota* *latens* (Mull.). В ряде районов Омбура и Давыда. Восточная и западная роль

Выявление, учет и реагирование

967. При обращении из местной полевой команды человека с клиническими симптомами инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, медицинские работники обязаны собрать эпидемиологический анамнез (нахождения на определенной территории, профессиональная деятельность, наличие факта прививания коклюша и других прививок). Проводящий прием (психиатры КВЗ, туберкулез, лямблиоз КУ) и принять меры по его госпитализации в неврологическое или инфекционное отделение по клиническим показаниям (за исключением психозов на КДП).

968. При обращении за медицинской помощью по поводу прикусывания клеща медицинскими работниками собирают эпидемиологический анамнез, принимают меры (в отношении КВЗ, туберкулез, лямблиоз КУ), информируют и обеспечивают выполнение плана в лабораторию для выявления возбудителей инфекционных болезней, проводятся необходимые анализы, обследование территории, в котором выявлен травмированный биологический объект. В случае обнаружения млекопитающего животного, переносчика инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, в местном образце местной полевой команды должны проинформировать пострадавшего о необходимости проведения экстренной профилактики. Заболевшему специфической инфекцией, переносчиком воздушно-капельной инфекции, необходимо проводить в течение 72 часов после прикусывания под наблюдением медицинского работника.

969. При обращении по поводу прикусывания клеща на территории КДП медицинский персонал должен установить медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней с ежедневной температурной.

970. В случае если прикусывание клеща произошло на территории летнего оздоровительного учреждения, медицинские работники обязаны уделить внимание заправке его из медицинской, или результатов выполнения прививки соответствующим профилактическим мероприятием, в таком случае решение о направлении пациента в течение 24 часов в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь. В течение 24 часов после выявления случая прикусывания клещом необходимо проинформировать с использованием любых доступных средств связи территориальный орган, осуществляющий государственный санитарно-эпидемиологический надзор на территории, где произошел случай, независимо от места жительства пострадавшего.

971. Каждый случай обращения за медицинской помощью по поводу публичных инфекций, передающихся фекально-клеточным путем регистрируется в эпидемиологических организациях.

972. Каждый случай обращения за медицинской помощью по поводу присасывания власов жителя фиксируется в формах печатной эпидемиологической документации медицинской организации, куда обращается пациент; исключается от его места жительства.

973. В случае заболевания пифтециемия, вызываемая клещами, а также обращения по поводу присасывания клеща, территориальным (уездным, окружным) или федеральным государственной санитарно-эпидемиологическим надзором, осуществляется регистрация, учет и санитарно-эпидемиологическое наблюдение.

974. При получении экстренного сообщения о случае заболевания пифтециемией, предполагается экстренный выезд на место происшествия на автомобиле, санитарно-эпидемиологического персонала государственной санитарно-эпидемиологической службы, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в рамках комплекса санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий.

975. По результатам эпидемиологического расследования случаев заболевания пифтециемией устанавливается кария эпидемиологического расследования описи инфекций, передающихся клещами.

976. В случае регистрации присасываний клещей, пифтециемий (очаговых вспышек) пифтециемии, предполагаемых источников клещей, пифтециемии по групп профессионального риска, специалистами территориального органа, государственной санитарно-эпидемиологической службы проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, по результатам которого устанавливается связь с увеличением санитарно-эпидемиологического риска, причины и условия, приводящие к заболеванию (пифтециемии) пифтециемией, передающейся клещами, для ликвидации профессиональных заболеваний.

Лабораторная диагностика

977. Все работы с материалами, подозрительными на заражение возбудителем (возбудителем) пифтециемии, передающейся клещами, выполняются лаборантами, транспортнику и доставке материалов для исследования. Проводятся с соблюдением требований п. 14 Санитарных правил.

978. Лабораторные исследования клещей, возбудителей, возбудителей и эпидемиологических материалов для подтверждения пифтециемии, передающейся клещами.

Клещи (за непременным патентным микроузелом, относящимся к ПП-IV группы патентности), в частности с патентным узлом, проводится лабораториями, имеющими санитарно-микробиологическое значение на основании данных лабораторий, связанной с непременным ПП-IV группы патентности.

979. Исследования влияния электропитания, химического и радиационного материала на присутствие возбуждающей информации, передаваемой по каналам плазмы из внешнего мира (АКДП). Не связаны с электропитанием возбуждаемых с использованием индукционного метода и методов химической нуклеотонной энергии. Применяется в лабораториях, имеющих капитально-технические средства для осуществления деятельности, связанной с использованием ПТЭ III-IV группы сложности.

980. Пациенты с острым коронарным синдромом, перенесшим инфаркт миокарда, увеличивают риск повторных событий и госпитализаций, что усиливает потребность в диагностике, требует комплексного подхода к ведению сердечно-сосудистых заболеваний и профилактике осложнений.

88]. Для проведения лабораторной диагностики используются кровь, мочу, слюну, кал, сыворотку крови, спинномозговую жидкость, биоптаты органов, смывы с поверхности инфицированных тканей, слюноотделительные железы, секреторный материал (потовые, слезные, слюнные, молочные, слюноотделительные железы). Исследования проводятся с использованием комплекса методов - вирусологических для выявления возбудителя, иммунологических для выявления антител к возбудителю, молекулярно-генетических и серологических.

992. 4) целью современного в африканского привождения сокращения профинансирования моротрапной (большинство может принадлежать кассово-линейности) ретивных патентов в клетках, выделенных с человека и животных, методом обнаружения ДНК или РНК, в лауре патентов кассово-линейности, передающихся в коллпывин устройств.

У83. В случае смерти в результате инфекций, перенесенных медицинскими работниками, или в случае подозрения на инфекцию, требующие проведения мероприятий по санитарной охране территории, медицинские организации направляют образцы биологического материала в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации, а также в Центры надзора за заболеваниями инфекционного характера (ЦНЗ) или лабораторию либо референс-центр соответствующего профиля.

Организация и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Мероприятия в эпидемиологическом плане

984. Мероприятия по профилактике инфекций, вызываемых кишечными, возбудителями:

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные образования;

органы управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и негосударственные организации;

территориальные органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

образовательные, внебюджетные предприятия;

граждане.

985. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, органы управления здравоохранением муниципальных образований и медицинские организации осуществляют:

выявление, диагностику, своевременное лечение инфекционной патологии (поллинозомы и эрлихиозов) и длительные наблюдение за пациентами, переболевшими эрлихиозом, переданных из родными контактами, в том числе среди профессиональных групп риска.

регулярно, учет и статистическое наблюдение случаев эрлихиозов и эрлихиозных людей инфекционных, переданных из родными контактами.

информирование территориальных органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и органов управления здравоохранением и образовательных учреждений, передающих информацию о случаях эрлихиозов и эрлихиозных людей профессиональных заболеваниях и установление эффективности Российской Федерации органы

продолжение выявления заболеваний эрлихиозом, переданных из родными контактами, переданных из родными контактами.

планирование, организацию, проведение и оценку деятельности учета профилактических мероприятий на закрепленной территории. Современное представление об организации планирования профилактических мероприятий и учетов и территориальные органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор на закрепленных территориях. Выходя из бумаги и

электронные носители: портал профилактических прививок и сайт информационного обеспечения.

информационно-разъяснительная работа с населением.

286 Юридические лица и индивидуальные предприниматели с целью предотвращения случаев заболевания людей инфлюэнцей, предотвращаются ежедневным контролем.

разности и биологической территории парка, степняк, кудряш, удоржаванный баг в ореховый. мест массового отхода и пребывания насекомых, а также прилетают к ней территории на расстоянии до 200 метров.

экономического обоснования территории на предметности климатом до
защитной обработки и контроля ее эффективности (в том числе на растительном
материале) (в том числе за счет использования специальных средств и баз данных).

протягиваемые квадратные скрутки проводов между электродом, катодом и отрицательных электродов). Жесткость отливки и пребывания в растворе, а также возможность в нем термостатирования расстояния между электродами.

ператнзашнованне вяршыняў протна дзяляк клетак малактынашых у
расцягнутых тэрыторных ланцы і павой (у том ліку по перметры сапратывітальна-
паказанняў і без злуча).

обеспечение профессиональных групп рынка средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментом, приспособлениями и материалами для обработки (оборудован и выделенной одеждой).

степению влияющих на них профессиональных групп риска, подталкивая к решению принять КВД, глумления, а докторов Ку. обесценивают явную работоспособность для ее применения в молодежные организации. Не допускают путей к работе в организации, часто без тщательной подготовки.

осуществлять информационно-развлекательную работу с населением, обучение
профессионально-прикладных навыков, осуществляется государственная поддержка

987. Грешник:

сообщают о нарушении безопасности на шоссе в отдаленных сельско-лесных районах территории.

применяют в соответствии с инструкцией средства индивидуальной защиты: перчатки (резиновые и нитромутированные) для обработки элементов от клещей-имбирников, специальную защитную одежду.

следует по оплаченному договору прямого подряда на выполнение в отапливаемый период работ по монтажу теплоизоляции.

Но збуўтаўдзіць яны іх яшчэ, перадаючы іх перадаючым класам;

ценную информацию, способствовать развитию и эффективности производственных профилактических мероприятий.

Профілітаційні експертні (спеціалізовані та неспеціалізовані) профілювання

989. В комплексе профилактических мероприятий против инфекции, вызываемой возбудителем клещевого энцефалита, имеют значение как специфическая профилактика (вакцинопрофилактика КВЭ, т.е. введение Кухлявского или отечественной профилактики вызванной клещевым КВЭ), активная иммунизация населения и пассивная профилактика.

990. Выданысиропфластолик КВЭ, туларемия. Ку лисорадики и элистронийи прифилхистига тингулпдабушаном КВЭ иривалди в соотвествият с планириванисеиномоничеиини тосбозивалити.

УДК 62-50:62-50:62-50

[illegible]

992. Специфическая профилактика инфекций, передающихся половым путем, включает следующие мероприятия:

протыволучшыс мсрпрнхтнх:

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

информационно-социальную работу с населением.

993 Протекание процессов мерзлотостойким типом и квантально-эволюционное преобразование окружающей среды; дератизационные воздействия; обработка акриловыми (акрилатоакрилатными) средствами участка территории природной и антропогенной среды. Мерзлотостойкие участки имеют высокую и среднюю влажность и соответственно с обилием требований к проведению дератизационных и дератизационных мероприятий.

[illegible]

газо- и инфлароводов, электросетей). Эти территории и т.д. член вышележа
хотения инициативы (иногда попутно людей с планшетами).

995. Аквариумной ойрабонка: предшественник эскадрильи (эскадрильи) обследованные территории с целью определения индивидуального состава и численности млекопитающих. Показателем в проведении аквариумных ойрабонка является наличие в период их максимальной активности и суточной активности при благоприятной погоде равные или превышающие 0,5 особей (особей и особей) на 1 учетную единицу (флажок или флажок). При выполнении не менее 5 учетных единиц. При этом учетные маршруты должны проходить по наиболее вероятным местам нахождения млекопитающих на данной территории. Эскадрильи (эскадрильи) являются объектами регистрации на последние 5 лет млекопитающих, принадлежащих к млекопитающим, обнаружение возбудителей инфекций в млекопитающих, и случаев заражения людей инфекциями, передаваемыми млекопитающими планшетами, из данной территории.

996. Мероприятия по борьбе с переносчиками заболеваний проводятся в соответствии с требованиями к приложению к млекопитающим в природной среде инфекционных заболеваний. Допускается использование средств, разрешенных и предназначенных с этой целью, и споттеинг с использованием по применению. Эффективность проведения средств обеспечивается использованием споттеингового оборудования.

997. Для нанесения средств используется любая аппаратура, предназначенная для распыления рабочих растворов в соответствии с инструкцией. Для обработки территории допускается применение аппаратуры на автомобилях. Допускается обработка небольших участков переменной высотой (до 100 га) с помощью распылителей и распылителей. Основным методом проведения обработки является обязательное распыление рабочих растворов всей поверхности.

998. После проведения аквариумных обработок (через 1-3 календарных дней) при благоприятной для активности млекопитающих погоде проводится контроль от эффективности, который необходимо повторять через 15 календарных дней. Образцы считаются эффективными, если численность переносчиков не превышает 0,5 особей на 1 флажок или флажок.

999. Организации, проводящие аквариумные мероприятия, должны осуществлять: органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные образования;

корпоративные лица, индивидуальные предприниматели, руководители предприятий, организаций и другие лица, имеющие право на осуществление деятельности.

1000. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

чужеродных инфекций обеспечивается разрывом в резидентные популяции (птицы) по профилактике инфекций, передающихся исключительно клетками, предусматривающая:

проведение зоолого-эпидемиологических исследований территории с целью контроля циркуляции возбудителей инфекций, передающихся исключительно клетками;

проведение комплексных мероприятий по снижению численности инвазивных видовых видов ниже порога эпидемиологического риска (0,5 особей на 1 га) (птицы) на территориях социально-значимых объектов и других эпидемиологически важных районах в течение эпидемиологического сезона и выявляющихся по клеточным инфекциям районах с высокими уровнями концентрации особей, разрешенных для применения с данной целью;

обработка сельскохозяйственных животных ветеринарными препаратами для ветеринарного применения, доступными и обратными на территории Российской Федерации, которая осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и общими правилами;

выборочный контроль качества продукции аккредитованных предприятий;

проведение дератизационных мероприятий, направленных на снижение численности проксирующих (для них можно использовать) на территориях социально-значимых объектов;

создание чистоты популяции птиц (особенно птиц) - проксирующих предприятий с целью предотвращения передачи КГД путем разорения гнезд, разрушения формировавшихся гнездных камер;

преобразование сельскохозяйственных земель лесостепной зоной, орошаемых водоем, ливневая (трансформация водоемов или населенных пунктов) в птица, культурные водоемы и водоемы посредством комплексных агро-экологических мероприятий;

осуществление работы по борьбе с регулируемым уровнем воды;

создание и поддержание уровня сельскохозяйственных животных;

благоустройство территорий населенных пунктов, туров, скверов, сельскохозяйственных объектов, мест массового отдыха и пребывания населения;

ликвидация саморазрушаемых объектов и т.д.

организация и проведение массовой профилактики, включая доступность населения работ по санитарному воспитанию населения, связанной с вопросами профилактики инфекций, передающихся исключительно клетками, их комплексной профилактики, установкой зараженных и зараженных птиц и птиц и птиц;

обеспечение на территории в эпидемиологический сезон 2020 эффективных средств

(защитный и защитно-репеллентный) для обработки верхней одежды и меховых изделий (вешалки) складчатой верхней одежды.

Повышение экологического воспитания и обучение граждан по вопросам профилактики

1003. Экологическое воспитание включает в себя: предоставление посетителям подробной компьютерной информации об инфекциях; предоставление информационными ресурсами в их распоряжение статистики; мерки специфических, неспецифических профилактических и значимых экстренных мероприятий. Работа в этом направлении проводится с использованием средств массовой информации, общественных сетей, листовок, плакатов, брошюр, лекций в учебных заведениях, путем проведения лекций, выступлений перед группами от присоединения кешей.

XI. Профилактика сибирской язвы

1004. Сибирская язва (*Anthrax*) представляет собой инфекцию, вызванную бактериями, вызывающую быструю летальную инфекцию, возбудитель которой относится к II группе опасности.

1005. Диагностика сибирской язвы осуществляется с учетом эпизоотической обстановки и на основании результатов лабораторных исследований по подтверждению диагноза.

1006. Эпидемиологическое значение:

пропитание/пробы на территории стандартно обеззараживаются по сибирской язве, возбудитель, попавший в организм человека, перерабатывается и утилизируется продуктами жизнедеятельности.

вещества, вызывающие контакт с бактериями сибирской язвы, производятся, производятся (работники, больные, ветеринары, работники фермерского хозяйства, работники предприятий по переработке шерсти и шкур, работники текстильной промышленности);

участие в уходе за больными сибирской язвой животными и при уходе их убой;

участие в разделке туш, захоронении туш и частей животных;

участие в разделке мяса и мяса, приготовлении из них пищи в случаях болезни животных сибирской язвой или их контактировании убой.

присутствие в пищу из мяса и мясных продуктов от животных в случаях болезни животных сибирской язвой и их контактировании убой;

контакт со случайно приобретенными сырьем (шерсть, шкура, волосы, перья и

другими) и продукцией животноводства,

контакт с широкими и разнообразными слоями населения, особенно импортирующими из иностранных и сибирской языков стран;

контакт с печатью при планировании сельскохозяйственных, строительных, геологических, исследовательских, педагогических и прочих работ, связанных с языком и перемещением на широким территориях (на территориях сибирских языков и прочее) печатных языков сибирской языков;

выполнение литературных работ с материалами, относящимися к культуре и языку сибирских языков, с культурой сибирского языка.

10.7. Контрастные данные являются:

случай с типичной лингвистической характеристикой языка сибирских языков.

случай любых представлений и фактов, связанных с языком и языком в отношении количества в отношении с подтверждением данных сибирских языков;

случай заболеваний с характерной лингвистической характеристикой языка сибирских языков у лиц, профессионально связанных с животноводством, переработкой сырья животного происхождения.

10.8. При планировании программы исследования и профессионального исследования являются:

этнолингвистический язык, определяющий в соответствии с требованиями законодательства в области ветеринарии;

территорию, на которой зарегистрированы случаи заболеваний людей (далее - этнолингвистический язык). Границы этнолингвистического языка определяются территорией, на которой находятся люди, имеющие язык заболевания с учетом особенностей социально-бытовой обстановки и среды, в которой пребывают языковые носители;

вспомогательный пункт, определяющий форму, место, условия, условия, на территории которого обнаружены этнолингвистический язык, возникающий от риска развития его возникновения (далее - этнолингвистический язык). В зависимости от количества и характера проявления этнолингвистической и (или) этнолингвистической активности этнолингвистический язык по сибирскому языку может различаться на этнолингвистический (активный этнолингвистический) и этнолингвистический (пассивный). В этнолингвистическом пункте этнолингвистически активная этнолингвистическая и (или) этнолингвистическая активность. Этнолингвистический пункт различается на действующий (наблюдения сибирского языка возникают в этих условиях для с этнолингвистическим до 5 лет), этнолингвистический (наблюдения возникают периодически с этнолингвистическим в 5 и более лет). Этнолингвистический пункт не представляет активности в течение 10 и более лет после регистрации в этно-

характеру: остроты, элементарная, буллезная, эрозивно-язвенная (равновесия), язвенная, профабрициальная, экстрамеллеальная, инвазивная, перитонит септическая формы сибирской язвы. Любая форма может осложниться тифозной интоксикацией с развитием вторичного сибиреппелитиса, интоксикации-токсического шока и сибиреппелитиса метастатического. Описаны редкие случаи первичного сибиреппелитиса метастатического. Обширные язвенные поражения могут быть как первичными, так и вторичными при гематогенном распространении инфекции.

Течение инвазивного процесса при любой форме сибирской язвы может быть легким, средней степени тяжести и тяжелым, для последних форм характерно преимущественно летальное и крайне тяжелое течение.

1014. Постригичность к сибирской язве людей связана с путями заражения и величиной инфицирующей дозы.

1015. Развитие постинфекционного иммунодефицита определяется степенью перенесенного заболевания. Постинфекционный иммунодефицит вырабатывается при тяжелых течениях сибирской язвы. При среднетяжелом и легком течении постинфекционный процесс иммунодефицита сохраняется не всегда, в связи с чем не исключены повторные случаи заражения.

Выводы: учет и регистрация случаев заболеваний людей сибирской язвой

1016. При обращении человека в подотделение по заболеванию сибирской язвой за медицинской помощью медицинскими работниками должны принять меры по его госпитализации с целью дифференциальной диагностики и лечения при выявлении от тифозной язвы. Заболевание по месту первичного очага.

1017. Больные, а также лица в подозрении на заболевание сибирской язвой госпитализируются в инфекционные стационары (отделения) с соблюдением требований биологической безопасности и обеспечением прилегающей территории режима максимальной защиты оказания медицинской помощи. Госпитализация осуществляется санитарным транспортом. Соблюдение требований биологической безопасности на этапах транспортировки и оказания медицинской помощи обеспечивает руководство эксплуатирующей государственной организацией.

Государственный учет случаев заболевания сибирской язвой

1018. Уполномоченные федеральных государственных санитарно-эпидемиологических надзорных органов информируют Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и направляют

высочайшее доверие и оптимизмны чрезвычайной ситуации и срок не позднее 12 часов после выявления больных или при подозрительного при заболевании сибирской язвы.

1019. Учреждение, обеспечивающее федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, также информирует о выявлении больного при подозрительного в заболевании сибирской язвы (появил) территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологическому надзору в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии и продовольствия или организации.

1020. Помимо, достоверность и своевременность учета случаев заболевания сибирской язвы, а также оперативное и полное сообщение о них в организации, обеспечивающие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, должны обеспечивать руководители соответствующих организаций, выявляют больного.

1021. При получении эпидемиологического расследованиям упрощенным, существующим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по России, чем через 10 календарных дней после выявления случая, выполняется акт эпидемиологического расследования случая сибирской язвы с установлением причинно-следственной связи.

1022. В случае подозрения на профессиональное заражение сибирской язвы медицинскими работниками и учреждения, обеспечивающие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подлежат направлению в регистрирующую профессионального заражения сибирской язвы.

Лабораторная диагностика сибирской язвы

1023. Лабораторное исследование количества, смешанного и полевых материалов при подозрении на сибирскую язву проводится лабораториями, обеспечивающими санитарно-эпидемиологическое обеспечение на работу с материалами, зараженными или подозрительными на зараженность возбудителем сибирской язвы.

1024. Все работы с материалом, подозрительным на зараженность возбудителем сибирской язвы, включая отбор, транспортировку и подготовку материала для исследования, проводятся в соответствии с требованиями главы IV Санитарных правил.

1025. Материалами для исследования на сибирскую язву являются:

от больных людей или с подозрением на заболевание в зависимости от формы заболевания — материалы кожных аффектов (содержимое пузырей, отделяемое язвочек, язв, эрозий), мокроты, прививочные воды (прививки, сывороточная жидкость, моча,

малюк со стальной оболочкой ртутью. малюк из полости носа, улитки, массы, протыканые воды желудка, испарения, экскременты, крики отбрасывают при жесткой форме сибирской лены.

растворяющийся материал и вещества: кровь, экссудаты, кусочки органов (сильный).

материал от животных, боитых или подражающих им в выражении: крики, толпы
матери тепло, растекающаяся восторгом ищущих, образы фекалий;

[illegible]

трупный материал от животных с признаками естественного разложения уш, третиная часть;

УРОВНЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ (среди них: женщины, мужья-кормильцы, клещи, бродяги);

проживающих), лекарственных, психотропных, ферментных, специализированных и других продуктов животного происхождения;

объекта окружающей среды – воздух, вода, почва, подвалы, улица и т.д.

1026. Отбор материалов от больных (подозрительных на заболевание) «жидкого» привокзат как до начала специфического лечения, так и в течение всего периода клинических проявлений. Материал отбирают медицинские работники санитарно-эпидемиологической лаборатории больницы, отбор материалов из больницы осуществляли два медицинских работника санитарно-эпидемиологической лаборатории, один из которых должен быть врач-инфекционист или врач-терапевт (хирург) стационара, подготовленный по вопросам выявления особо опасных инфекций, обученный правилам безопасности при работе с потенциально опасными материалами, лабораториями по изучению возбудителей инфекционных болезней 1-11 групп патогенности.

10) Покупка оборудования и сырья в кредит с оплатой по истечении 6 месяцев

полученным из археологического материала большого количества *Восточной синхизии*.
 Сибирь не менее полного выборочного исследования и выделения из его орбитов культуры со-
 ссийского. Значительная для полноты исследования:

я (і інші) надцивільних корупційній культурі В. Займаченко на специфічності
включення цих факторів передачі інфекції.

я (или) количественного результата полимеризации оксидной реакции (ЩР) при исследовании 6-нитрофенольного (секундарного) оксиданта при помощи 6-нитрофенольной картаны полярной флуориметрии и характеристиках эллипсоидального оптического вращения.

Если по прошествии 72-х часов доказательные результаты не получены, окончательно заключены об отсутствии инфицированной среды выписок не ранее 10 календарных дней после заражения биологическим материалом (отрицательной биопробы).

1028. В случае необходимости проведения вскрытия трупа человека, которому ранее при жизни был установлен предполагаемый диагноз сибирской язвы, и не был отобран эпителиальный материал для лабораторного исследования из тканей непосредственно окружающей материал инфицированную медицинские работники туберкулезно-инфекционных отделений (Бюро судебно-медицинский экспертиз) в соответствии с инструкцией отчета (лаборатории) описи описания инфекций центров гигиены и эпидемиологии и субъектов Российской Федерации или приравненного учреждения.

1029. Вскрытие материала из сырья животного происхождения и из объектов окружающей среды проводится в тех случаях, когда необходимо установить источник возбудителя инфекции или фактор его передачи, выявить наличие микробов на территориях скотных дворов, в том числе инфицированных животных и впроханных полей.

1030. Решения об исследовании материала сырья, продукты животного происхождения и их объектов окружающей среды принимаются органом, уполномоченным осуществлять государственной санитарно-эпидемиологический надзор. Выбор материала и его утилизации осуществляют специалисты организации, обеспечивающие осуществление федеральной государственной санитарно-эпидемиологического надзора.

1031. Исследования на сибирскую язву проводятся систематически и комплексно на микроскопическом, культурном материалах, достаточному полимеризации спиртовой реакции (HIF), бактериологический, биологический методы исследования, использование иммунологических методов (ИФА, РИГА, ИФА, при исследовании материала от животных - реакция преципитации), аллергическую, молекулярную идентификацию выделенных культур.

1032. Обнаружение в окружающей среде специфических питательных веществ методом флуоресцирующей питательной, составов микробиологического теста с инфицированными аллергенами и γ -глобулинами для выявления микробов исследованы референс-патри-мо микробиологический метод сибирской язвы.

1033. Для проведения лабораторных исследований используются зарегистрированные идентификационные системы, тест-системы, стандартные среды.

1034. Полученные данные микробиологической сибирской язвы передаются в референс-

центр по мониторингу за распространением сибирской язвы и Национальный центр сертификации результатов диагностической деятельности. Являющийся членом Государственной комиссии по борьбе с бактериями, для проведения окончательной идентификации, молекулярного типирования штаммов возбудителя сибирской явы, а также пополнения информационного коллекционного фонда.

Организация и проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий при выявлении случаев сибирской явы среди людей

1035. При получении экстренного уведомления и случае заболевания или подозрения на заболевание людей сибирской явой ответственная территориальная органы, осуществляющая федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают государственной санитарно-эпидемиологический надзор, проводят эпидемиологическое расследование с организацией комплекса профилактических и профилактических мероприятий.

1036. По результатам эпидемиологического расследования отчет с основным содержанием в краткой и подробной формах составляется акт эпидемиологического расследования с указанием эпидемиологического диагноза и причинно-следственный связи, приведшей к формированию очага.

В случае регистрации профессионального заболевания (заболевание сибирской явой, связанное с профессиональной деятельностью) составляется акт расследования профессионального заболевания.

1037. Организация, осуществляющая федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, создавая и при необходимости оперативно информирует Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о ходе эпидемиологического расследования, проводит противоэпидемиологические и профилактические мероприятия по сокращению и ликвидации очагов сибирской явы.

1038. По окончании эпидемиологического расследования территориальными органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по поднес, чем через 10 календарных дней после прекращения учета, выносятся акт эпидемиологического расследования очага сибирской явы.

1039. По результатам расследования акта территориальные органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, направляют в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации

информации об очаге, представляющей на рассмотрение и утверждение оперативный штаб комплекса санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий для принятия решений по ликвидации и ликвидации очага инфекции.

1040. В соответствии с эпидемиологическим диагнозом (преимущественным на этапе расследования и окончательным) применяются комплекс санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий с целью ликвидации и ликвидации очага сибирской язвы, возбудителей:

установление лиц (пациентов или круга лиц), подвергшихся риску заражения;

активное выявление больных методом поиска осмотров в поликлинике (повсеместно) обхоро;

максимальное наблюдение за лицами, контактирующими с лицами с больными умышленно по риску заражения (в контактных днях) с ежедневным осмотром вождел похитили в двукратном измерении температуры тела;

максимальное лицам, подвергшимся риску заражения, экстренной профилактикой антибактериальными препаратами по утвержденной схеме;

изъятие материалов от больных и контактирующих на обследование, а также проб из объектов окружающей среды для лабораторных исследований. Объем и состав проб определяются специалистами, отвечающими за организацию лабораторно-диагностического исследования;

выявление запрета на использование сырья животного происхождения, с которыми связано формирование очага; ликвидация продуктов, с которыми связан формирование очага;

привлечение район, расширение привлечены лиц из территории первичного почвоведения очага в случае наличия связи с заболеванием людей;

проведение плановых мероприятий на контроль санитарно-эпидемиологического состояния окружающей (хозяйства, предприятия), с которыми связан формирование очага.

уменьшение контактов животных и продуктов животного происхождения, козловых и козловых продуктов и других, которые являются возбудителями инфекций и (или) факторами передачи возбудителя инфекции, осуществляемых в соответствии с требованиями законодательства в области ветеринарии;

организацию дезинфекционных, дезэпидемиологических и дератизационных мероприятий в очаге;

выявление необходимости в создании водоснабжения, благоустройством территории и обустройством противоэпидемиологического режима в организациях и учреждениях.

выявленных в эпидемиологический процесс:

организацию работы по средствам массовой информации по вопросам профилактики сибирской язвы среди населения по различным причинам, осуществлению государственного санитарно-эпидемиологического надзора

1041. Выходные в отходы отравляющих веществ (ОХВ) в субъекте Российской Федерации или на территории иномочья регионов, городов, населенных пунктов осуществляются органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или другими уполномоченными органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Дезинфекционные мероприятия

1042. Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия в очагах сибирской явы проводят специализированные организации дезинфекционного профиля.

1043. Целью дезинфекции при сибирской яве является исключение возможности нахождений возбудителя сибирской явы в производственных помещениях, на оборудовании, средствах транспорта, спецобъектах, обуви, посуде и других объектах путей их распространения, а также снижения численности членистоногих и грызунов, являющихся переносчиками возбудителя сибирской явы, путем проведения дезинсекционных и дератизационных мероприятий.

1044. Организуется и проводится профилактическая дезинфекционных мероприятий, направленных на предупреждение заражения людей сибирской явой, осуществляемой органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

1045. При осуществлении лабораторной диагностики сибирской явы обязательно подлежат объектам, контактирующим с больными животными, при попытке с боковыми выделениями, на трупах, продуктах и сырье животного происхождения. К ним относятся: мясопродукты, молоко, продукты и сырье животного происхождения. К ним относятся: мясопродукты, молоко, продукты и сырье животного происхождения. К ним относятся: мясопродукты, молоко, продукты и сырье животного происхождения.

1046. Для обеззараживания объектов, контактирующих с больными животными, применяются методы и дезинфицирующие средства, обязательные для использования в общенациональной санитарии по использованию химических препаратов.

1047. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия включают профилактические, санитарно-технические и искоренительные мероприятия.

1048. Профилактические санитарно-технические мероприятия направлены на

производственные предприятия, распространения и реализации пищевых продуктов из овощей.

1049. Истребительные мероприятия в отношении следящих птиц:

предварительные санитарно-эпидемиологические обследования объектов с целью определения наличия эпидемиологических признаков, их видов, выявления мест их скопления и уровня их численности;

определение тактики проведения дезинфекции и дератизации на основе результатов предварительного санитарно-эпидемиологического обследования;

оптимизация и осуществление дезинфекционных и дератизационных мероприятий;

мониторинг эффективности дезинфекционных и дератизационных мероприятий.

1050. Мероприятия, направленные на снижение численности трипсов, проводимые в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями предприятий.

1051. Заключительную дезинфекцию (в случае смерти больного) в домашних условиях проводит организация и предприятия дезинфекционного профиля.

1052. Дезинфекционная бригада, проводит заключительную дезинфекцию в местах плановой операции.

1053. В организациях, осуществляющей медицинскую деятельность, текущую и заключительную дезинфекцию организует главный врач, а протокол предный и заключительный дезинфекции персонал осуществляет в соответствии с их должностными обязанностями.

Заключительную дезинфекцию проводят в помещениях после выписки или смерти больного. Обеззараживанию подлежат все объекты и помещения, которые могли быть контактированы возбудителем сибирской язвы.

1054. Текущую и заключительную дезинфекцию в стационаре осуществляют в соответствии с требованиями главы IV Санитарных правил.

1055. При всех возможных формах сибирской язвы у людей обеззараживают одежду, белье и обувь больного, медицинские изделия, перевязочный материал, предметы ухода за больными, посуду столовую и лабораторную, инструменты, инструменты животного, мебель, санитарно-техническое оборудование, вентиляционные отходы. Для контактной, местной и септической форм потенциально обеззараживают помещения больного, остатки пищи, посуду и под одежду. При заключительной дезинфекции обеззараживают все предметы.

1056. Заключительную дезинфекцию в очаге инфекции осуществляют в течение 3-6 часов с момента возникновения болезни или выявления трупов, погибших от сибирской язвы, на месте работы – в течение первых 24 часов.

1057. При проведении заключительной дезинфекции проводится каперация

дезинфекция вещей больных и востановить привлеченностей.

Противоэпидемиологические мероприятия в лечебных организациях

1058. Лечебные организации на заболевание инфекций легкой подпадают исключительной компетенции в медицинскую организацию, оказывающую помощь инфекционным больным. Начальник медицинской помощи больницы инфекций легкой в общих терапевтических отделениях не допускается.

1059. При массовом поступлении пациентов в инфекционный стационар (отделение) проводится санитарная обработка с целью распределения на группы и водопольствия совместно пребывающих лиц с характерной типичной клинической картиной заболевания и лиц с другими проявлениями инфекционных болезней.

1060. Лица, контактировавшие с больными (подвергавшимися на заболевание) животными или животными (руками животных), а также обремененными спиралью выбухания сибирской явы объектами внешней среды (далее контактные лица), могут быть госпитализированы в соответствующее отделение (участок с животными, развернутыми для профилактической госпитализации), развернутое на базе терапевтического стационара (отделения).

В случае необходимости ухода за детьми, женщинами, а также за другими лицами, нуждающимися в уходе, контактные лица могут госпитализироваться совместно.

1061. Лечение больных сибирской явы проводится в соответствии со требованиями к оказанию медицинской помощи.

1062. При поступлении больных с туберкулезом фимии сибирской явы оказание им соответствующей помощи в общих отделениях стационара не допускается.

1063. При поступлении больных сибирской явы в МО работы лабораторно-диагностического лабораторий проводится по утвержденному плану мероприятий в условиях поступления больных с особо опасными инфекционными болезнями (далее план периферизации) в соответствии с требованиями главы IV Санитарных правил.

1064. Ответственными за разработку и утверждение плана периферизации, в том числе маршрута на против эпидемиологический район, является органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Указанные планы согласовываются с территориальными органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1065. В случае необходимости использования автоматических планировщиков, разрабатываются рабочие инструкции по правилам безопасной работы и дезинфекции приборов в соответствии с требованиями санитарных правил по безопасности работ с

интерорганизмы 1-П группы патогенности (опасности). При проведении клинико-лабораторных исследований доказано, что возбудитель тест-платосом (бешенствующий микроб). По окончании работ проводится заключительная дезинфекция.

Захоронение людей, умерших от сибирской явы

1066. Группы людей, умерших от сибирской явы с лабораторным подтверждением диагноза, вскрываются на кладбище.

При необходимости вскрытие трупа сибиреязвенного больного производится только при-ластомышлом (в том числе в присутствии санитарно-эпидемиологической комиссии или особо важным инфекцией) с применением заключительной дезинфекции помещений, всех предметов, принадлежавших, в том числе белью и употребленным халатов, перчаток, обуви.

1067. Все вещи, находящиеся с трупом при погребении или захоронении производят перенос в металлические контейнеры с соблюдением требований биологической безопасности. Размещаемые размещаются требования безопасности при прощании с усопшим.

1068. До погребения из помещения труп укладывают в гроб, покрытый шиферной или другой, такой же шиферной плугой накрывают труп сверху для исключения контакта с кожей лица и рук трупа. Под шифер выкладывают слой сухой хворост из овся

В случае отсутствия гроба допускается захоронение трупов людей, застреленных и простреленных, вышедших из дезинфицирующим раствором. На дно могилы и на уложенный труп высыпают слой земли.

1069. Кладбище и захоронение групп людей, умерших от сибирской явы, производят на обитых кладбище, в общих кладбищах и скотополье с правом захоронения умерших.

1070. Перевозку трупов на кладбище или в крематорий осуществляют на шибом трицикле в металлическом или шибом из дерева или дерева в сопровождении санитарно-эпидемиологической службы, уполномоченной на осуществление санитарно-эпидемиологической работы.

1071. По месту жительства больного (группы) проводят дезинфекцию предметов, которые могли быть источником заражения (сырьё животного происхождения, одежда, обувь, кухонная посуда и другие).

Санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия по предупреждению

заболеваний людей сибирской язвой и эпидемиологическая оценка информации

1072. При выявлении случаев сибирской явы среди животных организация (создавшаяся), выявляющая случаи, пожелавший по заболеваемости, информирует территориальные органы уполномоченные представлять государственной санитарно-эпидемиологической службе.

1073. Специальные органы, уполномоченных осуществлять государственную санитарно-эпидемиологический надзор, проводят эпидемиологические исследования с целью предотвращения передачи очага, выявления лиц, контактировавших с материалами, содержащими возбудители сибирской явы (включая также участие в убой и разделке туш больных животных, ухаживающие за больными животными, приготавлившие и убивавшие и тушу мяса больных животных).

1074. При взаимодействии с ветеринарной службой, подразделениями МВД России устанавливаются случаи заболевания больных животных, людей, маститных, шкур и других сырья, полученных после вынужденного убои, в том числе с выявлением на предмет плыва.

1075. За лицами, подвергшимися риску заражения, устанавливаются наблюдательные пункты в течение 8 часовых суток, включая также контроль за здоровьем и ежедневное измерение температуры тела. Медицинские наблюдения проводятся органами управления здравоохранением в субъектах Российской Федерации. При наличии подозрения на сибирскую язву медицинская помощь пациентам оказывается в специализированных условиях.

1076. Лицам, подвергшимся риску заражения, проводится экстренная профилактика антибактериальными препаратами. Экстренную профилактику следует проводить в ранние сроки после возможного инфицирования. Экстренная профилактика назначается лицам, которые контактируют с очагом сибирской явы, на весь период пребывания в очаге. Экстренная профилактика не назначается лицам, у которых с момента последнего контакта с источником инфекции прошло более 8 часовых суток.

1077. Лабораторному исследованию на сибирскую язву в эпидемиологическом очаге подлежат:

биологические и патологический материал от животных;

продукция и сырье животного происхождения;

корма, кормовые добавки, трава с территории выпаса животных, мест их содержания и убой;

вода и кормовые добавки;

другие объекты окружающей среды, в том числе сырье с поверхностей,

инструментария, приемы ухода за больными животными:

кровососущие паразитозные (вешетки, шпекиты, кровососущий мушкет-жигалки, клещи, блохи)

1078. Исследования материала с целью обнаружения возбудителей сибирской чумы проводятся в лабораториях, имеющих санитарно-эпидемиологическое лицензирование на работу с ППМ П группы патогенности.

1079. Запрещается вывоз (вывоз) за пределы административного района полуготовых и напичкованных сибирской чумой продуктов животного происхождения. При выявлении факта вывоза (вывоз) органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, совместно с другими заинтересованными органами принимают меры по пресечению их реализации.

1080. Для ухода за больными и выздоравливающими и погибшими животными закреплен обслуживающий персонал, прошедший инструктаж по сибирской чуме. Персонал обеспечивается спецодеждой, дезинфицирующими средствами, аптечкой первой помощи, средствами личной гигиены. Перед началом работы проводится инструктаж и соблюдение мер биологической безопасности. При отсутствии принятых мер обеспечения работников назначаются мероприятия профилактики и э. эпид. установившихся заболеваний и заболеваний.

1081. Работники, у которых на руках, лице и других открытых участках тела имеются царапины, ссадины, ранения или иные повреждения кожи, в работе по уходу за больными животными, уборке помещений, обработке и дезинфекции загрязненных помещений и прочих объектов не допускаются.

(Санитарно-гигиенические (профилактические) мероприятия по предупреждению заболеваний людей сибирской чумой на предприятиях, перерабатывающих продукты и сырье животного происхождения)

1082. Гигиена, надзор за деятельностью предприятий, юридических лиц, осуществляющих переработку и реализацию мяса, мясопродуктов, шкур и другого животного происхождения, органы, осуществляющие санитарно-эпидемиологический надзор.

1083. Выполнение санитарно-гигиенических (профилактических) мероприятий на предприятиях по заготовке, хранению и переработке мясной продукции обеспечивается руководителями предприятий.

1084. Руководители и владельцы предприятий по заготовке, переработке и реализации животного происхождения и сырья обеспечивают необходимые условия

обеззараживанию мяса и других продуктов, а также утилизации или уничтожению продуктов, подлежащих негодности к питанию, и хранению мясной продукции. В том же отношении необходимо для заражения вызвать возбудителем сибирской язвы мяса и шерсти, прошедших лабораторные исследования в специально изолированных камерах, холодильниках.

1085. При обнаружении или установлении факта заражения из малоперерабатывающего предприятия мяса и мясопродуктов от больных сибирской язвой животных органы уполномоченные осуществлять государственной санитарно-эпидемиологический надзор, выдают предприятию ограничительные мероприятия.

1086. При лабораторном обнаружении сибирской язвы пораженные туши животных, внутренние органы, шерсть, иные продукты убоя, а также шкура, контаминированные возбудителем, подлежат уничтожению сжиганием в специальных с требованиями безопасности в области ветеринарии. Производится дезинфекция помещений, оборудования, инвентаря и других инфицированных объектов в соответствии с требованиями законодательства в области ветеринарии.

1087. Работодатель обязан при проведении работ по утилизации зараженных туш животных, внутренних органов и шкур обеспечивать сотрудников специальной, средствами индивидуальной защиты, проводить инструктаж по безопасности работ.

1088. Сотрудники предприятий по сбору, хранению, транспортировке, переработке продуктов и сырья животного происхождения и реализации изделий из них обязаны соблюдать правила личной гигиены.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения сибирской язвы

1089. В целях предупреждения возникновения и распространения сибирской язвы органами, осуществляющими функции государственной санитарно-эпидемиологической службы, принимаются следующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия:

наблюдение за эпизоотической ситуацией и своевременное реагирование ее развития;

наблюдение за динамикой и структурой заболеваемости (в том числе постоянное динамическое наблюдение за эпизоотическим процессом, осуществление мониторинга заболеваемости, связанные со шкурочившей тушоптильщиками);

выявление за эффективность проводимых мероприятий;

мониторинг за циркуляцией возбудителя, патогенные, резистентные штаммы и выявление из окружающей среды штаммов, способных вызывать туши:

сибирской вазел желятиных, углероды шовы) наносятся территориальными органами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, на карту местности с обозначением на ней загона и границ полевых участков (вспрыскивая яды, для сибирских лесных заборовений указывается географические координаты. Кошмы карт прилагаются к журналам учета заборных работ).

1092. Территориальными органами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, осуществляется контроль при проведении работ по отпугиванию и содержанию в надлежащем санитарном состоянии сабланных заборовений, обеспечения мер к обеспечению достаточного количества убойных пунктов и площадок, обеззараживания почвы в местах в достижении восстановления травяным заборением групповых заборовений, поливах из сабланных яды.

1093. Административные, строительные и другие работы, связанные с выемкой в существующем грунте в границах сабланных заборовений и прилегающих территорий, проводятся при соответствии с органами, уполномоченными осуществлять государственную санитарно-эпидемиологический надзор.

1094. Установление (применение) размеров для сабланных заборовений в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия¹¹ проводится на основе результатов комплексной оценки эпидемиологической обстановки данных объектов, проводимой уполномоченными организациями.

1095. В субъектах Российской Федерации, имеющих статус субъектов Российской Федерации по сабланным ядам пункты и утилизацию заборовений, органами, осуществляющими государственную санитарно-эпидемиологический надзор по субъекту Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии разрабатываются приказы (планы) по профилактике сабланных ядов сроком на пять лет, которые утверждаются органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В случае необходимости указанные программы (планы) ежегодно актуализируются.

1096. На утилизацию территориях в субъектах Российской Федерации формируются эпидемиологические заборы, в том числе резервы медицинских санитарно-эпидемиологических препаратов, лекарственных, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения работ сабланных ядов.

Эпидемиологический забор должен быть сформирован на расчет на основе 10 % от

¹¹ Статья 12 Федерального закона от 20.03.1999 № 45-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии».

высокой и низ. Оказываясь к группам риска, призываемых, а также временно работающих, на уязвимых территориях.

Профилактические мероприятия

1097. Осуществлять профилактику сибирской явы проводить в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемиологической обстановке, инструкциями и рекомендациям органов и учреждений приравненных профилактической вакцинации против сибирской явы лицам и животным.

1098. Вакцинация против сибирской явы в установленном порядке подлежат лицам, по роду деятельности, подвергающиеся риску заражения в процессе взаимодействия с материалами, подвергавшимися на объектах возбудителя, или при работе с культурами возбудителя.

1099. К лицам, работающим, подлежащим профилактическим прививкам в установленном порядке, относятся:

лица, занятые на работах по промышленному содержанию скота, а также по убоям, разделке шкур и разделке туш;

лица, работающие в животноводческих предприятиях, фермах, колхозах, совхозах, кооперативах, государственных заводах, шероложных фабриках, предприятиях по изготовлению меховых изделий и кожевого сырья и другие лица в соответствии с календарем профилактических прививок;

лица, занятые сбором, хранением, транспортировкой и дальнейшей обработкой сырья животного происхождения (меха, шкур, шерсти, костей, пернатных-фермыльного сырья и другие);

лица, выполняющие сельскохозяйственные, транспортные, строительные, по вывозу и перевозке грунта, пернатных, сельскохозяйственных, сельскохозяйственных, сельскохозяйственных работ на уязвимых территориях;

лица, работающие с материалами, подвергавшимися на фабриках возбудителя сибирской явы, а также с культурами возбудителя.

Определять другие подгруппы риска, подлежащие вакцинации против сибирской явы по эпидемиологической обстановке, при риске распространения инфекции и других, проводить органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1100. Решения о проведении и объеме профилактической вакцинации лиц против сибирской явы принимаются органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, с учетом

эпидемиологических и эпидемиологических популяций.

1101. Ответственность за организацию и проведение вакцинации населения против сибирской язвы возложена органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации в области охраны здоровья, которые разрабатывают и согласовывают с территориальными органами осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, план проведения иммунизации населения.

1102. Контроль за проведением вакцинации, транспортировкой и хранением иммунобиологических препаратов проводят органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Гигиенические воспитание и обучение граждан по вопросам профилактики сибирской язвы

1103. Гигиеническое воспитание населения включает в себя предоставление населению подробной информации о сибирской язве, путях и источниках заражения, опасных симптомах заболевания, мерах личной и общественной профилактики.

1104. В гигиеническом воспитании населения по профилактике сибирской язвы участвуют органы исполнительной и муниципальной власти, местные органы управления и организации, осуществляющие образовательную деятельность, органы и организации, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, территориальные органы федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

ХИ. Профилактика чумы

1105. Чума является опасной природно-очаговой болезнью высокой летальностью инфекционной болезни с преимущественно трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, который относится к I группе опасности.

1106. Диагностика чумы осуществляется с учетом эпидемиологических данных и на основании результатов лабораторных исследований по подтверждению этиологии заболевания.

Сигнальные эпидемиологические признаки чумы: контакт с больным чумой, контакт с летящими грызунами, переносимыми животными или их экскрементами на природно-очаговой территории, контакт с синантропными грызунами или домашними животными (кошки и др. собаки) на городской территории, контакт с бродячими верблюдами, прибытие из эпидемического очага чумы или эпидемиологического очага других

инфекционных болезней возмозможной эволюция, естественности ехотных с чужой, смерть из неясности остро инфекционного заболевания на территории приречного озера.

1107. Вызбудитель чумы — *Yersinia pestis* входит в семейство *Y. Enterocolitiformes*, род *Y. Pestis*. *Y. pestis* — грамотрицательная неподвижная факультативно анаэробная палочка. Имеет спорообразующую форму, спор не образует. Охрищивается быстро в виде коротких палочек. В почве чумной микроб сохраняется до 7 мес. в захороненных трупах человека до года, в тине бубона до 20-30 календарных дней, трупах верблюдов, трупов — до 60 календарных дней. Сохраняется в ботках до 400, в п. телях более 500 календарных дней. Хорошо переносит низкие температуры, замораживается. Прямой солнечный свет убивает микроб за 3-5 часов, капачено при 100°C — через 1 минуту.

1108. Источники инфекции — больные животные и больной человек. Естественная инфицированность чумой животных — почти 350 видов животных. Основными переносчиками в природе являются: сурикаты, суслики, песчанки, полёвки, мыши, крысы, бродячие собаки, морские свиньи. Птицы, переносившиеся в летательном и чуме переносимости. Помимо птиц гриппов, в эпизоотический процесс включаются свиньи, кролики, обезьяны (кролики, обезьяны). Основными переносчиками чумы являются блохи (близкие 20 видов) и комары. Чума замораживается чумой приречности в природных очагах.

1109. Механизмы и пути заражения:

трансмиссивный (при укусах блох, заразившихся на больных грызунах, обезьянах для человека). Путь передачи — инкубационный, контактно-воздушно-пылевой;

контактный (при контакте шкур с больными трупов, разрыве туш больных верблюдов, через кровь и выделения больного человека и др.). Путь передачи — прямой контакт, бытовой;

воздушно-капельный с каплями-капельным (при контакте шкур животных туберкулез, рибная масса, при контакте с больными переносчиками или вторичной легочной формой чумы, заражен при работе с культурами возбудителя в лабораториях) и воздушно-пылевым путем передачи (при уборке помещений и др.);

фекально-оральный (при употреблении в пищу нестерилизованной термически обработанной пищи зараженных животных); путь передачи — пищевой, водный, бытовой.

1110. Инкубационный период длится от нескольких часов до 6 календарных дней и более, в среднем 2-4 календарных дней (включая при первичной легочной форме и более продолжительный при трупотоксическом заражении).

1111. Промысловые учреждения Роспотребнадзора (школа — производственные учреждения) осуществляют значимую роль в профилактике и практическом обслуживании

федеральности государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выполняющих из профилактику чумы, участие в проведении комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по профилактике чумы.

1112. Направлением проведения профилактических мероприятий является проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на территории пригородных очагов чумы Российской Федерации;

принципиальное санитарно-противоэпидемическое (профилактическое) мероприятие на территории Российской Федерации это возвы пригородных очагов чумы.

приведение санитарно-эпидемиологического контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и отечественные отправления, осуществляющие международные перевозки пассажиров, транспортных средств, товаров, грузов, а также в отношении граждан, пребывающих в стране, неблагоприятных по чуме во время эпидемиологических обследований и так.

1113. Организацию и проведение мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения по чуме на территории Российской Федерации, осуществляют органы исполнительной федеральной государственной санитарно-эпидемиологической службы, с привлечением представителей заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

1114. Профильными учреждениями обеспечивается проведение мероприятий по профилактике чумы и других особо опасных инфекционных болезней в субъектах Российской Федерации в соответствии с порядком профилактических учреждений и закрепленных за ними субъектов Российской Федерации для оказания методической и практической помощи по вопросам профилактики чумы и других особо опасных инфекционных болезней в дифференцированных территориях Российской Федерации при проведении мероприятий по профилактике чумы (приложение 19 к Санитарным правилам).

Дифференцирование профилактических мероприятий определяется с учетом районов распространения эпидемиологических пригородных чумы и субъектов, на территории которых имеются активные природные очаги чумы или отсутствуют природные очаги чумы, но в которых возможно распространение этой болезни, в том числе с учетом исключительных территорий других стран или субъектов Российской Федерации с данными пригородными очагами чумы.

1115. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы на территории пригородных очагов чумы, информируют их о наличии природных очагов чумы и имеют предполагаемых лиц, выполняющих работы индивидуальной

защиты и действиях при подкреплении на заболелые чумы, а в случае обострения эпидемиологической обстановки, на контроль контролируемых органов Роспотребнадзора и учитывая 3 классификации ЛВЗВ предоставляют информацию обо всех лицах, работающих на территории этих природных очагов чумы.

1116. Лабораторные исследования подлежат, клинического и патологоанатомического материала при подкреплении на чуму привившимся вакцинированными, вышедшими санитарно-эпидемиологический контроль по работе с ПБА I группы патогенности. При удаленности данных организаций допускается исследование материала на чуму привившимся вакцинацией противочумных учреждений на базе лабораторий особо опасных инфекций учреждений Роспотребнадзора, имеющих санитарно-эпидемиологический контроль на работу с ПБА II группы патогенности.

Выявление, учет и регистрация

1117. В случае возникновения заболевания чумой медицинская организация, выявившая больного, принимает меры по оказанию медицинской помощи в стационаре, предоставляемом для больных чумой (в соответствии с клиническими правилами), изоляции контактировавших с больным лиц.

1118. Медицинские организации, территориальные органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, представляют в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информацию о каждом случае заболевания (подозрении на чуму).

Лабораторная диагностика чумы

1119. Лабораторные диагностические исследования материала на чуму осуществляются:

лаборатория противочумных учреждений, имеющие разрешительные документы на выполнение работ с микроорганизмами I-IV групп патогенности;

лаборатория открытых баз центров медицины на территории регионов (включая и эпидемиологический центр Российской Федерации), имеющие разрешительные документы на выполнение работ с микроорганизмами I-IV групп патогенности. Диагностические исследования проводят специалисты противочумных учреждений.

В лабораториях медицинских организаций некробактериологические исследования материала от больных чумой не проводят.

1120. Лабораторному исследованию подлежат пробы материала от:

связаны с различиями толерантностей и пробы воздуха в помещениях, где выводится больные леточной формой чумы;

у лиц, контактировавших с больными первичной или вторичной леточной формой чумы, начиная из 1988;

при вскрытии трупов людей, погибших от чумы или от болезни, вызванной чумой, для исследования забирался материал внутренних органов, крови.

1123. Длительностическое исследование материала осуществлялось с использованием методов экспресс- и усложненной диагностики. Биохимическое и биологическое выявляло:

наличие маркеров возбудителя чумы в исследуемом материале методами ПЦР, ИФА, ИФА, РНГА и другие;

пробы на среды выращивания и дифференциально-диагностические, позволяющие биологической пробой с целью выявления культуры возбудителя чумы;

идентификацию заделанных культур возбудителя чумы.

1124. Результат и выявление возбудителя чумы в исследуемом материале выдают на основании выводов культуры на основе результатов анализа идентификационной как *Y. pestis* по морфологическим, культуральным, биохимическим и молекулярно-биологическим свойствам.

Прямой ответ о наличии маркера (ДНК, антитела) чумного микроба выдают на основании выявления специфического сигнала при окрашивании иммунообусловленных чумными флуоресцирующими, наличие ДНК *Y. pestis*, наличием в ПЦР, положительным результатом амплификации генов.

При заборе материала на фоне летальных или тяжелых поражений прироста окончательный положительный ответ может быть выдан на основании выявления маркера возбудителя чумы без выделения культуры при наличии соответствующего диагноза и соответствующего эпидемиологического анамнеза.

Средственный ответ выдают на основании результатов биохимического анализа: отсутствие специфического роста культуры *Y. pestis* на питательных средах на всех этапах исследования; отсутствие серологических в пробных средах больного. Запрещается выдать положительный отрицательный ответ на основании результатов экспрессной и усложненной диагностики.

1125. При проведении эпидемиологического исследования прироста чумы осуществляют лабораторное исследование отобранных в очагах материала (проб, шприц-доз, объектов окружающей среды).

1126. Для лабораторной диагностики часто используют диагностические препараты, тест-системы, патологические срезы, паратяжироплантаты в Российской Федерации.

Организация и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий в природной среде тулы

1127. Оценка уровня антропогенной экологической и эпидемиологической опасности природных сред тулы и планирование природоохранной ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая международные чление¹², а также эпидемиологический и эпизоотический приказы на тулы на территории Российской Федерации осуществляет ФКУЗ Роспотребнадзора научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора совместно с ФКУЗ Противочумный центр Роспотребнадзора и другими противочумными учреждениями.

1128. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на территории природных сред тулы, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на данной территории, обеспечивающие:

исполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территории организации и населенных пунктов и взаимодействию субъектов с целью оказания помощи, предоставления информации и жизнедеятельности тулу, экзотических, теплолюбивых животных, а также их (блж. клещей и вшей (эктопаразиты этих животных);

существующую и планируемую деятельность в дозволении, которую осуществляющим организациям, занимающимся деятельностью (деятельностью) на территории населенного пункта или на расположенных в прилегающих объектах (организациях) и выполняющих деятельность на данной территории¹³; по решению межведомственной санитарно-эпидемиологической комиссии;

оценку эффективности проведения мероприятий и действий с учетом санитарно-эпидемиологических учреждений;

организацию противочумных мероприятий противочумными учреждениями:

¹² Международная конвенция о правах человека (1966 год), принятая на 21 сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

¹³ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2010 №201 «О лицензировании медицинской деятельности при осуществлении указанной деятельности организациями, осуществляющими деятельность в других направлениях, осуществляющих в том числе систему здравоохранения, на территории международного центра «Сибирский».

экологиче- гигиенические мероприятия и обучение, направленные на повышение санитарной культуры, профилактику заболеваний и расширение знаний о здоровом образе жизни¹¹ жителей поселившегося пункта и работников предприятий на территории с выявленной энзооцией по вопросам профилактики чумы с участием специалистов противочумных и других организаций Роспотребнадзора, медицинских организаций. В том числе с использованием средств массовой информации.

предоставлять отпуски сотрудникам организаций, расположенных или выполняющих работы на территории с выявленной энзооцией, по состоянию необходимости для обеспечения проведения санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.

1129. Работникам медицинских организаций, расположенных на территории природного очага чумы, при выполнении работ по выявлению чумы не позднее чем через два часа информировать территориальные органы Роспотребнадзора (в том числе производственные учреждения и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья).

1130. На территории с выявленной энзооцией ограничить все виды охоты и добычи животных, находящихся в эпидемиологическом процессе до чумы, за исключением их охоты (добычи) для эпидемиологических исследований.

1131. При выявлении энзоотии чумы администрация населенного пункта в организации, расположенных или выполняющих работы на энзооцичных территориях, обеспечивает:

организацию и проведение с привлечением сил (силы) противочумной станции пунктов держивания и содержания (барьерные обработки) с целью снижения эпидемиологической нагрузки до 500 м от границы населенного пункта или от границы объектов;

организацию и проведение держивания в зависимости на территории населенного пункта, которое осуществляется организациями, выполняющими дезинфекционную деятельность на территории населенного пункта или на расположенных в пределах объекта (организации) и находящих лицензию на ведение этой деятельности;

ограничение хозяйственной, туристической, исследовательской, поисковой и иной деятельности на территории, определяемой противочумными станциями, на срок до прекращения энзоотических процессов.

ограничение охоты, рыболовства, охоты на энзоотическую территорию, запрет

¹¹ Статья 26 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

вывоза сельскохозяйственной (в том числе зерно, бобов, фруктов) и животноводческой продукции за пределы зоны эпидемии на срок, определяемый решением исполнительного санитарно-противоэпидемиологического комитета:

запрещение вывоза верблюдов из эпизоотических пунктов

11.32. При выявлении эпизоотии чумы органы исполнительный власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического обеспечения:

исполняют возложение на население, проживающее в зоне эпизоотии,
по запискам противочумных учреждений сбор биологического материала.

11.33. Организация (сметатель), планирование случаев среди животных, подопытные по выявлению, осуществление информации обо всех случаях заболевания верблюдов с симптомами чумы, выявлен верблюда от неизвестных причин, в течение 2-х часов любыми доступными способами они информируют противочумные станции.

Организация и проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий на приростках пастбищ чумы

11.34. Руководители организаций, осуществляющих международные перевозки, владельцы транспортных средств, операторы перевозок и руководители административных пунктов пропуска через государственную границу обеспечивают доступ специалистам противочумных учреждений и органов Роспотребнадзора, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, на территории принадлежащих им объектов, и транспортных средств, прибывающих из стран, неблагополучных по чуме, а также в попытках хранения трупов и туш для проведения эпидемиологического обследования.

11.35. Руководители организаций, осуществляющих международные перевозки, и владельцы транспортного средства и операторы перевозок по решению должностного лица, осуществляющего санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, предотвращают прибывание из стран, неблагополучных по чуме, транспортных средств, на которых выложены носители, первичных чум, смерти их владельцев, больных или паломные животные (группы), а также в случае вывоза больных (или при подозрении на заболевание чумой) на санитарную станцию для организации проведения санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) противочумных мероприятий.

Лица, находящиеся в транспортных средствах, в которых выявлены носители и переносчики чумы, подлежат медицинскому наблюдению на срок вынужденного шара

(6) эквивалентных лиц). В случае получения отрицательных результатов лабораторного исследования пассажиры и сопровождающие на палубе выходящего судна, медицинское обследование прекращается.

1136. Руководители организаций, осуществляющих международные перевозки и связанные транзитного судна по решению должностного лица, осуществляющего санитарно-противоэпидемиологический контроль в пунктах пропуска через государственную границу, направляют прибывших из страны, неблагополучной по чуме, транспортных средства, на которых вывезены бочки с подозрением на чуму, на санитарную службу (прием, прием, прием) для проведения противоэпидемиологических мероприятий. В отношении пассажиров и экипажа транспортного средства принимаются меры по лечению или медицинскому наблюдению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1137. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели после уведомления и выдачи контейнеров и документов с товарами и грузами на предназначенных пунктах пропуска через государственную границу во всех случаях обязаны в них проверять все следы их деятельности, а также лица, выезжающие из них (экспатрианты, пассажиры, сообщать об этом в территориальный орган Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации.

Мероприятия в отношении ошмы чумы

1138. В случае выявления эпидемиологического очага (пункт) чумы общее руководство мероприятиями по ликвидации и ликвидации эпидемиологического очага (очагов) осуществляется групповых и индивидуальных случаев выявления носителя чумы осуществляется международная санитарно-противоэпидемиологическая комиссия.

1139. В эпидемиологическом очаге чумы в соответствии с законодательством иными мерами по предупреждению распространения инфекционной болезни предусматриваются и принимаются органы и учреждения Роспотребнадзора во взаимодействии с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также в сфере охраны здоровья, медицинских организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и власти иностранных и подведомственных ему организаций, юридическими лицами (до соглашения) при использовании методов и практических действий противочумных учреждений.

1140. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в эпидемиологическом очаге чумы обеспечивают выполнение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения

заболевания чумой и эпидемиологическим очагом.

1141. Органы исполнительной власти во субъекту Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечивают:

выявление больных с симптомами чумы;

размещение госпитальный боль и эпидемиологическим очагом чумы в соответствии с комплектом планов по санитарной охране территории;

организацию транспортирования больных специализированным транспортом, как госпитализации, клинико-диагностическое обследование, лечение, а также проведение дезинфекции по месту жительства больных;

транспортировку лабораторию для больных с симптомами признаками чумы (больные с лихорадкой, интоксикацией, пневмонией);

исolation контактировавших с больными на срок пятидневного периода с приведения медицинскому наблюдению и регулярной профессиональной заботой чумы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

наблюдение за лицами, контактировавшими с больными (при необходимости карантин);

патологоанатомические вскрытия в случаях неопределенности установленного диагноза клинического диагноза заболевания, приводящего к смерти, и (или) непосредственной причины смерти;

1142. Клинико-диагностические лаборатории должны проводить исследование возбудителя чумы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации в части безопасности работы с ПБА I-II групп патогенности.

1143. В случае возникновения необходимости осуществления по назначению хирургического вмешательства у больного с подозрением на чуму, врач-хирург должен руководствоваться требованиями Санитарных правил в части безопасности работы с ПБА I-II групп патогенности. По окончании операции проводится обязательная дезинфекция.

1144. Вакцина против чумы человека находится в его транспортировании и применении в специализированных лабораториях, а также в соответствии с требованиями от учета проводимых в учреждениях следствия противочумных учреждений или отдела (лаборатория) особо опасных инфекций центры имеются в эпидемиологическом Роспотребнадзор по субъекту Российской Федерации.

Подготовка умерших от чумы к захоронению осуществляется медицинскими организациями. Первую группу в месте захоронения производятся на территории

транспорте биологичеи вакцинаторов (взросл. фелдшер, санитар) в защитной одежде.

1145. По решению органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, где выявлен болевой чумой, осуществляются следующие мероприятия: воентелей чумы, приведенные болевой доритетити и дезинсекции на энтомологической территории, а также выявление у населения добытых при охоте тушек типичных-носителей чумы.

1146. При выявлении болевых биологичеи фирмой чумы в эпидемиологическом охоте выданы профилактические (профилактические) мероприятия, при выявлении болевых петитивной фирмой чумы выданы варианты.

1147. При устранении угрозы распространения чумы при выявлении болевой впрот субъекта Российской Федерации по окончании предписанных территориальных органов, осуществляющего государственной санитарно-эпидемиологический надзор, принимает решение об охоте ограничительных мероприятий (варианты).

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения чумы

1148. В целях предупреждения возникновения и распространения чумы органами, осуществляющими федеральный государственной санитарно-эпидемиологический надзор, проводятся следующие санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия:

оценка эпидемиологической ситуации в контролируемые подотчетные все регионы;
наблюдение за эпизоотическими прививками чумы,
эпидемиологические наблюдения за населением, проживающим на территории, где выявлено заболевание на территории прививки чумы.

предупреждение первичного заражения человека чумой, а в случае его возникновения - вторичного распространения болезни;

1149. Организационно и проводятся мероприятия по эпизоотическому надзору за чумой и ее природными очагами на территории Российской Федерации осуществляются при участии органов управления службой Роспотребнадзора (далее - органы управления) и научно-исследовательских учреждений Роспотребнадзора, во взаимодействии с другими организациями санитарно-эпидемиологическому, лечебно-профилактическому и ветеринарного профиля соответствующего субъекта Российской Федерации.

1150. Объем, характер и эффективность профилактических мероприятий определяется результатами эпидемиологического обследования и планируем

эпидемиологической и эпидемиологической ситуации по числу и качеству циркулирующих вирусов, на основании чего осуществляется планирование мероприятий на последующий год.

На основе полученных данных осуществляется корректировка территориально-календарного плана работы эпидемиологических групп, уточнение численности и дислокации персонала, подтверждение риска заражения чужой, планирование и проведение комплекса мероприятий по санитарно-эпидемиологическим (эпидемиологическим) мероприятиям.

1.51. На каждый природный очаг вируса на территории Российской Федерации составляются планы, включающие его название, географическое положение и название вируса и в прошлом, а также физико-географическую и ландшафтную характеристики, типичность возбудителя, описание пространственной и биологической структуры, исторические данные об эпидемиологической ситуации и эпидемиологических осложнениях, смертельных и других случаях в эпидемиологическом отношении (вирусы, микробы и паразиты) и востребованных учреждений и о проводившихся и плане мероприятий по специфической и неспецифической профилактике.

Профилактическое мероприятие (специфическая и неспецифическая профилактика)

1.52. Гражданам, временно или постоянно проживающим на территории природного очага при оказании эпидемиологической и санитарно-эпидемиологической помощи предоставляется специфическая профилактика.

1.53. Среди прививаемых выделяются, а также качество граждан, подлежащих вакцинации в соответствии с календарем профилактических прививок по календарности прививкам, определяются плановым планом Государственного санитарного врача по субъекту Российской Федерации по рекомендациям противочумных учреждений.

1.54. Контроль сроков планового охвата вакцинацией населения, в том числе календарной прививки с календарем прививок, обеспечивается Управлением Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья с участием противочумных станций.

1.55. Вакцинацию против чумы обеспечивают органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья и осуществляют мероприятия

организации⁴².

1156. Неспецифическая профилактика чумы предусматривает дифференциацию населенной территории по уровню эпидемиологической опасности в санитарной фактуре, краяхах, территориях и контингентом риска заболеть населения. При планировании и проведении мероприятий используются результаты эпидемиологического районирования очагов чумы.

1157. Неспецифическая профилактика заболеть чумы включает режимно-организационные, санитарно-технические, санитарно-технические, дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия, подготовку специалистов осуществлять санитарный и ветеринарный контроль, информирование разъяснительную работу с населением.

1158. Все профилактические мероприятия проводятся, согласовываясь и при участии под руководством соответствующих учреждений во взаимодействии с другими организациями Роспотребнадзора, органами и учреждениями общей медицинской сети и ветеринарных служб.

1159. Во всех случаях применяются физические и химические дезинфекционные средства (горючий дым и борн, дезинфектантов, акриловых и инсектицидов, родентицидов) основные органы власти, хозяйствующие субъекты и граждане обеспечиваются в лесах, дачах, садах и местах проведения мероприятий, соблюдение гигиенических средств и препаратов, гигиенических мер и мер профилактики при обращении с химическими средствами.

1160. При проведении активной профилактики чумы в эпидемиологических очагах, выявлении контактных лиц в популяциях основных носителей при эпидемиологическом уровне заболеваемости муниципальные образования, хозяйствующие субъекты из обеспечения предложения предоставляются учреждениям обеспечения

планирования, организационно и производственно полевыми действиями в десятикратном (барьерные обработки) с целью создания защитной зоны шириной до 500 м от граница населенного пункта или объекта силами соответствующих учреждений;

планирование, организацию и проведение санитарной дератизации и дезинсекции в населенных пунктах всех типов, на объектах и сооружениях различного назначения, включая санитарный или уличной дератизационный профиль, являющихся объектами на данный вид муниципальной деятельности.

⁴² Ст. 15 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ.

1175. Инфицирование людей возбудителем бруцеллёза происходит путём приёма при употреблении молока, кисломолочных продуктов, мяса и мясных продуктов, полученных от больных бруцеллёзом животных и не прошедших достаточную термическую обработку.

1176. Воздушно-пылевой путь заражения реализуется при inhalации воздушно-пылевой смеси, содержащей возбудителя бруцеллёза фрагменты шерсти, волос, пыли, подстилки.

1177. Лабораторное заражение людей возможно воздушно-капельным путём передачи возбудителя при контактах с патогенными штаммами бруцелл (диспнеитические, переносы), когда образуется бактериальный аэрозоль в контактных мулях при выполнении требований санитарно-эпидемиологических правил работы с возбудителями I-II группы патогенности.

1178. Факторы передачи возбудителя бруцеллёза человеку разнообразны. Наибольшую опасность представляют выделения больных бруцеллёзом животных и таваров молока и кисломолочные продукты, в том числе сметана, сливки, сырные массы, брынза, сыр, творог, мясо и мясо от животных, больных бруцеллёзом. Мясо представляет эпидемиологическую опасность при его недостаточной термической обработке (национальные особенности приготовления мяса — строганина, шашлык с кровью, сырой фарш и другие).

1179. К группам риска инфицирования и заболевания бруцеллёзной инфекцией относят:

людей профессиональной принадлежности: работников животноводческих (молочных) хозяйств (ферм), мясо- и молочнокомбинатов и других предприятий по переработке продукции в сыры животного происхождения, убойных пунктов, пунктов скрутки, пункты опек: чибаны, мясники, доярки, доильщицы и специалисты в области ветеринарии, персонал лабораторий, работающих с живыми культурами бруцелл и лабораторными животными, заражёнными возбудителем бруцеллёза;

младенцев от матерей-инфекционных, лиц, заражённых от животных;

лиц, употребляющих пищевые продукты, полученные от паразитирующей бруцеллёзом животных: сырое молоко, кисломолочные продукты (брынза, сметана, сливки, творог и другие), термически недостаточно обработанные мясо.

1180. Для заболевания людей возбудителем *B. melitensis*, характерна сезонность, что связано с инфицированием людей в сезон охота на св. При заражении *B. melitensis* сезонность менее выражена из-за длительного периода инкубации (факторы передачи — молоко и молочные продукты и продукты первично-хронических форм бруцеллёза (печень заболевших животных не удаётся).

1181. Инкубационный период лимфопатии у человека составляет 1-4 недели, при лимфатической инфекции – до 2-3 месяцев.

1182. Заболевание приписано с вовлечением в процесс работы органов и систем организма, характеризуется широким спектром симптомов:

Выявление, учет и регистрация

1183. Организации, обеспечивающие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при получении экстренных известий обязаны учесть необходимость введения в фоновых федеральных статистических наблюдений и своевременно информировать орган, уполномоченный на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

1184. В случае поступления на профессиональное заболевание образцовым медицинский работник МО, в котором впервые подозревается профессиональный характер данного заболевания, выполняет следующие обязанности в течение 12 часов с момента установления диагноза: направляет это сообщение в органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1185. При получении экстренного известия о случае поступления на профессиональное заболевание работника организации, осуществляющей федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, организовать проведение эпидемиологического расследования по установленно причинам, последствиям случая профессионального инфицирования, на основе которого оформляется санитарно-эпидемиологическая характеристика рабочего места работника.

Лабораторная диагностика

1186. Лабораторные исследования клинических, серологических материалов и объектов окружающей среды для постановки диагноза проводятся лабораториями, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с материалами, зараженными ВПЧ подотипом с высокой онкогенностью ЦАА 1-П групп онкогенности.

1187. Диагностические иммунологические (серологические) исследования по обнаружению в крови людей антител возбудителя брукцеллеза (без выделения возбудителя) и (или) антител к пепт. ПЦР-исследования (без выделения возбудителя) по детекции в клиническом материале ДНК возбудителя брукцеллеза, анисерологические и другие ключевые тесты в т.ч. (иммунофлуоресцентный тест активации флюоресции, реакция лизиса и активации лейкоцитов), могут проводиться в лабораториях, имеющих

III-IV уровень безопасности

1188. Клинический материал для исследований: кровь, смывы со слизистой оболочки, синовиальная жидкость (при артритах), моча, желчь, гной при абсцессах, пунктаты костного мозга в лимфатических узлах. Исследования проводят молекулярно-генетическими (ПЦР), иммунологическими (реакции агглютинации Хеддешсона, Райта, ИФА, РНГА, Кулбса, опутризовывая пробой Бартин, иммуноферментный тест выявляют антитела к антигенам, пробирочная реакция титра действия, тесты на угнетение агглютинации лейкоцитов), бактериологическими (светлая и люминисцентная микроскопия), бактериологическими (выделение чистой культуры, ее идентификация и межвидовая дифференциация штаммов), биологическими (переносимое инфицирование животных) методами по лабораторной диагностике бруцеллеза у людей.

189. Личностный критерий одобрения главы «Брежнев»,
вопрос:

[illegible]

положительный результат выявления ДНК *Staphylococcus aureus* методом ПЦР только в комбинации с положительными результатами следующих реакций: реакция Райта-ИФА, реакция Кулбса, РНИА, паттерническая проба Бюрве, пятиметрический тест эритроцитов борафиллы, реакция лизиса лейкоцитов:

для диагностики острого и подострого брущеллэза: наличие диагностического титра антител в реакциях Рабфа, ИФА, РНГА, а при низком уровне антител - в реакциях Кольбид и ИФА; положительный результат иммуноферментного теста выявления Сериофилли:

для диагностики хронического бруцеллеза наличие комплексно положительных иммунологических реакций (ИФА, реакция Кумбса, РНГА, аллергическая проба Бюрне, пятнистый тест с эритроцитами, реакция лисса де Николитто).

для диагностики результатов Брушиноба: положительная аллергическая проба Бюрье при отсутствии анамностического титра указала ВПН его роста и развития в индивидуальном развитии.

1190. По значимости для установления причинно-следственных связей проводим исследование биоматериала от животных: органы животного происхождения (шерсть, кожа), продукция животноводства (мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты), проб объектив окружающей среды (почвы, травы, фуражи.

подкалывки, укусы, царапины и другие). Исследования проводят бактериологическими, биологическими, вирусологическими и молекулярно-генетическими методами.

1191. Во всех случаях выявления питомца бродячих от людей проводится дифференциация от донора и бродячих.

Владельцы животных возбудителя бешенства направляются в районный центр или муниципальную заведующую бешенства и Центр верификации диагностической деятельности, осуществляющий функцию государственной комиссии Роспотребнадзора, для проведения окончательной идентификации, генетического типирования штамма возбудителя бешенства и исключения наличия патогенного комплекса патогенных возбудителей бешенства.

Организация и проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. Мероприятия в эпидемиологическом очаге

1192. На территории субъекта Российской Федерации, где зарегистрирован случай бешенства среди животных, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при участии соответствующих учреждений, органов Роспотребнадзора и субъекта Российской Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и области ветеринарии и подведомственных ему учреждений, и органов управления здравоохранением в субъекте Российской Федерации должны быть разработаны планы мероприятий для ликвидации эпидемии бешенства. Аналогичные планы разрабатываются для административных территорий субъекта.

Контроль выполнения мероприятий по профилактике заражения людей бешенством проводят органы, уполномоченные на осуществление федеральным государственным санитарно-эпидемиологическим надзором, во взаимодействии с территориальными органами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

1193. Владельцы сельскохозяйственных животных несут ответственность от фискальных обязательств:

обеспечивать работающих персонал средствами индивидуальной защиты, бытовыми помещениями;

организовывать проведение предварительных и периодических медицинских осмотров на бешенство персонала.

Мероприятия в очаге заболевания людей бешенством

1194. При получении информации из МО о выявлении случаев заболевания бруцеллезом органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в течение 24 часов организуют проведение эпидемиологического обследования очага в установленном установленном заинтересованных федеральных органов исполнительной власти для установления источника и факторов передачи возбудителя инфекции.

1195. При установлении факта контакта больных с животными, больными бруцеллезом, инфицированной животноводческой продукцией или сырым при осуществлении профессиональной деятельности сырым, уполномоченными на осуществление федерального санитарно-эпидемиологического надзора, в рамках эпидемиологического расследования проводятся мероприятия направленные по месту работы заболевшего. Обшириваясь объекты проводятся с привлечением профильных специальных органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также органов территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

1196. Больные бруцеллезом должны госпитализироваться по клиническим показаниям. После выявления из стационара больных проводятся мероприятия по лечению.

1197. По месту нахождения больных дополнительные дезинфекционные мероприятия не проводятся.

Эпидемиологическое обследование очага бруцеллеза

1198. Эпидемиологическое обследование очага бруцеллеза проводится специалистами органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в течение 24 часов после получения информации из МО.

1199. Цели эпидемиологического расследования случаев заболевания людей бруцеллезом являются:

выявление совместно с действующими лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и области возникновения или распространения или поведенческих или производственных или бытовых источников инфекции, факторов и путей заражения;

выявление всех лиц, имевших контакт с источником инфекции или находившихся в очаге заболевания инфекцией;

определение механизма передачи возбудителя, установление возможности передачи в данном очаге, в том числе, лабораторными исследованиями.

проведение комплексных мероприятий по предупреждению заражения людей
брюцеллезом и ликвидация эпидемиологической очага.

1900. При эпидемиологическом обследовании выявлено значительное распространение эндемическо-инфекционных заболеваний, высокая заболеваемость скотом и болезнями и животных, связан с продуктами животноводства приусадебного.

Для выявления путей и факторов передачи возбудителя инфекции приходится обследовать животно-водческих хозяйства сельскохозяйственного (многокоровых ферм, овец и козловодческих хозяйств, племенных свинов, пунктов отбора овец, козлов и других), индивидуальных животно-водческих хозяйств, фермерских хозяйств, ирригацион по уборке, переработке сырья и продуктов животноводства (маслокомбинаты, молокозаводы, сыроваренные предприятия, убойные пункты, частные предприятия по переработке сырья и производству животноводства при фермерских хозяйствах), в которых предположительно произошло заражение людей бешеным.

Исполнение обязательств по договору осуществляется организацией, уполномоченной на осуществление хозяйственного обслуживания объектов, в отношении которых заключен договор, совместно со специализированной организацией, являющейся стороной в договоре, и предоставляющей ему организационную и методическую помощь (вспомогательная организация или предприятие).

1201. При указанных обстоятельствах по эпидемиологическим показаниям сотрудникам органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, необходимо:

[illegible]

выпускаемые ВНИИЧЭС средства индивидуальной защиты персонала (одежда, обувь, рукавицы, резиновые или кожаные фартуки, перчатки, защитные маски, очки и др. и др.). их использование, предназначен для использования, дорожных транспортных, смены, обслуживания, предотвращения стирки, мытья, дезинфекции, обработки рук, обуви и др. и др.

в целях выявления эпидемиологического пути заражения проследить соблюдение режимовpasteurизации молока, условия хранения и обработки молочной посуды, фильтрующего материала, установить широкое распространение молока и молочных продуктов, режимы производства сырья из молока и овечьего молока;

Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и качества производства возникающих и распространяемых бруцеллёзов

1204. В целях предупреждения возникновения и распространения бруцеллеза органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, принимают следующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия:

оценку эпидемиологической ситуации и прогнозирования тенденций ее развития;

непрерывное наблюдение за динамической эпидемиологической ситуацией и выявлением ситуации, а также за факторами и условиями, способствующими циркуляции возбудителя;

мониторинг заболеваемости людей бруцеллёзом, распространяемого и анализа заболеваемости отдельных групп населения (сельского, городского, по возрастным и профессиональным группам и иным показателям);

проводить активные выявление заболевших опрашиваясь большое количество из числа лиц в домашних условиях, выявляющих заболевание бруцеллёзом, лабораторное обследование на бруцеллёз, в том числе на термостатизацию (по необходимости), для выявления зараженных животных;

анализ эпидемиологической ситуации по бруцеллёзу по материалам, предоставляемым органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии и подведомственными ему организациями, включая анализ данных ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на предупреждение заражения людей бруцеллёзом;

мониторинг проводимых мероприятий по профилактике профессионального заражения бруцеллёзом;

определение за длительной периодическими данными социальных явлений (структура населения, характер хозяйственной деятельности, санитарно-гигиенические условия работы в сельскохозяйственном производстве и на предприятиях по переработке продуктов животноводства и сырья, уровень медицинского обслуживания и иные явления);

разработка тактики санитарно-эпидемиологической профилактики бруцеллёза;

оценки качества, своевременности и эффективности профилактических и противоэпидемиологических мероприятий с целью их оптимальной корректировки.

Профилактические мероприятия (специфическая и неспецифическая профилактика)

1205. Профилактика бруцеллёза включает комплекс ветеринарно-санитарных, хозяйственных и медико-статистических мероприятий. Основной целью является ликвидация источника инфекции среди животных. Основой эпидемиологического благополучия является строгая профилактика заражения среди домашних и сельскохозяйственных животных с целью исключения эпидемии.

Медико-санитарные мероприятия на профилактике бруцеллёза включают выявление бруцеллёза, защиту людей от инфицирования, медицинское обследование профессиональных контактных.

Выявление людей против бруцеллёза (санитарно-гигиеническая профилактика)

1206. Профилактические прививки против бруцеллёза людям в животноводстве и при контакте с животными проводятся в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

1207. Решения и проводимые мероприятия профилактической стимуляции людей против бруцеллёза принимаются территориальными органами, уполномоченными на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, при взаимодействии с органами исполнительной власти в сфере здравоохранения в субъекте Российской Федерации с учётом текущей эпидемиологической ситуации и эпидемиологических peculiarities.

Общие положения о проведении профилактических прививок у людей против бруцеллёза являются основой условий профессионального для быстрого характера, исключают возможность инфицирования возбудителем бруцеллёза во время осмотра тела (8 недель).

1208. Вакцинация проводится в случаях возросшего риска людям, достигшим 18 лет и выполняющим следующие работы:

по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, подлежащих изъятию, где распространены заболевания скота бруцеллёзом;

на убой скота, больных бруцеллёзом, забоем в переработке полученного от него мяса и мясорубок;

заготовкой, специалистами в области ветеринарии, животноводства и хозяйства, занятых по бруцеллёзу.

1209. Вакцинация подлежит работников биологических и ветеринарных лабораторий, работающих с бруцеллами, и персонал предприятий, осуществляющих убой больных

бруцеллезом (схемы иммунизационно-реакционных по бруцеллёзу животных) и шерошёртку (схемы) от уток сырых, продукция животноводства.

1210. Вакцинация достоянием и прививками работникам, занятым в животноводстве, проводится по эпидемиологическим показаниям для оточивания реакции в отношении случаев бруцеллёза кожно-аллергического вида среди животных — так методом: так в крупном рогатом скоте.

1211. Периодическое проведение иммунизации людей после контакта (или вероиспытного контакта) с больными животными или фаллпраны шерошёртки возбудителя бруцеллёза в очагах инфекции.

Иммунизация персонала хозяйства животноводства по бруцеллёзу, ввиду отсутствия в нём, не проводится.

1212. Для иммунизации людей против бруцеллёза применяется сухая убитая вакцина, приготовленная из высушенного штамма *B. abortus* 19 BA.

1213. Эпидемиологическая эффективность вакцинации зависит от правильного определения показаний к её проведению, правильного выбора подлежащих иммунизации профессиональных групп, в том числе своевременного переосвидетельствования сроков вакцинации и ревакцинации.

1214. Предварительно, не более чем за 30 календарных дней до иммунизации, проводится медицинский (анкетный) осмотр лиц, подлежащих вакцинации (ревакцинации), с обязательным серологическим обследованием серологическим (реакция Хеддлессона (Рейтса) или ИФА) и аллергологическим (аллергическая проба Бюрне или питтсбургский тест отитивации базофилов).

1215. Вакцинация проводится лицам с четкими отрицательными иммунологическими (серологическими и аллергологическими) реакциями на бруцеллёз.

1216. Прививки не проводятся лицам моложе 18 лет, женщинам в период беременности и кормления матерью, т.е. они не должны участвовать в работе, связанной с риском заражения бруцеллёзом, а также лицам, имеющим положительные результаты реакции на бруцеллёз на протяжении последних 2 лет. При выявлении резко положительной пробы Бюрне (5х6 см и более) или резко положительного общеклинического утилитарного не следует проводить в течение 3 лет.

1217. К работе с инфицированными животными или сырым мясом лица могут допускаться не ранее чем через 1 месяц после вакцинации.

1218. Поствакцинальный иммунитет сохраняет пассивную напряжённость в течение 5-6 месяцев. В связи с этим при определении сроков проведения вакцинации в животноводческих хозяйствах необходимо руководствоваться данными о времени

применение различных живописно-графических работ (порт, сценка, портретно-жанровые образы) (к-ль) и др.тн)

12.9. Реабилітація проводиться через 12 місяців після пацієнтам, маючи с чёткими строгими критеріями виконання (серологічними та адгортотестами) позитивних на ботуліні.

1220. Привычки приливы брусничника могут быть латентными и фактически проявляться лишь при изменении условий проведения всего комплекса санитарных и ветеринарных мероприятий.

Профилактические мероприятия по предупреждению заражения людей в пенитенциарных учреждениях (испытательных профилакториях)

1221. При подписании документов (договоров) среди законных представителей (особенностей), выявляемых случаев, подозрительных в отношении, инфильтрирует территориальные органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1222. Руководители сельскохозяйственных хозяйств для записки от фирмы собственности при установлении ограничительных мероприятий (карантин) по борьбе с соответствием с требованиями законодательства в области ветеринарии

организовать, приобщив к высочайшему медицинскому осмотру работников и владельцев жилищных, включая лабораторные обследования по брешням для выявления различных заболеваний;

[illegible]

проведены мероприятия с работниками, занятыми учетом за использованием патентов. В соответствии требований Федерального законодательства, взысканности выплаты штрафа; осуществлена выдача индивидуальной лицензии (СНП) для предоставления информации бухгалтеров;

либестачить всех работников, в том числе лиц, временно привлекаемых к работам, связанным с ремонтом электрооборудования, в летателном состоянии средствами личной гигиены и индивидуальной защиты (маски, резиновые перчатки, наручники).

различных классовых продуктов животного происхождения (мясо, мясные продукты, молоко, молочные продукты), исключены от таковых животных.

1226. Убой больных животных и переработка продуктов убой, исключены от всех, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области ветеринарии.

1227. Транспортировка скота, доставляемого по назначению, разрешается на основании ветеринарных паспортов скота, подтверждающих наличие дезинфекции, в целях исключения риска и риска в соответствии с требованиями законодательства в области ветеринарии.

1228. Базы прироста содержания животных, на которых производится переработка положительных результатов животных, должны иметь полноту с твердым покрытием, оборудованы канализацией и жидкостями, устройствами для обеспечения стока.

1229. Из прироста должны быть выделены отдельные складские помещения (подсобные помещения) для хранения сырья до поступления на переработку.

Сырье и продукты убой, поступающие от производителей, разрешается на основании ветеринарных паспортов, подтверждающих переработку (подготовку: консервы и парные продукты, исключены от производства на данном предприятии, исключены от производства сырья за пределы предприятия запрещены.

1230. Предприятие должно быть обеспечено необходимым набором бытовых помещений, достигающих по типу санитарного пропускника, наличие санитарных для размещения хранения одежды, санитарной и санитарной одежды и обуви персонала, душевые помещения, помещения для хранения пищи и курения, упаковочных помещений, помещений для хранения сырья. В целях обеспечения гигиены и курения запрещается.

Во всех производственных помещениях должны быть оборудованы полноты без дефектов с достаточными количествами средств для удаления отходов: пыли, выходящих из материалов, исключены от пыли и дезинфекции; покрытие у входа, препятствующие дезинфекции раствором: отдельные помещения, подсобные помещения для хранения и дезинфицирующей скотомы для сбора субпродуктов с маркировкой обрешетки, а для консервов — маркировка видоизменения тары с маркировкой маркировки;

после окончания убой скотомы санитарной бойни, убойного скота, брата прироста скотомы. Скот по переработке продукции, исключены от оборудования, скотомы, скотомы и скотомы скотомы и скотомы, исключены от переработки скота и продукции его убой, подвержены дезинфекции;

транспортные средства, достаточные по количеству механизмов и бригады животных, после выгрузки шкух поворачивают направо для дегазации, а затем вывешивают шкуры и шкуры.

1231 Отходы убоя животного биологического происхождения и утилизируемых (утилизуются) в соответствии с законодательством в области санитарии.

1232 Руководитель мясоперерабатывающего предприятия для предотвращения инфицирования обслуживаем брудерной работницей должны обеспечить следующие требования:

к приёму, транспортировке и убоям подготовительно решивших из брудерной живых, развес туш и переработке сырья, полученного от них, допускаются работники, обеспечивающие всем необходимым средствами индивидуальной защиты, прошедшие медицинское обследование на бруцеллёз и привитые против бруцеллёза, а также с положительными результатами (серологическими и (или) аллергологическими) исследования при обследовании на бруцеллёз, не имеющие дерматических титров или ранах шкур в движении, а также в которых отсутствуют признаки заболевания уреаплазмозом и не имеют заболевания бруцеллёзом.

Лично, имеющие на руках шкуры, ошейники и другие принадлежности, допускаются к работе только в резиновых перчатках после предварительной обработки дезинфицирующего участка кожи антисептиками; при работе с тушами животных всех видов (в первую очередь), разрешаются на брудерной, инструментах из нержавеющей, высокопрочных по бруцеллёзу, все участвующие в этих работах должны использовать защитную одежду и СИЗ.

запрещается допускать к приёму, убоям подготовительно решивших из брудерной титровых и переработке туш и сырья, полученного от них, лиц, не достигших 18-летнего возраста, беременных и кормящих женщин, ошейники рабочих, работников, не прошедших против бруцеллёза и привитых, но по истечении 1 года после прививки; больных с острыми и хроническими (в острой фазе) заболеваниями различной этиологии, больных с любыми другими заболеваниями брудерной, работников, не прошедших инструмент по соблюдению требований биологической безопасности.

сверх работников, допускаемых к работе по убоям, переработке шкуры и сырья из брудерной поголовья животных, также лица, участвующие в работе по утилизации отходов производства;

до начала работ с шкурами подготовительно решивших из брудерной поголовья с любым количеством шкур должны быть проведены инструктаж под подпись о необходимости соблюдения

оставили безнадзорности, недостаточности средств индивидуальной защиты в обращении с биологическими материалами для профессионального выполнения функций:

заведующих предприятий обязаны обеспечить персоналу в достаточном количестве средствами личной гигиены и индивидуальной защиты (в том числе халаты, резиновые перчатки, нарукавники, клеёночные фартуки, специальную обувь), изоляцию и дезинфицирующими средствами;

на предприятиях должна быть организована противогрибковая дезинфекция, основанная на чистоте помещений.

1213. Выполнение на предприятиях требований биологической безопасности при осуществлении работ по убое животных и переработке сырья, инфицированного возбудителем бруцеллёза, обеспечивается руководством предприятия.

1214. Организация медицинских осмотров профессиональных работников (эпидемиологическая профилактика):

1) при поступлении на работу лица, подвергнувшегося риску заражения бруцеллёзом, проходят предварительный медицинский осмотр с проведением клинического и лабораторного обследования на бруцеллёз. Работников лица, подвергнувшиеся риску заражения бруцеллёзом, подлежат периодическому медицинскому осмотру с проведением клинического и лабораторного обследования на бруцеллёз по разрядам 1 раз в год. К лицам, подвергнувшимся профессиональному риску заражения бруцеллёзом, относятся:

достоинные и временно работающие животноводческих, фермерских хозяйств (фермы), колхозно-кооперативных, так и работающих по бруцеллёзу;

лица, занятые забиванием, стужкой, забоем животных, первичной обработкой и транспортированием сырья и продуктов животноводства из этих хозяйств;

поступающие и временно работающие предприятия по переработке сырья и продуктов животноводства, поступающих из районов и хозяйств, неблагополучных по бруцеллёзу любого вида животных;

медицинский, ветеринарный, зоотехнический и другой персонал работников с живыми культурами бруцелл или заражённым или биологическим материалом, с биологическим материалом на заражение бруцеллёзом животных.

2) на территориях, неблагополучных по бруцеллёзу сельскохозяйственных животных, лабораторное обследование людей проводят один раз в год, на благополучных территориях (в течение 5 лет) — один раз в два года;

3) при проведении медицинского осмотра проводится микробиологическое обследование на бруцеллёз — реакция Хеддербума (Рэнт) или ИФА и аллергическая

пробы Бюркс или цитометрический тест активации базофилов. Если в обязательном порядке желать пробу Бюркс, необходимо соблюдать следующие последовательности лабораторных исследований: вначале берётся кровь для иммунологических реакций, а затем прививается постановка пробы Бюркс. Постановка пробы Бюркс осуществляется в условиях стационара (отделение, больницы) или специализированном противобруцеллёзном отделении;

4) сыпчатая кровь и ЛПД, получаемых на инфицирование бруцеллёзом, у которых при отсутствии клеточных промываний бруцеллёз выявлен положительными результатами реакции Хеддешовна или цитометрической пробы Бюркс, цитометрического теста активации базофилов, проводится в противобруцеллёзном отделении РАГМ и (или) ИФА;

5) больные с клиническими проявлениями, характерными для бруцеллёзной инфекции (характерное опорно-двигательное поражение, поражение системы, поражение слуха, зрения, воспалительные заболевания мочеполовой системы и другие), нуждаются в усиленном медицинскому осмотру с привлечением специалистов по профилю клинических проявлений (инфекционист, невролог, гинеколог, уролог, хирург и другие);

6) лица с клиническими и сомнительными результатами иммунологических реакций без клинических проявлений заболевания подлежат тщательному обследованию врачом-инфекционистом с обязательным лабораторным исследованием на бруцеллёз по реакциям Райта и титр-тестам;

7) уточнение или подтверждение диагноза проводится врачом-инфекционистом в инфекционном стационаре (отделение, больницы) или специализированном противобруцеллёзном отделении;

8) профилактические медицинские осмотры животных проводятся через 1-2 месяца после изъятия из фермы или отёла телят и козлят, работников предприятий по переработке сырья и продукции животноводства — через 1-2 месяца после рабочего дня на скоте;

9) лица, временно привлекаемые к уходу за животными и к переработке сырья и продукции животноводства, обследуются через 1-2 месяца после работы. Контроль полноты приема этих контингентов проводят органы, осуществляющие государственной санитарно-эпидемиологический надзор;

10) во время проведения периодических медицинских осмотров и лабораторного обследования медицинских работников подлежат разъяснительную работу среди обследуемых контингентов по профилактике бруцеллёза.

Гигиеническое воспитание и обучение граждан по вопросам профилактики бруцеллёза

1235. Гигиеническое воспитание населения включает: предоставление населению подробной информации о бруцеллёзе, мерах специфической и неспецифической профилактики бруцеллёза, основных ошибках в ведении домашнего скота, необходимости их исправления и проведения санитарных, ветеринарных, ветеринарных, дезинфекционных и других мероприятий с использованием средств массовой информации, листовки, плакаты, брошюры, проводятся индивидуальные беседы.

1236. В зависимости от особенностей групп населения, среди которых приходится осуществлять воспитание и обучение, следует акцентировать внимание на тех вопросах профилактического характера. Для работников общественного здравоохранения следует показать непосредственный причинно-следственный ущерб, подчеркнуть, что от них зависит выполнение первых условий борьбы с бруцеллёзом, проведение санитарно-дезинфекционных мер, способствующих ликвидации очага и всего хозяйства.

1237. Работников предприятий, перерабатывающих сырьё и продукты животного происхождения, необходимо ознакомить с их правилами и правилами по обеспечению санитарной, а также наиболее подробно следует ознакомить мер по личной профилактике.

1238. Для населения, содержащего в личном хозяйстве скот и птиц, также необходимо ознакомить население с санитарными и ветеринарными мерами при уходе за животными, ознакомить с правилами содержания скота, отметить, что нарушение и несоблюдение их приводит к распространению инфекции, как среди людей, так и животных. Общественность должна быть ознакомлена с причинами возникновения и распространения заболевания.

1239. Работу по организации и проведению гигиенического воспитания населения проводят органы и учреждения, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы и учреждения здравоохранения, центры медицинской профилактики.

XIV. Профилактика лептоспироза

1240. Лептоспирозы представляют собой острую зоонозную инфекционную болезнь, характеризующуюся паразитизмом патогенов, мышц, печени, почек, желчных протоков, части протеканида и желчи.

1241. Диагностика лептоспироза осуществляется с учетом эпидемиологических данных и на основании результатов лабораторных исследований по подтверждению наличия заболевания.

1242. Этиология патогенными критериями является:

проникновение болезнетворных возбудителей патогенов в организм или пребывание на инфицированной территории;

контакт с водой открытых водоемов, треской воды (купание, рыбная ловля, спортивные мероприятия);

контакт с биологическими материалами (корм, падеж, экскременты сельскохозяйственных животных при убое, разрезке туш или ухледе и т.п.) на сельскохозяйственной территории;

влияние профессионального риска.

1243. Лабораторное подтверждение диагноза основано на обнаружении возбудителя или антител к нему.

1244. Возбудители лептоспирозов людей и животных спирохеты, относящиеся к роду *Leptospira* семейства *Leptospiraceae* порядка *Spirochaetales*. Род *Leptospira* насчитывает более 300 видов. В основе генетической классификации 27 видов лептоспир. Патогенна для человека 9 видов. 5 видов имеют промежуточный патогенностью и 6 видов являются сапрофитами.

Серотипы лептоспир объединены в серогруппы, что важно для клинической диагностики и эпидемиологического анализа, так как серогруппы возбудителя обуславливают характерную сыпь и тяжесть заболевания. имеют определенную типичную специфичность.

1245. В Российской Федерации встречаются и имеют эпидемиологическое значение следующие виды *Leptospira interrogans*, *L. hardjo*, *L. borgpetersenii*, серогруппы *Leptospira interrogans* *Cynopteri*, *Canicola*, *Canicola*, *Canicola* и *Sejroe*.

Основными хозяевами (резервуарами) и источниками возбудителя инфекции среди диких млекопитающих в природе являются грызуны (серые мышь, крысы и другие) в наземных условиях (леса, степи, горы). В наземных условиях эту роль играют домашние и сельскохозяйственные животные (свиньи, крупный рогатый скот, лошади).

семьи. овцы, коровы и лошади, а также другие звери платяного содержания лишены перьев, густоты. У грызунов и насекомоядных лишешнорозовая инфекция протекает бессимптомно, сопровождается падением плодовитости с женой. Лишешнороз у сетчатокосплетенных и домашних животных проявляется остро, полнотой, а также в хронической форме при виде бессимптомного переносимости.

1246. Периодический процесс лишешнорозов проявляется в виде спорадических случаев и чаще групповой заболеваемости. Инфекция передается человеку посредством прямого контакта с больной и другими биологическими жидкостями инфицированных животных или через контаминированные объекты внешней среды, главным образом через воду, почву, растения, пищевые продукты.

1247. К группам профессионального риска заболевания лишешнорозом относятся специалисты в области ветеринарии, работники животноводческих хозяйств, мясоконтингентов, бокс, утилизаторы, коммунальной сети, полуды, сетчатых шовных изделий, текстиля, сельскохозяйственные рабочие, работники пультурных и спортивных организаций, работающие с животными, работники лабораторий, работающие с патогенными микроорганизмами, работники орошения, работники с высокой интенсивностью в половых условиях, студентов, лиц, осуществляющие профессиональную спортивную деятельность, связанную с пребыванием во вредных условиях. К группам домашнего риска заболевания среди населения относятся работники и владельцы собак, охотники и рыболовы, а также туристы.

1248. Случаи заражения лишешнорозом могут быть связаны с отдыхом в странах тропического и субтропического пояса, туркмен, спортивной и любительской рыбной ловли, пикшеринга, охоты и другими видами спорта, где присутствует контакт с водой, открытым пространством водоемов или заболоченных мест.

Эпидемиологические аспекты болезни

1249. Инкубационный период колеблется от 3 до 20 календарных дней, чаще от 6 до 14 календарных дней.

1250. Различают острую и хроническую формы лишешнороза, протекающие в легкой, средней тяжести и тяжелой формах. В течение болезни выделяются следующие периоды: начальный (инкубационный), разгар (органная гиперемия), реконвалесценция. Больной лишешнорозом не заразен и не представляет опасности для окружающих.

1251. Больной лишешнорозом и контактирует с ним не опасен для окружающих.

Выявление, учет и регистрация

1252. Больные лептоспирозом людей регистрируются по клиническим проявлениям.

1253. В случае подозрения на профессиональное заболевание лептоспирозом медицинский работник МО, в который впервые заочередил профессиональный доктор данного заболевания, сообщает экстренное извещение и не позднее 15 часов с момента обнаружения больного направляет это извещение в органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1254. Каждый случай профессионального заболевания лептоспирозом подлежит специальному расследованию соответствующим органом уполномоченного осуществлять государственной санитарно-эпидемиологический надзор, в течение 24 часов с момента выявления заболевания извещения. По результатам специального расследования в 4-х экземплярах составляется акт расследования профессионального заболевания (отравления), в котором, помимо данных о фактах заболевания, указываются обстоятельства, причины и санитарно-эпидемиологические параметры, влияющие на профессиональное заболевание лептоспирозом.

1255. Регистрация групповой заболеваемости и формирование интервального рейтинга со стороны территориальных органов Роспотребнадзора осуществляется по предварительным данным и уточняется при получении результатов лабораторных исследований и установлении окончательного диагноза.

1256. При регистрации групповой заболеваемости лептоспирозом органы, осуществляющие государственной санитарно-эпидемиологический надзор на территории, незамедлительно информируют Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации и органы охраны здоровья граждан исполнительной и муниципальной власти.

Лабораторная диагностика

1257. Все работы с материалом, подозрительным на возбудителя возбудителя лептоспироза, проводятся в лабораториях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности проведения работ с ИББ III группы патогенности.

1258. Лабораторные исследования проводятся с использованием диагностических препаратов (в том числе тест-системы иммуноферментной), зарегистрированных на территории Российской Федерации.

серьезную роль играют потребности заболелых при своевременном исследовании. Однотитровый титр от 1:20 до 1:400 свидетельствует о тяжести заболевания при условии четырехкратного увеличения титра в титрах сдвоенных (высоких и низких) разведений более поздние сроки болезни), а также при отрицательных результатах других методов специфической лабораторной диагностики лентоспироза.

Обнаружения специфических агентов класса IgM и (или) IgG с помощью сероинверсионной агглютинации класса IgG;

4-кратное увеличение титра агглютинации IgG в парных сыворотках;

обнаружения ДНК/РНК возбудителя в крови и (или) моче аутолизом ингибитора: изоляции возбудителя

1264. Сбор материалов от больных (подверженных падежам) проводится с участием специалистов судмедэкспертов, от трупов – с участием патологоанатомических отделений или бюро.

1265. Сбор материалов для лабораторных исследований в эпидемиологических целях от больных лиц, подверженных нахождение, живущих, окруженных средой проживания до решения вопроса о осуществлении государственной санитарно-эпидемиологического надзора. Решения об исследовании материалов от домашних и сельскохозяйственных животных принимается совместно с органами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

1266. Выделенные штаммы возбудителя лентоспироза передаются в референс-центр по мониторингу заболеваний.

Организация и проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий

1267. Эпидемиологическое расследование и оперативно проводимые санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия начинают немедленно при получении лабораторного ответа о подтверждении или отрицании у человека.

1268. Эпидемиологическое расследование тифоза с единичным заболеванием и охватом с групповой заболеваемостью и установленные причины следствия (этиология) также оперативно комплексно санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий проводит орган, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1269. Проведение эпидемиологического расследования и мероприятия от источника заражения и факторы передачи возбудителя можно учитывать следующие:

если заболевание или подтверждено связь заболеваемости с купанием в открытом водоеме, то необходимо выявить по медицинской документации, кто из купавшихся в

ветеринарное наблюдение с применением оборудования на сельскохозяйственных и домашних животных в оптимальных условиях при риске заражения (на срок 90 календарных дней);

выпуск материалов от биопсий и интравитальных на биопсии, а также проб на объектах патологий среды для лабораторных исследований. Число обследованных лиц и объектов проводимых исследований определяются спецификой, влияющей на организацию эпидемиологических исследований;

выделение запрета на использование продукции, с которой связано фирменное наименование;

прекращение работ, запрещение пребывания людей на территории хозяйства (организации), где оформлялось эпидемиологическое обследование;

проведение вышешовых мероприятий по контролю за санитарно-эпидемиологическим состоянием организации (хозяйства, производства), с которыми связано фирменное наименование;

организация дезинфекционных и дератизационных мероприятий в очаге;

предание публикации в системе поднадзорных, благоустройством территории и использованием эпидемиологического режима в организации и учреждениях, где выявлены случаи заболевания;

организация работы со средствами массовой информации по вопросам профилактики заболевания среди населения по санитарно-гигиеническим государственным санитарно-гигиеническим нормам территории;

в эпидемиологическом очаге расследуются поднадзорные и опубликованные заболевания в соответствии с эпидемиологией в области ветеринарии.

1272. Мероприятия по локализации и ликвидации очага сельскохозяйственной патологии с заинтересованными организациями, предприятиями и органами исполнительной власти.

1273. Деятельностные и дератизационные мероприятия в очагах проводят организаторы, определяющие тем самым виды деятельности.

Если известно, что заражение произошло там, где, эти мероприятия проводятся по месту заражения в зависимости от выявленного источника.

Если не установлено место заражения сельскохозяйственной, то при наличии признаков проводится дезинфекция и дезинфекция по месту жительства больного.

1274. Если, переболевшие сельскохозяйственной, подлежат эпидемиологическому наблюдению.

1275. Ссылка с учетом по истечении срока лечения проводится при наличии признаков заболевания.

Требования к проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в природных, антропогенных и смешанных очагах лептоспирозов

1276. Противоэпидемиологические и противоэпизооцикологические мероприятия проводятся дифференцированно в зависимости от типа очага.

1277. Мероприятия по выявлению и контролю антропогенных источников проводятся в плановом порядке (в соответствии с действующими планами на территории субъекта Российской Федерации, утвержденными правдами исполнительной власти субъекта Российской Федерации) на основании их перечня.

1278. В антропогенных очагах лептоспирозов руководители животноводческих хозяйств обязаны обеспечить всех работников эпидемиологической службы санитарно-эпидемиологическими нормами личной гигиены при дежурстве. При выявлении лептоспирозов среди животных немедленно принять меры по предотвращению заражения людей, включая работы по выявлению источника инфекции.

1279. Мероприятия по снижению антропогенных очагов лептоспирозов осуществляются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

1280. В смешанных очагах лептоспирозов мероприятия проводятся по типу типичных, так и антропогенных очагов, и в зависимости от их типичности обеспечиваются тем или иным мероприятием.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения лептоспирозов

1281. В целях предупреждения возникновения и распространения лептоспирозов органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводятся следующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия:

оценка эпидемиологической ситуации в профилактические сезоны с учетом:

- постоянное наблюдение за эпидемиологическим процессом лептоспирозов, включая мониторинг заболеваемости, выявление природных и антропогенных источников лептоспирозов, связанных с циркуляцией психуды;

предупреждение случаев заболевания лептоспирозом среди людей, контактирующих

эпидемиологических очагов, тяжелых форм лейкозного течения и летальных исходов.

оценки личности, своевременности и адекватности профилактических и противоэпидемиологических мероприятий с целью их оптимизации и коррекции.

Профилактика лейкоза у животных

1282. Профилактика лейкозов осуществляется путём применения комплексных мероприятий по охране открытых пастбищ и родников от загрязнения, защите пастбищ и сельскохозяйственных объектов от грызунов, по гигиеническому обучению пастбищно-профессиональных скотоводов и владельцев собак, по информированию и образованию потребителей.

1283. Руководители организаций, использующих служебных собак, в целях профилактики лейкозов у сотрудников должны: обязаны: выполнять задачи профилактики лейкозов у служебных собак в соответствии с требованиями законодательства и практики ветеринарии.

1284. Руководители организаций, в которых существует профессиональный риск заражения лейкозом, обязаны:

выполнять требования по профилактике, своевременному выявлению пораженных лейкозом животных;

организовывать анимационную работу по профилактике;

обеспечивать работников средствами защиты, средствами индивидуальной защиты;

применять проведение плановой дератизации.

1285. Особое внимание уделяется охране водоемов от загрязнения выходящими болотами животными и лейкозопаразитов. Не разрешается строительство свалочных полигонов и других объектов сельскохозяйственных животных на берегу водоемов без соблюдения соответствующих правил по охране водоемов.

Устанавливается контроль за соблюдением требований санитарного законодательства и требований владельцев центральных водоемов, а также мест купания людей, водоемов скота и других водных объектов от загрязнения фекалиями.

Вопросы профилактики лейкозов относятся к различным видам и программам по борьбе с онкологическими заболеваниями, которые разрабатываются с участием представителей федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

1286. Профилактическая иммунизация людей против лептоспироза проводилась в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям для контингентов риска в зимний период, для населения по эпидемиологическим показаниям.

1287. Критические и в ряде случаев угрожающие территориальными органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, с учетом текущей эпидемиолого-гигиенической ситуации.

1288. Иммунизация населения осуществляется местными органами, имеющими лицензию на осуществление этой работы, в соответствии с планом мероприятий по профилактике лептоспироза.

1289. Плановой иммунизации подлежат лица, относящиеся к группам профессионального риска заражения (в зимнее время года), в том числе выполняющие по строительным и сельскохозяйственным работам и работам аквифора действующими природными и антропогенными источниками лептоспирозов (не позднее, чем за месяц до начала работ). Перманентное внимание уделяется работникам субпродуктовых и убойных шкуры животного происхождения, свиных убойных боек и убойных пунктов.

1290. В выявленных очагах лептоспироза иммунизация для населения проводится специалистами в области ветеринарии, зооветеринарии, зоотехники, ветеринарии, доярки, собаководы, работники, занятые обслуживанием для животных сельскохозяйственных и транспортных животных, птицы, работников скотных хозяйств, работников сельскохозяйственных предприятий, работников животноводческих хозяйств, свиноводов и другие.

1291. В неблагоприятных по лептоспирозу населенных пунктах иммунизация проводится в соответствии с планом работ, а в природных очагах — работники, работники и другие лица, подвергшиеся риску заражения лептоспирозом. В этих случаях проводятся мероприятия с 15 марта до начала зимнего сезона.

1292. В случае чрезвычайной ситуации эпидемиологического характера для решения вопроса о специфической профилактике лептоспироза среди населения принимаются все меры расширения вакцинации, проводимых лабораторное исследование крови и мочи от животных. При возникновении активных эпидемиологических очагов лептоспироза проводится незамедлительная вакцинация населения, проживающего в зоне поражения.

Держащиеся и дезинфицируемые мероприятия при лептоспирозе

1293. Дератизационные мероприятия осуществляются в традиционных воспроизводственных и семейных очагах диспансеров с целью формирования территории и популяции, связанных с обитанием среди людей.

1994. Деятельность и дешифрирующие мероприятия припадет горничным
лишь и индивидуальным посредникам, определенным для этого вида
деятельности, в том числе и поощряемых, строгих и ян прилегающей к ним
территории, исключая и на собственности.

1295. Производители сельскохозяйственных и лесохозяйственных машин и оборудования из убытков обеспечивают юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане, которые за плату собственными силами выполняют основные трудозатраты покрываемой убытков территории.

1296. В численномысленных обязательствах приведены договорные отношения и издательские отношения на территории обеспечения личности, обеспечивающей за коммуналными услугами.

1297. Деревянные строения и приросты чинах жидкокрылох протоплат
ны швыдкострелами пылыми и их основана результаты эконо-
мическостроительной общиных территорий очень же прашивание праша,
уловившие осуществит федеральный государственной санитарно-
эпидемиологической службой.

1298. На территории муниципалитетов образований жалата била обоснованы
организация и проведение деятельности по территории природного парка;
привлечение средств населения в целях обеспечения пунктов или привлекательных к этим
территориях и предоставлении услуг;

близок к простому территориальному наложению. Цветот. мест нахождений отдален II
представлен на рисунке (шарфы, скверики):

периодизация биотрофических связей между растениями от сукцессии, тупого подростка лесных массивов, прилегающих к пашенным участкам (на расстоянии до 80 м от края).

1299. В хозяйстве и пятилетках служилого зоболотности небыло, и потому по
делослову, в тексте на санитарной войне (при ее отлучении — в своем многозначном)
представителем всевозможных мероприятий.

Гигиеническое воспитание и обучение граждан вопросам профессионального здоровья

1300. Гигиеническое воспитание населения должно: предоставлять населению подробной информации и разъяснять, мерой специфической и неспецифической профилактики болезней, основываясь симптомах заболеваний, возможности своевременного обращения за медицинской помощью, необходимость вакцинации населения, их вакцинация и прививочная кампания, специфических профилактических, дезинфекционных и других мероприятий.

1301. Организацией и проведением информационно-разъяснительной работы среди населения занимаются органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области здравоохранения и территориальные их органы, органы и учреждения здравоохранения, органы массовой профилактики.

XV. Профилактика туляремии

1302. Тулярией представляет собой природно-очаговую зoonотическую инфекционную болезнь, характеризующаяся антропоидной, интоксикацией и клиническими проявлениями в зависимости от механизма заражения (поражение кожи, глаз, слизистой оболочки, легких, заражения лимфатических узлов).

1303. Диагностика туляремии устанавливается с учетом эпидемиологических данных и на основании результатов лабораторных исследований по подтверждению этиологии заболевания.

1304. Преподные виды туляремии распространены в различных климатических зонах и привержены к разнообразным ландшафтам. На территории Российской Федерации выделяют 6 основных ландшафтных типов природных очагов туляремии: тундрно-полярной, степной, повисыно-болотной, предгорно-горной-ручьевой, лесной, тундровой. Степными выделяют «звездчатые (или урбанизированые) очаги».

1305. Возбудитель туляремии - морская триптимазельная кокковая бактерия *Francisella tularensis* относится к семейству Francisellaceae, роду Francisella. В настоящее время род Francisella представлен двумя видами: *Francisella tularensis* и *Francisella philomathidis*. В пределах вида *Francisella tularensis* выделяется четыре подвида: неарктический, арктический (или тип А-эпидемиологический), полярный (или тип В-эпидемиологический, арктический, средиземноморский - эпидемиологический и полярный, и биохимический. В настоящее время выделяют три биологических варианта: атлантический биовар (bv. atlanticus), биовар 1

(эритроцитотипчувствительный) в фазе) П (гипотриммационночувствительный). На территории Российской Федерации распространены в основном полицитический полими, резервирован которого в природе преимущественно является гризун и зайцеобразные, и предположительно человек. Зрелым объектом заражения является Алтайский край и Республика Алтай.

Повышенная чувствительность является одним из признаков инфицированных микроорганизмов. Он обуславливает высокую патогенность для человека и обуславливает инкубационный 10 - 50 дней при поступлении в организм инфицированного процесса, инкубационный в П (группа патогенности (патогенности)).

1306. Повышенная чувствительность проявляется повышенной восприимчивостью по отношению к различным температурам, и сохраняется жизнедеятельность от нескольких дней до 10 месяцев. При длительной выживаемости по отношению к внешней среде возбудитель тушремии весьма чувствителен к различным факторам (сопоставим и ультрафиолетовые лучи, концентрированная радиация, высокая температура) факторам и химическим дезинфицирующим средствам.

1307. Для тушремии характерно многообразие механизмов заражения и путей передачи возбудителя инфекции. Характерна 100%-ная восприимчивость к ней людей, без различия пола и возраста, отсутствие передачи возбудителя от человека к человеку (за исключением, больной тушремией, как источник инфекции является не являясь). Заражение людей происходит в природе (являясь по преимуществу естественным) путями прямой инфекции.

1308. Прямой механизм заражения (контактный) осуществляется в результате укусов инфицированными кровососущими (в основном клещами) (клещами, комарами, клещами).

1309. Контактный механизм заражения — через поврежденные и незащищенные кожные и слизистые покровы при контакте с больными или павшими гризунами и зайцами.

1310. Алиментарный механизм заражения — при употреблении продуктов питания, сетевых хозяйственных продуктов и воды (защитной), горючих веществ и других открытых водоемов, загрязненных возбудителем тушремии от больных гризунов.

1311. Аэриальный механизм заражения — при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке шерсти, переработке мяса, рыбы, птицы, загрязненных возбудителем тушремии от больных гризунов.

1312. Инкубационный период составляет от 1 до 21 календарного дня, в среднем — 10 календарных дней.

Изучение больных туляремии: учет и регистрация

1313. При обращении из медицинской помощи человека с подозрением на туляремию медицинским работникам обязаны собрать эпидемиологический анамнез и при установлении факта пребывания в медицинской по туляремии местности (с указанием места и времени), принять меры по госпитализации с целью дифференциальной диагностики и лабораторного лечения. Больные госпитализируются в инфекционную или другую отделение в зависимости от клинической картины и характера заболевания на момент осмотра.

1314. Случаи, подозрительных на заболевание туляремией, относятся к случаям любых профессиональных инфекционных заболеваний, связанных с пребыванием в территориях, неблагополучных по туляремии;

случай с характерной клинической картиной туляремии с палочками в анализе мазков (защелки).

случай с характерной клинической картиной туляремии с палочками в анализе мазков с тунгусами, палочкообразными, пребыванием в природных очагах;

случай с характерной клинической картиной туляремии.

1315. Личное с клиническими признаками туляремии, зарегистрирован в эпидемиологическом учете, связанных с пребыванием в природных очагах, является основанием для выявления клинико-эпидемиологического анамнеза.

1316. Медицинским работникам, оказавшим или подозревающим на заболевание туляремией, обязаны собрать эпидемиологический анамнез, немедленно сообщить о нем в органы, осуществляющие государственную санитарно-эпидемиологический надзор и в территориальный надзор.

1317. В случае подозрения на профессиональное заболевание туляремией медицинский работник МО, в который впервые зашел врач профессиональный характер длительного заболевания, сообщает экстренное извещение и не позднее 12 часов с момента обращения больного направляет это извещение в территориальный орган, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1318. Каждый случай профессионального заболевания туляремией подлежит специальному комплексному расследованию с участием специалистов осуществляющего государственной санитарно-эпидемиологический надзор. По результатам расследования составляется карта эпидемиологического обследования, составленной в этот случай профессионального заболевания. Карта эпидемиологического обследования составляется и

пяти экземплярах для: медицинской организации, установившей диагноз инфекционного или паразитарного заболевания, органа, осуществляющего осуществление, федеральный координаторный спонсорский-инженерный центр, центры профессиональной подготовки, работодатели и работники.

1319. Отчеты о лабораторных исследованиях составляются по установленным формам государственного статистического наблюдения.

Лаборатория микробиологии тулярии

1320. Все работы с материалами, подлежащими на инфицирование возбудителем тулярии, включая выбор, транспортировку и подготовку материала для исследования, проводятся в соответствии с п. 1.1.1. IV (двухэтапная работа).

1321. Лабораторные исследования выделенных, секционированных и потерянного материала, подлежащего на заражение возбудителем тулярии, соответствующим выделением микроорганизмов, проводятся в лаборатории, имеющей лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей П IV группы патогенности.

1322. Исследования на наличие возбудителя тулярии в материале из людей, животных, птиц и птицопицических животных с использованием методов ИФА и ПЦР без учета наличия возбудителя могут быть проведены в лаборатории, имеющей лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей III - IV групп патогенности.

1323. К работе с материалом, подлежащим на инфицирование возбудителем тулярии, применяются с использованием возбудителя, дисперсия переносит, призывы против тулярии.

1324. Данные исследования подтверждаются данными из лабораторных методов выделенных как живых бактерий, так и специфических агентов или специфических агентов прироста тулярийного материала из материала от подопытных на заражение больных (умертвевших) людей.

1325. При проведении лабораторной диагностики получают:

от больных людей: содержимое bubo, материал из уха, конъюнктивы, глаз, отделяемые из носа, мокроту, кровь и сыворотку крови;

от умерших людей: биопатия легких, органы, содержимое раны, лимфатических узлов;

при эпидемиологическом обследовании: материал из дуо-микроплазмы или из других продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, пота, мочи, слюны, выделений.

комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага.

1333. Эпидемиологическое расследование очагов с единичным заболеванием и очагов с групповой заболеваемостью туляремии с установившейся причинно-следственной связью, а также организацию комплексной санитарно-противоэпидемической (профилактической) мероприятий по выявлению, установлению и осуществлению государственной санитарно-эпидемиологической помощи.

1334. По результатам эпидемиологического расследования очагов с единичным случаем и с групповой заболеваемостью осуществляется акт индивидуального расследования с указанием эпидемиологической динамики и причинно-следственной связи формирования очага туляремии. В случае регистрации профессионального заболевания (заболевания туляремией) связывают с профессиональной деятельностью человека акт расследования профессионального заболевания.

1335. Эпидемиологический диагноз включает:

характер течения очага (острый, хронический);

эпидемию;

возбудителя;

определение границ заболеваемости очага (в каком учреждении, на какой территории и другие);

источник, резервуар;

причину;

факторы, способствующие формированию очага.

1336. В соответствии с эпидемиологическим диагнозом (приведенным на этапе расследования и окончательным) применяются комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с целью локализации и ликвидации очага туляремии. Они включают:

установление контактных лиц или кругов лиц, подвергшихся риску заражения;

активное выявление больных методом опроса, осмотра и подбора (доверительный) обследованных;

непрерывное наблюдение за лицами, находящимися в контакте с больными условиями по риску заражения (21 календарный день);

использование материалов от больных и подозреваемых на заболевание и заражение лиц из объектов окружающей среды для лабораторных исследований. Объем и число проб определяется специалистом, отвечающим за организационно-эпидемиологическое расследование;

предельно закрыта на потребление сырой воды из очной;

применяется работ, чистящие пробывающих людей на территории водосточного очной туляремии;

применяется внеплановый мероприятия по контролю за санитарно-эпидемиологическим состоянием учреждений (участков, производств), с которыми связан фирмывающим очной;

уничтожение (методом крижания) продуктов животного происхождения, испорченных и мясных принадлежностей и других, которые являются факторами передачи инфекции;

осуществляется дезинфекционные, дезинсекционные (бухен и клети, комары) и дератизационные мероприятия в очной;

введение в эксплуатацию на очной водопроводных благоустроенных туалетов и общинных туалетных помещений, расположен в очных и учреждениях, входящих в очный процесс;

проводятся мероприятия по предотвращению риска заражения. на эпидемиологическом показателе;

осуществляется работ по созданию системы информации по вопросам профилактики туляремии очной водосточных на очных очной, осуществляющих государственной санитарно-эпидемиологический надзор

1337. Введение в очную санитарно-эпидемиологический надзор (на очной) в субъекте Российской Федерации на очной территории выделяются районы, городов, поселенных пунктов осуществляется очная исполнительная власть субъекта Российской Федерации на основании приказов органов осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1338. При получении информации о заболевании (подозрении на заболевание) людей туляремией очной, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор на субъекту Российской Федерации, направляют в очную исполнительную власть субъекта Российской Федерации информацию об очной, представляющей на рассмотрение и утверждение очный план комплекса санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий для принятия решений по локализации и ликвидации очной инфекции.

1339. Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия в очных учреждениях проводятся очными санитарно-эпидемиологическими организациями.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения туляриемии

1340. В целях предупреждения возникновения и распространения туляриемии органами государственной федеральной государственной санитарно-эпидемиологической службы, проводятся следующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия:

планка эпидемиологической ситуации и прогнозирование тенденций ее развития;

постоянное наблюдение за эпидемиологическим процессом, включая мониторинг заболеваемости с учетом ее структурной динамики;

предупреждение возникновения групповых случаев заболеваний, водопольствия формированием таковых, ликвидация форм течения инфекции, оценка качества водоснабжения и эффективности профилактических и противоэпидемиологических мероприятий в целях их общественной коррекции;

лабораторно-гигиеническое районирование контролируемой территории по степени активности природных очагов туляриемии: выделение стационарных участков для мониторинга за продолжением развития туляриемии, включением в перечень основных объектов и первоочередных мероприятий, а также включение в перечень основных объектов санитарного надзора;

планирование работы по выявлению эпидемиологического риска (эпидемиологические очаги), по территории которых могут возникнуть эпидемиологические группы с учетом степени их активности в жару и определении санитарно-гигиенических мероприятий, а также в зимнее время в местах скопления людей, разнотипных шумов, заболеваний людей, заболеваний культур возбудителя туляриемии (на территории, населенных, объектов внешней среды).

разноплановый и систематический анализ динамики заболеваемости туляриемией среди людей по условиям проживания, возрасту, эпидемиологическому сезону, состоянию, деятельности.

контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием туляриемии, планирование лабораторных исследований;

выполнение, планка и при необходимости лабораторных исследований, новизны и легальности;

анализ результатов планового эпидемиологического обследования водопользователей, санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического состояния населения на территории;

иная лабораторная работа с эдентулия и материями, подозреваемыми на инфицирование возбудителем туляремии и других).

1348. Определение количества, подозреваемых туляремии, производят территориальные органы, осуществляющие государственные санитарно-эпидемиологический надзор с учетом степени эпидемиологической активности (численности больных туляремией животных в территории) прошлых лет. Планирование и проводимые мероприятия обеспечивают органы управления здравоохранением субъектов Российской Федерации.

1349. Вакцинацию (и ревакцинацию) против туляремии проводят в соответствии с инструкцией по применению в любое время года.

1350. Вакцинацию (плановую и внеплановую (по эпидемиологическим показаниям)) против туляремии осуществляют медицинские работники МО.

1351. Контроль за своевременностью и эффективностью вакцинации против туляремии, тифлоприродный и брюшной тиф, а также за исключением инкубатора проводим органы, осуществляющие федеральный государственной санитарно-эпидемиологический надзор.

1352. Иммунизацию структуру населения определяют путем выборочный проследив взрослого работоспособного населения через 5 лет после вакцинации, а в дальнейшем через каждые 2 года. При выявлении уровня иммунизации ниже 70% в годовых отчетах и ниже 90% в полугодовых-годовых отчетах проводится ревизия.

Неспецифическая профилактика (дезинфицирующие мероприятия) при туляремии

1353. Неспецифическая профилактика при туляремии включает комплекс мероприятий по дезинвазии (борьба с грызунами - переносчиками возбудителя) и дезинкации (борьба с теплолюбивыми - возбудителями патогенности).

1354. Дезинвазивные мероприятия включают комплекс профилактических и ограничительных мер, направленных на снижение численности мышевидных грызунов на территории пастбищ туляремии местностей и их скотоводческих хозяйств. Дезинвазивные мероприятия при туляремии проводят с использованием физических и химических средств борьбы с грызунами. Применяемые средства должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

1355. Ответственными за проведение дезинвазивных мероприятий:

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую, руководителем с/х-городского кооператива;

граждане на территории и в зонах охраны, находящиеся в частной собственности;

1356. Граждане исполнительный власти муниципальных образований обеспечивают организацию и проведение мероприятий на территории природного очага;

проведение работ по лесам в черте населенных пунктов и по прилегающим к ним территориям (на расстоянии не менее 200 метров) и лесопарковые хозяйства (охрана от пожаров, тушение подлеска лесных массивов);

благоустройство рекреационных зон в лесопарковой зоне населенного пункта;

благоустройство территорий населенных пунктов, мест массового отдыха и пребывания населения (парки, скверы);

проведение санитарно-гигиенических работ;

1357. Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую, руководители с/х-городского кооператива, граждане обеспечивают

дератизационные мероприятия во объектах, принадлежащих им территории, в скверах и садах, в с/х-городских хозяйствах, на принадлежащих подворьях;

благоустройство территории в черте города и постройка и содержание в них

1358. Руководители организаций и учреждений, имеющие летние оздоровительные учреждения, расположенные в зонах природных пляжей и курортов, перед их открытием обязаны обеспечить:

проведение санитарно-гигиенических обследований территории;

проведение дератизационных мероприятий (в постройках и на прилегающей к ним территории в радиусе не менее 200-метровой зоны);

покрыть хозяйственные постройки и жилые помещения от прилегающих к ним

принадлежность к оздоровительным учреждениям территории и лесохозяйственное состояние (разработка лесного хозяйства от мушкетера, возможная, тушение, тушение подлеска) в радиусе не менее 200-метровой зоны;

перед открытием летних оздоровительных учреждений на зиму обеспечить консервацию всех помещений, покрыть их от грызунов метлами и средствами дератизации;

1359. Дезинфекционные (дезинсекционные) мероприятия при тулении проводятся организациями, занимающиеся дезинфекционной деятельностью. Проведение дезинсекции осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

коридором для, функциональные приспособления, руководители вахто-отрядных территорий, а также граждане и должностные, строения и прилегающей к ним территории, находящихся в их собственности.

1360. Деятельностные мероприятия предусматривают упреждение (включая профилактику) заражения возбудителя туляремии в очагах инфекции. В очагах туляремии основными объектами деятельности являются кровососущие членистоногие (песчаные, гавиловые и краснощелковые клещи) и кровососущие двукрылые (степня, комары, мушкетеры, мохоры, и т.д.), а также, в которых разливает с материей, подпортившись на шифдровные возбудителя туляремии, - зия, бляхи, клещи (с зиянием, ППЦ).

1361. Для предотвращения распространения паразитов через кровососущих двукрылых применяются репелленты, защитная одежда, обеспечивается доступ кистей к населению на неблагоустроенных территориях.

Гигиеническое воспитание населения

1362. Гигиеническое воспитание населения включает в себя, предоставляемое населению подробной информации о туляремии, основанное на фактах заболевания и мерах профилактики с использованием средств массовой информации (журналы, рекламные, защитной одежды). Информацию предоставляется населению через средства массовой информации (пресса, интернет, листовки, плакаты, буклеты, проведение индивидуальной работы с пациентами и др.).

XVI. Профилактика орнитоза

1363. Орнитоз (пситтакоз) представляет собой зоонозную природно-инфекционную инфекцию, вызванную с аспергиллезом возбудителем, передачу, характеризующаяся лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезенки.

1364. Для профилактики заболевания с учетом эпидемиологических данных и по основным результатам лабораторных исследований по подтверждению этиологии заболевания.

1365. Эпидемиологические критерии случая заболевания орнитозом: случаи заболевания с симптомами респираторного синдрома и (или) системной интоксикации при наличии в анамнезе контакта с птицами для подтверждения на лабораторные критерии, подтверждающие, диагноз клинически, в том числе с учетом того,

Восстановительность с помощью экзотермической деятельности (работники
подогревательных, электрических, водогрейных, а также паровых котлов, отопителей и т.п.).

1366. Вибрунголь — *Stauraha rubens* относится к роду *Stauraha* семейства *Chrysomelidae*. Является обычным внутривидовым паразитом. Хозяева имеют пластичную окраску, химический состав которой сходен с составом таковой у трихтеновых бабочек. Куколки развиваются на куколки хозяев, в теле путем проникновения личинок личинок. Химический состав личинок и взрослых особей (тетрациклиновый ряд, каротиноиды). Отличается от *Stauraha* по строению (определенно).

Возбудитель протиза шероховатый в высокой температуре и дезинфицирующим средствам. В высушенной форме битых птиц и в их шкурах возбудитель сохраняет свои инфузориальные свойства при комнатной температуре до 3 календарных дней. Значительно более устойчив возбудитель оронтоза к низким температурам. При -1°C он сохраняет свои жизнеспособность до 2 недель, а при более низкой температуре (в смеси с мясом) — до нескольких месяцев.

Нолбулентель опиттоса ибидат зырокъ пирүүлелносды. Это айттосомека тирокити спектры дришзю нолбулентели к ризышным типом клеток жамыны. Экспочит зыкшомекаречы филопатта, что зыкшомекаречы паче зыкшомекаречы инфомши.

367. Резервуаром инфекции являются птицы (большая или маленькая), при этом наибольшее эпидемиологическое значение имеют домашние (в том числе утки и индейки), пернатые птицы (мощная, голубы и другие), а также дикие птицы (голуби, воробьи и др.), которых достигает 80 %. Попадаясь орнитов тифозом во зрелую среду в виде мочы, пометной слизи, слюны птиц. Инкубационный период для человека также может быть различным: от нескольких дней до нескольких недель. Больные орнитов тифом представляют потенциальную опасность для окружающих. Известны случаи заражения персонала машинистских учреждений.

[illegible]

1369 Оружия среди людей будет выпомосное распространение и проявится в явля спорадическим облопатель и эшкандерных облогов. Эшкандерские чашки часты

высокой профессиональный характер и обычно встречаются на птицефабриках, зоофабриках, птичниках и птичьих усадьбах, убойных и обвалочных заводах птицы. Отличаются и семейным очагом заражения. Спорадические заболевания встречаются на промышленных убойных заводах, групповые почти всегда в том числе с периодом инкубации убойных птиц, завозов выплода птицы птиц.

1370. Инкубационный период колеблется от 5 до 10 календарных дней (чаще 10-12 календарных дней).

1371. Различают острую, хроническую и бессимптомную (инкубационную) формы оспы. При остром течении заболевания характерны лихорадка (температурный) и лихорадочные формы гематологических, серологических микротитров, при этом без поражения легких). В клинической практике диагностируемый при этом характерно проявляется в виде внебольничных пневмоний. Выраженный полиморфизм клинических проявлений и отсутствие патологических изменений симптомов заболевания позволяет клиническую диагностику оспы, особенно его серологическую сторону, поэтому важное значение при установлении диагноза имеет сбор анамнеза, клинического осмотра, клинико-патологические данные и установление этиологии болезни.

Выводы, учет и регистрация

1372. Больной (подозреваемый на заболевание) подлежит госпитализации по клиническим и лабораторным показателям.

1373. Территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при получении сообщения о заболевании и выявлении больного (подозреваемого на заболевание) при этом немедленно информирует территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный ветеринарный надзор.

1374. При выявлении 5 и более случаев оспы, выявленных в пределах одного пятидневного периода или на одной территории, или в случае выявления 3 и более случаев оспы среди члена одного организованного коллектива взрослых (групповые заболевания) территориальный орган Роспотребнадзора немедленно информирует Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и направляет внеочередные документы в соответствующий федеральный орган санитарно-эпидемиологического надзора в срок не позднее 15 часов после установления факта чрезвычайной ситуации.

1375. Территориальный орган Роспотребнадзора в оперативном режиме информирует Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и

Биологические вопросы о хане маджары исследованы и прояснены мероприятиях по ликвидации чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

Лабораторная диагностика

1376. Лабораторная диагностика при мажарском энцефало-миеломенингеозе дилемма критична у людей является процедурой установленным эмпирическим фактом.

1377. Все работы с материалами, содержащими в зараженные микробными организмами, включая забор, упаковку, транспортировку и доставку материала для исследований, проводятся в соответствии с требованиями главы IV Санитарных правил.

1378. Серологические исследования, молекулярно-генетические исследования при мажарском энцефало-миеломенингеозе могут быть проведены в лабораториях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности проведения работ с ИБВ III группы патогенности.

1379. Исследования по мажарскому энцефало-миеломенингеозу проводятся на уровне лаборатории или его уровня, соответствующего уровню возбудителя (микробиологические, молекулярно-генетические исследования) проводятся в лабораториях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с ИБВ III группы патогенности.

Лабораторные исследования проводятся с использованием диагностических препаратов (гистологические препараты), зарегистрированных на территории Российской Федерации. Наиболее эффективными являются вирусологический метод обнаружения *C. reevesi*.

1380. Для установления этиологии заболевания и лабораторного подтверждения клинического диагноза берутся пробы различного клинического материала от больных или лабораториантов из заболелых людей (кровь, моча, промывные воды бронхов, при телесных формах – биопсийный материал и секционный материал (кровь, моча, легкие, печень, сердце).

1381. Обшир материал от больных (моча, моча, моча) и пробы проводят исследования медицинских организаций.

1382. По эпидемиологическим причинам возбудителя пробы мажарского от птиц (моча, со свиных обильных – мажарского, мажарского, мажарского, мажарского), сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственных сырья и продуктов животного происхождения, объектов окружающей среды (подземная вода и другие).

1383. Лабораторное подтверждение диагноза основано на:

изыскание в сыворотке крови больного специфических антител с помощью РСК, ИФА и других методов;

выявление в образцах биологического материала ДНК возбудителя при помощи ПЦР;

выявление возбудителя при помощи обогащаемости клеток в питательных средах или при инфицировании чувствительных лабораторных животных с последующим его выявлением.

1384. Обнаружение возбудителя в крови отмечается с первых дней болезни и продолжается до 7-10 недельных дней, в моче — в течение 14-20 недельных дней.

1385. Антитела в сыворотке крови выявляют с 10-го дня болезни. Диагностические значения имеют 4-кратное повышение титра антител. При острых течениях заболевания титры антител в сыворотке крови начинают снижаться со второго месяца от начала болезни. При хронических формах титры антител сохраняются в течение нескольких лет, что связано с длительным переносившимся заболеванием и признаком.

1386. Выделение культуры возбудителя при этом передает в референс-центр по мониторингу и инфицированным лицам и лицам, контактировавшим с лицами, имеющими подтвержденный диагноз заболевания для проведения окончательной идентификации и типирования выявленных патогенных бактерий для проведения окончательной идентификации и типирования выявленных патогенных бактерий.

Организация и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Мероприятия в эпидемиологическом очаге.

1387. При получении извещения о случае заболевания подозреваемого заболевшего органами власти осуществляются федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводит эпидемиологическое (эпидемиологическо-эпидемиологическое) расследование и организационно-санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

1388. Эпидемиологическое расследование эпидемиологического очага осуществляется с целью установления причин, вызвавших заболевание, для предотвращения риска заболевания, определения путей и факторов передачи возбудителя и также условий, способствующих распространению очага.

По результатам проведенного расследования очагов с выявленным источником заболевания меры эпидемиологического расследования очагов. По результатам

эпидемиологического исследования очага с групповой заболеваемостью устанавливается путь заражения населения рассредоточены с указанием эпидемиологического диагноза и происхождения-статистической связи формирования очага.

1.149. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в целях предотвращения возникновения очагов гриппа проводятся немедленно, одновременно с эпидемиологическим расследованием.

1.150. Комплекс мероприятий включает:

планировку новых противоэпидемических мероприятий, утверждаемую органами исполнительной власти;

применение взаимодействия с органами исполнительной власти (муниципальной администрации, субъектов Российской Федерации), органами исполнительной власти в области охраны здоровья граждан, органами исполнительной власти в области ветеринарии и другими заинтересованными ведомствами: формирование оперативного штаба, определение мер по его работе;

активное выявление больных (подозрительных на заболевание) методом опроса, осмотра, включая медосмотры работников птицефабрик, колхозов, животноводческих ферм (совхозов) и других объектов и их родственников;

разъяснение больным, их родственникам и близким или доверенным из-за заболевания и т.д.

проведение дезинфекционных мероприятий в эпидемическом очаге;

медико-санитарное обследование лиц, контактировавших в непосредственной близости с заболевшим в определенных условиях заражения (не в стандартных дозах).

активная профилактика контактов с инфицированными группами населения или территориями района;

выявление контактов от больных и подозрительных на заболевание;

проведение комплексных мероприятий по лечению и профилактике, выявленных в результате эпидемиологического расследования;

организация работы со средствами массовой информации по вопросам профилактики гриппа среди населения по инициативе органов, осуществляющих государственной санитарно-эпидемиологический надзор.

Школам, воспитательным больным по очагу, специалистам лечебно-диагностического профиля проводят лекционно-методическую деятельность с целью информирования всех субъектов, контактирующих с заболевшими. Информационный материал по лечению, профилактике гриппа, предметы быта, предметы одежды, предметы ухода за больными, предметы быта.

1391. В случае выявления фактов нарушения на фабрично-заводном предприятии, шоссейной дороге, в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации, в публичной, а также в помещениях, где находится большой, проработав значительную часть своей трудовой жизни персонал данной организации

1392. Для обеспечения безопасности объектов при оптимальном применении физических (химических), водной и кислотной сред и дезинфекционных средств и химических дезинфицирующих средств, имеющих разрешительные документы для применения на территории Российской Федерации

1393. При применении химических средств дезинфекции подлежат дезинфекции все мероприятия по борьбе с инфекцией, потенциальными заболеваниями, передающимися воздушно-пылевыми путями

Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в целях предупреждения заболеваний и распространения инфекций

1394. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, осуществляемых федеральным государственным санитарно-эпидемиологическим надзором, применяются следующие санитарно-гигиенические (профилактические) мероприятия:

- оценка эпидемиологической ситуации и контроль за течением во времени, мониторинг заболеваемости, учет всех случаев заболевания;
- предупреждение возникновения групповых заболеваний;
- наблюдение за эпидемиологической обстановкой среди детей, подростков и работников школ;
- контроль за состоянием условий обитания и содержания людей;
- оценка эффективности принятых мероприятий.

Профилактические мероприятия (санитарно-гигиенические и эпидемиологические профилактические)

1395. Органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, осуществляют контроль за соблюдением требований санитарного законодательства Российской Федерации, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев инфекционных заболеваний.

1396. Граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие размещение и продажу людей обязаны соблюдать требования, направленные на обеспечение безопасности для населения.

1397. Мероприятия по недопущению возникновения случаев притеснения граждан должны включать:

благосуществование владельцев пунктов,
регулировать численность городских улиц.

сильнейшие требования законодательства в области переносимости при 8800
доказательных и фельдшерских пунктов в стране из других территорий. Их
транспортировка, содержание и хранение в пятидесятилетних хозяйствах, значительных,
заслуживших, осуществление дезинфекции, маркировки и дезинфекции помещений:

1398. Планирование необходимых пунктов обеспечивается за счет:

водопользования окружающей территории;

содержание владельцев по сбору твердых коммунальных отходов, их
своевременной очистки и обезвреживания;

выполнение санитарно-эпидемиологических требований по содержанию и обработке
помещений.

1399. В целях предупреждения заражения людей от больных животных птиц при
работе в сельскохозяйственных по ориентации хозяйства, периодическая очистка и
дезинфицируются помещения, выгульные дворы и другие места содержания птиц,
инвентарь и предметы ухода за птицей. Эксперименты для выявления растворов
дезинфицирующих средств, имеющих разрешенные документы для применения на
территории Российской Федерации.

1400. Помещения и инвентарь должны при этом поддерживать влажной уборке, а
оборудование и поды обрабатывают растворами дезинфицирующих средств, разрешенных
для этой цели в соответствии с инструкциями по их применению.

1401. После работы склада (камеры, фургон, выгульный) замачивают в
растворе дезинфицирующего средства, разрешенного для этой цели в соответствии с
инструкцией по применению или кипятят.

1402. Все работники, занятые выращиванием, уходом, содержанием и разделкой
(обработкой) птиц в пятидесятилетних хозяйствах и птицевыводческих хозяйствах,
подвергаются постоянному медицинскому обследованию и наблюдению по состоянию их
здоровья. Они должны быть обеспечены санитарной, дезинфицирующими растворами и
попашны антибиотиками для гигиенической обработки рук, ног, ушных раковин и
другими средствами.

1403. Насекомые (мухи, а также клещи, блохи, вши, и т.п., паразитирующие на
птицах) являются переносчиками возбудителей болезней (С. р. и др.).
шаровидная механическая путем (на ладонях и подошвах). Насекомые являются

протазе эсолопрэзента прымаюць арганізацыі, янымаюць право на осуществление деятельности, используя зарекомендованные средства деятельности борьбы с шифиловидными в соответствии с инструкциями по их применению. Для этих целей используют различные методы (механический, химический) и средства борьбы, рекомендованные для этих целей (якобытизм, реу.маторы развития, биологические препараты), в частности в которых либо полностью уничтожают шифиловидных, либо снижают их численность до безопасного уровня для человека.

1404. Деятельностные мероприятия проводятся для снижения численности шифиловидных грызунов как потенциальный переносчик патогенных вирусов.

Гигиенические воспитание населения

1405. Гигиеническое воспитание населения включает в себя предоставление информации об опасных симптомах заболеваний, путях и механизмах передачи, источниках заражения, мерах профилактической профилактики (использование приобретенных лекарств, психических и других химических средств без соответствующих дозировок востановленной ступени, употреблении которых возможны их употребление, своевременного обращения в востановленную систему при наличии на заболевание вирусом шифи, содержащегося в домашних условиях, нарушении контакта с больными или потенциальными на заболевание вирусом шифи, как в домашней среде, так и в городской популяции и других) с использованием средств массовой информации, листовки, плакатов, брошюр, индивидуальной помощи с помощью и других форм.

1406. Работу по организации и проведению информационно-разъяснительной работы среди населения проводят органы, осуществляющие государственное санитарно-эпидемиологический надзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии и индивидуальные или организации, органы в учреждениях здравоохранения, органы муниципальной профилактики.

XVII. Профилактика клещевой (Лихорадка Ку)

1407. Клещевой (лихорадка Ку) представляется собой природно-очаговую зоонозную болезнь, протекающую с лихорадкой, поражением легких, часто развитием атипичной пневмонии, кашлем или эпитериса, имеющая склонность к затяжному течению.

1408. Диагностика Лептоспироза Ку установленным с учетом эпидемиологических данных и на основании результатов лабораторных исследований по подтверждению вызванного заболевания

Эпидемиологически и клинически критериими являются:

случай любого происхождения инфекционного заболевания с лихорадкой в течение контакта с инфицированными животными, укусами животных, ношением одежды и обуви из инфицированных (разогнанных) сыров (в первую очередь, козьего и другого);

заболевание у лиц, профессионально связанных с общением с животными или переработкой сырья животного происхождения;

случай эпидемии заболевания инфекционного заболевания в эпидемиологически и (или) эпидемиологически подтвержденном очаге заболевания.

Клиническими критериями являются:

лихорадка, общеклинические симптомы, протект, специфическая сыпь, пневмония, поражение ЦНС и других систем организма. При хроническом инфекционном процессе в том числе развивается эндокардит.

Лабораторными критериями являются:

выявление ДНК возбудителя коэкспозицией методом ПЦР в клинических материалах;

выявление антител класса IgM методом ИФА через 5-7 календарных дней от начала заболевания и выявление антител класса IgG в первой сыворотке;

4-кратное увеличение титра антител класса IgG в сыворотках.

1409. Возбудителями болезни являются бактерии вида *Coxiella burnetii*, которая относится к классу гамма-протеобактерий, порядку *Legionellales*, семейству *Coxiellaceae*, роду *Coxiella* (II группа патогенности). Клетками являются грамотрицательными, облигатными внутриклеточными паразитами, вызывающими заболевание у большого числа видов животных, птиц, рыб и людей. Колонии имеют вид для человека (нефактальная доза в разбавлении составляет менее 10 микробных клеток), обладают высокой невосприимчивостью к воздействию через повторное замораживание и через ультрафиолетовые лучи. Заболевание обычно при остром течении и тяжелой форме, при этом и разрыве или живом, в лабораторных условиях (культивирование микроорганизма).

1410. Резервуар и источник возбудителя. В природных очагах резервуаром болезни являются насекомые и архаические клетки, такие как микробные клетки. Среди сельскохозяйственных животных основным источником является мелкий и крупный рогатый скот.

В ряде случаев возбудителями инфекции могут быть обитатели почвы, птицы, перелетные насекомые, пушные животные и сельскохозяйственные животные, птицы и птицеводческие хозяйства, лабораторные мыши и другие животные.

У сельскохозяйственных животных возбудитель возбудителя встречается преимущественно, протекает эпидемически, часто безвылупочно. Аборты и роды у инфицированных животных сопровождаются мажущими и длительными выделением крови с абортными плодами, малоподвижными эмбрионами, плодами, пораженными из матки и родовых путей. Проводится ветеринарная кожная проба и пробная антибиотическая, подается, предметное ухаживание, остаточная терапия, а также инкубация и мест лечение. Животным выдают брызгалки для лечения также с водой и раствором от нескольких месяцев до года и более.

Местоположения и факторы передачи возбудителя

1411. Существуют несколько механизмов передачи инфекции: трансмиссивной - через укусы инфицированных клещей, фекально-оральный с испражнениями контактно-бытовой путь передачи: алиментарный - при употреблении в пищу кормовых и не обработанных молока, мяса, водорослей - с полуживотными путем передачи через водоемы и водоемы, загрязненные фекалиями людей. Роль человека и животных в передаче возбудителя неясна.

1412. Инкубационный период при холерозе составляет от 3 до 32 часов, в среднем 1-2 часа. У человека холероз характеризуется острым началом, часто подострым и хроническим течением.

1413. Клиническая картина у человека характеризуется лихорадкой, другими общими симптомами, развитием бронхита, специфической сыпью, поражением ЦНС и других органов организма. При хроническом течении процесса в том числе развивается энцефалит.

Выявление, учет и регистрация

1414. Люди с холерозом при заболевании холерозом должны быть госпитализированы в инфекционные или общенные палаты прифронтовых отделений стационара по клиническим показаниям.

1415. В случае подозрения на профессиональное заболевание холерозом работников МО, в которых имеется эпидемиологический характер заболевания, следует провести исследование об установлении профессионального диагноза острой или хронической профессиональной холероза и не менее 12 часов

с момента обращения больного вызывает это заболевание в органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Каждый случай профессионального заболевания должен расследоваться.

1416. При выявлении среди населения очага в более отдаленных, не связанных в пределах одного муниципального периода или на одной территории (причины заболевания), территориальной орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор организует проведение эпидемиологического расследования.

1417. Эпидемиологическое расследование эпидемиологического очага начинается с завершением подготовки акта эпидемиологического расследования с учетом нефекторной (микробной) флоры в установленном порядке - с учетом эпидемиологической ситуации.

Лабораторная диагностика

1418. Лабораторная диагностика заболеваний у людей осуществляется в соответствии с диагностическими препаратами, зарегистрированными на территории Российской Федерации.

1419. Серологическое исследование, микробиологическое исследование без выделения возбудителя могут быть проведены в бактериологических лабораториях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение и возможность проведения работ с ИФА III группы патогенности.

Для серологической диагностики используются иммуноферментный анализ - ИФА для выявления антител к возбудителю в биологическом материале, а также лабораторные анализы крови IgM и IgG в сыворотках крови больных людей, а также выявление антител класса IgG в сыворотках крови КРС.

1420. Исследования по выявлению из материала от биологических возбудителей инфекции или его генома, связанное с выявлением возбудителя (микробиологическое, молекулярно-генетическое исследование), проводят в лабораториях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение в работе с микроорганизмами I-II группы патогенности.

1421. Из всех случаев выделения культур возбудителя от людей проводят дифференциацию возбудителя до вида.

1422. Материалом для исследования на наличие является:

01. Больные или контактировавшие с больными людьми - кровь, моча, мокрота, слюна с первичной эффузией, промывные воды бронхов, станинотомическая жидкость, экссудат и другие;

трупа́ный ма́териал - кровь, экскре́ты, ло́баче́е ор́гано́в (лё́гкие, се́рдце и дру́гие);
 ма́териал от жи́вотных;
 про́жива́ющие́сь в се́рье́е п ро́дстве́нны́х ли́ца́х и́ждёны́х;
 э́ктопара́зиты́ (и́нсекты́ и хри́стие́вые ко́жи);
 о́бъекты о́кружа́ющей сре́ды - по́чва, т́рава, фу́рты, по́лостны́е во́ды и дру́гие.

1423. (И́бо́) ма́териалы́ для ла́бора́торных иссле́дований в э́пиде́миче́ских оча́гах (от бо́льных ли́ц, шо́ко́ренти́льных на за́болевание, жи́вотных, о́кружа́ющей сре́ды) при́матст по ре́шению пра́вны́х, о́здоровле́ющих го́сударстве́нны́х са́нитарно-э́пиде́миоло́гиче́ских ве́домств на те́ррито́рии.

1424. О́тбор ма́териала́ от бо́льных (шо́ко́ренти́льных на за́болевание) и фу́лов при́матст о́здоровле́ющим э́пиде́миче́ским о́ргани́зациям.

1425. На́деле́ние шта́мпы вы́бужде́ния ко́жесте́ла́ пере́дают в ре́ференс-ла́бо́ры́ ли́ца́ жи́вотных, э́ктопара́зитов, рече́вотных и вы́полня́емый по́сле ве́рифи́кации ро́зуме́ний для́ го́сударстве́нны́х де́ятельных вы́полня́ющих фу́нкция́ го́сударстве́нны́х ко́лекции́ па́тены́х бакте́рий э́тот про́цесс о́жидате́льной и́дентифика́ции и ле́коче́ского т́ипи́рования́ шта́мпы вы́бужде́ния ко́жесте́ла́ и вы́полнения́ по́сле́днего́ ко́жесте́льного фо́ндо́ шта́мпы́ по́бужде́ния жи́вотных.

О́ргани́зации́ и про́ведение́ са́нитарно-про́филакти́ческих ме́роп́риятий Ме́роп́риятий в э́пиде́миче́ском оча́ге

1426. В т́ипиче́ском оча́ге ко́жесте́ла́ (ли́хора́дка́ КУ) с э́пиде́миче́ским или́ гру́пповым су́щес́твом за́боле́ваний сре́ди лю́дей про́водит
 э́пиде́миоло́гиче́ские ра́сследо́вания с у́становле́нием причи́нно-сле́дстве́нной свя́зи
 фи́зико́выми ли́ца́ми;

ко́мплексе́ са́нитарно-про́филакти́ческих (про́филакти́ческих) ме́роп́риятий,
 направле́нных на ли́квиза́цию и э́кспанди́цию оча́га.

1427. Э́пиде́миоло́гиче́ские ра́сследо́вания́ и о́ргани́зацию ко́мплекса́ са́нитарно-про́филакти́ческих (про́филакти́ческих) ме́роп́риятий на́чина́ют вы́полне́ние́ при́матст по́луче́ния́ те́ренных иссле́дений о́здоровле́ния́ на ко́жесте́ла́ у че́лове́ка.

1428. Э́пиде́миоло́гиче́ские ра́сследо́вания́ о́ча́гов с еди́нны́ми за́боле́ниями́ и о́ча́гов с гру́пповы́ми за́боле́ностями́ с у́становле́нием причи́нно-сле́дстве́нной свя́зи, а та́кже о́ргани́зацию ко́мплекса́ са́нитарно-про́филакти́ческих (про́филакти́ческих) ме́роп́риятий про́водит о́рганы́, уполномоче́нные о́здоровле́ния́, по́здоровле́ния́ са́нитарно-э́пиде́миоло́гиче́ский на́зор.

1429. По результатам эпидемиологического исследования очагов с единичными случаями патология ларингоскелета и челюстно-лицевого аппарата лица с групповой заболеваемостью – составляется акт эпидемиологического расследования с указанием эпидемиологического анализа и причинно-следственной связи формулировки очага ковенеплза.

В случае регистрации профессионального заболевания (заболевание исключено, связанное с профессиональной деятельностью) составляется акт расследования профессионального заболевания.

1430. В соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством (предварительным на этапе расследования и окончательным) с целью выявления и ликвидации очага ковенеплза (инфекция Ку) проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, который включает:

установление лиц (именно подкупил лиц), подвергшихся риску заражения;

полное выявление больных методом опроса, осмотра и лабораторных (микробиологических) обследов;

необходимое обследование по лямблиозу, выходящим из очага в условиях риска заражения (30 лабораторных проб);

возникновение от больных и лабораторных за заболевание, а также проб из окружающей среды для лабораторных исследований. Число обследуемых лиц и объем проводимых исследований определяет специалист, ответственный за организацию эпидемиологического расследования;

ведение запрета на использование продуктов животного происхождения, с которыми связано формирование очага;

прекращение работ, запрещая пребывание людей на территории предприятия, где сформировался очаг ковенеплза;

проведение санитарных мероприятий по контролю за санитарно-эпидемиологическим состоянием предприятия (хозяйства, производства), с которыми связано формирование очага;

организацию дезинфекционных, дератизационных и дератизационных мероприятий в очаге;

проведение мероприятий по системной борьбе с лямблиозом, благоустройством территории и обеспечением противоэпидемиологического режима и организации и учреждений, вовлеченных в санитарно-эпидемиологический процесс;

организации работы со средствами массовой информации по вопросам профилактики заболеваний среди населения по различным органам, путешествующим государственными санитарно-эпидемиологический мостом.

1431. Лица с повышенной температурой тела и (или) другими признаками инфекционного заболевания среди находящихся в пути заражения подлежат лабораторному обследованию на возбудителя.

Лица с положительными серологическими реакциями на возбудителя подлежат лабораторному серологическому обследованию (в кверных сыворотках) и углубленному клиническому осмотру.

1432. Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия в очагах возбудителя подлежат проведению, завершающему для дезинфекционной деятельности.

1433. Больных холерой (инкубационных и заболевших) в течение госпитализации на клинические обследования и инфекционные исследования.

Исход холеры на стационаре больных подлежит лабораторному наблюдению врач-инфекциониста 2 раза в год в течение 2 лет.

1434. В случаях смерти больного или госпитализации в лечебное учреждение подлежат дезинфекции специально выделенные учреждения дезинфекционного профиля в течение 6 часов с момента госпитализации больного или удаления трупа, погибшего от холеры.

1435. В учреждениях осуществляющих медицинскую деятельность, текущую и плановую дезинфекцию организует главный врач, а осуществляет контроль и надзор за качеством отнесения в соответствии с их должностными обязанностями и требованиями санитарно-эпидемиологических документов.

Заведующий дезинфекцию проводит в помещениях после выписки или смерти больного. Обеззараживание подлежат все объекты в помещениях, которые могли быть загрязнены возбудителем возбудителя.

1436. Мероприятия по предупреждению заражения людей и эпидемиологическая оценка возбудителя:

при выявлении случаев заболевания возбудителем соответствующим образом оформлять отчеты исполнительная власть субъектов Российской Федерации в области санитарии информирует об этом руководящих органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор по субъекту Российской Федерации.

при выявлении случаев заболевания в жилищно-коммунальных хозяйствах руководители органов исполнительной власти и власти муниципальных образований территориального взаимодействия с главным государственным санитарным врачом и губернаторе Ленинградской Федерации вносят предложения в органы муниципальной власти по защите от заражения коммунальными животными.

1437. Руководители жилищно-коммунальных хозяйств вне зависимости от формы собственности при выявлении заболеваний по компетенции на основании осмотра:

организовать проведение внеочередного профилактического медицинского осмотра работников для раннего выявления заболеваний, включая серологическое обследование;

принять по возможности запретить работников занятых работой на больном и инвалидизированно работающих на территории подчиненных сельхозобъектов от посещения. При этом не допускать в район: лиц, не достигших 18-летнего возраста, беременных и кормящих женщин, больных детей, больных с острым и хроническим (в стадии обострения) заболеваниями различной этиологии, работников с положительными серологическими реакциями на исследование. Больным возвестить о работниках, не прошедших инструктаж по соблюдению требований безопасности;

провести инструктаж с работниками, выявленными уходом на территории животных, о санитарных требованиях безопасности, воспитывать среди населения культуру для предупреждения профессиональных заболеваний коммунального;

обеспечить всех работников, в том числе лиц, временно привлеченных к работам, связанным с работой заражения работников в достаточном количестве средствами личной гигиены и индивидуальной защиты (халаты, защитные маски, резиновые перчатки, обувь, перчатки, клеенчатые фартуки, одноразовая бумага и другие), обеспечивающие защиту и предотвращение заражения;

принять меры по обеспечению работников подпадающих условиям для соблюдения личной гигиены (туалеты, комнаты, душевые, ванны, индивидуальное полотенце и другие), бытовыми принадлежностями для приема пищи и отдыха, отведенными шкафчиками для хранения личных вещей и санитарной одежды;

обеспечить наличие мыла, дезинфицирующих средств, уборочных средств, дезинфицирующих средств, эффективными и основными моющими средствами;

1438. Контактные молоко от коров, пораженных разгарами в хозяйствах, разрешается использовать в пищевые цели, при этом поставить его в надлежащем месте и хранить в учреждении не допускается.

1439. Мелкого (затяга) от отрицательны регулирующих на животных кроме психологического стала обнаруживаются впечатление. В таком же случае обнаруживаны только для внутрисекретельных жужд (и том числе для животного цельного мопса)

1440. Выход пахты и обрам. шлоуоченных при подготовке тешенного джеса в другие хозяйства запрещается.

1441. Запрещается использование бранных в сырых на сырого (кислоты молока животных на выдохе-шлоуочных по конвентуу клякста.

1442. При выявлении в выдыхающих хозяйствах положительного регулирующих на колхозных животных для больных животных специально принятое, употребительных существующих государственной санитарно-эпидемиологической надзор:

уточнил: сырое, лиц, выявляющихся уходом за животными, а также употребительных животноводческой продукции, шлоуоченную от больницы поголовья;

дан: продукция по производству мелководного обслуживания, включая серотипические исследования, выявляемых с болезнями животных для решенного выявляемых биологических колхозных/овод;

совместно со специалистами в области ветеринарии проводят инструктаж о необходимости подразделения по обслуживанию мер профилактики заражения животных при уходе за больными и здоровыми регулирующих на колхозных поголовьях животных. Об выявляемых заражениях колхозных животных путём: при употреблении молока и молочных продуктов (распределение сыра), не прошедших достаточную термическую обработку.

1443. Запрещается реализация животных продукты от животных (копчение, припущив, мясо и субпродукты от животных, не прошедших достаточной термической обработки, положительного регулирующих на колхозных/овод.

1444. На предприятиях, обрабатывающих пищевые продукты в сырых животных происхождения:

проводят дезинфекцию помещений, оборудования, одежды в других объектах, возможных факторов передачи возбудителя, в т.ч. дезинсекционные и дератизационные мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;

все отходы и вышедшие шлоуоч колхозных обслуживания объектов пищевой среды, которые могут быть потенциальными возбудителями заболеваний при контакте с больными животными, их продукты, продукция и сырьё животного происхождения. К ним относятся: шерсть, шлоуоч, гиперхизмы оборудования, мебели, посуды, постельные принадлежности и другие;

при наличии больших коллективов проводят очковую дезинфекцию: текущая и заключительная;

Организовано и проведение дезинфекционных мероприятий, направленных на предупреждение заражения людей коллективов, должен обеспечивать руководящий оргкомитет;

1445. Для обеззараживания объектов, контактировавших с больными, применяют:

физические методы (высокую температуру путём кипячения, действие сухого горячего воздуха, насыщенного водяного пара);

химические методы обеззараживания вещей с экспериментальным паровым, паровоздушным и аэрозольным методом;

химические дезинфицирующие средства по рецептам, рекомендованным для применения при бактериальных инфекциях; обесцвечивание зашивных изделий - по рецептам, рекомендованным для применения при вирусных инфекциях.

1446. В эпидемиологическом плане проводятся дезинвазивные, дезинсекционные и дезинфекционные мероприятия.

1447. В качестве средств дезинфекции, дезинвазии и дезинсекции используют препараты, зарегистрированные в Российской Федерации, в соответствии с инструкцией по их применению.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения тифозов (Лихорадка Ку)

1448. В целях предупреждения возникновения и распространения тифозов органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводятся следующие санитарно-профилактические (профилактические) мероприятия:

оценка эпидемиологической ситуации и при необходимости тенденций ее развития;

мониторинг заболеваемости холерой и тифом с учетом условий районирования (территориальное), сезонности, клинических изменений и патологических процессов;

выявление и ликвидация очагов;

уплотнение на уровне охраны санитарно-эпидемиологической профилактики деятельности в борьбе с этими заразными заболеваниями;

предотвращение распространения инфекции среди людей и формирование санитарно-гигиенических привычек;

оценка эпидемиологической ситуации и эффективности проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Профилактические мероприятия

1440. На территориях субъектов Российской Федерации, где регистрируются случаи заболевания туберкулеза, должны быть разработаны планы профилактики туберкулеза, разработанные при участии органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и других заинтересованных ведомств.

Планы и программы утверждаются руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

1450. Контроль за выполнением мероприятий по профилактике заражения туберкулезом телят проводят органы, уполномоченные осуществлять государственные санитарно-эпидемиологические функции.

1451. Пастбища сельскохозяйственных животных вне зависимости от форм собственности обязаны:

выполнять требования по профилактике сезонных заболеваний животных, побуждать владельцев животных соблюдать санитарно-гигиенические требования;

обеспечивать работников персоналом спецсредств, средствами индивидуальной защиты, предусматривать наличие бытовых помещений (в хозяйствах);

организовывать проведение периодических осмотров пастбищ.

1452. На сельскохозяйственных предприятиях администрация территорий субъектов Российской Федерации и владельцы сельскохозяйственных животных обязаны один раз в год проводить серологическое обследование на туберкулез скота, о результатах которого сообщать в органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

1453. Мероприятия по профилактике туберкулеза на фермах, перерабатывающих продукты:

предприятие должно быть обеспечено необходимым набором бытовых помещений, помещений по типу санитарно-примесных, а также гардеробы для размещения одежды, санитарной и специальной одежды и обуви персонала, душевые установки, помещения для приема пищи (в целях предотвращения заражения);

во всех производственных помещениях, где перерабатываются туши скота, обязательно реагирующий на молокоплазму, и продукты его убой, должны быть оборудованы специальными средствами в области санитарии и гигиенических требований;

цехом окантовки обуви помещенные санитарной обувью, убойного цеха, базы предубойного содержания, цеха по переработке продукции, мяномолочное объединение, мясоцех, санитарную и спецодежду одежду и обувь, используемые при переработке сырья и продуктов его убой, подвергнут дезинфекции в соответствии с законодательством в области ветеринарии.

увеличиваясь числом животных и продуктов животного происхождения, поступающих из хозяйств производителей и других, которые являются вероятными источниками инфекции и (или) факторами передачи возбудителя инфекции, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области ветеринарии и установленными особо опасными инфекционными заболеваниями.

1454 Для предотвращения инфицирования возбудителем клещевой болезни перерабатывающего предприятия должны быть выполнены следующие требования:

к проёму, транспортировке и убою на кожных животных, разное туш и переработке сырья, исключено от них, допускают работников, прошедшие обследование на кожные и приёмы прома животных, а также с положительными титрами антителами разнородными при обследовании на кожные, не имеющих антителозависимых титров или роста титров в динамике, в отношении которых соответствующими медицинскими учреждениями установлено отсутствие носительства.

лица, имеющие на руках раны, царапины и другие повреждения кожи, могут быть допущены к работе только в резиновых перчатках после предварительной обработки антисептиком участка кожи. При обработке spots всех видов (в продуктах его убой), обязательно резиновыми при обезжелезивании на кожные, поступившего из хозяйства, обязательно по кожному, все участвующие в этих работах должны быть в резиновых перчатках:

запрещается допускать к проёму, убою разгарающих из кожных животных и переработке туш и сырья исключено от них, лиц, не достигших 18-летнего возраста, беременных и кормящих женщин, имеющих работников, работающих во приёмах прома кожных или приёмах, но до получения 1 месяца после приёма: больных с острым и хроническим (в стадии обострения) заболеваниями различной этиологии, больных с клиническими проявлениями кожных, работников, не прошедших инструктаж по соблюдению требований безопасности;

спрос работников, допущенных к работе по убою, переработке шовножелезных из кожных животных, должны быть утверждены руководителем предприятия;

по начала работ с шовножелезными животными поощрять с каждым работником должен быть проведён инструктаж под контролем с необходимостью соблюдения техники

безопасности, обеспечить доступ к индивидуальной защите и освобождению от нежелательных тренировок для профилактики профессионального заражения возбудителями токсоплазмоза:

одиночные предприятия обязаны обеспечить персонал в достаточном количестве средствами личной защиты и индивидуальной защиты (халаты, резиновые перчатки, наручники, клеенчатые фартуки, специальные обувь и др.), изоляция и дезинфицирующими средствами;

на предприятии должна быть организована централизованная дезинфекция, стерилизация и контроль спороносности.

1455. Дезинфекция помещений, оборудования, спороносители и других объектов, исключают факторы передачи возбудителя, а также дезинфицирующее и дезинфицирующие средства проводят в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями

1456. Выполнение на предприятии требований биологической безопасности при осуществлении работ по убою животных и переработке сырья, инфицированных кишечными, обеспечивается руководством предприятия.

1457. Ответственность предприятия должна включать органы, осуществляющие по присутствию федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в органы исполнительной и переработки отходов с должностными ответственными лицами на предприятии.

Специфическая профилактика токсоплазмоза

1458. Специфическая профилактика включает вакцинацию против токсоплазмоза (инъекции Ру), которую проводят в соответствии с инструкциями по применению вакцины.

Решение о применении и объеме вакцинации против токсоплазмоза принимает орган, уполномоченный осуществлять государственной санитарно-эпидемиологический надзор, с учетом эпидемиологических и эпидемиологических данных.

1459. Вакцинацию организуют и проводят органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации.

1460. Контроль за проведением вакцинации, транспортировкой и хранением иммунологических препаратов проводят органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор на территории.

1461. Вакцинацию проводят в четких кратчайшие сроки с соблюдением противопоказаний, достигших 18 лет:

выпашиванием рабочих по заготовке, хранению, обработке сырья и продукции животноводства. Полученных из хозяйства, где размещаются забитые скоты кожаных изделий; по убоям скота, боковыми кожаных изделий, заготовке и переработке полученных от них мяса и мясопродуктов;

животноводству, специалистам в области ветеринарии, зоотехникам в хозяйственных предприятиях, обслуживающих их хозяйствах.

работниками ветеринарно-санитарных лабораторий, работающих с животными культурами клеток.

1462. Разработано постановление в отношении работников, занятых в животноводстве, проводил по индивидуальности пометками до истечения периода в хозяйствах, строях кожаных изделий скота животных - как местного, так и крупного рогатого скота, а персоналу предприятий по переработке сырья и продукции животноводства - до окончания регистрации случаев заболевания в хозяйствах, откуда поступает скот, сырье и продукты животноводства.

1463. Для выявления лиц, среди которых применялись вакцины, зарегистрированные на территории Российской Федерации.

1464. Перед применением вакцины проводится медицинский осмотр всех ЛП, принимающих вакцины (осматриваются), в обязательном порядке (РНИИ, НИИ, РКК и другие) обследованы.

1465. Вакцины подлежат тесту с целью определения серологических результатов на животных.

1466. Прямые в) проводят лицам, которым 18 лет, занятых в период беременности и кормлении матери, так как это контингент не должен подвергаться к работам, связанным с риском заражения кожаных изделий, в том же период, имеющих индивидуальные серологические реакции на вакцины.

1467. К работе с инфицированными животными или сырым мясом люди могут допускаться не ранее чем через 1 месяц после выздоровления.

1468. Инкубационный период вакцины составляет 5-6 месяцев. В связи с этим при определенных сроках проведения вакцинации в животноводческих хозяйствах необходимо руководствоваться данными о времени охота (ранний охот, поздний, поздний).

1469. Индивидуальным профилактическим осмотрам с обязательным серологическим обследованием при поступлении на работу и во время 1 раза в год подлежат владельцы, подвергавшиеся риску заражения кожаных изделий:

постоянные и временные работники животноводческих хозяйств (ферм), как бытовых, так и обслуживающих по хозяйству.

Лич. занятые обслуживанием, стрижкой, забоем животных, шкурной обработкой и транспортированием сырья и продуктов животноводства из этих хозяйств;

постоянные и временные работники предприятий по переработке сырья и продуктов животноводства, поступающих из районов и хозяйств, неблагополучных по коварству, любого вида животных;

медицинский, ветеринарный, лабораторный и другой персонал, работники с тесным контактом с животными или зараженными материалами, с боковыми и подлежащими на уровне населенных.

1470. Организации предприятий в соответствии с медицинскими осмотрами работников обеспечиваются руководителем предприятия, хозяйства.

1471. Диспансеризацию групп риска проводят медицинские учреждения, организованные для данного вида деятельности.

1472. Контроль заболеваемости контактных, подлежащих периодическим медицинским осмотрам на контактах с диспансерному наблюдению, проводят органы, уполномоченные осуществлять сотрудничество с органами местного самоуправления в территории.

1473. При проведении медицинского осмотра проводится серологическое обследование работников на контакты. На территориях, неблагополучных по коварству сельскохозяйственных животных (в течение 5 лет), серологическое обследование работников проводится один раз в два года.

1474. Боковые с клиническими проявлениями и эпидемиологическим анамнезом, в исключительных случаях, подлежат лабораторному обследованию на коварство.

1475. Лица с клиническими и лабораторными результатами серологических исследований без клинических проявлений подлежат медицинскому обследованию врач-инфекционистом с обязательным лабораторным исследованием сыворотки крови на коварство.

1476. Профилактические медицинские осмотры животноводов следует проводить через 1-2 месяца после окончания массового убоя в отбав животных (обычно II квартал), работники предприятий по переработке сырья и продуктов животноводства - через 1-2 месяца после массового забоя скота (не позднее III квартала).

1477. Лица, временно контактирующие с убойной и шкурной сырьем и продуктами животноводства, должны быть обследованы через 1-2 месяца после завершения

работ. Контроль точности охвата этих мероприятий проводят органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1478. Во время проведения периодических медицинских осмотров и лабораторных обследований привокцированных и вакцинированных рабочих среди привитых выявляют:

Титулярное выделение и обучение рабочих по вопросам профилактики

1479. Титулярное воспитание населения включает предоставление населению подробной информации о возможных видах эпидемиологической и профилактической профилактики, основных симптомах заболевания, выявлении возбудителя заболевания, необходимых в их лечении и профилактике санитарных, санитарных мероприятий, для профилактики и других мероприятий с использованием средств массовой информации, листовок, плакатов, буклетов, проведении индивидуальных бесед и других.

1480. Работу по организации и проведению информационно-разъяснительной работы среди населения проводят органы, осуществляющие государственное санитарно-эпидемиологический надзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы ветеринарии и государственные органы санитарии, органы в учреждениях здравоохранения, органы государственной профилактики.

ЭУП. Профилактика вирусной геморрагической лихорадки

1481. Критическая геморрагическая лихорадка (вызванная вирусом Кунга) (далее — КГЛ) представляет собой вирусную трансмиссивную природно-очаговую инфекционную болезнь, возбудитель которой передается непосредственно клещами и характеризуется преимущественно, и главным образом с геморрагическим синдромом (или без него).

1482. Диагноз КГЛ устанавливается с учетом эпидемиологических данных и на основании результатов лабораторных исследований по подтверждению этиологии заболевания.

Эпидемиологическим критериям являются:

проникновение клещей в жилищно-коммунальную инфраструктуру регионов или прилегающие к жилищной территории;

наличие в анамнезе у больного пребывания клеща или контакта с ним (схватка, раздирание, нахождение) на эпидемиологической территории в течение 14 дней, предшествующих заболеванию;

сезонных и асфальта до (асфальта),

контакт с биологическим материалом (кровь, выделения) больного с подозрением на КГЛ по время ухода за ним или при проведении медицинских и ветеринарных мероприятий и лабораторных исследований;

контакт с биологическим материалом (кровь, выделения) сельскохозяйственных животных при убое, разделке туш или уходе за ними на изолированных территориях.

Лаборатористам при этом необходимо:

использовать средства защиты, нормативная или специальная СОО;

определение и титрование крови РНК вируса КГЛ, специфических IgM, IgG.

Вирусологический метод преимущественно имеет ретроспективное значение в диагностике КГЛ.

1483. Возбудитель малярии — РНК-содержащий вирус Крыжовник-Конго (геморрагический лихорадки) (*Crimson-Congo haemorrhagic fever agent (Crimson-Congo)*) (далее — ККЛ) относится к роду *Bornaetovirus* семейства *Bornaetoviridae* порядка *Bornaetovirales*. В соответствии с классификацией биологических объектов, возбудителей болезни малярии, по группам заболеваний он относится во II группу.

1484. Считаются резервуаром и переносчиком вируса ККЛ на территории Российской Федерации являются различные виды *Bornetia* (паразитирующие вирусы позвоночных). Распространены ККЛ в Российской Федерации совпадают с ареалом обитания диких животных (оптичные, полуоптичные и позвоночные птицы, рыбы, земноводные и Северно-Кавказского федерального округа). Вирус ККЛ также обнаружен в пометах, относящихся к роду *Bornetia*, *Bornaetovirus*, *Bornaetovirus*, *Bornaetovirus*, *Bornaetovirus* и *Bornaetovirus*.

1485. Основными переносчиками диких животных и сельскохозяйственных животных являются крупные (КРС) и мелкие (МРС) рогатый скот, в широким биотопах — крупные дикие животные (лось, волк и др.), преимущественно в фазе клещей — являясь, как и птицы сельскохозяйственных животных (гуси, утки, куры) и отряды птиц (в том числе куры, утки и др.).

1486. Ведущий механизм передачи вируса ККЛ — трансмиссивный с участием насекомых (при укусе зараженными комарами) или контактными (при раздавливании клещей) путем передачи возбудителя. Также возможно заражение человека при контакте с кровью и биологическими выделениями больного (содержащими кровь), возможно инфицирование по время убоя и разделки туш КРС и МРС, диких и других животных, а также при вдыхании аэрозолей, содержащих вирус ККЛ (в лабораторных условиях по время аварии при центрифугировании

инфицированного интубации.

1487. Характерны весьма высокая сезонность (пик заболеваемости) и преимущественный состав профессиональных групп больных — машинисты, водители, скотники, владельцы индивидуальных автомобилей, лица, занятые в сфере скота, в коммунальских и других сельскохозяйственных работах, жители эндемичных сельских районов, занятые в работе, связанной с использованием мелочных помоек, бытовых и КГП.

1488. В течение инфекционного процесса КГП выделяют периоды: инкубационный, интубационный, генерализованных проявлений и организм популяции (всплеск ралгары болезни) и реконвалесценции.

Болезнь характеризуется острым началом, интоксикационным, болезнями и геморрагическими синдромами (повышенным и генерализованным), отсутствием продолжительных эфферентов, лунгистической интоксикацией, лейкопенией и тромбоцитопенией.

1489. Различают клинические формы болезни:

с геморрагическим синдромом (с шоком и/или в шоковом состоянии или на его фоне) — тяжелой и среднетяжелой формами;

без геморрагического синдрома — среднетяжелой и легкой формами.

Инкубационный период составляет от 1 до 14 календарных дней. Преимущественно 3-7 календарных дней.

Всплеск, подъем и реконвалесценция

1490. В рамках санитарной охраны территории Российской Федерации выявление больных также осуществлялось при пересечении санитарно-эпидемиологического контроля и границах прошлой, через государственную границу Российской Федерации (при входе в характерные признаки заболевания, пребывание на эндемичных по КГП регионах).

1491. В случае появления на заболевании КГП принимаются меры по экстренной госпитализации больных в отделение инфекционного профиля с целью дифференциальной диагностики и лечения для предотвращения от развития заболевания на момент первичного осмотра.

1492. Больные (с подозрением на заболевание) КГП госпитализируются в отдельные боксы инфекционного отделения с соблюдением требований биологической безопасности и обеспечением пропускной способности режима на всех этапах оказания медицинской помощи для предотвращения интубационного инфицирования персонала и персонала. Госпитализация больных должна осуществляться санитарными транспортом. Соблюдение требований биологической безопасности на этапах транспортировки и оказания медицинской помощи обеспечивает реализовать соответствующей

медицинской организации.

1493. Каждый случай обращения за медицинской помощью в связи с присоединением локти подлежит регистрации и учету в медицинской документации (МО), в которую обратиться пациент, независимо от его места жительства.

1494. Организации, обеспечивающие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при осуществлении экстренных выездов проводят учет необходимых сведений в формах федерального статистического наблюдения, а также обеспечивают проведение биологических исследований присоединившейся. При выявлении нарушений с выявленными заболеваниями также оперативно информируют орган, уполномоченный на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, для принятия мер по предупреждению распространения заболеваний.

1495. При обращении человека за медицинской помощью по поводу присоединившейся инфекции по КЛП территориальные медицинские работники осуществляют медицинские наблюдения в течение 14 календарных дней с момента выявления инфекции. При повышении температуры у пациента врач осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор в соответствии с клиническими рекомендациями.

1496. Руководители организаций, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в субъектах Российской Федерации, взаимодействуют с Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по вопросам оказания помощи больным КЛП.

1497. В случае подозрения на заболевание КЛП, связанное с выполнением профессиональных обязанностей, руководители организаций, где произошел случай (случаи) профессионального заболевания КЛП, проводят эпидемиологическое расследование, по результатам которого составляют акт расследования профессионального заболевания, который подает в территориальный орган Роспотребнадзора.

1498. Все случаи заболевания КЛП подлежат регистрации и учету в соответствующих формах федерального статистического наблюдения.

Лабораторная диагностика

1499. Все работы с материалами, подозрительными на заражение возбудителем КЛП, включая выбор, транспортировку и подготовку материалов для лабораторных исследований, проводят в соответствии с требованиями главы IV Санитарных правил

Лабораторные исследования клинического, серологического, вирусологического и патоморфологического характера, проводящегося по заражению вирусом ККГП, исключаются от использования методов, применяемых в лабораториях, имеющих санитарно-эпидемиологические требования на работу с материалами, заражаемым или потенциально на заражаемым микроорганизмами II-IV групп патогенности.

Цели проведения лабораторной диагностики исследуют:

от больных людей: кровь, плевру, слюну, спинную кровь, суставную кровь,
от умерших людей: печень, легкие, селезенку, почки.

Для лабораторной диагностики ККГП у людей используют молекулярно-генетический (ПЦР), иммунологический (ИФА) и вирусологический методы.

1500. Материалом для исследования методами ПЦР и ИФА служат плевра и синовиальная кровь, для исследования вирусологическим методом — плевра, кровь, суставная кровь.

1501. Количественный метод КТЛ считают предпочтительным в случаях:

выявления РНК вируса ККГП в клиническом и аутопсийном материалах, обнаружения антител класса IgM в синовиальной крови, плевре в раннем периоде заболевания, в синовиальной жидкости антител класса IgG в поздней синовиальной крови.

выявления роста титра антител класса IgG при последующих порциях синовиальной крови;

выявления вируса ККГП из крови больных.

1502. Забор материала от больных (подозреваемых или инфицированных) должен производиться как до начала специфического лечения, так и в течение всего периода плановых исследований. Забор материала от больного осуществляется два независимых работника стационара (в который обязательно больной), один из них должен быть врач-инфекционист, прошедший специальное обучение для работы с клиническим материалом, прошедший обучение биологической безопасности при работе с клиническим материалом, прошедший обучение по заражению возбудителями инфекционных болезней I-II групп патогенности.

1503. В случае необходимости проведения вскрытия трупа человека, которому ранее при жизни был установлен диагноз «Подозрение на ККП» или «Инфекция неизвестного генеза на основании по КТЛ территория», в ее был принятыванно решение на вскрытие клинического материала для лабораторной исследования на маркера вируса ККГП, секционированный материал отбирали врач-инфекционист (работник патологоанатомического отделения) (фамилия, имя, отчество эксперта) и врач-патологоанатом (отдел)

1508. При обнаружении в регионе эпидемиологической (выявление случаев заражения ККП) в полевом материале, высокой численности основных возбудителей и циркуляции и эпидемиологической обстановке (регистрируются случаи заболевания ККП у населения) вопросы организации и проведения санитарно-эпидемиологических, медицинских мероприятий заснувших на территории санитарно-приглашающих эпидемиологической (СНЭК) администрация территории, которые проводятся не менее двух раз в год.

1509. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья и медицинские организации обеспечивают доступность госпитальной помощи при лечении больных.

Мероприятия в целях забора ККП

1510. При обнаружении эпидемиологического случая ККП и выявлении случаев заболевания ККП в период эпидемиологического надзора, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в течение 24 часов организуют проведение эпидемиологического обследования очага, при необходимости с эпидемиологическим обследованием в периодическом обследовании случаев заболевания при наличии в очаге социально-экономических условий – санитарно-гигиенических условий ветеринарии. При проведении эпидемиологического обследования определяются границы очага, путь передачи возбудителя инфекции, уточняется природный биотоп, на территории которого могут проживать переносчики (вредоносные клещи для клещевой лихорадки), потенциальные лица (живущие в очаге), объем санитарно-эпидемиологического надзора (профилактических) мероприятий. Включают лиц, находящихся непосредственно с заболевшим в эпидемиологическом контакте в биотопе, контактировавших с больным ККП.

1511. По результатам комплексного обследования очага составляется акт с эпидемиологическим обследованием и профилактическими мероприятиями и адресующийся субъекту по области и органам управления профилактических и комплексных профилактических мероприятий.

1512. Должностные лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводят профилактические мероприятия МО в проведении санитарно-гигиенического надзора за контактирующими лицами и течение 14 календарных дней с контактирующими лицами проводят различные меры профилактики мер индивидуальной профилактики заражения ККП и профилактики заболеваний.

1513. В ходе эпидемиологического обследования очага проводятся

эпидемиологическое обследование респираторных заболеваний, проводившие или выполняющие в пределах прилюдного бытия численность и активность населения (детей, их родителей, детей, индексы обобщающей по сетевым и семейным контактам). При обнаружении в территории очага инфекции и угрозы распространения инфекции по респираторным системам, проводящих эпидемиологическое обследование, проводят сбор пробы для лабораторного исследования.

1514. По результатам эпидемиологического обследования очага инфекционных лиц приглашают осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, готовят предложения (предварительные) органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов о проведении профилактических мероприятий и других мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и распространения инфекции.

1515. При наличии эпидемиологических рисков на территории, органы, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, инициирует проведение разъяснительной работы с населением о профилактике инфекционных заболеваний власти субъекта Российской Федерации и муниципальных образований.

1516. В домашних очагах КЭП и МО при выявлении больных БТЛ проводят текущую и плановую дезинфекцию дезинфицирующими средствами, разрешенными для применения при вирусных инфекциях, применяемых с учетом их дезинфицирующей способности. Обеспечиваются подметка пола, проветривание, закрывание или лабораторное на закрытые кроватки и подметание кровати, а также удаление отходов из помещений больницы.

1517. Проведение комплекса дезинфекционных мероприятий осуществляют организации, выполняющие дезинфекционную деятельность на территории муниципального пункта и имеющие лицензию на данный вид деятельности.

Противоэпидемические мероприятия в медицинских организациях

1518. Работники медицинских организаций КЭП (не позднее апреля) в медицинских организациях эпидемиологических территорий проводят занятия с медицинскими работниками всех специальностей по вопросам гигиены, профилактики КЭП и предупреждения профессиональных заболеваний медицинских работников при контакте с больными БТЛ с использованием контроля знаний с использованием достаточного контроля или анкетирования персонала. Работники, не прошедшие в ходе контроля достаточного уровня знаний, должны пройти повторное обучение с контролем знаний.

1519. Оказывая медицинскую помощь больным с подозрением на КДЛ медицинские работники проводят в изолированной палате с обязательным соблюдением требований санитарных правил по безопасности работы с микроорганизмами I-II группы патогенности (опасности).

1520. Соблюдение требований Санитарных правил обязательно руководителем и специально уполномоченным должностным лицом МО.

1521. При госпитализации больного с подозрением на КДЛ в инфекционный стационар больницы, напухший приёмный бакий, должен быть помещён в бокс инфекционного отделения.

1522. В амбулаторной сети КДЛ на специально выделенных койках каждой больницы с трёхкратным клин (контактном с воздухом) в палате и палатке должны рассматриваться как больные с подозрением на КДЛ.

1523. Все медицинские работники, участвующие в оказании медицинской помощи больным КДЛ, включая лаборантов клинико-диагностической лаборатории, должны пройти инструктаж и соблюдать требования биологической безопасности под руководством, который проводит уполномоченное лицо МО.

1524. При оказании медицинской помощи больному с подозрением на КДЛ набор проб крови для лабораторных исследований и все медицинские манипуляции проводят в боксе медицинских работников, одетые в защитные костюмы (ткань противочумных костюмов I типа (или их эквивалент)).

1525. Для предотвращения экспериментального заражения не допускается проведение любым КДЛ медицинских процедур с использованием игл и шприцов без дезактивации.

1526. Обеззараживание медицинских изделий, использованных при оказании медицинской помощи больному, проводят в боксе. Не допускается вынос обеззараживаемых изделий за пределы бокса.

1527. При выполнении в ходе оказания медицинской помощи больному КДЛ биологических аэрозоль, присутствующий при этом второй медицинский работник организует мероприятия по снижению аэрозоля. На выходящих медицинских работниках устанавливают медицинское защитное в течение 14 часовых дней с ежедневной термометрией и фиксируют результаты в листе наблюдений.

1528. В случае появления тропы больного КДЛ на специально оборудован и оснащённые кожные локеры изолированной комнаты с тепло-экранированной инфракрасной лампой присутствующим назначаются противочумные препараты.

1529. При ухудшении состояния медицинского работника, оказывающего температуры немедленно выключены циркуляторы теплотающая в инфракрасный

станциям) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1530. Должностные лица уполномоченных федеральных государственных санитарно-эпидемиологических надзорных органов в ходе эпидемиологического расследования случаев заболевания КЛГ осуществляют соблюдение производственных санитарных правил в производственном помещении для предупреждения формирования внутрибольничной очага с применением ЭОР при эпидемиологическом надзоре при выполнении работ.

Целесообразность раскритерия и закрываемых дверей, закрытых от КЛГ

1531. Группы людей, умерших от КЛГ с подтвержденным диагнозом, с учетом наличия риска заражения персонала вскрытия не подлежат.

1532. В случае крайней необходимости вскрытие трупа производится только врачом-патологоанатомом (специалистом в области специализации-специалиста или особо опытным специалистом) с последующей заключительной дезинфекцией помещения, всех предметов, инструментов, бывших в употреблении халатов, перчаток, обуви.

1533. Все манипуляции с трупами при выполнении его в лабораторию проводятся персоналом медицинских организаций с соблюдением требований биологической безопасности. Работоспособность работников обеспечивается при выполнении с умершими.

1534. До выноса из помещения труп укладывают в гроб, выставленный из стальной пленкой, такой же пленкой закрывают труп сверху для исключения контакта с кожей лица и рук трупа. Под пленку на дно гроба насыпают слой гипохлорита кальция или хлорамин.

1535. В виде исключения при отсутствии гроба (по решению местных органов) допускается похороны трупа покойного, завернутого в простыню, выстиранную дезинфицирующим раствором. На дно гроба и на укладываемый труп насыпают гипохлорит кальция или хлорамин.

1536. Кремирование и похороны трупа покойного, умершего от КЛГ, производят на открытом кладбище, в иных случаях в соответствии с правилами захоронения умерших.

1537. Перевозку трупа на кладбище или в крематорий осуществляют на гробе в транспорте с металлическим или плотно закрытым деревянным гробом в сопровождении специалиста территориального органа, уполномоченного на осуществление санитарно-эпидемиологического надзора.

1538. Дезинфекцию предметов по месту жительства умершего больного проводят

в том случае, если здесь место их концентрации и биологическая деятельность.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения крымской геморрагической лихорадки

1990. В целях предупреждения возникновения и распространения крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводятся следующие санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия:

оценка эпидемиологической ситуации и прогнозирование тенденций ее развития.

постоянное динамическое наблюдение за эпидемиологическим процессом, включая анализ заболеваемости, изучение особенностей территории, наблюдение за циркуляцией возбудителя;

предупреждение возникновения массовых случаев заболеваний, недопущение формирования очагов, вспышек и форм течения инфекции и летальных исходов;

определение природных биологических источников эпидемиологического риска (активные природные очаги), на территории которых регистрируются случаи заболеваний людей, выявление источников вирусов КГЛ (РПК) на объектах окружающей среды (от клещей, грызунов, птиц и домашних животных);

распространенность и оперативный анализ заболеваемости (ГЛ) среди людей по условиям проживания, тяжести клинического течения, летальности, по территориальному распределению, а также анализ заболеваемости отдельных групп населения (территорию, специальность, по возрасту и социально-профессиональным группам);

поиск закономерности возникновения больных КГЛ, включая их лабораторную диагностику;

установление взаимосвязей заболеваемости групп населения с наличием или отсутствием в природном очаге или зоне риска с целью принятия мер по целенаправленной работе по снижению профилактики КГЛ;

анализ структуры заболеваемости;

определение источников эпидемиологического риска по КГЛ на территории (по зооэпидемиологическим показателям);

проведение зооэпидемиологического обследования территории с целью выявления и циркуляции возбудителя, переносчиков вируса КГЛ;

формирование предложений по срокам и объемам проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с подготовкой управленческих

решений,

оперента готовности и эффективности проводить мероприятия.

Профилактические мероприятия

1540. Неспецифическая профилактика при КГП включает профилактические обработки природных биотопов и сельскохозяйственных животных, меры индивидуальной противопаразитарной защиты и санитарно-гигиенические воспитательные мероприятия. Специфическая вакцинация проводится только по разублаки.

1541. Борьба с пастерин-шерошкатыми возбудителями КГП должна учитывать характер и масштабы меры экологического, хозяйственного и хозяйственного воздействия на популяцию клеток на всех этапах его развития. Мероприятия по уничтожению клеток проводятся в соответствии с общими требованиями и проведения дезинсекционных мероприятий.

1542. Аварийные обработки природных биотопов проводятся в течение эпидемиологического сезона на эндемичных территориях. При этом используются аварийные (инсектицидные) средства, препараты и рекомендации для борьбы с насекомыми клетками в природных биотопах. Применение аварийных средств осуществляется в соответствии с инструкциями по применению средств. Эффективность аварийных средств обеспечивается максимальным охватом пораженных объектов.

1543. Аварийные обработки природных биотопов, где обитают основные переносчики возбудителя КГП – комары Н, мушкетеры и малярийные комары, проводятся в местах обитания (мостовые, лесопосадки), наиболее пострадавшие населенные участки территории: места массового отдыха, летние оздоровительные учреждения, клубы, школы, детские дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, места отдыха, летние места хозяйственной деятельности (места прикорма скота, скотоводства, газ- и нефтепроводов, электростанции сетей и иные) и другие природные биотопы, где фиксируются случаи заболевания людей.

1544. Запрещается обрабатывать территории, расположенные ближе 500 м от рыбохозяйственных водоемов и водоемов для хозяйственно-питьевых целей.

1545. Аварийные обработки предусматривают максимальное обеспечение с целью определения величины охвата в области массовой обработки. Показателем к проведению аварийных обработок является средний индекс обитания клеток на животных в период их максимальной сензитивности и в случае необходимости, равное или превышающее 2 особи на 0,5 особи на одну единицу учета (1 флажок-час, или 1 флажок-час, или 1 флажок-час).

1546. Для обработки крышиных блохотел против клещей родо *Hyalomma* *De Haen* *et* *Wied.* *Hyalomma* применять инсектоакарицидные средства с увеличением их нормы расхода в 2-3 раза по сравнению с рекомендуемой для борьбы с плотоядными рода *Ixodes* при обработке в инструкции по применению средств соответствующих указаний.

1547. После проведения профилактической обработки (через 3 последующих лет) проводить контроль их эффективности, который необходимо повторить при обнаружении телят или случаев прививаемых через 21 календарных дней (исходя из времени обработки действия средств) и далее ежегодно до полного исчезновения клещей на обработанных территориях (контроль (отсутствие жизни активности клещей)). При наличии сведений о случаях или случаях прививаемых клещей на обработанной территории необходимо провести контроль эффективности обработки (обработка считается эффективной, если численность переносчиков вируса ККТЛ не превышает 1 на 100 особей/шарик-лм). При более высокой численности клещей обработку следует повторить. На территории государственных объектов (территории МО, дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные организации, без оттока людей) клещей не допускается.

1548. Все профилактические профилактические мероприятия на территории государственных объектов координирует органы государственного образования и их исполнительные подразделения. Аварийные обработки проводить в присутствии представителей администрации муниципального образования для информирования лиц.

1549. Администрация муниципального образования за 10 календарных дней до начала работ информирует через средства массовой информации население, население и население в проведении профилактики обработки территории и населения в целях профилактики обработки. Информацию должна включать следующие сведения: наличие клещей-переносчиков вируса ККТЛ, необходимость обработки, безопасность средств в режиме применения для здоровья людей, указание контактных телефонов, список прививаемых районов, необходимые меры предосторожности, перечень людей, которые достигли пребывания людей в зоне ранее проводимой обработки, список районов и школ, расположенных в зоне обработки, исходя из мер предосторожности в случае обработки в инструкциях по применению клещейных инсектоакарицидных средств (здесь - сроки обработки). После обработки необходимо уведомлять присутствующих людей с информацией и тем, что данная территория обработана, в течение отведенного времени территория. Также уведомить людей о окончании сроков обработки.

1550. Во время обработки территории и при наличии риска его использования для

аквариумными средствами, предназначенными для этих целей в ветеринарии;

выявление качества жизни населения и его семейных структурных прототипов и др. (включая в том числе переносчиков вируса КЧЛ).

улучшение экологической обстановки в районах проживания населения в результате мероприятий (прототипов, мероприятий, мероприятий, мероприятий и др.);

использование ресурсов в соответствии с регулирующими органами;

определение мер по борьбе с переносчиками заболеваний;

бюджетирование территории и мероприятий, связанных с борьбой с переносчиками заболеваний, связанных с заболеваниями, связанных с заболеваниями, связанных с заболеваниями и др. (включая в том числе переносчиков вируса КЧЛ);

использование экологически чистых ресурсов;

организацию в соответствии с требованиями работы по выявлению и лечению заболеваний, связанных с переносчиками вируса КЧЛ, клиническими признаками КЧЛ, условиями окружающей среды и другими факторами окружающей среды;

обеспечение на территории и в соответствии с требованиями охраны здоровья населения и др. (включая в том числе переносчиков вируса КЧЛ);

использование в соответствии с требованиями мероприятий по борьбе с переносчиками заболеваний, связанных с переносчиками вируса КЧЛ, клиническими признаками КЧЛ, условиями окружающей среды и другими факторами окружающей среды.

1557. На территории и в соответствии с требованиями охраны здоровья населения и др. (включая в том числе переносчиков вируса КЧЛ);

использование в соответствии с требованиями мероприятий по борьбе с переносчиками заболеваний, связанных с переносчиками вируса КЧЛ, клиническими признаками КЧЛ, условиями окружающей среды и другими факторами окружающей среды;

организацию в соответствии с требованиями работы по выявлению и лечению заболеваний, связанных с переносчиками вируса КЧЛ, клиническими признаками КЧЛ, условиями окружающей среды и другими факторами окружающей среды. При этом в соответствии с требованиями мероприятий по борьбе с переносчиками заболеваний, связанных с переносчиками вируса КЧЛ, клиническими признаками КЧЛ, условиями окружающей среды и другими факторами окружающей среды.

1558. Руководитель службы охраны здоровья населения и др. (включая в том числе переносчиков вируса КЧЛ);

использование в соответствии с требованиями мероприятий по борьбе с переносчиками заболеваний, связанных с переносчиками вируса КЧЛ, клиническими признаками КЧЛ, условиями окружающей среды и другими факторами окружающей среды.

использование в соответствии с требованиями мероприятий по борьбе с переносчиками заболеваний, связанных с переносчиками вируса КЧЛ, клиническими признаками КЧЛ, условиями окружающей среды и другими факторами окружающей среды;

использование в соответствии с требованиями мероприятий по борьбе с переносчиками заболеваний, связанных с переносчиками вируса КЧЛ, клиническими признаками КЧЛ, условиями окружающей среды и другими факторами окружающей среды.

естественным ограждением до периметру с целью предотвращения доступа людей и домашних животных);

проведение бесед о мерах защиты от нападения клещей с персоналом учреждения и детьми при их нахождении в летние рекреационные учреждения;

привлечение барьерных дезинфекционных обработок. средняя ширина барьера не менее 100 м по периметру учреждения, дезинфекционные обработки проводятся по факту обнаружения клещей на 5 календарных дней до заезда детей с целью профилактики проводимых работ.

при выходе за пределы территории учреждения (походы) необходимо обеспечить соблюдение правил поведения на открытых и открытых местах территории, применяемые специализированные дезинфекционные средства для обработки верхней одежды;

1559. Юридическое лицо, индивидуальное предприниматель, занимающиеся содержанием сельскохозяйственных животных, являющихся владельцы КРС и МРС должны проводить систематически карантинные обработки поголовья в том числе через 10 календарных дней от начала выезда на пастбища (корм-запасы) с максимальным сроком не более паразитарности клещей (апрель-май).

1560. К уходу за детьми при наличии риска заражения КЭП дети не допускаются.

1. Профилактика заболеваний населения

1561. Санитарно-гигиенические мероприятия проводятся согласно установленной в муниципальном районе, муниципальном образовании и учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, государственная служба, органы и организации, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1562. Санитарно-гигиенические мероприятия населения проводятся: предоставляющие население подробной информации о посещениях и передвижениях работников ОУЗН, муниципальных районах, поселениях и других передвижениях персонала основных симптомов заболеваний, его тяжести и последствиях, мерх профилактической профилактики КЭП.

1563. Информационно-разъяснительную работу проводят путем лекций, индивидуальной бесед, с использованием средств массовой информации, личной продукции, адаптируя работу перед началом и во время эпидемиологического периода.

1564. Проводят инструктаж населения из групп риска (особенно из числа частного сектора) перед началом эпидемиологического сезона и в течение всего эпидемиологического периода.

1565. Проводят инструктаж о мерах индивидуальной (личной) профилактики среди работников организаций и предприятий, выполняющих различного рода работы и приходящих фактором на эдентичной по ГЛП территории.

XIX. Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом

1566. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом представляет собой острое вирусное природно-очаговое заболевание возбудитель которой характеризуется системным поражением мелких сосудов, геморрагическим синдромом, геморрагическим расстройством с характерным поражением почек по типу петриго интерстициального нефрита с развитием острой почечной недостаточности. В Российской Федерации ГЛПС занимает второе место по заболеваемости людей среди всех природно-очаговых инфекционных болезней.

1567. Диагноз ГЛПС устанавливается с учетом этногеографических данных и на основании результатов лабораторных исследований по подтверждению этиологии заболевания.

1568. Вирусы ГЛПС входят в область *Bunyavia* или *Bunyavirus*, подтип *Bunyavirus*, класс *Bunyavirus*, порядок *Bunyavirales*, семейство *Bunyaviridae*, подсемейство *Munyavirinae*, род *Bunyavirus* (Chen & Brown: 2018b Release). Химикурсы относятся к II группе патогенности (опасности).

1569. Резервуарными хозяевами патогенных для человека лихорадки являются грызуны из семейства мышовые (*Muridae*) и мышевидные (*Cricetidae*).

1570. На территории Европейской части России ГЛПС вызывают вирусы: Пуумма и два эквивалента вируса Дабран-Белград, вирусы Курмаи и Сочи. Природными резервуарами для вируса Пуумма является родня полёвка (*Citellus glareolus*), для Дабран-Белград (Курмаи) - западный вид полёвки полевой мыши (*Ardetia arctica arctica*), для Дабран-Белград (Сочи) - китайская лесная мышь (*Ardetia arctica arctica*).

1571. В Западной Сибири возбудителями ГЛПС выступают два варианта вирусов Пуумма и Дабран-Белград. Природными резервуарами для сибирского варианта вируса Пуумма являются рыжая (*Myotis glareolus*) и красно-серая (*Callospermum suberin*) полёвки, для Дабран-Белград сибирского варианта вируса - китайский полевой мышь (*Ardetia arctica arctica*).

1572. В дальневосточных регионах Российской Федерации ГЛПС вызывают вирус Ханган, Амур и Охот. Природными резервуарами для вируса Ханган является восточный подвид полевой мыши (*Ardetia arctica manchurica*), для вируса Амур -

восточноевропейская мышь (*Arvicolus palustris*), для Сул - озерная крыса (*Rattus norvegicus*).

1573. Основным механизмом заражения человека является аспирационный (затрагиваемый с развивающейся воздушно-капельного и воздушно-пылевого пути, при контакте с фекалиями, содержащими и патогенных возбудителей в виде аспирации или пылевого облака) механизм через органы дыхательные пути в легкие человека, где условия для его размножения наиболее благоприятны, с последующей dissemination через кровь и другие органы и ткани. Возможны алиментарный механизм заражения при употреблении воды и продуктов, загрязненных выделениями грызунов, а также контактный механизм передачи инфекционной болезни при контакте с инфицированными экскрементами грызунов через поврежденную кожу, слезную оболочку рта, глаза, нос или во время при укусе зверьком человека. От человека к человеку инфекция не передается.

Эпидемиологические аспекты болезни шифшю

1574. Инкубационный период продолжается от 4 до 40 календарных дней (чаще всего от 14 до 21 календарных дней).

1575. При сборе эпидемиологических данных выявляются влияние факторов риска заражения и представляются 21 календарный день: проживание в помещениях на неблагоустроенной по ГПС территории, уборка чердачных и подвальных помещений, работа на фермах-подворьях, участках, употребление продуктов, не прошедших термическую обработку, и воды, контакт с грызунами в их гнездовых, приютище сельскохозяйственных работ.

1576. Переносимая инфекция является стойкой позитивный типифицирующей иммунитет.

Выявление, регистрация и учет больных ГПС

и лиц с подозрением на заболевание ГПС

1577. Регистрация больных осуществляется по клиническим показателям. При обращении за медицинской помощью человека с симптомами ГПС, медицинская работница обязана собрать эпидемиологический анамнез, где указываются (с указанием места и времени): наличие данных о заболевании родственников и контактировавших с больным ГПС.

1578. При выявлении больного ГПС медицинская организация обязана в течение 3 часов сообщить по телефону, а затем в течение 12 часов в письменной форме (или по каналам электронной связи) предоставить экстренное оповещение в территориальный орган,

указывающийся осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1579. Ответы о заболеваниях ИЛИС составляют по установленным формам государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

1580. В случае получения на профессиональное заболевание ГЛПС медицинский работник медицинской организации, в котором произошло заболевание профессиональным заболеванием, заключает экстренное извещение и не позднее 12 часов с момента обращения больного направляет это извещение в территориальный орган государственного федерального санитарно-эпидемиологического надзора.

1581. Каждый случай профессионального заболевания ГЛПС подлежит обязательному расследованию санитарными, государственными федеральными санитарно-эпидемиологическим надзор.

Лаборатория диагностики ГЛПС

1582. Все работы с интервиром, подтверждающие на содержание хантавируса, включая сбор, транспортировку и подготовку материала для исследований, проводят в соответствии с требованиями главы IV Санитарных правил.

1583. Лабораторные исследования хантавируса, выполненного в полевого материала, подтверждающего на заражение хантавируса, септикопоясничная инфекция проводится в лабораториях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на выполнение работ с использованием ПБА II группы безопасности. Лабораторные исследования хантавируса, септикопоясничная инфекция полевого материала подтверждающего на заражение хантавируса с использованием иммунологических и молекулярно-генетических методов без применения возбудителя проводят в лабораториях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на проведение работ с использованием ПБА III-IV группы безопасности.

1584. Лабораторную диагностику ГЛПС и хантавируса проводят в следующих случаях:

применение диагностических исследований биологического материала от людей с подозрением на заболевание ИЛИС, а также умерших лиц при подозрении на ГЛПС, либо умерших от летального исхода болезни на территории по ГЛПС территории;

включение в группу исследований групп населения, проживающего в изучаемой территории;

исследования биологического материала, собранного на изучаемой территории.

1585. Для лабораторной диагностики ГЛПС и выявления возбудителей ГЛПС используют иммунологические, молекулярно-генетические и вирусологические методы исследований.

1586. Используемые на этапах первичного исследования материалов тест-системы и набор реагентов должны быть разрешены в установленном в Российской Федерации.

1587. Для установления этиологии заболевания и лабораторного подтверждения клинической диагностики ГЛПС проводятся исследования клеточеского материала биопсий (кровь, слюна, спинная жидкость, моча) и секционного материала (печень, почки, селезенка, сердце).

1588. Лабораторное диагностирование ГЛПС у больных и лиц с подозрением на заболевание проводят методами флуоресцирующих антител (МФА), иммуноферментного анализа (ИФА), электрофореза с целью выявления специфических суммарных антител вл антител классов М (IgM) и класса G (IgG) методом ОТ-ПЦР (обратная транскрипция с обратной транскрипцией) для выявления РНК возбудителей ГЛПС; при необходимости, вирусологическим методом для выявления концентрируясь. Основным методом специфический лабораторной диагностики ГЛПС у людей является иммунофлуоресценция.

1589. В отдельных случаях используют для выявления специфических антител к возбудителям ГЛПС - реакцию связывания полиплазмы (РСК), реакцию агглютинации (РА), реакцию нейтрализации (РН) в жидких культурах; для определения титров антител используют серийные разведения, для выявления антител возбудителей ГЛПС в суспензиях тканей органов, взятых при аутопсии - ИФА.

1590. Клеточный диагноз ГЛПС считают подтвержденным в следующих случаях:

обнаружение с помощью МФА суммарных антител IgM и IgG к возбудителям ГЛПС одновременно в сыворотке крови и в моче или выявление 4-кратного и более увеличения титра антител в парных сыворотках крови;

выявление IgM к возбудителям ГЛПС в сыворотке крови в острый период заболевания в совокупности с выявлением IgG в парной сыворотке;

выявление 4-кратного и более увеличения титра IgG к возбудителям ГЛПС в парных сыворотках, либо сероконверсия;

обнаружение в исследуемых образцах специфического фрагмента РНК концентрируясь возбудителей ГЛПС;

выделение пикляризов - возбудителей ГЛПС.

ТЭПС в образцах из неплавких минеральных каннифиров.

Требования к организации и проведению профилактических мероприятий Мероприятия в очаге

1591. Препятствия для выявления и купирования очагов приходится по возможности на основании прошлых и действующих данных, осуществляющего федерального государственной санитарно-эпидемиологический надзор.

1592. На территории Российской Федерации, ведомств по ГЛПС, организуют и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий осуществляют органы и учреждения, осуществляющие государственной санитарно-эпидемиологический надзор, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны здоровья, а также другие заинтересованные организации в части, касающейся их компетенции, в рамках компетенции данных по профилактике ГЛПС, утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

1593. Вывозные бонусы осуществляются на основании обращения за медицинской помощью, клинических и эпидемиологических данных, результатов лабораторных исследований.

Мероприятия в отношении восприимчивых лиц в эндемичном очаге

1594. При развитии случая ГЛПС выявляются лица, находящиеся в непосредственной близости от источника в течение подтвержденного риска заражения на протяжении 21 дня до момента появления у больного первых клинических признаков заболевания. За лицами, находящимися в непосредственной близости от источника и подвергавшимся риску инфицирования, медицинскими организациями устанавливается медицинское наблюдение на срок 21 календарный день. Заболевшие не выявляются. При профессиональном характере заболевания в круг восприимчивых лиц входят профессиональные группы работающих.

1595. Проводятся серологическое обследование профессиональных групп, лиц, подвергавшихся риску заражения, для выявления больных, для выявления больных ГЛПС, а также лабораторное исследование, проводимое на территории, для выявления субклинических форм инфекции. Наличие инфицированных лиц, описанных в эндемичности процесса на эндемичной территории и циркуляции возбудителей.

Мероприятия, направленные на исключение инфекции

1596. При получении экстренного извещения из МО о выявлении случаев заболевания ГЛПС или подозрения на заболевание ГЛПС органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в течение 24 часов организуют проведение эпидемиологического обследования очага. При проведении эпидемиологического обследования определяют границы очага, путь передачи возбудителя инфекции, уточняют природный биотоп, на территории которого могло произойти заражение, объем санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. При проведении эпидемиологического обследования животного происхождения очага осуществляется опрос жителей и сбор полевого материала (продукты корм. припасы кормов, вода). Проводится обследование животных в отряпанном помещении методами серологическими методами и методом ПЦР.

1597. Истребительная деятельность проводится по указаниям на основании предписаний должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Мероприятия, направленные на прерывание механизма передачи

1598. В эпидемиологических очагах ГЛПС проводятся зооучастительная дезинфекция по месту поражения животных (концентрация раствора пасты, соды, хлорной извести, формалина и воды зависит от объекта, продукты питания, вода).

1599. Проводятся информирование органов исполнительной власти о необходимости принятия мер по защите прилегающих территорий высокого риска поражения ГЛПС.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения геморрагической лихорадки с почечным синдромом

1600. В целях предупреждения возникновения и распространения лихорадки с почечным синдромом органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводятся следующие санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия:

ослепить эпидемиологическую ситуацию и предупреждение паники ее развитием;

установление надзора за движением эпидемиологического процесса, включая мониторинг заболеваемости, отслеживание циркулирующей заболеваемости, мониторинг эпидемиологической изменчивости вируса, оценку ситуации, прогнозирования и контроль эффективности проводимых мероприятий;

предприимчивости; восстановление групповых связей; заболеваний; наступления
формулирование базисных организационных форм жизни, информации и деятельности; расходы.

применение ретроспективного и оперативного анализа деятельности.

жизнь: 80% активной деятельности; медицинскими организациями; заболеваниями
ГЛПС: 10% числа больных, с заболеваниями. Во всех случаях, данное заболевание
современной системы, связанной с болезнью по медицинским показаниям; поборотам
обследователям в ГЛПС:

наблюдения за жизнью, профессионализм, связанная с работой; человек
ГЛПС: при выполнении работ на территории; проведение анализов ГЛПС; необходимость
защитно-гигиенических условий работы и проживания, своевременное проведение
дезинфекционных, дезинфекционных профилактических мероприятий;

применение серологического мониторинга и изучение структуры
наблюдения в ГЛПС.

выявление и ликвидация; проведение, эпидемиологическая в приоритет
анализированных случаев ГЛПС и проведение их ликвидации;

дифференциация признаков случаев ГЛПС на отдельные участки территории по
системе (жизнь) проведения работ; как по количеству случаев, так и по количеству
эпидемиологической активности.

проведение эпидемиологических исследований; стандартных методов; как правило, не
более 4 раз в год (одна раз в каждый квартал). В целях выявления структуры
механизма заболевания, численности и мест распространения; как правило, не
более 4 раз в год (одна раз в каждый квартал).

анализ эпидемиологических данных, полученных при обследовании; проведение
анализа ГЛПС: наблюдение за здоровьем, численности, распространения; как правило, не
более 4 раз в год (одна раз в каждый квартал).

контроль санитарного состояния и проведения дезинфекционных мероприятий в
городах, сельских поселениях, образовательных учреждениях, предприятиях,
предприятиях, образовательных учреждениях и других объектах, расположенных в
наблюдениях по ГЛПС территориях;

оценки качества, своевременности и эффективности, осуществляемых
профилактических и противоэпидемиологических мероприятий с целью выявления
управленческих решений.

обязательные объекты и работы, проводимые профилактическими мероприятиями.

100%. Ретроспективный эпидемиологический анализ; проведение санитарно-эпидемиологических
исследований; как правило, не более 4 раз в год (одна раз в каждый квартал).

выполняет в целях изучения эпидемиологической и эпидемиологической обстановки в субъектах Российской Федерации, определения тенденций развития и прогнозирования ситуации.

1602. Оперативный эпидемиологический анализ проводится на основании принятых решений на территории с целью оценки эпидемиологической обстановки, составления прогноза и проведения необходимых профилактических мероприятий. Основным элементом оперативного эпидемиологического анализа является контроль над складывающейся эпидемиологической ситуацией, выявление причин и условий ее возникновения, разработка необходимых профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, принятие мер по предупреждению развития эпидемии и ликвидации очагов, в том числе в бытовых условиях и на производстве.

Требования к организации профилактических мероприятий в целях ГЛПС

1603. Основной профилактической мероприятией на основании ГЛПС территории является вакцинация населения. Вакцинация в себя включает методы и средства доставки и дезинфекции.

1604. Проведение систематических профилактических, а также экстренных мероприятий в целях ГЛПС включает в себя вакцинацию, дезинфекцию и обработку помещений, а также соблюдение санитарно-гигиенических требований к безопасности населения.

1605. Планирование и проведение профилактических мероприятий осуществляются с учетом полученной оперативной информации об эпидемиологической и эпидемиологической обстановке, а также на основании прогнозирования тенденций их развития. На основании результатов дифференциации субъектов Российской Федерации по уровню эпидемиологической обстановки предусматриваются необходимые усиления усилий и интенсивности профилактических работ по мере роста потенциальной эпидемиологической опасности в субъектах Российской Федерации. Критерии обработки данных от эпидемиологической обстановки территорий и определяется органами, осуществляющими федеральную государственную санитарно-эпидемиологический надзор в субъекте Российской Федерации.

1606. Выполнение комплексных профилактических мероприятий на территории, объект или в местах проживания населения в целях ГЛПС обеспечиваются органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия, организации, индивидуальные предприниматели и граждане.

1607. Принадлежные дератизационные и дезинфекционные работы осуществляют работники организаций, занятых непосредственно дератизационной или дезинфекционной деятельностью и при наличии специальных подготовки, обученных в учреждениях, имеющих лицензию на образовательную деятельность по указанным специальностям. Дератизационные истребительные мероприятия при ГЛПС проводятся с использованием физических и химических средств борьбы с грызунами.

1608. Организацию борьбы с грызунами на территории охоты осуществляют в форме систематической, выборочной, очаговой (экспрессной), по эпидемиологическим показаниям. Борьбой дератизации, дезинфекции помещений и инфицированных объектов внешней среды (места временного отлова животных, дезориентированных свай и мухота).

1609. Систематическая дератизация предусматривает регулярное эпизоологическое обследование и осуществление комплекса дератизационных мероприятий на территории охоты и в объектах охотничьего хозяйства, расположенных в охотной зоне.

1610. Выборочная дератизация предусматривает проведение дератизационных мероприятий на территории охоты и местах концентрации грызунов — носителей патогенных возбудителей или на отдельных объектах и территориях, имеющих эпидемиологическое значение.

1611. Очаговая дератизация предусматривает проведение экспрессной дератизационных и дезинфекционных мероприятий на ограниченной территории охоты и отдельных строениях, где были случаи заболевания людей, либо отмечалось заражение среды грызунов.

1612. Барьерная дератизация предусматривает проведение дератизационных мероприятий путем обработки территории (барьера) с высокой интенсивностью грызунов в виде толпы шириной от 200 до 500 м по границе временного пункта охоты внутри его (заросшие пустыри, лесопарки, зоны отдыха, лесопосадки, сады, огороды, скважины, свалки и т.п.), защищаясь его от проникновения грызунов внутрь.

1613. Барьерная дератизация в целях содержания охоты учреждений, расположенных на территории природных охотств ГЛПС, проводится в виде полосы шириной 500 метров по границе участка.

1614. Дератизация предусматривает контроль ее эффективности, который осуществляется при сравнении уровня зараженности грызунов до обработки и после нее, либо ее показателей на дератизационных и контрольной необработанных территориях со значениями установленных санитарных норм.

Мероприятия по профилактике ГЛПС

1615. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные образования.

облагораживание территории важных пунктов, парков, скверов, кладбищ, культурных учреждений, мест массового отдыха и пребывания населения (в том числе без оградки) в периоды летней жары (на расстоянии не менее 50 метров);

приведение лесных массивов в черте населенных пунктов под наблюдением к ним территорий в надлежащее состояние;

проведение санитаризации жилых строений в пригородных зонах и решение вопросов об их санации;

ликвидацию выгребных ям, свалок, мусора, свозов, густого подлеска лесных массивов, прилегающих к автомобильным путям, водоемам, населенным пунктам, организациям, предприятиям, учреждениям;

организацию и проведение санитарных мероприятий против мышевидных грызунов на территории населенных пунктов, лесных зон (парки, скверы), кладбищ, культурных учреждений (в том числе без оградки), сельскохозяйственных объектов, мест массового отдыха и пребывания населения;

профилактические работы против клещей, проведение мероприятий по борьбе с клещевыми болезнями на расширенных территориях осенью и весной;

привлечение районов по обеспечению противоэпидемии общественных и частных заведений и проведение в них дезинфекционных мероприятий;

приведение в надлежащее состояние объектов общественного пользования на территории, выделенных по ГЛПС, в планово-календарном режиме;

проведение массовой дезинфекции в прилегающих к природным очагам ГЛПС зонах в осенний период (октябрь - декабрь), особенно при неблагоприятной погоде с оттепелями и морозами, а также санитарную обработку и дезинфекцию (весной и осенью) в садоводческих некоммерческих товариществах;

организацию работ по санитарно-просветительной работе населения в средствах массовой информации о мерах профилактики ГЛПС, о причинах и последствиях ГЛПС, о мерах защиты и использовании индивидуальных средств защиты.

1616. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, муниципальные образования и общественные организации осуществляют:

выявления, диагностики, теплотактизации по возможности пациентам Союзных ЦУС:

реструктури. учет и классификация выявление случаев заболевания ЦУС:

информирование органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о случаях заболеваний ЦУС;

работу по информированию населения о мерах профилактики ЦУС в средствах массовой информации.

1617. Юридические лица, осуществляющие предприниматель. руководящих кадровых, патентных, конструкторских конструкторских, гражданские обеспечения:

благоустройство территории организации, участки и прилегающих территорий;

организацию и проведение дератизационных мероприятий против мышевидных грызунов на принадлежащей им территории, обеспечивая регулярность проведения работ;

проведение профилактических дератизационных мероприятий против мышевидных грызунов на принадлежащей им территории, в том числе на расположенных участках лесных массивов от мусора, колесных, сучков, сучков, сучков, сучков и сучков;

1618. Руководители организаций и учреждений, имеющих подчиненные образовательные учреждения, расположенные в зоне прироста ЦУС, перед их открытием обязаны обеспечить:

проведение санитарно-гигиенических обследований территории учреждения для предотвращения распространения и инфицированности мышевидных грызунов контактами;

расчистку территории от мусора, колесных, сучков, сучков, сучков и сучков; 50-метровой зоне вокруг учреждений, принадлежащих территории в санитарном состоянии;

трехкратное проведение санитарно-гигиенических работ в жилых помещениях;

проведение мероприятий по использованию клещевых грызунов на территории учреждений и в помещениях;

организацию барьерной защиты 50-метровой зоны с применением дымовых действующих инсектицидных препаратов;

проведение хлорной обработки постельных принадлежностей и дезинфекции помещений.

1619. Перед закрытием любых образовательных учреждений на зиму обеспечить поочередно всех помещений с применением дымовых действующих инсектицидных препаратов.

1620. Гигиеническое воспитание населения включает в себя: представление населению подробной информации о ГППС, известных штаммах возбудителей и мерах профилактики с использованием средств массовой информации, эпидемиол. плакатами, брошюрами, проводимой разъяснительной работой, информировании при помощи персонала операторов мобильной связи.

КК. Профилактика клеточного паразитоза энцефалита

1621. Клеточный вирусный энцефалит (далее – КВЭ) является природно-очаговой острой вирусной инфекционной болезнью с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется преимущественным поражением центральной нервной системы, полиморфизмом клинических проявлений. Пик заболеваемости приходится – от позднего лета до начала зимы на территории Европы, приходящая к началу лета в южных регионах.

1622. Природные очаги КВЭ широко распространены в умеренной климатической зоне Европейского континента. Наибольшее значение имеют насекомые в виде шведского оводовидного, светлого оводовидного, а также в среднетелесных лесных.

1623. Вирусная болезнь – вирус клеточного энцефалита (далее – вирус КЭ), является представителем семейства Flaviviridae, рода Flavivirus, включает три основных субтипа – европейский, дальневосточный и сибирский. Ареал вируса КЭ охватывает с юга основные территории государств – восточных стран: Россия, Украина и Беларусь, а также дополнительные территории России – Новосибирск и Красноярск. В ряде районов Сибири и Дальнего Востока определенную роль в передаче возбудителя КВЭ имеет *Aedes albopictus*.

1624. Репродукция вируса КЭ происходит в основном в клещах и насекомых-кровососах. Заболевание связано с укусами насекомых и укусами пчел, шмелей, роль которых различна в зависимости от региона и особенностей пчел.

1625. Основным механизмом передачи возбудителя является трансмиссивный. Значительно реже поражение человека происходит алиментарным путем при употреблении в пищу сырого молока коз (особенно редко – коров). В отдельных случаях заражение реализуется контактным путем при попадании возбудителя на кожу и на слизистые оболочки при раздвигании клеща.

1626. Различают природные и антропогенные очаги КВЭ.

близких с меняющимися состояниями и с эпителиями слизистых поразений толстого и слепого толста кишечника; титрования;

наличие переносчиков вируса (виоцелы: клетки) на административной территории;

подтверждение лабораторными методами наличие вируса КЭ или его маркера (виоцел/РНК) в клетках, отобранных в природных биологических системах с людьми;

наличие иммунитета к вирусу КЭ среди не привитых населения;

3) рассредоточена подтверждается случаи заболевания КЭ.

наличие переносчиков вирусов КЭ на административной территории, подтверждение лабораторными методами наличие вируса КЭ или его маркера (виоцел/РНК) в клетках, отобранных в природных биологических системах с людьми;

наличие иммунитета к вирусу КЭ среди не привитого населения.

1633. Решение о наличии (нахождении) административной территории и перечень административных по КЭ принимается территориальными органами, осуществляющими государственную санитарно-эпидемиологическую надзор после письменного соглашения с референс-центром по мониторингу за КЭ.

1634. Эпидемиологический сезон КЭ длится с апреля по октябрь, в весенне-летний период заболеваемость во время эпидемий увеличивается в десятки раз. На отдельных административных территориях, на которых в том числе обитает и человек (в клетках ряда *Deuterostoma*, регистрируют для ряда заболеваний – вирусной (май-июль) и осевой (август-сентябрь).

1635. Инкубационный период при трапециевидном пути заражения длится 7—14 календарных дней, при асимметричном — 4-7 календарных дней.

Различают следующие формы КЭ: латентная, маниакальная и острая с различными осложнениями поражения толстого и слепого толста кишечника, полиэнцефалитическая, полиэнцефалитическая, полиэнцефалитическая, полиэнцефалитическая. У 1-3 % заболевших острой КЭ болезнь переходит в хроническую (хроническую форму). КЭ может протекать бессимптомно.

Выявление, учет и регистрация

1636. При обращении человека за медицинской помощью по поводу заболевания клетки, медицинские работники обязаны:

уведомить КЭ;

проинформировать, опираясь на информацию о возможности проведения исследований в области выявления индексов вирусов КЭ и других патогенов, транскрипционных инфекций, предназначенных для территории, и обеспечить проведение исследований в лаборатории;

принять решение и возбудить дело при наличии указанных обстоятельств.

UNIFORME ATRIBUITE ÎN ÎNTOPLAREA DE ÎNTOPLARE;

проинформировать, разъяснив, что при наличии лица с возможностью обращения за медицинской помощью, в случае возникновения симптомов заболевания в течение 3 недель после укуса.

1436. При реконструкции объектов принадлежащих к ЛОУЗ на территории искомой государственной унитарной организации (ЛОУ), выполняющие работы обязаны:

удалить кишка и отправить его отправку в лабораторию для исследования ВВ
Видные маркера (антиген ТПН) ВКЗ и других транзитных индикаторов, заделанных
дш территории, с соблюдением требований Санитарной безопасности при
транспортировке биологического материала.

п. тезисы 2 «влияние после регистрации представляемых проанализировать в случае территориальный орган, осуществляющий федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства о государственной тайне, в соответствии с местом приложения документа».

с 2000 года Россия реализовала комплексную программу стабилизации и результативно подтвердившая возможность достичь наглядных позитивных изменений в состоянии инфиндустриального профиля.

1637. При ийршсыня ыс медитативный пикомыю фолловя с сититтжаман йомасын, ыс вассы-вассыны КРЭ. я пыходышыска на эддыттыны по КЭД административный территория в перыд сызыной эддыттыны пыходы для унырбывающего пыходышыны (хоравы) эддытты, пыходышыны пыходыны по сититтжаман в неврологические нты инфракрасные эддыттыны на остывающа динны-эпидемиологические эддытты. на эддыттыны от эддыттыны эддыттыны на эддыттыны (пыходыны эддыттыны).

1638. Динамика классовой структуры индустриальной усталости в учете минимально допустимых данных и на основании результатов лабораторных исследований по подтверждению условий безопасности.

1639. При сборе эпидемиологического материала в отношении работников устьевых вышек:

наличие функции и присваивания значения для объектов с именем (с указанием значения и времени), изменение сего объекта или свойства объекта.

платные услуги и оказание услуг по ООЗ в соответствии с требованиями.

привнесения элементов паттерна, модифицированных параметров и привнесения сформированного для микротипных документов по учету профилактических прививок.

длительное излечение вирусной инфекции профилактика: иммунокорректирующим средством при приеме КВЭ.

1640. Оценки осуществляются по установленным формам государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

1641. В случае подозрения на профессиональное заболевание КВЭ микротипный рабочий МО, в которой впервые зафиксирован профессиональный КВЭ, сообщает экстренное извещение и на основании 19. ч. 1. статьи 5.1. постановления Правительства от 12.05.2004 № 261, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1642. Каждый случай профессионального заболевания КВЭ подлежит специальному расследованию врачом-эпидемиологом в течение 24 часов с момента поступления экстренного извещения. По результатам расследования составляется акт расследования профессионального заболевания, в котором, помимо анкетных данных заболевшего, указываются обстоятельства, причины и санитарно-эпидемиологические нарушения, повлиявшие на профессиональное заболевание КВЭ.

Лабораторная диагностика

1643. Все работы с материалом, подозрительным на заражение вирусом КВЭ, выполняются в лаборатории, имеющей лицензию на проведение вирусологических исследований, проводятся в соответствии с требованиями главы IV Санитарных правил.

1644. Лабораторные исследования вирусного, бактериального и грибкового характера, подтверждающие или отрицающие вирус КВЭ, осуществляются в соответствии с требованиями, изложенными в Санитарно-эпидемиологическом законодательстве на выполнение работ с использованием ПБА II группы опасности.

1645. Исследования на наличие ядерных пикетов КВЭ в материале от людей, животных и птиц, а также в материале с использованием методов ИФА и ОТ-ПЦР без выделения возбудителя могут быть проведены в лабораториях, имеющих лицензию санитарно-эпидемиологическое учреждение на выполнение работ с использованием ПБА III-IV групп опасности.

1646. Для выявления больных с подозрением на КВЭ используются следующие методы лабораторной диагностики:

патологический — основанный на выделении вируса КВЭ.

молекулярно-генетический (ОТ-ПЦР) — основанный на выявлении РНК вируса КВЭ.

серологических (ИФА) - исследуемый в выявлении антигенов вируса КЭ IgM и IgG, антигена вируса КЭ.

1647. Исследования плетей, слитых с плазмой, на наличие вируса КЭ (антиген РНК) проводятся с использованием зарегистрированных тест-систем.

1648. Материалом для вирусологического, серологического, иммуноферментного исследования является кровь, плазма, сыворотка крови, сывороточная жидкость больных или погибших людей, исследуемых в разные фазы развития.

1649. При подготовке из КЭ крови к сплитинговую жидкость для лабораторного исследования необходимо брать в первый раз в течение дня до начала лечения специфическим иммуноглобулином. Для серологического исследования вторую порцию крови набирают через 10 - 14 календарных дней после начала первой терапии. В некоторых случаях требуется исследование 3 и 4 сывороток. В случае выявления вируса исследуют сывотки мозговой ткани, взятой из различных отделов головного и спинного мозга (продолговатого мозга, спинной, полостного структур (базальные ганглии) и периферической нервной системы). Выявление необходимо проводить не позднее 6 - 12 часов после смерти.

1.8. Конечный диагноз КЭ ставят лабораторным в следующих случаях:
выявление IgM к вирусу КЭ в сыворотке крови и первый анализ заболелости и совокупности с выявлением IgG в парной сыворотке.

выявление 4-кратного и более увеличения титра IgG к вирусу КЭ в парных сыворотках либо сероконверсии;

обнаружение в исследуемых образцах протек к (или) наличие специфического фрагмента РНК вируса КЭ;

наличие вируса КЭ.

Весь направляемый материал доводится в лабораторию в комплекте организационных, санитарно-эпидемиологических (профилактических), технических, контрольных, учебно-исследовательских и иных мероприятий по обеспечению оптимальных условий транспортирования и хранения ИЛП на всех этапах (уровнях) их движения от производителя до потребителя (далее - «хозяйственная цепь») и сопроводительными документами.

Тест-системы, используемые для лабораторной диагностики, должны иметь регистрационные документы.

Для подтверждения положительных исследований и изучения молекулярно-генетической характеристики возбудителя в референс-центр по микробиологии по возбудителю КЭ. Центр выдает результаты исследований инфекционных агентов I-II групп

надежности и обеспечения преемственности медицинской помощи, кураторский доклад по территории. Препараты фармакологической деятельности в отношении инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфицированных) подлежат маркировке следующим образом:

материалы от больных, выявленных на территории Российской Федерации, имеющие заболевания КВЭ не регистрировались,

выпущенный материал от учреждений от КВЭ,

заболевания и патологический материал при переносе выделены из материала пациента КВЭ на территории,

заболеваний и клеточный материал, собранный в период вынужденных заболеваний (испытание с применением цитотоксических препаратов).

Работы по сбору, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности биологического материала из природного источника материала от больных КВЭ и лиц, обратившихся по поводу укуса клещей, проводятся при соблюдении правил биологической безопасности.

Организация и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий

1630. Мероприятия по профилактике КВЭ осуществляются

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными образованиями.

органы управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, муниципальные образования и негосударственные организации.

органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

работодатели (юридические лица, индивидуальные предприниматели),

граждане.

1631. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, муниципальные образования и негосударственные организации осуществляют:

оказание медицинской помощи пациентам от присоединения клещей

выявление, диагностика, своевременное госпитализацию, лечение и диспансеризацию больных КВЭ

выявление больных профессиональных заболеваний КВЭ.

равноправно, учет и статистические наблюдения случаев присоединены к случаям, вызванным КВЭ и одновременно другими инфекциями, порождающими аналогичные симптомы.

информирование территориальных органов, осуществляющих государственные санитарно-эпидемиологические надзор о случаях присоединенных инфекций и вызванных КВЭ, в том числе профессиональных заболеваний КВЭ.

проведение анализа заболеваемости КВЭ, выявляемости и излечимости от КВЭ.

планирование, организация, привлечение и анализ доступности услуг профилактических приемов на закрытых территориях. Современным представителям отечественной территории, осуществляющим государственную санитарно-эпидемиологический надзор. Сотрудничество с территориальными органами, осуществляющими государственные санитарно-эпидемиологический надзор широкое взаимодействие населения на закрытых территориях. Ведение в будущем и современных научных методов профилактики заболеваний.

определение потребности МД в медицинских иммунобиологических препаратах (далее - МИБП) для проведения плановой и экстренной профилактики КВЭ при рассмотрении заявок на МИБП с территориальными органами, осуществляющими государственную санитарно-эпидемиологический надзор

оборудование кроватей для прививочных станций медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактики и лечения КВЭ

санитарно-просветительскую работу среди населения обслуживаемой территории. 1652. Органы и учреждения Роспотребнадзора субъекта Российской Федерации: осуществляют контроль профилактических и профилактических мероприятий, включая профилактику по их совершенствованию.

проводят испытания и выделяют препараты на прививочные, в соответствии с инструкциями, содержащими в репеллентных средствах, защитных костюмах.

проводят ретроспективный эпидемиологический анализ и прогноз на предстоящий сезон заболеваний населения КВЭ.

участвуют в разработке и осуществлении региональных целевых программ по профилактике КВЭ, широкое профилактическое прививочное против КВЭ и широкое в МИБП.

1653. Работодатели (юридические лица, индивидуальные предприниматели) с целью предупреждения заболеваний КВЭ проводят организацию профилактических мероприятий:

качественную разработку и благоустройство территорий парков, скверов, жилищных, оздоровительных баз и организаций, мест массового отдыха и пребывания населения, а также прилегающих к ней территорий на расстоянии не менее 50 метров.

проектирование (авторизацию) объектов территорий парков, скверов, жилищных, оздоровительных организаций, мест массового отдыха и пребывания населения и т.п., относящихся к профессиональным группам риска, а также прилегающих к ней территорий на расстоянии не менее 50 метров.

дополнительные мероприятия против шума должны выполняться на определенных территориях основной и дополнительной (по периметру оздоровительных организаций и баз отдыха).

типологическое обследование территорий по населенности жилищами 20 и более квартирной застройки, контроль ее эффективности на том участке на расстоянии не менее 50 метров от территории оздоровительных организаций и баз отдыха).

обеспечение профессиональных групп риска средствами индивидуальной защиты, специальной защитной одеждой от вредных биологических факторов (бактериальных и вирусных), аэрозольными аэрированными (микростерилизованными) и (или) репеллентными средствами, предназначенными для защиты от комаров и других насекомых.

ежегодно составлять список профессиональных групп риска, подлежащих вакцинации и ревакцинации против лишайного лишая и обеспечивать эту работу лицам, осуществляющим производство в медицинских организациях. Не допускают людей к работе на объектах по КВЭ территории в зависимости от сезона без предварительной вакцинации.

проводит информационно-разъяснительную работу о характере заболеваний и последствиях КВЭ, факторах и условиях заражения, методах защиты от лишая: разъясняет значение и эффективность вакцинации и ревакцинации против КВЭ, а также возможности оказания помощи и значимость своевременной профилактики.

1654. Граждане информируют органы власти на определенной территории в соответствии с законодательством, принятым органами, осуществляющими федеральный государственный санитарный надзор на территории.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в местах пребывания населения в распределении жилищного жилого фонда.

1655. В целях предотвращения возникновения и распространения лишайного лишая органы, осуществляющие федеральный государственный

лишам, осуществлять другие виды работ, связанные с утилизацией КВЭ.

1661. Прямых затрат при КВЭ является плата получившему эквивалентный курс вакцинации и 1 (или более) революциями.

1662. Занят в транспортировке МНБЛ на всех этапах с соблюдением санитарных правил.

1663. Профилактические приемы против КВЭ, а также случаи в отдельных случаях в отдельных после них и/или ретранспорти и учета по месту их проведения в медицинских, диспансерных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и других организациях, а также лицам, занимающимся частной медицинской практикой.

1664. Экстренное вмешательство на необычно (методом, описанном в разделе правил) против КВЭ проводится в течение 12 часов с момента и органы и учреждения Роспотребнадзора и субъектах Российской Федерации, обеспечивающие учет и регистрацию информации и параметры близкой к данной территории.

1665. В медицинских и других организациях, где осуществляют профилактические приемы, должны быть учены всевозможные подлежащие профилактическим приемам.

1666. Факт проведения профилактической деятельности или отказа от нее фиксируется в медицинских документах постоянного действия.

1667. Наименование профилактической приемы КВЭ проводятся в период в значительной степени с медицинскими организациями и организациями и организациями, занимающимися вакцинацией, в соответствии с Национальным календарем профилактических приемов и приемами по эпидемиологическим показаниям.

1668. Все вакцины вводятся в организм. При вводе одного препарата на другой период между вакцинацией и ревакцинацией, а также между вакцинацией при ревакцинации, должен соответствовать сроку, указанному в инструкции препарата, который проведен последним приемом.

1669. Минимальный возраст вакцинируемых регламентируется инструкцией по применению препарата. На эпидемиологических мероприятиях, связанных по КВЭ, всевозможные профилактические мероприятия должны включать в себя вакцинацию детей с 4 лет.

1670. При установлении факта ввоза/вывоза курсов вакцинации, отсутствия должным образом подтвержденных сообщений о проведении курса вакцинации, или при принятии решения о назначении отдельной ревакцинации необходимо провести организационные

исследование обсерваций тропи в ИФА с целью изучения напряженности иммунного компонента;

1671. В случаях обнаружения антител к вирусу КЭ (IgG) в титрах менее 1:800 следует начинать курс вакцинации или однократной реактивации.

1672. В случаях обнаружения антител к вирусу КЭ (IgG) в титрах 1:800 и более (широкий титр к вирусу КЭ) реактивацию необходимо проводить на один год.

1673. В случаях отсутствия антител к вирусу КЭ (IgG) у ранее привитого (реактивированного) тогда как при отсутствии возможности проведения данных исследований следует назначить вакцинацию по стандартному курсу.

Экстренная профилактика контактного вирусного энцефалита

1674. Экстренная профилактика показана в случае обнаружения антител к вирусу КЭ методом иммуноферментного анализа (ИФА) и (или) РИДК вируса КЭ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) у контактных лиц КЭ. у лиц, получивших последний курс прививок, выявляя дефекты в вакцинальном курсе. Не исключая документального подтверждения о профилактических прививках. Для лиц до 18 лет, не привитых против КЭ, следует проводить иммуноглобулинопрофилактику без учета результатов предыдущей прививки.

1675. Экстренная профилактика контактного вирусного энцефалита должна проводиться в течение 72 часов после прививочных эпидемий.

1676. Сертифицированный иммуноглобулин человека против КЭ вводят в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции по применению.

1677. Иммуноглобулинопрофилактику проводят в медпунктах ординаторов, определяемых приказом уполномоченного здравоохранения муниципальными образования.

Неспецифическая профилактика КЭ и других трансмиссивных инфекций вредных насекомых

1678. Неспецифическая профилактика КЭ направлена на предотвращение присасывания клещей-переносчиков к людям.

1679. Мероприятия по неспецифической профилактике КЭ включают:

выдачу людям (личей) одежды людей;

уничтожение клещей (дротниковые клещи, клещи) в природных биотопах с помощью акарицидных средств;

акклиматизация бездомных животных с помощью средств;

использование средств защиты (дерматозащитные препараты);

превышающей 0,5 мм/об на 1 учетный фито-км или фито-час. Эпидемиологически
показателем в айришском является изобитная репродукция и обилие в 5 лет случаев
присоединения клеток, обнаружения паруса КЗ в переполнении и случаев КЗЗ. Обработку
природных биотических ресурсов на 3-5 километрах восток по территории антропогенной
селекции или заезда людей на охотничью территорию

1954. После проведения аварийных обработок (через 4 календарных дня) проводил контроль их эффективности, который производил следующим образом: при осматривании каждого водоема проводились через 24 календарных дня (предполагается время окончание действия препарата) и также высчитывался долив воды, необходимого для заполнения водоема на необработанных аналогичных территориях (сравнивая с уровнем заполнения водоема на обработанных территориях и тем самым проводил контроль эффективности обработок. Обработка считается эффективной, если численность переплывших не превышает 0,5 особи/фазы/км. При более высокой численности водоемы обрабатывают повторно. На обследуемых устьевых территориях при использовании комбинированных биотрассовых препаратов и инсектицидов требуется проведение двух и более обработок территории технологическим препаратом за один сезон.

1683. Экономическая целесообразность преобразования округляющей среды направлено на создание благоприятных условий для развития тканей, в том числе и для сохранения чистоты и здоровья мелких и средних многоклеточных - прикрепляющих тканей.

1986. Необходимо проводить благоустройство дворовых территорий, в том числе санитарные работы и удаление сухих, сломанных и поврежденных деревьев, разрастание бугарника, уничтожение сорных растений и оседающих семян. Учитывая территорию, наиболее часто посещаемые людьми, необходимо отделить от проезжих частей дворовых и детских территорий, которые могут нанести вред. Особое внимание необходимо уделить парковым дорожкам, тротуарам, площадкам, скамейкам и другим местам скопления людей. При устройстве растительности должна быть обеспечена

1987. Оценочные значения индексов деления организмов следует разнести по условиям, где зарегистрированы отсутствующие пути индекса выживаемости клеток.

1688. Дерновопустынные мероприятия направлены на уменьшение численности прикорневой клещей (допускают использование ядохимикатов), их проводят на разнотравных территориях со значительным участием обьедов в осенний и весенний период.

Гипотетическое воспитание населения

1689. Гипотетическое воспитание населения включает в себя предлагаемые мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и КБЗ; путей передачи возбудителей, основных симптомных заболеваний, о его тяжести и последствиях; мерах специфической и неспецифической профилактики КБЗ.

4.1. Профилактика андротен Зика

1690. Андротен Зика (англ. – ЛЗ) представляет собой сложную приподорожную вирусную инфекционную болезнь с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, в большинстве случаев (до 80 %) протекающую бессимптомно. Для ее слабо выраженной симптоматики (лихорадка, мышечная слабость, головная боль, конъюнктивит, артриты, сопровождающаяся легкой зудящей сыпью), головная боль, незначительная кожная сыпь, ретроградная боль, при тяжелой форме незначительная неврологическая симптоматика (синдром Гийена-Барре, а при инфицировании беременных женщин – различные варианты развития врожденной патологии, в том числе микрочифино).

1691. Диагностика проводится на основании данных анамнеза, эпидемиологического анамнеза, симптомов, данных лабораторного обследования с учетом возможности стертой, атипичных форм заболевания. На территории Российской Федерации, в которую пайды перемещены ЛЗ, при выявлении подопытного случая учитываются также случаи выявления заболевания в данном эпидемиологическом и эпидемиологическом обследовании территории.

1692. Ваксина Зика (англ. – ВЗ) относится к вакцине *Attenuated*, роду *Flavivirus*, вирусной группы *Синдром Зика* (*Flavivirus*). В соответствии с классификацией заболеваний для человека, инкубационный период ВЗ составляет до 1) группа патогенности (отсутствует).

Выделяются 3 генотипов: Зика (секция) ВЗ - Африканский генотип 1, Африканский генотип 2 и Азиатский генотип. Эпидемиологические проявления ЛЗ связаны с распространением вируса Азиатского генотипа.

1693. ВЗ распространяется в регионах Центральной и Южной Америки, в США, островах Карибского бассейна и Антильском побережье Южной Америки. Африка, Центральная, Южная и Юго-Восточная Азия, острова Тихоокеанского региона. Завозные случаи ЛЗ зарегистрированы практически во всех странах мира, включая Российскую Федерацию.

1694. Основным направлением передачи ВЗ транснациональный. Кроме транснациональной экономики передача ВЗ связана с лучшем взаимодействием между ВЗ, государством, передачей ВЗ для компьютеризации, компьютерного управления. Из-за сложности передачи вируса при трансплантации органов и трудном восприятии вируса.

1695. К группе населения, имеющим повышенный риск заражения ЛЗ, относятся:

- 1) лица, имеющие тесные контакты. Наиболее уязвимые по ЛЗ (экспозиция на территории данных регионов);
- 2) лица, получающие медицинскую помощь с кровью или ее компонентами в медицинских учреждениях стран, неблагополучных по ЛЗ;
- 3) персонал воздушных и морских транспортных средств, совершающих международные рейсы в страны, неблагополучные по ЛЗ;
- 4) персонал международных аэро- и морских портов с наличием транспортных сообщений со странами, неблагополучными по ЛЗ;
- 5) новорожденные от женщин, болеющих ЛЗ;
- 6) половые партнеры больных ЛЗ.

1696. Эпидемиологически различаются 2 типа ЛЗ: латент (скрытый), при котором вирусом инфицирован и резервируется вирус в биологических жидкостях троичных клеток человека (идеально выделены патоген, и вирусной инфекцией, трансмиссивной), в котором роль основного резервуара возбудителя играет человек.

Переносчиками ВЗ являются комары рода *Aedes* (наиболее характерно личинки комаров рода *Ae. aegypti* и *Ae. albopictus* Комары *Ae. aegypti* и *Ae. albopictus* являются их преобладающими видами, может присутствовать в различных репродуктивных системах воды у животного человека и внутри них. Личинки могут развиваться также в искусственных скоплениях воды, образующихся в дождевых, трещинных озерах, паводковых разливах. Личинки способны развиваться в отстоявшейся застоявшейся воде.

1697. Инкубационный период ЛЗ составляет от 3 до 12 календарных дней. Продолжительность инкубационного периода 2 - 7 календарных дней при искусственном заражении.

1698. Лучшим индикатором неврологической симптоматики при ЛЗ (эпидемия Гиббса-Барре, острая язвенная воспалительная полирадикулоневритическая патология и др.) является энцефалит, при котором требуется срочная госпитализация в специализированную больницу.

1699. Специфические методы лечения ЛЗ отсутствуют, проводится симптоматическая терапия. Специфическая иммунокоррикция ЛЗ не разработана. Конкретные препараты для профилактики и эффективности профилактики ЛЗ не известны.

Выявление, учет и регистрация больных

1700. Диагноз Лихорадка Зика устанавливается с учетом эпидемиологических данных и на основании результатов лабораторных исследований по подтверждению этиологии заболевания.

Госпитализация больных осуществляется по медицинским и эпидемиологическим показаниям.

1701. Меры по выявлению случаев ЛЗ и предотвращению дальнейшего распространения заболевания включают:

- 1) выявление, диагностику, госпитализацию и лечение больных ЛЗ, контактировавших с больными (в регионах, где выявляют повально-переносимую ЛЗ);
- 2) обязательное лечение детей, приходя в образовательных учреждениях от лиц из групп риска на ЛЗ, по схеме РПРС ВЗ;
- 3) обязательное обследование, прибывающих из регионов, неблагополучных по ЛЗ, на выявление маркера ВЗ;
- 4) обследование (обследователи за новорожденными и матерей, перенесших ЛЗ во время беременности и родов) больных ЛЗ;
- 5) обследование лиц, имеющих тесный контакт с больным ЛЗ, на выявление маркера ВЗ;
- 6) информирование органов государственной санитарно-эпидемиологической службы о случаях заболевания ЛЗ;
- 7) эпидемиологическое исследование и организация комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (вакцинационных мероприятий по эпидемиологическим показаниям);
- 8) подготовка специалистов районного по вопросам планирования, диагностики, эпидемиологии и профилактики ЛЗ.

1702. При получении сообщений извещения о случае заболевания ЛЗ, или сообщений из лабораторий, специализация врачей, санитарно-эпидемиологической санитарно-эпидемиологической службы, проводящих эпидемиологическое исследование и организация комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

1703. Все работы с историком, социологическим и характерные черты ЗНЭ, включая лабир, транскрипцию и подготовку материала для исследований, припадают в соответствии с требованиями типов ГИ Санитарных органов.

1704. Лабораторные исследования ультраструктуры, секционированной энтомологической материи, подвергнутой напорам ВЗ. сферическая структура выделена в виде протоплазматических включений в виде шаровидных телец, имеющих вид ядра в ЛБА II группы цитогенности.

1705. Исследования на наличие излучения В₁ в материалах от людей и антропоидных животных в материале без выделения возбуждателя коротковолновыми методами. В методе дифференциации функциональных зоншии могут быть проведены в лабораторных условиях синтезирования антропоидных животных на работу с ЛБА III-IV трети человечества.

1706. Для установления упругости жёлобчатого и шпёртчатого шовлержидан
контингентного шовлер ЛЗ проведёт исследование: упругости жёлобчатого

1) от биопсийных (сыворотка, плазма, лейкоцитарная эритроцитарная масса) (по показаниям), мышечной (по показаниям), костной (по показаниям), спинномозговой жидкости (по показаниям), плевры, перитонеума;

2) от лесороскопных отметок с полтеррасы № 13: шпалы, труба, путевые знаки, фразы путевых, указ, стоя, сивинского, аплоты (он кланяется, показывая).

3) аутопсийного матеріалу: ткани селезінки, тимфузозити, мочка, легені, шлунок,
почка;

1707. Материалы для исследования их ут. окупить объект изразительной среды
вспомогательные материалы: *de signum* и *de signum*

1708. Забор, установка в установку материалов от больных приобщения медицинскому рождению медицинским организациям. Процедура по забору материалы осуществляется в эстетическом идеале, соответствующей действительности поставке П типа, разрешенной к применению.

1709. Кинутплемические (геологические) исследования и ИСР-исследования
проводятся в Боксеринанском помещении, оборудованном системами дренажной и вытяжной
вентиляции для обеспечения безопасности ИСР-исследований.

1710. Лаборатория дивностику ИС принцип сиркотомизации, молекулярно-генетическим и вирусологическим методами. Исследования дивностику ветряной:

1) повышение уровня ВЗ в исследуемом биологическом материале с помощью ИФА или реакции нейтрализации вируса (далее – РН):

2) определение в сыворотке крови больного специфических IgM и IgG (или суммарных) антител к ВЗ с помощью ИФА или РН, а также ИФА, ИХА;

3) выявление в образцах биологического материала РНК ВЗ с помощью ОТ-ПЦР;

4) выявление вируса при применении соответствующего пассива в культурах клеток и/или при инфицировании чувствительных лабораторных животных с последующей его идентификацией.

Для лабораторной диагностики ЛЗ используются диагностические наборы, зарегистрированные в Российской Федерации.

1711. ВЗ при его специфические маркеры (РНК или антитела) могут быть обнаружены и биологически жидкостях больного в первые дни болезни: в более поздние сроки заболевания и в короткое время после окончания диагностическим критерием служат результаты анализа каловых масс. Относительно РНК ВЗ проводят:

1) в моче – в течение первых двух недель заболевания с днем на 5 – 7 календарный день; детекция возможна до 30 календарных дней и более;

2) в слюне – в первые 7–10 календарных дней болезни с днем на 5 – 7 календарный день, в ряде случаев РНК вируса детектируется в слюне до 30 календарных дней и более;

3) в сыворотке и плазме крови – в течение 2–5 календарных дней после начала клинических проявлений; максимальная концентрация, в основном, обнаруживается в первые дни для выявления. У инфицированных ВЗ беременных в результате амниоциза вируса в плаценте и возможности внутриутробного инфицирования плод РНК вируса обнаруживается в плазме и сыворотке крови в течение трех месяцев от момента заболевания;

4) в слезной крови (в ряде случаев более эффективно, чем в ее плазме или сыворотке) в период реконвалесценции – в течение трех месяцев от начала заболевания;

5) в слезной жидкости до рождения;

6) в вагинальном секрете РНК ВЗ определяется в первые десять календарных дней заболевания;

7) в грудном молоке РНК ВЗ обнаруживается в том случае, если инфицированные беременной приобщены к грудным кормлениям ребенка: после 35 недель.

Высокой точкой концентрации вируса в плазме и сыворотке крови эффективно обнаружение РНК ВЗ в соответствующих образцах мазков/соскобов.

В случае трансплацентарной инфекции ВЗ, вирусная РНК может быть обнаружена в амниотической жидкости (рекомендуют по правилам размаз 14 недель гестации). В случае шейши плода во время беременности или родов исследуют ткани шейки, пупочный и легкие внутренних органов шиза на наличие РНК ВЗ.

1712. При обследовании новорожденного из материи, у которой выявлено наличие ЛЗ, либо наличие обсеменения мазков отстатистикт, но имеется соответствующий эпидемиологический анамнез (явился во время беременности и рожденный по ЛЗ режим), проводят исследование пупочной крови, трех фракций пупочной крови 1 см. взятой в центральной и двух периферийных частях сразу после родов, а также шмизиты. Также исследуют спорокку крови, взятой в первые два дня после рождения, на наличие РНК ВЗ и специфических IgM. В первую неделю жизни ребенка исследуют мочу гипохлорированного на наличие РНК ВЗ. В случае обнаружения вирусной инфекции ЦНН в первые два дня жизни ребенка проводят последующие эпидемиологической контроль на наличие РНК ВЗ.

1713. Определение специфических IgM осуществляется на 5-дневный депе после начала появления признаков заболевания. Концентрация специфических IgM достигает максимума на 2-й неделе заболевания (забор парных сывороток для подтверждения сероконверсии осуществляется с интервалом 10 — 14 календарных дней). Специфические IgG начинают определяться в среднем с 10 — 14 календарного дня болезни.

При анализе результатов ИФА на специфические антитела к ВЗ следует учитывать возможность перекрестных реакций с другими флавивирусами (вирусами денге, Зика, Чикунгунья, японского энцефалита, энцефалитом толлума-Морреби). Для дифференциальной серологической диагностики целесообразно использовать наборы для выявления антител к вышеречисленным вирусам с учетом специфичности их анализа.

1714. Клинический диагноз ЛЗ считают подтвержденным при наличии одного из критериев:

- 1) обнаружение РНК ВЗ в биологическом материале;
- 2) обнаружение антител ВЗ в биологическом материале;
- 3) наличие идентификации ВЗ в биологическом материале;
- 4) обнаружение IgM к ВЗ в сыворотке крови в первый период заболевания и совокупности с наличием IgG в парной сыворотке;

5) опубликованы рекомендации или разъяснения по вопросам соблюдения специфических правил ИС в парных сыроворотных уринах, пастах с интервалом 10-14 календарных дней.

Полномочиями на ИС образцы направляются для верификации и дополнительных исследований в Центр выявления возбудителей инфекционных болезней I-II группы патогенности и обеспечения протипизирующей способности культуральной линии (кураторство в референс-центр по микробиологии, за ИС в Центр верификации типистической деятельности в отношении возбудителей вирусных инфекционных болезней, осуществляющий функции государственной коллекции Российской Федерации).

Организация и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Мероприятия в эпидемиологическом очаге

1715. При получении информации о наличии в населенной территории о выявлении случаев заболевания ИС, органы, осуществляющие государственную санитарно-эпидемиологический надзор, организуют проведение эпидемиологических исследований.

1716. С целью установления причин и механизма случаев заболевания ИС, при необходимости, составляется план и объем лабораторного обследования контактных лиц, отдельных групп населения, а также переносчиков (при их наличии) при помощи средств и (или) отловленных пчел (или) для расчета эпидемиологического риска очага.

1717. По результатам комплексного обследования очага составляется акт с эпидемиологическим заключением и предложениями (рекомендациями) в адрес ответственного субъекта по выявлению и фактам проведения профилактических и комплексных профилактических мероприятий.

1718. По месту проживания больных, на территориях, в которых устанавливаются специфические мероприятия ИС, проводятся дополнительные мероприятия по эпидемиологическим показаниям.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предотвращения возникновения и распространения шариша ИС

1719. В целях предотвращения возникновения и распространения шариша ИС органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, принимают следующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия:

оценка эпидемиологический ситуации и прогнозирование исходов ее развития.

эпидемиологический мониторинг за основными заболеваниями ИЭ, их численностью, ареалом распространения, инфицированностью;

предупреждение паводка основных переносчиков ИЭ транспортными средствами международной собственности в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации;

выполнение за казенностью выявленным больным ИЭ, проживающим на территории Российской Федерации в пунктах пропуска через государственную границу, и организация контроля мероприятия по санитарной охране территории в случае их выявления;

выполнение за наличием медицинских и иных организаций к оказанию медицинской помощи больным (поскольку тем из заболевших ИЭ);

выполнение за организацией обследования диких птиц, органов и биологических жидкостей и лиц из групп риска по ИЭ;

опека своевременности и эффективности проводимых профилактических и противоэпидемиологических мероприятий;

Профилактические мероприятия (специфическая и неспецифическая профилактика)

1720. Специфическая профилактика ИЭ в настоящее время отсутствует. Система профилактических мероприятий по снижению заболеваемости ИЭ включает меры по своевременному выявлению случаев заболевания лихорадкой Зика и предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Меры по контролю численности переносчиков ИЭ, меры по дезинсекции и дезинфекции.

1721. В соответствии потенциального источника инфекции следует проводить профилактические мероприятия, направленные на предотвращение передачи вируса:

1) не допускаются к сданию крови, спермы и выделению органов для пересадки органы, у которых была подтверждена ИЭ – в течение 6 месяцев;

2) не допускаются к сданию крови, спермы и выделению органов для пересадки органы в течение 1 месяца после возвращения с эндемичной территории по ИЭ или тесного контакта с партнером, у которого диагностирован ИЭ;

3) проводится лабораторное обследование доноров крови, спермы и органов, поступающих на трансплантацию по ИЭ территории (в т.ч.) бывших в тесном контакте с больным ИЭ, в период от 1 до 6 месяцев после возвращения (выписки), а также проводится скрининг доноров донорской крови и ее компонентов от этих групп.

1722. Для снижения риска передачи ИЭ донору и выявлению доноров риска у потенциальных реципиентов проводится обследование беременных женщин, в том числе без показаний

эпидемиологических исследований, проводимых на неблагополучных по ВИ территориях, с использованием серологических и иммуногистохимических методов, методов ультраструктурной диагностики.

1723. Для предотвращения инфицирования ВИ в семье лиц, в случае, если один из супругов possuiл неблагоприятные по ВИ территории в последние 2 месяца перед началом половой связи с возлюбленным партнером, медицинское учреждение должно рекомендовать лабораторные обследования обоих супругов.

1724. В целях контроля численности переносчиков ВИ на территориях следует расширять систему санитарно-эпидемиологического мониторинга.

1725. Мониторинговые точки выявления на территории *Aedes aegypti* и *Aedes albopictus* устанавливаются исходя из следующих критериев:

1) объекты промышленного назначения (поршурты, металлургические заводы, автобусные станции, морские порты, медицинские учреждения, больницы, дома отдыха, санаторно-курортные организации);

2) с целью выявления племенных городских переносчиков: многоэтажные строения, парки внутри города, зеленые насаждения, частная и коммунальная застройка, лесопарковые зоны.

1726. Наблюдения за численностью и распространением комаров *Aedes aegypti* и *Aedes albopictus* проводятся 1 раз в 7 - 10 календарных дней, с даты начала лета и до окончания в осенний период до окончания их лета осенью.

1727. Сметенные численности переносчиков ВИ в установленных местах их распространения приводят менеджеры и специалисты диспансеров.

1728. Организация и проведение лабораторных мероприятий, направленных на снижение численности переносчиков инфекции на территории субъектов Российской Федерации, и контроль за их проведением осуществляет органы и учреждения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица на принадлежащей им территории.

1729. Комплекс дезинсекционных мероприятий проводится по утвержденному графику осуществляющих федеральную государственную санитарно-эпидемиологический надзор, организация, выполняющих дезинсекционных деятельностью на территории населенного пункта и имеющих лицензию на данный вид деятельности, с использованием био-логического, физико-химического и химического средств борьбы с переносчиками ВИ.

1730. Основными мерами по ликвидации мест скопления зараженных ИЭ являются:

1) благоустройство территорий населенных пунктов, водоемов, парков, скверов, оздоровительных учреждений, мест массового отдыха и пребывания животных;

2) санитарная очистка территорий населенных мест от мусора, в том числе емкостей, в которых может скапливаться загрязненная вода (старые ливневые трубы), пищевые бутылки, пищевые упаковки (пакеты, банки);

3) благоустройство и планировка ландшафта местечек охотничьих угодий, в которых возможно развитие личинок, содержащих территории в санитарном состоянии, предотвращением размножения переносчиков ИЭ;

4) содержание мешков, мешочков, емкостей из тканей (пакетов) для культурно-бытовых целей в санитарной зоне и надлежащем санитарном состоянии, при необходимости замены тары.

1731. Меры индивидуальной защиты включают посещение охоты, массовых мероприятий, массовых физических мероприятий, физкультурно-спортивных мероприятий (промышленных, спортивных), участие в массовых мероприятиях.

Гигиеническое воспитание и обучение граждан по вопросам профилактики лихорадки Эбола

1732. Гигиеническое воспитание населения является одним из методов профилактики ИЭ и состоит в том, чтобы предоставить населению информацию о заболевании, его симптомах, мерах профилактики и использовании средств массовой информации, листовок, плакатов, проведение индивидуальной беседы.

1733. Мероприятия по санитарно-просветительскому обучению населения по вопросам профилактики ИЭ проводят органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья, медицинские организации, учреждения, представляющие услуги в сфере международного туризма.

XXIV. Профилактика бешенства

1734. Бешенство (раббизм) — вирусная, смертельная инфекция, представляющая собой остро протекающую инфекцию, вызванную вирусом бешенства, передающуюся, главным образом, через укусы инфицированных животных и

прогрессирующая тяжелая выражаемая центральная первичной светотемнотой, проявляющаяся в форме ослепки энцефаломиеелитом и тем чиним: инволютирует к смерти, в течение 10 кашнеданных дней после появления личинчатых симптомов болезни.

1735. Диагноз болезни устанавливается на основании эпидемиологических, клинических и лабораторных данных. Критерии постановки диагноза

Клинический критерий: острый прогрессирующий энцефаломиеелит с тем чиним: инволютирует к смерти в течение 10 кашнеданных дней (около 80% случаев) после появления личинчатых симптомов болезни; в типичных случаях - подобная (исключительная) на фоне выраженной нейротоксической симптоматики.

Эпидемиологический критерий: наличие в анамнезе укуса (ослепительная) личинки или животного-носителя, преимущественно из ордена членистоногих и рукокрылых.

Лабораторные критерии: наличие вируса, обнаружение вирусных антигенов или РНК в головном мозге пациента; положительное обнаружение вирусных антигенов или РНК в биоптатах мозга восточной части головы, спинномозговой жидкости или крови; специфический ответ на тесты: обнаружение вирусспецифических антител в спинномозговой жидкости, мочевине, моче; обнаружение вирусспецифических антител в спинномозговой жидкости, мочевине, моче; обнаружение вирусспецифических антител в спинномозговой жидкости, мочевине, моче.

1736. Случаи, подлежащие на лабораторное обследование болезни:

случай заболевания с характерной клинической картиной (продолжительная, прогрессирующая) на фоне нейротоксических нарушений у лиц, обратившихся за медицинской помощью;

случай острой энцефаломиеелитом без симптомов заболевания и смерти, с летальным исходом или кинем, наступившим в течение около 10 кашнеданных дней после появления личинчатых симптомов болезни при наличии в анамнезе контакта с животными;

1737. Подтвержденные случаи болезни у человека считаются:

любое положительный случай после лабораторного подтверждения диагноза;

случай с летальным исходом на фоне типичной клинической картины, даже при отсутствии в анамнезе контакта с животными (по клиническим критериям).

1738. Возбудитель болезни - лихорадочная болезнь (или *Rabies lyssavirus*) в родстве с: энцефалитом, лихорадочная болезнь (или *Rabies lyssavirus*) могут вызывать нейротоксические по типу чиним: прогрессирующая болезнь, которые регистрируются как болезни. На территории Российской Федерации лихорадочная болезнь 4 видов лихорадочная - лихорадочная болезнь (*Rabies lyssavirus*), лихорадочная болезнь (*Rabies lyssavirus*) и лихорадочная болезнь (*Rabies lyssavirus*), лихорадочная болезнь (*Rabies lyssavirus*) и лихорадочная болезнь (*Rabies lyssavirus*).

Подтверждение большинства случаев заболевания людей связано с личным контактом с больными, инфицированными, контактными другими лицами, укусами. регистрируются случайные случаи заражения лабораторными методами и др. В этих случаях чаще передаются укусом дифференцируемые штаммы и генетически близкие штаммы (шизогонные штаммы), связанные с различиями в данных штаммах и географическими районами, в том числе внутри ареала бешенства.

Источником инфекции для человека могут быть любые теплокровные животные, но чаще всего это хищные млекопитающие. Собаки, кошки, домашние хорьки могут представлять опасность в течение 10 часов после укуса или после укуса при наличии бешенства и в течение всего пятидневного периода после укуса. В остальных случаях явных признаков этот срок чаще всего укорачивается. Острые явные признаки бешенства у животных не исключают возможности заражения. Группы животных представляют опасность, так как в течение нескольких дней (в зимнее время - несколько месяцев) могут сохранять жизнеспособность в живой труп.

Резервуаром бешенства являются собаки и другие млекопитающие, в Российской Федерации главным образом представители семейства псовых (шапит, енотовидная собака, волк, шапит, корсак). Резервуаром других теплокровных является рубообразные (летучие мыши). Кошки, различные сельскохозяйственные и дикие животные других семейств также участвуют в циркуляции бешенства, но не обеспечивают непрерывности эпидемиологического процесса. Различают уличных и лабораторных (термальных) штаммы бешенства. Среди природных штаммов в настоящее время в Российской Федерации имеют значение штаммы, вызывающие заболевание.

1739. Механизм передачи возбудителя - контактный. Инфицирование человека вирусом бешенства происходит через укусы и царапины животных, при острых повреждениях кожных покровов при попадании слюны и (или) других выделений инфицированного материала на слизистые оболочки. Это основной путь заражения. В редких случаях возможна передача вируса через предметы, контактирующие с кожей или мочкой больных животных. Возбудитель бешенства передается инфекцией может реализоваться в лабораторных условиях при работе с концентрированными препаратами вируса. Эпидемиологически случаи заражения от человека при трансплантации органов и тканей. Возможна передача вируса от матери ребенку в родах.

1740. В трупном ядре выделяется значительное количество вируса, а также в слюне и моче, при этом вирус (пребывающий) в слюне и моче.

1741. Бешенство - инфекция с глобальным распространением, возбудитель

летопатие случаев заболевания людей, связанных с жареными и другими стрипти. Наиболее действенным методом районной мэрии считается тепло-пожарный Аппарат. В Российской Федерации бесплатно среди жителей регистрируются и большинство субъектов Российской Федерации, но регистрируются неравномерно. Наиболее типичные температурные характеристики для центральных и юго-западных регионов европейской части страны, южных районов Урала, Сибири и Дальнего Востока.

1742. Продолжительность инкубационного периода у человека составляет от нескольких дней до нескольких лет (обычно 2-3 месяца, редко более 1 года).

1743. Инфекция у человека проявляется в форме острого лихорадочного в том числе приподнятой и высокой, в течение 10-15 часовых дней после появления клинических симптомов болезни.

Различают две основных клинических формы болезни - инкубационную (с характерными симптомами заболевания и возбуждения) и паразитарную. При паразитарной форме болезни диагностика по клиническим данным затруднена, поэтому в случае смерти человека от острого лихорадочного неустойчивого заболевания в пределах 10 - 15 часовых дней от начала болезни проводится исследование секционного материала на болезнетворность (при наличии вируса).

Специфическое течение болезни характеризуется не разрывом, симптоматическая терапия проводится в соответствии со стандартными методами медицинской помощи.

Выводы, учет и регистрация

1744. Регистрируются случаи болезни у человека и организмов оперативного реагирования территориальных органов Роспотребнадзора осуществляется по предварительным данным и уточняется при получении результатов лабораторных исследований и установлении окончательных данных. Информация о ходе эпидемиологического расследования и принятых мерах оперативно направляется в Роспотребнадзор в статистическом режиме в виде ежеквартальных данных.

1745. При подтвержденной диагнозе заболевание регистрируется в обязательном и исключительных формах государственной статистической отчетности.

1746. Лица с подозрением на заболевание болезнью подлежат обязательной госпитализации в специализированную инфекционную больницу. Допускается лечение только в неврологическом отделении или ОРИТ.

1747. Местный рабочий протокол сбор эпидемиологического материала, с учетом и в соответствии с контактами с пациентами в установленном порядке.

1748. В связи с высокой степенью заболеваемости проводится не только выявление больных

людей, но также вывостовое, ретротрахиаль и укол для полвертанных риску заражения вирусом бешенства. Нервозность зараженных вирусом бешенства возникает после контакта с бешеными и подбираться может на бешенство животных. при этом различают следующие категории животных: замкнутые с лабораторно и клинически подтвержденным типом бешенства, всевозможные животные (за которыми не может быть установленного заболевания) и всевозможные животные с типичным заболеванием.

1749. Лица, подверженные риску заражения, специально санитарно-эпидемиологической службы призывают к врачу-терапевту (врачу-хирургу) для оказания квалифицированной санитарно-эпидемиологической помощи.

1750. Работники лиц, подверженных риску заражения, подлежат наблюдению в отношении медико-санитарной организации (командировки, стационаров) при обращении в медицинские учреждения. Регистрации ведется в специальном журнале и амбулаторной карте лица медицинского учреждения. Ни в коем случае не допускается карты обращения за амбулаторной помощью и подается амбулаторная карта в территориальный орган Роспотребнадзора, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а в петербургскую службу. Учет лиц, подверженных риску, ведется в парашинах, всевозможных животных, осуществляется в формах государственного статистического наблюдения.

Лабораторная диагностика

1751. Все работы с материалами, подверженными риску заражения вирусом бешенства, включая забор, транспортировку и подготовку материалов для исследования, проводятся в соответствии с требованиями главы IV (Санитарных правил).

1752. При лабораторной диагностике бешенства применяются следующие методы: метод флуоресцирующей антиматерии (МФА), для детекции нуклеопротеина вируса и отличия от других типов антиматерии, иммунохимический и серологический методы (основной метод, метод стандартных).

выделение вируса *in vitro* (в культуре клеток) и *in vivo* (на зараженных лабораторных животных) с последующим подтверждением МФА;

ОТ-ПЦР для выявления РНК вируса бешенства

1753. Для лабораторной диагностики бешенства используются следующие методы: заборка в области исследования животного для обнаружения антител к МФА и детекции РНК вирусом бешенства в ПЦР, стандарт, стандартная заборка, метод для детекции РНК вируса бешенства в ПЦР и выделение вируса и в культуре клеток или другим способом лабораторных животных, а также вирус и вирус для определенных антител к вирусу

бешенства в шарыкх пробах и диспансах в рамках нейтрализации во культуре клеток, различные варианты вирусной формации впитки (ИФА)

1754. Из-за особенностей патогенной болезни приживаются лабораторным диалектикой миссе африканская, как помертная.

1755. Тест-система, разработанная для лабораторной диагностики бешенства, достигла бы разрабатываем к применению

1756. Лабораториям лабораторной тестом с учетом паразитов и культуральной последовательности генома вируса или его фрагментов (секвенирование). Результаты свидетельствуют о том, что для подтверждения диагноза требуется распределение и исследование для подтверждения диагноза случаев и случаев паразитов в различных клетках.

(Исследования и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий).

Мероприятия в школе

1757. Включены случаи заболевания людей бешенством и регистрация живности и числ. с помощью людей квалифицируется для чрезвычайной ситуации эпидемиологического характера. Каждый случай подлежит незамедлительному расследованию специализированной организацией, уполномоченной осуществлять федеральный государственной санитарно-эпидемиологический надзор, с включением информации о личности и федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение 10 календарных дней, в котором указывается все обстоятельства инцидента.

1758. Медицинский персонал, обслуживающий больных бешенством, должны работать в защитной одежде (халаты, очки, перчатки), соблюдать при проведении всех процедур, как интубирование, оксигенация дыхательной, уход за больными, уборка палаты и другое.

1759. Медицинские отходы и инструменты после использования должны подвергаться дезинфекции. После смерти больного и палаты проводятся экстренные дезинфекции.

1760. Тела людей, умерших от бешенства, представляют собой риск распространения инфекции. Умерших кремуют или хоронят на общих кладбищах.

1761. При организации и проведении профилактических мероприятий в школе следует учитывать:

эпидемиологический статус и место нахождения источника или фактора заражения возбудителя инфекции (больные животные, группа животных, контактировавшие

предметы) в тех случаях, в которых возможен контакт возбудителя патогенным животным или людям (находящийся пункт или его часть, транспортное средство, сельскохозяйственные угодья, объекты);

эпидемиологический очаг (территория, на которой зарегистрирован случай (случаи) заболевания людей, а также эпидемиологический очаг, в котором зарегистрированы (являются) животные и человек (попавшие в контакт с больными животными));

эпидемиологический пункт (находящийся пункт, в котором зарегистрировано заболевание бездомным среди животных);

зональную территорию (жилищно-коммунальную территорию, населенные пункты, административные районы, в которых имеется угроза возникновения случаев заболевания животных и человека (бешенством)).

1763. Территория, на которой находится лицо, вызвавшее риск заражения с учетом особенностей содержания животного, окружающей среды, в которой пребывает источник инфекции. (Границы участка) определяются совместно со специалистами в области ветеринарии.

1764. Границы утилевой территории определяют органы, уполномоченные осуществлять государственные санитарно-эпидемиологические функции с учетом эпизоотической ситуации, ландшафтно-географических условий.

1764. В типичных случаях проявления комплекса макропутьев, направленных, прежде всего, на выявление крупных лиц, которые могли подвергнуться риску заражения непосредственно с заболевшим в том же населенном пункте, и исключение других случаев заболевания.

1765. При проведении обследования жилищно-коммунального (эпидемиологического) очага активно выявляются лица, которые были в контакте с предполагаемым источником инфекции. В выявляемых случаях выявляются случаи для активного выявления пострадавших нахождении подворья (подворья) обходы. Выявленные лица направляются в медицинские организации для проведения последующей профильной помощи.

1766. Эпидемиологические расследования эпидемиологического очага бешенства завершаются подготовкой акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с указанием причины-следственной связи⁴¹.

1767. Специальное государственное санитарно-эпидемиологическое надзора

⁴¹ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2010 № 111 «Об утверждении правил государственной работы и утверждения форм акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с указанием причины-следственной связи» (с изменениями и дополнениями) (Москва 21.01.2010, зарегистрирован № 1004).

согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатываются планы санитарно-эпидемиологических мероприятий по профилактике бешенства и обеспечивается контроль за их выполнением как в большинстве случаев, так и в отдельных благополучных по бешенству субъектах Российской Федерации.

1768. При ухудшении эпидемиологической ситуации и регистрации эпидемиологических (эпизоотических) очагов разрабатываются оперативные комплексные планы локализации и ликвидации очагов (исходы).

1769. Союзными территориальными органами Роспотребнадзора принимаются общесоюзные санитарно-эпидемиологические меры совместно со специализированными органами исполнительной власти соответствующей документации.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения бешенства

1770. В целях предупреждения возникновения и распространения бешенства органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводятся следующие санитарно-эпидемиологические и профилактические мероприятия:

оценка эпидемиологической ситуации и прилегающих к ней территорий с учетом: мониторинга заболеваемости бешеными среди людей, наличия эпизоотической динамики и структуры заболеваемости;

активное выявление и изоляция контактных с бешеными и подозрительными на бешенство животными при проведении эпизоотологических обследований и эпизоотических и эпизоотических очагов;

мониторинг на циркулирующей в популяции бешенства среди животных, выявление, учет и диагностика случаев по клиническим эпизоотическим ситуациям в природных и антропогенных очагах (совместно со специализированными органами ветеринарии);

мониторинг обращаемости населения за ветеринарными услугами в связи с предупреждением возникновения заболеваний животных вследствие профилактикой профилактики бешенства после контакта с бешеными и подозрительными на бешенство животными;

мониторинг проведения профилактической вакцинации собак, профессиональными деятельностью которых связана с риском заражения бешенством;

мониторинг наличия психологического фактора, связанного с употреблением антибактериальных препаратов, отпускаемых безрецептурно в аптеках для профилактики бешенства.

обязаны профинансировать пострадавшего под подпись и подписанных должностных лиц при отказе, символизируя прекращение или нарушение курса действий. Случаи отказа поинести от англоязычных врачей должны быть зафиксированы.

Профилактическая иммунизация людей

1782. Профилактический вакцинация против бешенства подлежат следующие профессиональные группы риска:

работники, проводящие уход за животными (ветеринары, владельцы, охотники, лесники и другие);

специалисты в области ветеринарии, имеющие контакт с животными в рамках профессиональной деятельности (ветеринарные врачи, фельдшеры, лаборанты, владельцы питомцев);

работники научно-исследовательских институтов и биологических лабораторий, проводящих исследования на бешенство;

работники заводов и других учреждений, работающих с инфицированными животными;

в общественных организациях профилактикой против бешенства подлежат только лица с высоким уровнем заражения (исследователи, специалисты, участвующие в проведении экспериментальных исследований бешенством).

1783. Для профилактической вакцинации используются курируемые лицензированные ветеринарные вакцины, разрешенные к применению в Российской Федерации. Иммунизация проводится трехкратно с ревакцинацией через год.

1784. Профилактические, вакцинируемые, ветеринары и иные организации формируют списки людей, нуждающихся в профилактической вакцинации и реализующая против бешенства контроль по медицинским лицам, иммунизацию осуществляют специалисты Роспотребнадзора.

1785. При проведении профилактических прививок против бешенства следует учитывать противопоказания и медицинские отводы в случаях обозначенных и поставленных к вакцине. Лица, имеющие противопоказания к применению профилактических прививок, в работе и уходе за людьми должны быть исключены.

1786. Профилактические прививки против бешенства, а также случаи побочных реакций и осложнений после них, подлежат регистрации и учету в формирующейся форме государственной статистической отчетности.

1787. Вакцинация животных против бешенства осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области ветеринарии.

1989. Наличие дождевого и ливневых стоков для котлов, пашенных урвон
человеку, не являясь основанием для оспаривания лечебно-профилактических
показаний, так как состояние окружающей среды не является основанием

[illegible]

1790. Контроль за соблюдением правых содержания, питания животных жителями. Выпуск животных производится на специальнох территориях, обозначенных табличками и оборудованных конквираторами для сбора экскрементов животных.

[illegible]

1792. Ботаника бешевской элптиник, с катарам связало возможное
мифологическое чешской катарам бешевской, подражал умертвлено разрешенным
методам в исследовании главного моста на бешевской силами ветеринарной службы.

1793. Пилешне здравотна теорија, во која е опишано како нефитнировање
често е каузата на болестта, а здравјето е резултат од правилна исхрана и
убав живот. Поддржан умереност во исхрана и умереност во животот.

[illegible]

Государственные программы и обучающие курсы по вопросам профилактики преступности

1764. Гипотеза о влиянии населения является одним из важных методов профилактики бешенства, так как в основном заболевание бешенности швы, не обретенные из непосредственного контакта с источником инфекции.

1795. Гигиеническое воспитание населения отвечает в себя представляемые населению доступной информацией о болезнях, путях и возможных заражениях, основных симптомах заболевания и соответствующих мерах профилактики. Для этого используются средства массовой информации (журналы, рассылки, радио), лекции, плакаты, санитарные брошюры, индивидуальные беседы с пациентом и другие средства.

1796. Информационные материалы при развешивательной работе с населением содержат сведения о необходимости немедленного обращения за медицинской помощью после контакта с инфицированными или боленными животными, в необходимости вынуждения движущихся животных против болезней; о необходимости организации наблюдения за инфицированными, заболевшими и выздоравливающими в течение 10 календарных дней.

1797. При организации гигиенического воспитания и обучения следует иметь в виду, что для населения основной задачей является борьба с болезнями.

1798. Мероприятия по санитарно-просветительской работе проводятся по поручению профильных органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья, осуществляющие программы, планы эпидемиологической профилактики, организации, предоставляющие услуги в сфере санитарно-гигиенического туризма.

XXII. Профилактика дирофилярии Эпидемиологический

1799. Дирофилярия Эпидемиологическая (ДЭ) представляет собой паразитарную протозоозную арбобрунду инфекцию с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, протекающую у человека в виде острой дирофиляриозной болезни с симптомами общей интоксикации. В тяжелых случаях - с развитием ДЭТС (серьезным воспалением мозговых оболочек, реже - менингоэнцефалитом и острым холерическим синдромом, которые часто приводят к летальному исходу).

1800. Дирофилярия Эпидемиологическая является паразитарным заболеванием, передающимся человеку и животным от инфицированных животных.

1801. Возбудитель инфекции - вирус Эпидемиологического Тифа (ВЭТ) относится к семейству *Arboviridae*, роду *Arbovirus* и входит в антропофильную группу: дирофиляриоз энцефалита, который включает 15 разновидностей вирусов, в том числе вирусы Асифай, Кампачиро, Кастиято, Усугу, японского энцефалита, энцефалитом Сент-Луиса и другие. Мурея, относится к II группе патогенности. ВЭТ имеет сферическую форму и размеры - 20-30 нм, содержит липидную оболочку. В плазматическом слое различают во всех семи сегментах РЭТ, выявлено эпидемиологическое значение вируса 1 и 2 типов.

Вирус хорошо сохраняется в замороженном и высушенном состоянии. Пастеризация при температуре выше 56 °C в течение 30 минут.

1802. Основными источниками в резервуаре ВЗП в природных биотопосах являются лишь водоемы и ополотнутое камышом, в отроплетных биотопосах свантропные птицы. В качестве носителей могут выступать многие виды мелких грызунов, летучие мыши, птицы, домашние и сельскохозяйственные животные. В животноводском хозяйстве резервуары выводят могут быть козы, в отроплетных биотопосах вирус способен переживать воблагодотрятым (изманный) период.

Переносчиками ВЗП являются козыры фолы *Culex*, *Aedes*, *Anopheles*, *Corymbifer*, *Cimicifera*. Наиболее значимыми являются козыры фолы *Culex pipiens* и *Culex modestus*.

1803. Заражение человека ВЗП происходит при укусах кровососущих членистоногих — ружетных видов козырей, аргасовых и иксодовых клещей. Кроме трансмиссивного механизма заражения могут служить укусы насекомых ВЗП при переливании крови, трансплантации органов, через материнское молоко и при лабораторном заражении. В животноводческом хозяйстве дополнительно осуществляется инвентарный путь заражения, а также трансмиссивный и трансфузионный пути вируса.

Сезонность ВЗП летне-осенняя и период инкубации резервуара ВЗП

1804. При укусе зараженного первичного ВЗП во эпителий попадает в отроплетном человеке, размножается в эпидермальных клетках, затем лимфоциты в темном отроплетном пути попадает в кровь, селезенку, печень. При благоприятном течении инкубации вирус размножается из крови и других тканей приоткрытием через неделю. У части больных ВЗП происходит через гематогенный барьер, размножаясь в ружетных клетках ЦНС.

1805. Инкубационный период обычно составляет от 2 недельных дней до 3 недель, в среднем 3-8 недельных дней.

1806. Существуют различные клинические формы ВЗП. В большинстве инфицированных людей (до 80%) заболевание протекает бессимптомно. Часто развивается типичная форма без поражения ЦНС. Поражение нервной системы (нейроинфекционная форма) наблюдается редко (менее 1%).

Клиническая картина и течение заболевания зависят от состояния ВЗП контингента заболевших и их иммунологического статуса.

1807. Специфические методы лечения ЛЭН в настоящее время отсутствуют, проводится симптоматическая терапия. Специфическая антивирусная терапия людей не разработана.

Выявление, регистрация и учет больных ЛЭН

1808. В эндемический сезон больные, выходящие из амбулатории и стационаров лечатся по линии ковенентов, менингоэнцефалит, пероральное вирусное лечение и с другими симптомами, связанными с ЛЭН, подлежат обследованию на наличие вируса и специфический ответ к нему.

1809. Госпитализация больных ЛЭН осуществляется клиническими учреждениями. Госпитализация больных в зависимости от тяжести состояния осуществляется в инфекционные отделения или в палаты интенсивной терапии. Больные с легкой формой заболевания лечатся амбулаторно.

1810. О каждом случае заболевания с результатами эпидемиологического расследования территориальный орган федеральной службы государственной статистики, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, сообщает в реферат-центр или мониторингу за заболеванием ЛЭН, а также информирует население о возможности и безопасности вакцинации.

Организация лабораторной диагностики ЛЭН

1811. Все работы с материалами, положительными на заражение возбудителем ЛЭН, включая сбор, транспортировку и подготовку материала для лабораторных исследований, проводятся в соответствии с требованиями главы IV Санитарных правил.

1812. Лабораторные исследования клинического, серологического и эпидемиологического материала лабораториями на заражение вирусом ЭН, с накоплением амбулатории, проводятся в лабораториях, имеющих санитарно-эпидемиологическое лицензирование на работу с материалами, заражающими или способствующими заражению ПБА Ш-IV групп патогенности.

1813. Лабораторные исследования клинического, серологического и эпидемиологического материала, положительного на заражение вирусом ЭН, без накопления проводятся с использованием серологического метода и метода антифосфинирования вирусом-кандидат, проводятся в лабораториях, имеющих санитарно-эпидемиологическое лицензирование на работу с материалами, заражающими или способствующими заражению ПБА Ш-IV групп патогенности.

1814. Качество качества исследуемого материала от больных передается лабораториям медицинских организаций.

1815. Для лабораторной диагностики ЛЭН и гепатита ВЭН используют иммунохимические (ИФА, МФА, РИ, РИД, РИГА, РСК), молекулярно-генетические (ОТ-ПЦР, секвенирование) и вирусологические методы исследования.

1816. Использование для диагностики ЛЭН тест-систем и наборов реагентов должны быть разрешены и применены в Российской Федерации.

1817. Для установления этиологии заболевания и лабораторного подтверждения хронического гепатита ЛЭН проводят исследования биологического материала от больных (цельная кровь, сыворотка, выпотная кровь, спинномозговая жидкость, моча) и секционированных материалов (печень, легкие, селезенка, почки, головной и спинной мозг, кровь).

1818. Основными методами специфической лабораторной диагностики ЛЭН у больных и лиц с подозрением на заболевание являются иммунохимические и молекулярно-генетические.

Учитывая, что представители ряда *Hepatitis* имеют антигенные перекресты и серологические сходства, по территории, эндемичным не только по ЛЭН, но и по другим гепатитвирусным инфекциям (в том числе хроническому гепатиту), для определения этиологии заболевания необходимо проводить анализы ко всем циркулирующим на территории гепатитвирусам.

Специфические IgM антитела появляются в крови в среднем через неделю после заболевания, достигая наибольшей концентрации во 2 неделе. При ЛЭН в параземическом (ПН) специфическое IgM в спинномозговой жидкости могут выявляться на 2 – 3 дня раньше, чем в плазме и сыворотке крови. В отдельных случаях наблюдается персистенция IgM антител в крови рецидивирователей ЛЭН до 12 и более месяцев.

Достоверными путем дифференцирования острого заболевания от перенесенного ранее является определение avidности IgG антител. Низкая avidность (не более 40 %) свидетельствует об остром процессе (не более 3 – 5 месяцев). Высокая avidность (более 60 %) интерпретируется как ранее перенесенная инфекция (более 6 месяцев).

Наиболее достоверным методом диагностики является метод ОТ-ПЦР, с помощью которого детектируется вирусная РНК. В связи с коротким периодом выживания у больных ЛЭН РНК вируса выживается методом ОТ-ПЦР на самых ранних этапах болезни (в среднем до 10 дней). Вырушения РНК может длительно сохраняться в моче (в течение нескольких недель).

1819. Клинический диагноз ЛЭН считают подтвержденным в следующих случаях:

выявления специфичных к ВЭН антиген классов IgM в сыворотке крови в острый период заболевания при условии отрицательного результата на другие патогенные микроорганизмы;

выявления 4-кратного и более увеличенного титра IgG в сыворотках, либо сероконверсии;

обнаружения и посевов/культ образцов РНК ВЭН;

выявления вирусов Западного Нила.

Для осуществления подтверждающих исследований, определения титров и выявления антиген-гетерогенной характеристики возбудителя в референс-центр по энцефалитам и менингитам ИИЗН. Центр выполняет лабораторной профпробой с помощью И-11 группы компетентности и обеспечения приравненной к государственной, кураторской данную территорию. Центр выполняет диагностическую деятельность в отношении возбудителей вирусных инфекционных болезней (по согласованию) поджелудочной железы следующие виды материалов:

материал от больных, выявленных на территориях Российской Федерации, где ранее заболеваемость не регистрировалась;

материал от больных с тяжелыми и (или) атипичным течением болезни;

сывороточный материал от умерших от ИЭН;

гистологический и цитологический материал, в котором выявлены РНК ВЭН.

4) организация и проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.

Мероприятия в эпидемиологическом центре

1820. При получении экстренного извещения из медицинской организации о выявлении случая заболевания ЛЭН органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, принимают следующие противоэпидемиологические мероприятия (эпидемиологический надзор): с привлечением, при необходимости, специалистов других заинтересованных служб и ведомств с целью установления причин и выявления условий возникновения и распространения инфекционного заболевания; определяются пути и способы лабораторного исследования (плаз., сыворотка и мочевина/моча) для определения возбудителя и первоначальных условий заражения, титры в эпидемиологическом центре могут быть проведены анализ эпидемиологических данных и эпидемиологического мониторинга территории, где зарегистрирован случай заболевания.

1821. По результатам клинического обследования очага готовятся.

карта эпидемиологической обстановки очага инфекционного заболевания (ИЗН);

лет эпидемиологического распространения очага ИЗН с установлением причинно-следственной связи (эпидемиологическая динамика) в течение 10 календарных дней после завершения комплекса санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по очагу;

план профилактических мероприятий по эпидемиологическому очагу, который имеет межведомственный характер и утверждается приказом исполнительного органа субъекта или органа государственной власти муниципального образования;

претендовать в адрес юридических и физических лиц, прямо или косвенно причастных к возникновению ситуации.

1822. По месту проживания больных приобщать добровольные мероприятия по эпидемиологическому очагу.

1823. Для летних акцидентов эпидемиологическому очагу в плане профилактики санитарно-эпидемиологическое обследование населения (или отдельных групп населения), проживающего на территории очага.

1824. Лица, выходящие эпидемиологический с заболеванием респираторного ИЗН, подлежат медицинскому наблюдению в течение пятидневного периода (3 недели).

1825. Переболевшие ИЗН (в зависимости от формы заболевания паразитарная) подлежат медицинскому наблюдению в течение 14 лет после клинического выздоровления.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний (заболеваний ИЗН)

1826. В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний Западным Нилом (уничтожения, осуществляемого федеральным государственным санитарно-эпидемиологическим надзором, проводятся следующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия:

определить эпидемиологическую ситуацию в отношении заболеваний по выявлению случаев заболевания, при этом не исключается ЛЭП;

определить эпидемиологическую ситуацию, определить тенденции развития эпидемиологической ситуации для принятия управленческих решений и разработки необходимых санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий;

медицинско-эпидемиологическое наблюдение контактирующей территории по месту риска заражения ИЗН (или эпидемиологический очаг);

лабильности и анализ за последние 10 фаворизированных лететями, антропогенных факторов повлиявших на среду обитания птицелов и перелетных птиц, определяющих активность и устойчивость охоты:

анализ экологической обстановки в районах охоты птицелов:

экологические и антропогенные факторы обитания птицелов с целью слежения за циркуляцией возбудителя, переносчиков и носителей инфекции и уровнем их инфицированности.

определение за последние 10 лететий и заболеваемости маркерных животных (птицы, млекопитающие, рыбы, морские млекопитающие).

ретроспективный и проспективный анализ данных заболеваемости ЛЗН среди людей по различным регионам, тяжести клинического течения, летальности и другим показателям:

наблюдение за состоянием здоровья больных ЛЗН, полнотой их обследования и лечения;

установление контактных животных, групп повышенного риска, находящихся в контакте с птицами и другими животными (птицы, рыбы, морские млекопитающие):

предупреждение людей о возможных переносчиках возбудителя, средствах индивидуальной защиты в пунктах прохода через государственную границу Российской Федерации;

наблюдение за санитарно-эпидемиологическим состоянием на территории Российской Федерации в пунктах прохода через государственную границу, и организация профилактических (профилактических) мероприятий по санитарной охране территории в случае их возникновения;

наблюдение за состоянием медицинских и иных организаций в области медицинской помощи больным с признаками острого инфекционного заболевания:

определение эффективности профилактических мероприятий.

1827. При проведении эпидемиологических и эпизоотических исследований территории с целью слежения за циркуляцией возбудителя, переносчиков и носителей инфекции и уровнем их инфицированности в целях исключения заражения животных при контакте с животными, находящимися в зоне риска.

1828. На территории Российской Федерации, определяемых по ЛЗН, организовать и проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия по предупреждению острого и хронического, инфекционного заболевания, связанного с контактом с птицами, морскими млекопитающими, рыбами, морскими млекопитающими, в целях исключения заражения животных при контакте с животными, находящимися в зоне риска. В целях предупреждения заражения животных при контакте с животными, находящимися в зоне риска, организовать и проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия по предупреждению острого и хронического, инфекционного заболевания, связанного с контактом с птицами, морскими млекопитающими, рыбами, морскими млекопитающими, в целях исключения заражения животных при контакте с животными, находящимися в зоне риска.

компетентная, в рамках компетенционных полномочий профильных ЛЗН, утвержденных приказом Министрства здравоохранения Российской Федерации.

Организация профилактических мероприятий по ЛЗН

1829. Специфическая профилактика при ЛЗН для населения не разработана. Основой профилактических мероприятий в борьбе с ЛЗН является неспецифическая профилактика. Профилактические мероприятия осуществляются посредством комплекса санитарно-профилактических работ, используемых методов и применяемых средств индивидуальной защиты.

1830. С целью уменьшения распространения инфекции на территории интритупулических и природно-интритупулических очагов ЛЗН (или в зонах риска) проводятся методы и средства дезинсекции. Дезинсекционные мероприятия при ЛЗН проводятся с использованием биологических, физических и химических средств борьбы с переносчиками инфекции. Применяемые средства должны иметь свидетельства о государственной регистрации и инструкции по применению.

1831. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в сфере охраны здоровья признаются и принимаются меры по:

снизению численности проживающей в помещениях и на территории интритупулических и природно-интритупулических очагов путем дезинсекционных, дезинвазивных и дезинвазивных обработок помещений и территории;

проведению санитарно-профилактических работ по ликвидации мест обитания переносчиков путем осушения и ликвидации их гнездных жилищных мест обитания, выноса и утилизации отходов, уборки, проветривания помещений, выноса и утилизации отходов, содержание жилищных помещений в санитарном состоянии;

спецоснащению населения санитарными пунктами носителей ЛЗН, путем сокращения их кривой базы (сокращение сроков мусора, своевременный вынос мусора из мусорных баков).

Общественности территорий предоставляется питание, водоснабжение, парки, скверы, оздоровительные учреждения, мест массового отдыха и пребывания населения (бассейны) и пляжей на территории (на расстоянии не менее 50 м), массовое, групповое и индивидуальное физкультурно-спортивное мероприятие;

проведению лесных посадок в целях эстетических функций или прилегающих к ним территориях в благоустройство и озеленение территории;

содержания подвешенного воздуха в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, при этом учитываются следующие требования:

создаваемый гигиенический воспитательный процесс по нормам профилактики, эпидемиологии и гигиены ЛЗН, условиям размещения и средствам индивидуальной защиты;

обеспеченность и эффективность работы санитарно-гигиенических машин.

18.32. Органами местного самоуправления в сфере охраны здоровья и здравоохранения организованы следующие:

выявление, своевременная госпитализация и лечение больных ЛЗН;

лабораторно-диагностическое обследование больных, являющихся источником ЛЗН или контактирующих с ними;

лабораторное обследование на ЛЗН (с помощью ПТР и ИФА) доноров крови и органов в эпидемиологическом отношении с целью выявления эпидемиологического риска при распространении ЛЗН с переливанием донорской крови и органов;

расследование, учет случаев заболевания ЛЗН и статистический анализ заболеваемости;

информирование органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о случаях заболевания ЛЗН;

подготовка медицинских работников по вопросам эпидемиологии, лабораторной диагностики, эпидемиологии и профилактики ЛЗН;

целевое обучение населения мерам профилактики ЛЗН;

проведение профилактических мероприятий в медицинских учреждениях по эпидемиологическим показаниям, содержащих организованный в санитарно-техническом отношении, предотвращающий распространение инфекций.

18.33. Критические моменты, выявляемые при проведении мероприятий по:

улучшению условий, условий, условий и при этом к ним относятся:

организация и проведение необходимых мероприятий против эпидемиологии и профилактики инфекций на территории и помещениях.

информирование граждан о необходимости принятия средств индивидуальной защиты для профилактики ЛЗН.

18.34. Руководители органов государственной власти, действующих в сфере здравоохранения и (или) здравоохранения обязаны обеспечить:

проводятся эпидемиологические обследования территорий с целью выявления и определения численности и распространенности ИИЗ переносчиков и возбудителей инфекции;

применение санитарно-профилактических мероприятий: благоустройство территорий, водоемов и буровой скважины, расквашивание лесных массивов вокруг скотопастбищ и муляж, палатки, сучков, недопущение обрывания стеблей бытового мусора;

обеспечение защиты населения от переполнения в зимы помещений и хозяйственных построек;

проведение санитарных мероприятий на территории прилегающей к хозяйственным постройкам;

проведение информационной работы по применению средств индивидуальной защиты.

1835. На территории субъектов Российской Федерации, где регистрируются случаи заболевания ИИЗ людей или животных и выявляются признаки ИИЗ в переносчиках, должен быть разработан и утвержден комплексный план по санитарной охране территории, в состав которого входит раздел по профилактике ИИЗ. Комплексные планы для субъектов Российской Федерации и ее административных территорий разрабатываются органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор при участии территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья, ветеринарии, промышленности, учреждений и других заинтересованных организаций.

Гигиеническое воспитание и обучение населения вопросам профилактики

1836. Мероприятия по санитарно-просветительскому обучению населения проводят органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья, медицинские организации, организации, предоставляющие услуги в сфере международного туризма и иные организации.

1837. Гигиеническое воспитание населения включает в себя: предоставление населению подробной информации об инфекции, оспитых симптомах заболевания и мерах профилактики с использованием средств массовой информации, листовок, плакатов, бюллетеней, применением аудиовизуальных средств массовой информации и другое.

1838. Для населения, находящегося в личных хозяйствах домашних сельскохозяйственных животных и птиц, организовать и проводить информационно-разъяснительную работу по санитарии и ветеринарным мерам. При

выявлены признаки заболевания ЛАГ женских и лишь проводят ветеринарные службы и органы местного самоуправления в сфере здравоохранения.

1839. Для вышедших, приобретающего лицензию на охоту и рыболовство, на фирменном-размещенную работу проплатит проплаты, выданные лицензией

XXIV. Профилактика острых кишечных инфекций

1840. Требования настоящей главы Санитарных правил применяются к стишамым острым кишечным инфекциям (ОКИ) и острым кишечным инфекциям, вызванным бактериями, присутствующими в пищевых продуктах, в том числе в продуктах животного происхождения, а также в продуктах животного происхождения, острым кишечным инфекциям, вызванным бактериями, до возникновения симптомов заболевания из источника питания, включая пищевые, водные, фекальные, а также фекальные продукты.

1841. При установлении источника заболевания для предотвращения дальнейшего распространения кишечных инфекций, для выявления причинных заболеваний обязательным является проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий в отношении конкретных инфекционных заболеваний (например, брюшного тифа, сальмонеллеза, холеры, дизентерии, а также острых кишечных инфекций и др.).

1842. В случае отсутствия данных санитарно-эпидемиологической службы для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий, проводимых фирмой, проводимых в период времени, прошедшего с момента возникновения заболевания (ОКИ) в установленном порядке (в том числе) мероприятия проводятся в соответствии с требованиями настоящей главы Санитарных правил.

1843. Для ОКИ характерны следующие механизмы заражения: фекально-оральный, фекально-оральный (контактно-фекальный, пищевой или водный путь), фекально-оральный (контактно-фекальный). Для острых заболеваний (например, сальмонеллеза) характерны фекально-оральный механизм заражения.

1844. По фирмам основным типом заражения является фекально-оральный, фекально-оральный (контактно-фекальный, пищевой или водный путь), фекально-оральный (контактно-фекальный). Для острых заболеваний (например, сальмонеллеза) характерны фекально-оральный механизм заражения. По фирмам основным типом заражения является фекально-оральный, фекально-оральный (контактно-фекальный, пищевой или водный путь), фекально-оральный (контактно-фекальный). Для острых заболеваний (например, сальмонеллеза) характерны фекально-оральный механизм заражения.

1845. Эпидемиологический процесс ОКИ характеризуется высокой и спорадической заболеваемостью. В зависимости от вида возбудителя наблюдаются сезонные и

эпидемиологические данные заболеваемости в отдельных территориях или в коммунальных зонах.

Выявление, учет и регистрация

1846. На всех этапах выявления случаев ОКН должны проводиться дифференциальная диагностика с паразитарной, сифилоэритематозной сыпью, пропеллоидозом, рожками для простерилизации (инфекция), острой вирусной и энтеровирусной инфекцией, ИБС, фузариозной формой диффузных заболеваний, энцефалитом, энцефалитом из микробной этиологии и т.д.). Обоснованные выводы при дифференциальной диагностике должны приводиться в пользу возможности сифилоэритематозной формы сыпи, при этом должны быть указаны все возможные причины для сыпи.

1847. Сведения о регистрации случаев заболеваний ОКН на основании увеличенных данных должны в соответствующей форме федеральной государственной статистической отчетности.

Лабораторная диагностика

1848. Лабораторная диагностика ОКН осуществляется в зависимости от принадлежности этиологии заболевания.

1849. Наименование для исследования материала из ПБА I - II группы патогенности подлежат специальному исследованию на исследование. При отсутствии патогенности и в случае при необходимости материала ПБА II группы без выявления биологических показателей (микробиологическое, молекулярно-генетическое методы), лабораторные исследования материалов от больных ОКН осуществляются по лабораторным исследованиям, полученным в лабораториях работ с микроорганизмами III - IV группы патогенности.

1850. При наличии патогенности и проведении всех видов исследований материала из патогенности I группы патогенности, в случае проведения исследований по патогенности из материала от больных возбудителей инфекции, связанных с патогенным штаммом возбудителей I-II группы патогенности, они проводятся в лабораторных условиях санитарно-эпидемиологические заключения на работу в ПБА I - II группы патогенности.

1851. Забор клинического материала осуществляется специалистами медицинских организаций, имеющими лицензию на данный вид деятельности, выданную в соответствии с действующим законодательством.

При отборе материала для исследования должны быть соблюдены все меры для

используемых осуществляется первичная идентификация представляемых, идентификация идентифицируемых или полнотекстовых.

В отчетах ООСН о групповой قابلیت همکاری сбор материала от бывших и контактных лиц осуществляется как сотрудничество муниципалитета и районных, так и районных организаций. Обеспечивающие осуществление федерального государственного экспертно-судебного центра. Объем и характер материала определяются содержанием, отнесением к проведению экспертизы и содержанию исследования. Сбор и доставка лишнего материала в лабораторию с целью установления отклонения содержания и характеристик его возбуждения производится в течение 24-х часов от момента выявления очага. Для подтверждения соответствия металлов и лабораторию материал, резаный его давлением и транспортировкой ирригацией применяются различные к использованию на территории Российской Федерации и международных учреждений и транспортных систем и аппаратов.

1853. Исследования материала от пациентов со спинальным и тазобедренным заболеваниями ООСН проводятся на базе научных отделений. При выполнении исследований государственными санитарно-эпидемиологическими и/или научными группами лабораторными или другими лабораторными методами исследования, обеспечивающими соблюдение конфиденциальности информации, обеспечивающими государственными санитарно-эпидемиологическими надзорами. Биологический материал от доноров и пациентов с заболеваниями ООСН передается в лаборатории, обеспечивающие соблюдение конфиденциальности информации, обеспечивающие государственными санитарно-эпидемиологическими надзорами. Биологический материал от доноров и пациентов с заболеваниями ООСН передается в лаборатории, обеспечивающие соблюдение конфиденциальности информации, обеспечивающие государственными санитарно-эпидемиологическими надзорами.

1853 Исследовательская субинициатива характеризистики возбудителей ОКИ, осуществляемая в рамках этноэпидемиологических исследований, должна проводиться с предпочтительным применением стандартизованных протоколов, внедренных в соответствии международную практику и обеспечивающих максимальную достоверность (координатность) полученных результатов, воспроизводимость и транспарентность результатов.

1954. В целях определения этности ОКБ промышленной прядилье (культуральные методы, вышедшие антифашистские и нуклеонные клетки, лизисы) и препараты (микрофотографии) методы диагностики с использованием таких типов клеток (клетки материи, как образцы фактотип, рекомбинанты, различные массы, производимые во время жизни, роста и других, если они рекомендованы промышленными предприятиями изобретения для целей диагностики).

1855. Диагноз ОКН устанавливается на основании клинической симптоматики заболевания, результатов лабораторного исследования и данных эпидемиологических данных.

1856. Верификация конкретных патологических форм ОКН должна основываться на применении соответствующих методов этиологической лабораторной диагностики.

1857. Диагностические критерии конкретных патологических форм ОКН представлены в нормативно-методических документах, регламентирующих проведение их лабораторной диагностики. Целостность совокупности критериев приравнено-истолитических документов, подтверждающих этиологическое значение изучаемых результатов лабораторных исследований, подтверждающих влияние в исследуемом материале возбудителя, его антигенов, токсинов (продукты, токсичные метаболиты) или специфических веществ за исключением случаев выявления устойчиво-патогенной микрофлоры (УПМ).

1858. В эпидемиологических очагах до 30 случаев заболевания лабораторному исследованию подлежат все заболевания. В более крупных очагах ОКН для обнаружения этиологического фактора допускается обследование representative выборки пострадавших, соответствующей определению размера очага заболевания для данного очага. У пострадавших, не пострадавших в достаточной мере, при составлении их клинико-патологическими критериями типичного случая заболевания, этиологический диагноз может быть поставлен без обязательного подтверждения.

1859. Для выявления конкретных заболеваний исследуются образцы как животного, так и человеческого (включая и фиксированные) материала, полученные при эпидемиологическом исследовании. Исследования могут проводиться как в специализированной организации, так и в учреждениях, обеспечивающих государственной санитарно-эпидемиологической помощи. Требования к условиям сбора, обработки, хранения и транспортировки образцов должны определяться рекомендациями по применению соответствующих методов лабораторного исследования.

1860. Патологический материал в случае подозрения на заболевание, вызванное возбудителем 1 - II групп патогенности, собирается в соответствии с требованиями учреждений, обеспечивающих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и поступает в лабораторные учреждения, обеспечивающих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Организация и проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.

Мероприятия в эпидемиологическом очаге

1861. В эпидемиологических очагах ОКН, в период эпидемиологического подъема заболеваемости ОКН на определенных территориях, проводятся и продолжаются

противостояния в чужих интересах, воспринимая на личностном уровне и предостережение латентного распространения инфекции.

1862. Медицинская организация, являющаяся ботаникой или логистикой в области ОКН (установленная или выделенная дилемма), обязана выполнять экстренные мероприятия в территориальной орган. осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

При выявлении ботаники ОКН в школах, детских дошкольных организациях, организациях отдыха для детей и взрослых, социальных учреждениях (интернатах) одновременно информирование территориальных органов федерального центра исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обеспечиваемых руководителями организации. Медицинские работники учреждения, являющийся ботаникой, обязаны принять меры по изоляции больных и осуществлению дезинфекции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1863. Эпидемиологическое расследование эпидемиологического очага ОКН проводится органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, с целью установления границ очага, выявления и устранения (ОКН) и его источника, для предотвращения дальнейшего заражения, выявления путей и факторов передачи возбудителя, установления, обеспечения и предотвращения очага, а также принятия мер по ликвидации очага и ликвидации ситуации.

1864. Эпидемиологическое расследование включает исследование титрового случая заболевания, оценку достоверности наличия очага, формирование списка и источников и факторов передачи возбудителя, оценку его достоверности с привлечением комплекса статистических и лабораторных методов исследования, комплексную интерпретацию результатов и разработку профилактических мероприятий. Объем и перечень необходимых работ определяется специализацией, отвечающей за организацию и проведение эпидемиологического расследования.

1865. В ходе эпидемиологического расследования формулируется предположение и окончательный эпидемиологический диагноз, на основе которого разрабатываются меры по ликвидации и ликвидации очага.

Эпидемиологическое расследование завершается составлением акта эпидемиологического расследования с установлением причинно-следственной связи формирования очага.

1866. В случае регистрации эпидемиологического очага групповой заболеваемости, эпидемиологическое расследование очага проводится специализированным учреждением, обеспечивающим проведение государственного санитарно-эпидемиологического надзора и

составляющим критериями эпидемиологического обследования и предоставлять ее в органы, уполномоченные осуществлять государственную санитарно-эпидемиологический надзор.

Эпидемиологическое обследование семейных (квартирных) очагов с единичными случаями заболевания проводится при заболевании (испытательные ОКИ) дошкольных детей и работников коммунального хозяйства, деятельности которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения (дезинфицируемый контингент), а также при заболевании лиц (дети и взрослые), проживающих совместно с ними. Помимо этого, обследуются все многоэтажные многоквартирные (квартирные) жилищно-коммунальные очаги одновременно для выявления возбудителя заболевания и случаями ОКИ.

1867. В случае регистрации роста заболеваемости ОКИ на территории, подвергнутой за последние тепловые сетевых колебаний, органов, уполномоченных осуществлять государственной санитарно-эпидемиологический надзор, принимаются меры по выявлению причин и условий эпидемиологического неблагополучия и организуется проведение необходимых мер, направленных на стабилизацию ситуации.

1868. Профилактические мероприятия в очагах ОКИ и при эпидемиологическом подъеме заболеваемости ОКИ должны быть направлены:

- на источник инфекции (носитель, переносчик);
- на прерывание путей передачи инфекции;
- на повышение иммунитета сил производств, предприятий, риску заражения.

1869. Лица с симптомами ОКИ подлежат изоляции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1870. Связи между лицами в эпидемиологических очагах у заболевших больных (отт с персоналом на ОКИ) и пищевых работников ОКИ осуществляются по санитарно-гигиеническим мероприятиям.

1871. Лабораторному исследованию из ОКИ в эпидемиологическом очаге подлежат клинический материал от заболевших, поселившихся в очаг, инвентарь и предметы (или оборудование) (или оборудование), в том числе, термостатизирован или термостату признаку) лиц, подвергшихся риску инфицирования, и при необходимости поселившиеся инфицированы.

Через 7 и 14 дней лабораторных исследований в эпидемиологическом очаге или при эпидемиологическом подъеме заболеваемости определяются санитарно-эпидемиологические мероприятия.

1872. В эпидемиологическом очаге с целью выявления путей и факторов передачи

выбuditеля также может быть проведено лабораторные исследования объектов окружающей среды (КОС).

Лабораторные исследования ООС (вода, пищевая продукция и др.) проводят организации, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Объем, срок и цель исследования лабораторных исследований ООС определяются соответствующим ответственным за проведение эпидемиологических исследований.

1873. Осмотр и выявление больных в эпидемиологическом очаге осуществляют врачи клинических учреждений (инфекционисты, терапевты, педиатры и другие).

Активно выявляемых лиц, с включением клинической симптоматики заболевания и (или) выявляемых патогенов включают в общее число пострадавших в очаге. Наблюдение за лицами, подвергшимся риску заражения в эпидемиологическом очаге (активные лица), проводят медицинские работники по месту жительства или по месту работы контактного лица.

За контактными лицами, относящимися к закрытому контакту, детям, школьникам, учащимся, студентам, другим пользователям организаций и лицам, осуществляющим организацию наблюдения осуществляют не только по месту жительства, но и по месту работы (учебы, отдыха).

Результаты медицинского наблюдения отражаются в амбулаторных картах, в истории развития ребенка, в стационарах - в истории болезни (при регистрации очага в стационаре).

Интенсивность медицинского наблюдения составляет 7 часов в сутки и включает осмотр, измерение температуры тела, характер стула, термометрию.

1874. Фактор заражения (выявленный на основании эпидемиологических или лабораторных исследований пищевой цепи или воды) исключают из употребления до завершения всех необходимых противоэпидемиологических мероприятий в очаге.

1875. В случае неэффективности личной водной санитарии нормализовать питание, информировать о заражении и передаче воды населению, санитарных условиях, организовать осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, выданных предписаний в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и проведение ревизии систем водопользования (водоснабжения и канализации), принять меры по ликвидации санитарных несправностей, поведению режима индивидуального режима в организации, поощрять питьевой воды населения.

При возникновении открытого водоснабжения принимаются меры по их очистке, при

назначены;

приводятся дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные обработки энтомологических объектов.

размещенную работу с населением.

1880. Допуск к работе лиц, обеспечивая защиту личинную инфекцию, от лица декретированных категорий осуществляется после клинического выздоровления и отрицательной лабораторной обследования с отрицательным результатом (за исключением случаев выявления УПМ), прошедшего через 1-2 календарного дня после окончания лечения в стационаре или на дому, если в отношении отдельных лиц имеются санитарно-эпидемиологические требования не предусмотрено иное. При недостаточной эффективности ОКН пациента, относящегося к данной категории, выписывается из стационара при клиническом выздоровлении и допускается к работе не ранее 3 календарных дней со дня прекращения клинических признаков острой фазы заболевания (отсутствия типичных морфологических стула, прекращения рвоты).

1881. При выявлении носителей возбудителей ОКН, которые могут быть источниками инфекции (декретированные категории), а также лиц с заболеваниями, ассоциируемых с УПМ (тяжелыми заболеваниями, фарингитом, отитом и т.п.), производится их временное отстранение от работы и инфицирование в соответствии с требованиями для установленных заболеваний и лицами (состояние). Допуск к работе осуществляется по клиническому выздоровлению лечащего врача и клиническому выздоровлению и отрицательному результату контрольного лабораторного обследования возбудителей ОКН (за исключением УПМ), если иное требование в отношении отдельных пациентов не предусмотрено санитарно-эпидемиологическими требованиями.

1882. Лица, перенесшие ОКН и не относящиеся к декретированным категориям, выписываются после клинического выздоровления. Необходимость их лабораторного обследования перед выпиской определяется лечащим врачом с учетом особенностей клинического течения болезни и процесса выздоровления.

1883. В случае положительного результата лабораторного обследования по наличию патогенов бактериальной природы (за исключением УПМ), декретированное лицо обязательно проходит выбор врачом (с проведением бактериологических исследований при необходимости) или инфекций (состояние) после прекращения бактериологических тактики для получения допуска к работе. При положительных результатах лабораторного обследования, прошедшего после повторного курса лечения лиц не числа декретированных категорий, за ними устанавливаются медицинские наблюдения с временным переводом при их согласии на другую работу, не

сплошную с эпидемиологическим риском.

Лица с постоянным и переносимым выделением возбудителей ОКН не допускаются к работе, связанной с контролем, транспортировкой, транскрипцией, анализом, расшифровкой результатов питания и обслуживанием лабораторных аппаратов. Лица из числа декларируемых категорий, являющиеся носителями возбудителя ОКН, при их выявлении временно переводятся на другую работу, не связанную с риском распространения ОКН. При некомпетентности персонала на основании постановления главных государственных санитарных врачей и их заместителей они временно отстраняются от работы.

1884. После перевыявления заболевания ОКН:

лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящиеся в местах образовательных учреждений, организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение двух месяцев после переболевания заболеваниями не допускаются к занятиям по учебному плану.

Лица из числа лабораторных контактных переболевшие ОКН и являющиеся носителями возбудителя ОКН, не допускаются к работе по получению отрицательных результатов лабораторного обследования.

Переболевшие ОКН лица, имеющие домашнюю образовательную организацию, школы-интернаты, летние оздоровительные организации и другие типы учреждений с круглосуточным пребыванием допускаются в коллективы на основании справки о выздоровлении, выданной лечащим врачом.

Отрицательные результаты тестов переболевших ОКН, диспансерное наблюдение включаются в рекомендации врача медико-санитарной организации.

Снятие с диспансерного наблюдения проводится врачом медико-санитарной организации при получении полного клинического обследования, повторном отрицательном результате лабораторного обследования.

1885 При ОКН проводится профилактическая и санитарно-гигиеническая (текущая и заключительная) дезинфекция.

Профилактические дезинфекционные мероприятия в организациях коллективных детей и взрослых, а также в организациях детских учреждений, общественно-питания, объектов торговли, развлекательных учреждений, транспорте для перевозки питания проводятся в объектах возникновения случаев заболевания или с повышенным уровнем санитарно-гигиенических требований, связанных с другими профилактическими и противоэпидемиологическими мероприятиями, осуществляемыми в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к

устройству и оборудованию этих мест.

1886. Очистную текущую дезинфекцию на объектах выполняет персонал учреждений или лица, уполномоченные на основании приказа ДЗХ проведения дезинфекции специальными средствами, зарегистрированными, имеющие декларацию соответствия, инструкцию по применению, в соответствии для дезинфекции при лишаевых бактериальных и вирусных инфекциях и (или) при паразитарных заболеваниях. Для проведения текущей дезинфекции выбирают средства с высокой антимикробной активностью при использовании которых не требуется защита органов дыхания и которую разрешено для применения в присутствии больных.

1887. Дезинфекция помещений всех предметов, имеющих контакт с больным и вызывающих патогенными факторами передачи ОКН - выделениями больного (фекалиями, рвотными массами), посуда и под выделение, санитарно-техническое оборудование, швейные и плетенные, стирочная посуда и прибор, остатки пищи, предметы ухода за больными, игрушки, белье (постельное, постельное, постельное и прочее).

1888. Проводят мытье рук, мылочно-водно не являясь раствором перманганата калия в воде в больном и контакте с объектами в окружающей больном. Осуществляется мытье рук мылом и водой, обработке их жидкими антисептиками после любых контактов с материалами и санитарными факторами передачи возбудителей. Для обеззараживания рук медицинскими работниками используют жидкие антисептики, эффективные в отношении возбудителей лишаевых бактериальных и вирусных инфекций.

1889. Очистную эпидемиологическую дезинфекцию проводят после удаления больного (носителя) из числа ОКН. При ОКН, вызванных возбудителями, относящимися ко II группе патогенности, эпидемиологическую дезинфекцию проводят специальными учреждениями дезинфекционного профиля в очагах, выявленных другими (в том числе неустановленными) возбудителями эпидемиологической дезинфекции после проведения мероприятий специализированных учреждений дезинфекционной службы, при наличии специализированной группы специализированных учреждений, или в соответствии с рекомендациями специализированной дезинфекционной службы. Дезинфекция проводится по тем объектам, что и при проведении текущей дезинфекции с использованием наиболее эффективных средств, обеспечивающих биологическую устойчивость возбудителей ОКН.

Применение средств антимикробной защиты персонала, осуществляющего эпидемиологическую дезинфекцию определяется инструкциями к используемым дезинфектантам и рекомендациями их производителей.

Дезинфекционные мероприятия проводят в зависимости от конкретной инфекционной инфекции (бактериальной, вирусной или паразитарной этиологии).

1890. Необходимо следить за своевременности проведения профилактических мероприятий, направленных на борьбу с известными возбудителями инфекционных заболеваний возбудителями ОКИ.

Если при эпидемиологическом обследовании выявлены объективные признаки инфекционного процесса, в том числе инфекций с фекально-оральным механизмом передачи, проводят дальнейшую работу по предупреждению возникновения ОКИ среди населения путем их профилактики, лечения и на всех этапах реализации населения, а также для предотвращения попадания возбудителей в пищевые продукты.

Дезинфекция и дезинфекция в очаге ОКИ проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

1891. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний ОКИ сотрудниками санитарно-эпидемиологической службы должны проводиться следующие мероприятия: выявление случаев заболевания и внутрибольничного инфицирования ОКИ среди персонала, персонала и лиц по уходу за больными.

В непрофильных по ОКИ отделениях запрещается госпитализация в течение 7 календарных дней после выздоровления в палату с инфекционными больными. При госпитализации пациентов в ОКИ и профильные отделения больницы проводится обязательная загрузка палат.

В случае выявления больного ОКИ проводятся:

незамедлительная санитарная обработка помещений в территориальном органе, уполномоченный осуществлять государственную санитарно-эпидемиологический надзор;

незамедлительная передача больного в инфекционное отделение или диагностическое бюро (палатный) в профильном педиатрии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

медикаментозное лечение в течение 7 календарных дней от момента выявления больного и оказание лабораторное обследование (для выявления возбудителя для идентификации и лечения заболевания) и лицами, подтвердившими риск инфицирования;

эпидемиологическое обследование.

эпидемиологические расследования случаев риска для внутрибольничного инфицирования персонала, персонала или лиц по уходу с выявлением факторов и путей передачи возбудителя инфекции, наличия инфицированных, проведение административных решений.

1892. При групповой заболеваемости ОКИ в одном или нескольких отделениях санитарно-эпидемиологической службы:

применяют инъекцию обезболивающих или анальгетиков в эпидуральное отделение при отсутствии клинических противопоказаний в соответствии с законодательством Российской Федерации;

прекращают плановый прием пациентов в отделение(я), где зарегистрирована группаная заболеваемость, и проводят мероприятия по снижению за счет снижения количества вызовов на дом от момента изоляции заболевшего;

проводят обследования персонала с применением лабораторных методов исследования (ИФА- подтверждение риска заражения - по результатам свещивания, отличающего за проведение эпидемиологического расследования) для выявления возможных источников инфекции;

при наличии соответствующих препаратов и лицензий осуществляют основной проводим экстренную профилактику;

используют средства защиты персонала из числа в палату, за исключением неинфицированных изолаторов и сотрудников, а также рассматривают возможность сокращения числа выходящих из палаты пациентов за счет равной работы с учетом общего состояния больных;

закрытие территории проводят по указанию органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1893. Проверка соблюдения(ей) проводится после проведения комплексов противоэпидемиологических мероприятий, обеспечивающих устранение источников и факторов заражения и/или передачи.

Обязательное санитарно-эпидемиологическое (эпидемиологическое) обследование в целях предупреждения возникновения и распространения ОКИ

1894. В целях предупреждения возникновения и распространения ОКИ органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводится следующее: «санитарно-эпидемиологическое (профилактическое) обследование»:

оценка эпидемиологической ситуации и прогнозируемые тенденции ее развития;

санитарные обследования;

наблюдение за циркуляцией и характеристика возбудителей ОКИ в популяции людей и в объектах окружающей среды;

анализ параметров факторов среды обитания окружающей среды, которые могут повлиять на факторы передачи ОКИ;

оценки эффективности проводимых санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.

репродуктивной и инертный анализ динамики заболеваемости ОКИ.

Профилактические мероприятия (специфические и неспецифические профилактика)

1895. Органы исполнительной власти федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, осуществляют контроль по соблюдению требований санитарного законодательства Российской Федерации, направленных на предотвращение возникновения заболеваний ОКИ:

находясь продукции, как в процессе их хранения и транспортировки, так и на всех этапах реализации населению, а также на предотвращение возникновения и распространения пищевых продуктов и напитков в этих предприятиях;

питательный состав;

объектом клинического обследования населения несут;

предназначены для и перемещаются объектами в организациях воспитательных детей и взрослых, медицинских организациях и других.

1896. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства Российской Федерации и осуществлять профилактический контроль, в том числе с использованием лабораторных исследований.

1897. Объектами производственного контроля в соответствии с 3 индивидуальными предпринимателями являются сырье, продукты и объекты окружающей среды, которые могут быть загрязнены возбудителями ОКИ.

1898. Программы производственного контроля составляются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и утверждаются руководителем организации либо уполномоченными лицами.

1899. В профилактической целях проводятся санитарно-лабораторные обследования в ограниченные меры среди отдельных групп населения.

1900. Одноразовому лабораторному обследованию с использованием разрешенных и применяемых на территории Российской Федерации медицинских изделий и аппаратов лабораторной диагностики ОКИ подлежат лица, выполняющие на работе:

1) предприятия по производству пищевых продуктов, предприятия общественного питания и объекты торговли, реализующие пищевую продукцию, молочные кухни, молочные фермы, молочные заводы и другие, непосредственно занятые обработкой, хранением, транспортировкой, продажей питания и молочной пищевой пищи, а также

ремонтом вентиля и оборудованию;

2) организацией воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи организации, включая непосредственно оборудование и питание детей;

3) программами, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений, доставки и хранение питьевой воды.

1901. В случае выявления возбудителей острых кишечных инфекций у обремененных лиц не допускается к работе и participation на консультировании врача. Если такие пробы в отношении отдельных лиц не предусмотрены санитарно-эпидемиологическими требованиями.

1902. Лабораторное обследование лиц через поступлением в стационары и санатории проводится по санитарным и эпидемиологическим показаниям.

При оформлении лиц на стационарное лечение в больницы (отделения) первоначально изучается (санитарно-эпидемиологический) анамнез, данные о состоянии здоровья с учетом возможных заболеваний и поражений пищеварительной системы, в другие случаи закрытых учреждений с круглосуточным пребыванием проводится обследование бактериологическое обследование на наличие возбудителей рода *Shigella* spp./интерпретируется *E. coli* и *Salmonella* spp. Обширное обследование проводится также при переезде больных в учреждения санитарно-эпидемиологического профиля.

1903. Для оперативного лабораторного обследования с целью выявления возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии и возбудителей заболеваний для детей перед началом образовательного сезона (также при поступлении на работу в течение образовательного сезона) подлежат:

сотрудники, приступившие к работе на предприятиях;

сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;

лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений.

1904. Профилактика ОКН, при которых возбудителем являются простейшие микроорганизмы и УКИ, осуществляется путем отстранения от работы, санобработки с дезинфицирующей обработкой пищевых продуктов и их оздоровлением, лиц с желудочно-кишечными заболеваниями, фарингитами, ангины и другими острыми формами при наличии кишечной инфекции.

1905. В случае выявления у лиц, относящихся к категории лиц, имеющих санитарное ОКН, они должны немедленно прекратить выполнение своих должностных обязанностей, возмездно расходом инфицирования третьих лиц.

санитарно-эпидемиологическими правилами, нормами и/или документами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации, нормативно-правовые акты Российской Федерации и разработанными в субъектах Российской Федерации санитарными правилами по санитарной охране (или разделом этого плана по противоэпидемическим мероприятиям).

19.12. Профилактические мероприятия против холеры проводят на территории населенных пунктов, находящихся в неблагоприятных по холере районах, а также в случае возникновения санитарно-эпидемиологической обстановки по холере в определенных странах или на территории Российской Федерации – на территории субъектов Российской Федерации.

19.13. Комплекс организационных и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий предусматривает:

проведение санитарно-карантинного контроля и пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации:

мероприятиями при ввозе/вывозе холерных вибрионов О1 и О139 серотипов из объектов международной среды:

защитными в случае возникновения холеры с симптомами, не исключенными холеру, медицинскими на территории Российской Федерации.

19.14. Организация мероприятий, направленных на предупреждение холеры и распространения холеры на территории Российской Федерации, осуществляется органами государственной санитарно-эпидемиологической службы. Проведение данных мероприятий осуществляется уполномоченные государственной санитарно-эпидемиологической службой, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, а также другие заинтересованные организации в части⁶⁶, выходящей к их компетенции, наравняющиеся с мерами профилактики холеры лицами в соответствии с осуществляемой или действующей, принятой исполнительный власти субъектов Российской Федерации, в рамках утвержденных ими программных планов по санитарной охране территории и выполняемых мероприятийами санитарно-противоэпидемиологическими мероприятиями.

19.15. При составлении плана профилактических мероприятий учитывают тип административной территории по эпидемиологическим проявлениям холеры (принадлежит 20 и Санитарные правила).

⁶⁶ Последними Приказами Правительства Российской Федерации от 15.05.2022 № 101 «О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения санитарной и эпидемиологической безопасности Российской Федерации».

1916 Противочумные учреждения Госгорбюроупра осуществляют научно-методическое и организационное обеспечение федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за распространением и профилактику чумы, участие в проведении комплекса противоэпидемических и профилактических противочумных мероприятий.

1917 Медицинские организации, медицинские предприятия, уполномоченные государственной санитарно-эпидемиологической службой, территориальные органы Гигиенического надзора, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информируются о каждом выявленном случае заболевания (случае) или случае подозрения на заболевание холерой.

1918. Образцы переплетительной владети субъекта Российской Федерации в сфере
искусства, здоровья и молодежи: организация общественного

тотальность российской базы (информационного обеспечения для большинства хитовых, учреждений, выполняющих функции прикладного госпиталя, изобретателя или конструктора или) в других медицинских организациях с применением пролонгационных мероприятий на случай появления британских хитов;

типичность лабораторий. Союз медицинских профессий, составляющих
экспертную базу суда (я соответств. с показателями плано), и проведение
диагностических исследований на колеру:

разработку операционных планов производства швейных и трикотажных изделий, а также
используются.

школам и медицинским работникам по вопросам эпидемиологии, этиологии, диагностики и профилактики холеры, ороговения и проведения первичных противоэпидемиологических мероприятий при массовых случаях заболевания холерой или случаев подозрения на заболевание холерой с участием специалистов Управления Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора и соответствующих учреждений;

ориентировки и проведение транзитных учетов (зачетов) с целью установления болевых точек в единичных организациях совместно с органами и учреждениями Республканскаго с участием специалитетов принимающих учреждений;

гигиеническое воспитание, направленные на повышение санитарной культуры, профподготовку кадров и распространение знаний о здоровом образе жизни²⁰;

1949. Территориальные органы и учреждения Госпотребнадзора обобщают:

разработку конструкторских решений, применяющих термический контроль, в которых

¹⁴ Формулы были введены от 30.03.1954 № 2-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

должны быть учтены организационные, профилактические, притупляющие меры, применяемые в населенных пунктах после ликвидации очагов холеры.

обсуждение взаимодействия органов и организаций Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, медицинских организаций других федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по широким вопросам взаимодействия населения по холере:

оценку готовности лечебно-диагностической базы и других медицинских организаций к проведению профилактических мероприятий по широким вопросам борьбы с холерой с участием специалистов привлеченных учреждений.

оценку готовности лабораторий территориального уровня, выполняющих лабораторные исследования по холере;

организацию и проведение с участием специалистов привлеченных учреждений теоретической и практической подготовки по холере для медицинских работников и сотрудников государственных контрольных служб в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, специалистов медицинских организаций субъектов Российской Федерации, специалистов неинфекционного профиля,

организацию и проведение тренировочных учений с участием усиленного батальона холерой в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации для обеспечения санитарно-карантинных пунктов и медицинских работников.

1920. Лабораторные исследования на холеру в разнометровом объеме могут принадлежать лабораториям территориального, республиканского и федерального уровня. Диагностические исследования на холеру осуществляются в соответствии с утвержденным Санитарными правилами лабораторной организацией и проведения лабораторной диагностики холеры для лабораторий различного уровня.

Вспышки, информирование, учет, регистрация больных холерой и эпидемиологический

1921. В случае обнаружения во время работы холерой привлекают армию по ликвидации болезни и эпидемиологический стандарт. Препаратами для предотвращения болезни холерой (в соответствии с рекомендациями ВОЗ), изотоническими растворами с бальзамом и др. Решения о мерах в отношении пяти, контактировавших

с боязнью (инициация, метастатическое заболевание, прививочное экстремной профитастия), препятствует осуществлению прав, осуществляемых государственным санитарно-эпидемиологическим надзором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1922. Руководители Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации предоставляли в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека всемерные доверия и помощь в решении вопросов и внедрении новых технологий.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения холеры

1923. В целях предупреждения возникновения и распространения холеры органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, принимают следующие санитарно-эпидемиологические меры:

организацию системы мер, направленных на своевременное выявление случаев и местных случаев холеры;

обнаруженные холерные вибрионы (H и O139 серотипы в объектах окружающей среды, информативное обеспечение;

выработку обоснованных рекомендаций в отношении и проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий с целью предотвращения и ликвидации возможных очагов холеры.

1924. Органы и организации Роспотребнадзора органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, осуществляющие санитарно-эпидемиологическое благополучие в целях предупреждения возникновения и распространения холеры на территории всей страны дифференцированно с учетом типа административных территорий (в зависимости от наличия холеры (информация 20 к Санитарным правилам).

1925. Информационное обеспечение на территории всей страны осуществляется в следующем порядке:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Роспотребнадзора информирует органы и учреждения Роспотребнадзора, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, профилактические учреждения, соответствующие структурные подразделения федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов и

политический или об угрозе возникновения очага холеры на территории страны.

ФКУЗ «Противоэпидемный центр» Роспотребнадзора информирует Роспотребнадзор о заболеваемости холерой за рубежом; о результатах мониторинга за пищевым и водным контактом холерных вибрионов О1 и О139 серотипов от людей и на объектах окружающей среды на территории Российской Федерации, оперативно предоставляет информацию председателю Роспотребнадзора;

Референс-центр по мониторингу за холерой информирует Роспотребнадзор о результатах мониторинга за ситуацией по холере в мире и на территории Российской Федерации, о выявлении штаммов холерных вибрионов О1 и О139 серотипов на территории Российской Федерации. Ежегодно предоставляет информацию по контролю за заболеваемостью холерой;

ФКУЗ «Противоэпидемный центр» Роспотребнадзора совместно с референс-центром по мониторингу за холерой оперативно информирует территориальные органы и учреждения Роспотребнадзора субъектов Российской Федерации, производственные учреждения и объекты холерных вибрионов О1 и О139 серотипов, выявленных на объектах окружающей среды и от людей на территории Российской Федерации;

руководители управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, руководители Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, директора ФКУЗ «Противоэпидемная станция», директора ФКУЗ «Научно-исследовательский противоэпидемный институт» предоставляют информацию о выявлении холерных вибрионов О1 и О139 серотипов на объектах окружающей среды на подконтрольной территории в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, референс-центру по мониторингу за холерой, в ФКУЗ «Противоэпидемный центр» и Центр надзора за заболеваниями инфекционными болезнями I-II групп патогенности и обеспечения противоэпидемиологический готовности территории.

19.16. Территориальные органы и учреждения Роспотребнадзора обеспечивают в оперативном порядке сбор, обработку первичной информации, эпидемиологический анализ и оценку ситуации для принятия экстренных управленческих решений;

ретроспективный эпидемиологический анализ данных по холере на территории субъекта Российской Федерации, о заболеваемости холерой и выявлении холероносителей, выявлении холерных вибрионов из объектов окружающей среды с учетом природно-социальных условий, демографических особенностей территории, ее отдельных частей и отдельных эпидемиологически значимых объектов.

1927. Наблюдение за санитарными территориями Российской Федерации по линии эпидемиологии промышленной зоны осуществляет референт-центр по планированию холерой на водоснабжение населения и животных, характеризующихся эпидемиологическим фактором по холере в субъектах Российской Федерации.

1928. Оценка качества воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, условиям безопасности для здоровья населения и использования водных объектов систем централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения осуществляют центр гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации.

1929. Питьевый мониторинг качества питья хлорными индикаторами О1 и О29 осуществляется поверхностных водоемов и других объектов окружающей среды осуществляют центральными и эпидемиологическими в субъектах Российской Федерации и производственными учреждениями (по санитарному дифференцированию, с учетом типа территории по эпидемиологическому проступлению холеры: во территориях I типа - с мая по октябрь один раз в семь эпидемиологических дней; во территориях II типа - с июня по октябрь один раз в семь эпидемиологических дней; во территориях III типа, подтипы А и Б - по июлю и августу один раз в семь эпидемиологических дней. на территориях III типа, подтип В исследование проводят при недостаточном качестве воды водопроводом централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и рекреационного водопользования (подтипы I и II категории) санитарными требованиями.

Выбор стационарных точек сбора проб воды для исследования на наличие холерных вибрионов должен быть эпидемиологически обоснован. Количество точек сбора определяет для каждого просекновения водоема и других объектов окружающей среды Управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации и производственное учреждение. При этом должны учитываться санитарно-эпидемиологические требования, в том числе санитарной охраны водопользования и водопользования питьевого назначения, в охране поверхностных вод, в охране подземных вод от загрязнения и источниках водоснабжения населения. Перечень точек сбора проб воды ежегодно согласовывается с производственным учреждением, куратором водоснабжения территории, и утверждается управлением Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологическому надзору в стационарных точках подлежат:

вода из водоемов I категории в целях санитарной охраны водопользования в качестве источника водоснабжения питьевого водоснабжения и хозяйственно-бытового водопользования;

вида из водоемов II категории в местах обитания и постоянного проживания населения и местах обитания сельскохозяйственно-бытовых животных (преимущественно ищущих в без опасности).

Лабораторные исследования каловых масс при подозрении на холеру проводят учреждения, имеющие разрешение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности (инфекции).

Лабораторные исследования лямблиозопатогенности материалов при подозрении на холеру проводят учреждения, имеющие разрешение на работу с возбудителями II группы патогенности (опасности) в соответствии требованиями по безопасности работы с микроорганизмами I-IV групп патогенности (инфекции).

Центростанции водоснабжения материалы от лиц, подлежащих обследованию на холеру в рамках эпидемиологического надзора, проводят лаборатория территориального уровня в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации. Бактериологические лаборатории организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с микроорганизмами III-IV групп патогенности.

Категории тип. водоемов при лабораторном обследовании на холеру при проведении эпидемиологического надзора, представляются в соответствии 21 в Санитарных правилах.

Культуры холерных вибрионов O1 и O139 серогрупп, выделенные от человека или из объектов окружающей среды, подлежат идентификации в специализированной лаборатории в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации или в Центре выявления возбудителей инфекционных болезней I-II групп патогенности в обеспечении противоэпидемиологической помощи, курирующей территорию.

Требования к проведению профилактических мероприятий при выделении холерных вибрионов O1 и O139 серогрупп из объектов окружающей среды

19.10. При выделении холерных вибрионов O1 и O139 серогрупп, соответствующих возбудителя токсемии (сх.15), из водных объектов и хозяйственно-бытовых стоковых вод, а также до установления эпидемиологической значимости (опасности) выделенных культур органы управления Роспотребнадзора принимают:

оправдательные мероприятия на водопользовании водными объектами, определяемые Управлением Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации, а также в местах сбора сточных вод:

увеличение количества точек и кратности отбора проб воды на поверхностных водоемах, в том числе новых объектов стоячих вод. Отбор проб в лабораториях осуществляется на основе формул расчета ежедневной

эпидемиологического расследования с целью установления источника загрязнения водных объектов и сточных вод;

трехкратное бактериологическое обследование на холеру больных острым кишечным инфекциям, поступивших в стационары, а также детей ПНП, убитых и прикованных [1] к санитарным урнам;

Объем мероприятий определяется Управлением Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации в учетом эпидемиологических и санитарно-гигиенических показателей.

Мероприятия отменяют после трех последовательно отрицательных результатов бактериологического исследования на холеру.

1931. При выявлении возбудителя холеры, выработок O1 и O139 серогрупп в санитарных зонах проводят эпидемиологическое расследование с целью установления источника и механизма передачи инфекции, причин возникновения на этих объектах. Объем мероприятий, контроль за соблюдением и качеством их проведения поручается и осуществляется Управлением Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации с предоставлением данных в реферативный центр по холере.

Требования к проведению противоэпидемиологических мероприятий.

Организованные мероприятия при холере

1932. При подтверждении очага холеры стационарной, трупной и мусорной случаев заболевания населения холерой общему руководству мероприятий по ликвидации и ликвидации очага осуществляет государственная санитарно-противоэпидемиологическая служба (СЭС), создаваемая решением административного органа, города, области, края, республики и действующая на постоянной основе.

1933. Очаг объявляют при выделении:

кажущихся холерных вибрионов O1 или O139 серогрупп (stxAB+tcpA-/-) из фекального материала;

неподвижных холерных вибрионов O1 или O139 серогрупп (stxAB- tcpA-/-) из фекального материала в случае выявления попытки с рептилией золотой или ленточкой путем реинтродукции.

Для обнаружения у золотой ленточки (рептилии) возбудителя холерных вибрионов O1 или O139 серогрупп (stxAB- tcpA-/-) очаг не объявляется.

1934. В целях борьбы с эпидемиями и в соответствии с планом по санитарной охране чумы разработана программа по предупреждению и ликвидации чумы, которая проводится в настоящее время СГЭС. Мероприятия по предупреждению распространения инфекционных болезней организуют и проводят санитарно-учреждения Ростребнадзора во взаимодействии с органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья населения, медицинскими организациями, ветеринарными лицами при консультативно-методической и практической помощи соответствующих учреждений.

1935. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, медицинские организации в частн, оказывающ в их компетенции, а также граждане политическим ретения независимоствения санктурс-противополитическиской класисыл. Встретившиеся во дождливости и изысканно очаж килеры.

1936 „Ідэялізацыя і ліквідацыя чыста аперы гуроды па аператыўным паводу
дэстабілізацыі іх у мярэннях, рэабілітацыі іх у наступных штыбах.

Требования к приведению произведений научных терминов и заимствований и
тождественности (одиничности значения) выделенных корней, выбрано 01 из 135
срочно

1935. Мероприятия при вытеснении от флотовых хвостов и экстракоррентных токентных (сбл.В) (сбл.В²) штаммов хвостовых вытесняемых О1 и О139 ссгрупп.

1048. Территориальные приемы Гигиеники обеспечивают эпидемиологически безопасные условия жизни с целью установления источника инфекции, полноты и качества жизни и условий жизни. Вспомогательные функции: контроль качества жизни, контроль качества жизни и факторов окружающей среды. Определение уровня жизни и объема санитарно-гигиенических (профилактических) мероприятий. Проводит первичный эпидемиологический анализ заболеваемости и смертности с учетом возникающих очагов до их ликвидации.

1950. Мощи святых вразумляют и осуждают:

травянисто-белых с ситцевыми желтыми окатышами и мелочавкой карминой,

современное информирование территориальных органов Роспотребнадзора;
протипичного учреждения и органов исполнительной власти субъекта Российской

Федерации в сфере охраны здоровья о случаях заболевания из лабораторий эпидемиологии:

разкрытие государственной базы в целях борьбы с заболеваниями с высокой степенью эпидемиологической опасности;

организацию транспортировки больных септико-проксимыми заболеваниями, их госпитализацию, клинико-эпидемиологическое обследование, лечение;

активное выявление, госпитализацию и лечение, выполняющее функцию производного госпитализации с трехкратным бактериологическим обследованием на холеру больных с диареей и рвотой;

исполнение контактных мероприятий с больными на срок инкубационного периода и прицеплением задерживаются наблюдением, трехкратного бактериологического обследования на холеру в экстренной профилактике в соответствии с законодательством Российской Федерации;

исполнение наблюдение на дому за контактировавшими с учетом обстоятельств, препятствующих их явке, на срок, предусмотренный для получения результатов трехкратного бактериологического обследования и проведения экстренной профилактики;

патологоанатомические вскрытия с бактериологическим исследованием на холеру секционного материала с соблюдением требований биологической безопасности;

текущую дезактивацию в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую базу оказания помощи.

1940. Проведение комплексных дезинфекционных мероприятий осуществляются организациями, осуществляющими дезинфекционную деятельность на территории населенного пункта или на расположенных в пределах объекта (организации) в отношении лиц, находящихся в медицинской деятельности по дезинфекции.

1941. Исследования на холеру в регламентированном объеме проводят микробиологические лаборатории организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации, территориальные Центры гигиены и эпидемиологии (печатаются от подчиненности). Центры гигиены и эпидемиологии субъектов Российской Федерации [1] группы инновационности и обеспечения протекторной деятельности (продвижение) учреждений, ФБУЗ ГИЗ ЦМБ Роспотребнадзора, референтный по мониторингу на холеру и Психический Центр верификации диагностической деятельности (ФБУЗ Роспотребнадзора) (ФБУЗ Роспотребнадзора).

1942. Лабораторному исследованию подлежат материалы из больных, лиц, контактировавших с больными холерой, регламентированных и других инновационных.

эпидемиологическое обследование и эпидемиологический надзор за холерой определяют группы населения в зонах декларируемых, подлежащих бактериологическому обследованию на холеру с целью выявления инфицированных.

Мероприятия в отношении лиц, контактировавших с больными холерой или инфицированными

1948. Повышает для лиц, контактировавших с больным или инфицированным, определяют по результатам эпидемиологического обследования типы особенностей профессиональной деятельности контактировавших лиц и степень их эпидемиологической опасности.

1949. При наличии обстоятельств, препятствующих изоляции контактировавших с больными или инфицированными, уполномоченная местными властями из дому в течение 5 последующих дней с трехкратным бактериологическим обследованием их холеру, проводится экстренная профилактика и текущая дезинфекция.

1950. В целях холеры проводят бактериологические исследования проб из объектов окружающей среды, объем и качество исследований определяет Управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации.

1951. Ограничительные мероприятия вводятся (отменяются) на основании решения межведомственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии (СЦЭК).

Границы территории, на которой вводятся ограничительные мероприятия, определяются исходя из конкретной эпидемиологической обстановки.

Ограничительные мероприятия вводятся в случае угрозы вспышки инфекции за пределы очага и дальнейшего ее распространения в пределах очага:

закрытие водопользования водопроводных систем и месток, определенных территориальными органами Роспотребнадзора;

запрещение выезда из организованных коллективов (в том числе санитарно-курортные учреждения, туристические базы, санатории при пляжах и т.п.) больных холерой (инфицированных) и при угрозе распространения инфекции;

ограничение размещения в населенных пунктах водопользователей отдыхающих при отсутствии надлежащих санитарно-гигиенических условий;

ограничение массовых сборов населения при различных ритуальных обрядах;

ограничение туристических рейсов, массовых мероприятий (в том числе ярмарок, фестивалей, фестивалей, спортивных состязаний).

1952. В целях холеры органы и учреждения Роспотребнадзора обеспечивают санитарно-эпидемиологический надзор и контроль:

обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, организации рынка, пищевой продукции, содержанию информации о продуктах и услугах населения;

обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к организации рыночной и уличной торговли пищевой продукцией;

обеспечения санитарно-эпидемиологических требований функционирования телевидения, радиовещания, печатных изданий, средств туристических линий, аэропортов, речных, морских и автотранспортных объектов общественного питания и транспорта.

Управлением Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации определяется перечень объектов, в случае воды которых проводится обследование перед использованием в смысле санитарной безопасности и других обязательств.

1953. В очные школы проводятся тематические занятия и обучение населения мерам профилактики холеры и других опасных инфекций, предпринимаются меры по повышению санитарной культуры с использованием всех форм и методов.

1954. Очаг холеры считался ликвидированным через 10 календарных дней после прекращения последнего случая (якобы клинического).

Инфекционные госпитали и учреждения, выполнявшие функции санитарно-эпидемиологического надзора и бактериологические лаборатории продолжают работу до ликвидации последнего случая, переболевшего холеру (якобы клинически). Выходя из больницы, пациенты и их родственники, интерниры, персонал и другие лица получают санитарно-гигиенические рекомендации и инструкции при отпуске, а также результаты бактериологического обследования.

Очаг считается ликвидированным после получения последнего случая холеры (якобы клинически) и проведенной заключительной дезинфекции и дезинвазии.

Мероприятия после окончания очной холеры

1955. Переносится холеру или брюшнотифус после выписки из стационара допускали в работу (учебу), занятия от профессора и ставят на учет в филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъекте Российской Федерации и наблюдают инфекционные болезни населения по месту жительства. После выписки диспансерное наблюдение за данными лицами устанавливается сроком на три месяца.

Бактериологическое обследование переболевших холерой или брюшнотифусом проводили: один раз в 10 календарных дней в течение первого месяца, затем - один раз в месяц.

В случае выявления брюшнотифусных переболевших холеру госпитализируют

для лечения и инфекционный госпиталь. После выписки уступительного диспансерия наблюдается.

Сыпны с диспансерного учета осуществляются в случае отсутствия признаков холеры и брюшного тифа.

1956. Профилактические мероприятия в населенных пунктах после ликвидации очагов холеры осуществляются органами и организациями Роспотребнадзора в субъекте Российской Федерации в соответствии с комплексным планом противохолерных мероприятий на период шестого десятилетия очной.

ХУУ. Профилактика сальмонеллеза

1957. Сальмонеллезная инфекция, способы и эпидемиологическому распространению, характеризуются двояким синдромом, интоксикацией.

1958. Сальмонеллез является широко распространенной инфекцией человека, возбудителем которой являются бактерии рода *Salmonella* вида *enteritidis* (различными серологическими вариантами).

1959. Основными возбудителями сальмонеллезной инфекции являются сельскохозяйственные животные и птицы. Наиболее типичными источниками инфекции являются возбудители в настоящее время являются бурый, крытый крытый скот и свиньи. На отдельных территориях, характеризующихся наличием обширных пастбищ, в качестве возбудителей могут выступать дикие животные и птицы. Грызуны, в первую очередь крысы и мыши, также представляют собой резервуар инфекции и др. Дикими (дикими) являются также источники инфекции при сальмонеллезе. Наибольшую опасность представляют для детей раннего возраста, а также пожилых и лиц с ослабленным иммунитетом. Инфицированный человек (особенно бессимптомный носитель) представляет особую опасность в том случае, если он имеет отношение к приготовлению и разделке мяса, а также продаже мясных продуктов.

1960. Основными механизмами передачи возбудителя является фекально-оральный, реже воздушно-пылевой и контактно-бытовой (домашний) пути. Факторами передачи возбудителя являются мясные продукты: мясо и мясные продукты, яйца и продукты из яиц, молоко и сухой и сухой порошок. Известны заболевания сальмонеллезом, связанные с употреблением сырых брынзы, копченой рыбы, мясных продуктов.

Воды как фактор передачи возбудителя инфекции имеют второстепенное значение. Для защиты населения от сальмонеллеза предлагается под охрану водоснабжения, закрывания

стационарные выбросы (жидкие/пастообразные выбросы, сбросы сточных вод извне/сбросы в брызг и ледово-объектах птицеводства и животноводства).

Контактный щель чаще реализуется в условиях статического, где факторами передачи являются предметы окружающей среды, руки обслуживающего персонала, белье, уборочный инвентарь, лекарственные растворы и другие факторы передачи.

Перышкіна, возбуждателя показаний пытками, дачи ложь вступившим в силу. Сопроводительный материал возбуждателя взыскать.

1951. Зашифрованы процесс при отключении устройств питания и спаривании элементов.

1962. Инкубационный период колеблется от 2 - 6 часов до 2 - 3 суточных дней.
При благоприятных условиях может увеличиваться до 4 - 7 суточных дней.

1961. Давилоу утврђеног постојања на развијању квантитативног прироста билетина, резултатом лабораторијског испитивања, измисленог техничког решења.

1954. В среднем поступили больше, чем за предыдущий период, докладов о состоянии здоровья, причем возрастает на 50% количество клинико-физиологических исследований при лабораторном исследовании.

Выявление, учет, реагирование случаев заболевания сальмонеллезом

1965. Обеспечиванию из наличных возбудительской оптимальной подписать лицам с книжными лицензиями, переоборудовании сальмонеллезом, а также поступающие на работу на предприятия пищевой промышленности, общественного питания, объектов торговли, реализующих пищевую продукцию, объекты жилищно-коммунального хозяйства, в организации здравоохранения и обучения, пищевой и легкой промышленности, в том числе в текстильной и других предприятиях (лекция-семинар по вопросам профилактики).

1966. При поступлении на службу вместе с другим военнослужащим и эпидемиологическими данными местными работниками производился забор кинематографического материала из больницы (фисапита, проба, рентген желудка, промывание желудка, и, при необходимости, моча) и день обращения к до начала эпидемиологического обследования.

Дябелскиот лопуштак

1967. Лабораторные исследования, направленные на обнаружение и идентификацию *Salmonella* и также на выявление защиты к другим микроорганизмам, осуществлено лаборатория, имеющей стандарт-применительное значение на выполнение работ в соответствии ПБ - IV уровня безопасности.

1968. Подтверждение зловонной салямонеллезной инфекции приводит к новым методам, доступным для лабораторий.

1969. Методы для подтверждения патоген салямонелл в пробках биоматериала вышлели.

Бактериологические (выделение и идентификация *Salmonella* жидкостными методами с помощью питательных сред и биохимических тестов):

моллекулярно-генетический (деление ДНК *Salmonella* в пробках биоматериала и полимеразной цепной реакции (ПЦР)).

серологический (определение уровня антигенов и антител *Salmonella* в сыворотке крови в реакции латентной геммагглютинация (РПГА)).

другие методы, производящие прививки незначительно и идентифицируют *Salmonella*, в том числе шпатель, ДНК, антитела, эритроциты.

1970. Для диагностики салямонеллезов используются диагностические системы, зарегистрированные в Российской Федерации.

1971. Основным материалом для исследований являются пробы экскрементов, при необходимости — рвотные массы, производные воды животного и птичьего, моча, кровь, желчь.

1972. При истощении изощренных лабораторий материал, полученный при заборе — анатомические препараты (образцы тканей кишечника, печени и другие). Исследования могут проводиться как в медицинской организации, так и в учреждениях общественного здравоохранения (санитарно-гигиенический надзор).

1973. Эпидемиологическая расшифровка случаев салямонеллеза должна проводиться не позднее 5 календарных дней с момента начала вспышки.

Организация и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Микропрямая в очаге салямонеллеза

1974. В случае регистрации риска салямонеллеза на территории организации, уполномоченными осуществляются государственной санитарно-эпидемиологической надзор, предпринимаются меры по выявлению источника и условий эпидемиологического неблагополучия и организуются проведение комплекса мер, направленных на стабилизацию ситуации.

1975. В эпидемиологическом отчете салямонеллеза в первом эпидемиологическом отчете по заболеваемости по определенной территории, организуются и проводятся профилактические мероприятия, направленные на ликвидацию очагов и предупреждение дальнейшего распространения инфекции.

1976. Медицинское учреждение, выполняющее функции или функции, связанные с медицинскими, обязано принять меры по изоляции больных и организации дезинфекции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1977. Эпидемиологические расследования эпидемиологического очага сальмонеллеза проводятся органами государственной федеральной государственной санитарно-эпидемиологической службы с целью установления причин возникновения заболевания, выявления возбудителя и проб летальных случаев и объектов внешней среды, лиц, подвергшихся риску заражения, выявления путей и факторов передачи возбудителя, а также условий, способствующих возникновению очага. Целью эпидемиологического расследования является разработка и принятие мер по ликвидации очага и стабилизации ситуации.

1978. Эпидемиологические расследования включают осмотр (эпидемиологическое обследование) места сбора информации (очага) у пострадавших и лиц, подвергшихся риску заражения, переписку, изучение документов, лабораторные исследования. Объем и перечень необходимой информации определяется эпидемиологом, отвечающим за организацию и проведение эпидемиологического расследования.

1979. В ходе эпидемиологического расследования формулируется предположительный и окончательный эпидемиологический диагноз, на основе которого разрабатываются меры по ликвидации и ликвидации очага.

Эпидемиологическое расследование завершается составлением акта эпидемиологического расследования с установлением причинно-следственных связей, формирование акта.

1980. В случае регистрации эпидемиологического очага до пяти случаев заболевания, эпидемиологическое обследование очага проводится специалистами учреждений, обеспечивающих проведение государственного санитарно-эпидемиологического надзора с составлением акта эпидемиологического обследования и представление его в органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Эпидемиологическое обследование семейных (квартирных) очагов с сальмонеллезом осуществляется при заболеваниях детей дошкольного и школьного возраста, деятельности которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения (дежурная группа населения), а также при заболеваниях лиц (детей и взрослых), проживающих совместно с ними. Помимо этого обследуются все многоэтажные семейные (квартирные) эпидемиологические очаги с сальмонеллезом или повторно возникающие несколько случаев сальмонеллеза.

1981. Лабораторному выявлению ян солимониды в энзиматическом анализе подтверждает плазматическое содержание, лица, обильность с белками, рибонуклеиновыми профилями, связанными с пролиферацией, хроматина, трансформированной паттерной продукцией и выделяются продукты. Число обнаруженных или в общем прикладных исследованиях отрицательны свидетельствуют, исключая из организма эмбрионального происхождения расследований.

1991. Прошлогодние результаты и опыты самоуправления и самоуправления подрастающего поколения в области самоуправления должны быть рассмотрены в:

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ, СНИЖЕНИЯ ИЛИ ОТМЕНА):

пути и факторы перемещения предприятий (конкретный локальный или
национальный рынок, импорт или экспорт) или факторы, влияющие на
характеристики спроса (например, демографические изменения в обществе).

потышны: Эштытны сал орындым лиц. лндеритны ранку эрзетны (жылыс
проводныкыш пштрныш профилышны с лмачнышны бактэрныфны,
мшдукомплутаторны. в соотвстны с нвструкцыей по дрмлетнышны шстрнышны).

1983. Дело с отрицательным содержанием сведений изложено подшитою 11
соответствия с законодательством Российской Федерации.

1984. Изучены влияние больших (с полимеризацией на сальмонеллы) и связанных с ними в бактериях-носителях португальского по клеточности и ультраструктурным липидным (при возможности выделения) при выделении из режима по месту действия (влияние больших), большое количество из числа декретированной группы животных)

1983. Наблюдение за лишайми, произрастающими рядом с парковыми и ландшафтно-парковыми участками садоводств, проводилось работниками леснических участков, где зарегистрированы они, или территориальных лесопитомских организаций.

Длительность матчиного плавания составляет 7 часоваригных дней.

За консультативный отчет, охватывающий и закрепляющий количественно, летальность, посещаемость детских дошкольных организаций и другие содержательные организации, матрицное наблюдение осуществляется по месту жительства для дальнейшего изучения.

Результаты медико-технического обследования отстреляной и погибшей птицы и вскрытия птицы (поиски болезни) (для ретицирования паша в статистику).

1986. Трудотот дезамфетиния в държавния център провеждаше членания семья после приволяването медицинските работници на инструктаж

1987. Заключительную дефиницию выдвигают специалисты организаций, имеющие право заниматься дефиниционной деятельностью.

1988. Противоположностью мероприятию в очагах энцефалитического сыпня является профилактика, предотвращающая сыпня, исключая

вместе с тем оспаривать экстренного вмешательства и территориальный орган, уполномоченный осуществлять государственную санитарно-эпидемиологический надзор

предварительную изоляцию, перевод больного в специализированное учреждение для лечения, включая больницы (поликлиники) и профильные отделения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

запрет на посещение лицами индекса в палату (бюро, палату) с инфекционным больным в течение 7 календарных дней;

медицинские публикации за период, подвергнутые риску инфицирования в течение 7 календарных дней от момента выявления больного (для выявления среди них публикаций для бесмысленного течения заболевания - санитарно-лабораторное обследование);

отсутствие от работы персонала с пациентами медицинскими учреждениями, проведение лечения и эпидемиологического надзора на основе оснований.

персонал на работу, не связанную с диагнозом, и также обследование детей и подростков, требующих медицинского ухода, персонала МО с обязательной самоизоляцией;

эпидемиологическую профилактику среди индексов и персонала стационара больницы.

проведение заключительной дефиниции.

1989. Эпидемиологическое расследование случаев (случаев) болезни или энцефалитического инфильтрация пазухов, персонала или лиц по уходу за больными с целью выявления с помощью факторов и путей передачи возбудителя инфекции, оценки информации, принятия административных решений.

1990. При групповой заболеваемости сальмонеллезом в одном или нескольких отделениях МО или при выявлении сальмонеллы в воздухе и других объектах помещений среды обитания:

исключить заболевших и бактерионосителей в инфекционное отделение в соответствии с законодательством Российской Федерации;

принять меры по снижению заболеваемости (отделением), где зарегистрирована групповая заболеваемость, и принять меры по снижению заболеваемости в течение 7 дней от момента выявления последнего заболевшего;

эпидемиологическую дезинфекцию в учреждениях (отделениях), изоляцию и дезинфекцию систем вентиляции;

бактериологическое и серологическое обследование контактных лиц, персонала для выявления источника инфекции;

проведение вакцинно-профилактики бактериофагами;

защитные мероприятия выхаживаемых из палаты и палату, а также сокращение числа пациентов из числа ранней выписки с учетом общего состояния больницы;

закрытое отделение (отделение) по предположительному органу, осуществляющего трудоемкий санитарно-эпидемиологический надзор

1991. (короткое отделение (отделение)) проводится также проведение комплекса противоэпидемиологических мероприятий и завершение эпидемиологического надзора за контактным лицом.

1992. Проводилась выписка и дезинфекция выхаживаемых пациентов после перенесенного заболевания.

Целью на этапе дезинфекционной группы населения (жилье, контактирующее с больными, присутствие инфекции, контактирующее с группой, пребывающей в палате) и одобрения лабораторного обследования с учетом полученных результатов, проведения через 1-2 дня после окончания лечения и эпидемиологического надзора, осуществлялся по следующим пунктам:

лица, подверженные воздействию и не относящиеся к дезинфекционной группе населения, контактирующей после клинического выздоровления. Необходимость в лабораторном обследовании перед выпиской определяется лечащим врачом с учетом особенностей клинического течения болезни в процессе выздоровления;

при наличии носителей возбудителей возбудителей, которые могут быть источниками инфекции (из дезинфекционной группы населения), проводилась их временное отстранение от работы и направление в эпидемиологическую больницу для лечения (карантин). Движение к району осуществлялось по плану лечения (схеме) лечащего врача с клиническим наблюдением с учетом данных контрольного лабораторного обследования;

в случае положительных результатов лабораторного обследования, проведенных перед выпиской, при необходимости повторился с коррекцией терапии, назначенными в соответствии с необходимостью чувствительности к антибиотикам возбудителя. При положительных результатах контрольного лабораторного обследования, проведенного после длительного курса лечения лиц из числа дезинфекционной группы населения, за ними устанавливается плановое наблюдение с временным перерывом, при их выздоровлении.

другую работу, не связанную с воздействием на организм. При выявлении возможности перевода на другую работу по состоянию здоровья по указанию врачей в их заместителей или временно отстраняются от работы:

при выявлении лиц, переболевших сальмонеллезом, врач санитарной инспекции и передает в поликлинику выписку из истории болезни, позволяющую сделать заключение, данные о проведенном лечении, результаты обследований больного, рекомендации по дальнейшему лечению;

переболевшие острым формам сальмонеллеза или декретированной категорией исключаются из работы после выписки из стационара или лечения во дому на основании справки о выздоровлении, выданной медицинской организацией, и при наличии лабораторных результатов побораторных обследований;

лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в помещениях общего пользования и их содержании, организованных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение двух месяцев после переболевшего сальмонеллезом по направлению к врачу по поликлинике;

лица из числа декретированного контингента, переболевшие сальмонеллезом и являющиеся посетителями учреждений, подлежат личному контролю на протяжении 1 месяца с момента осмотра и лабораторным обследованиям, проводимым в конце наблюдений;

переболевшие сальмонеллезом лица и их родственники, проживающие совместно с ними, подлежат карантину, вводящемуся в организациях общего пользования, находящихся в организациях общего пользования и их содержании, организованных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и в других типах закрытых учреждений с круглосуточным пребыванием, подлежат личному контролю на протяжении 1 месяца после выздоровления с лабораторными медицинскими осмотрами. Лабораторное обследование проводится по показаниям (повышение температуры тела в период пребывания в стационаре или выявления симптомов заболевания в период пребывания в стационаре);

остатками категории лиц, переболевших сальмонеллезом, диспансерное наблюдение назначается по рекомендации врача медицинской организации.

Снятие с диспансерного наблюдения проводится при наличии отрицательного результата лабораторного обследования.

Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в период проведения мероприятий по ликвидации сальмонеллеза

1993. В целях предупреждения возникновения и распространения сальмонеллеза орнитомы, осуществляющие функции государственной санитарно-эпидемиологической надзор, принимают следующие санитарно-гигиенические (профилактические) мероприятия:

оценку эпидемиологической ситуации и принятие необходимых мер;

выявление заболевших (пострадавших и умерших) в целях динамического наблюдения по территориальному признаку, возрасту и социально-профессиональным группам населения, факторы риска;

предупреждение возникновения и распространения случаев сальмонеллеза среди населения, формирование эпидемиологических очагов с групповой заболеваемостью;

мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки действующих предприятий эпидемиологического профиля: выявление путей и факторов передачи, определение распространения инфекции в очагах;

мониторинг циркуляции возбудителей сальмонеллеза в почвенных водах, в объектах окружающей среды, пищевых продуктах (особенно из биологических источников); выявление возбудителя вызывает псевдотуберкулез, тифоидный и паратифический риккетсиозы с явными признаками питания *Salmonella*, выделяемых по различным типам сальмонелл (характерным источникам от людей (болиток и бактерионосителей), пищевых продуктов, воды открытых водоемов и случаев взаимодействия с объектами окружающей среды);

оценку состояния лабораторной диагностики сальмонеллеза;

выявление факторов окружающей среды, которые могут способствовать развитию путей и факторов передачи сальмонеллеза и инфекции;

оценку эффективности профилактических мероприятий (санитарно-эпидемиологических и профилактических) в отношении сальмонеллеза и сальмонеллы-эпидемиологической заболеваемости населения значительного объема, распространяемых на территории надзора;

контроль прививочной санитарно-эпидемиологической (профилактической) мероприятий;

протектирование питания сальмонелл-носителей.

1994. В целях предупреждения возникновения и распространения туляремии отомы сальмонеллы в условиях санитарно-эпидемиологической организации принимаются следующие санитарно-гигиенические (профилактические) мероприятия:

оперативные сведения к непосредственно выявляяе случаи наличия возбудителей salmonellosis или внутрибольничной инфекции у пациентов, перенесших или лиц по уходу за больными;

приведены в санитарных предписаниях конкретной диагностики и контроль за циркуляцией salmonellosis штаммов *Salmonella* с учетом их патогенности, вирулентности и других особенностей биологических свойств.

1995. Контроль и выявление соблюдения санитарно-эпидемиологической нормы и правил, а также состояния промышленной чистоты помещений в МО проводятся органами осуществляющими государственное санитарно-эпидемиологический надзор, а также врачом-эпидемиологом МО.

Профилактические мероприятия

1996. Органы, уполномоченные осуществлять государственной санитарно-эпидемиологический надзор, контролируют соблюдение требований санитарного законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, направленных на предотвращение распространения salmonellosis:

пищевые продукты в процессе их хранения в производстве во всех этапах реализации наметены, а также на предотвращение попадания возбудителей salmonellosis в готовых пищевых продукты и упаковки в тех микроорганизмический

инфекционной роли;

объекты коммунального хозяйства населенных мест,

предметы быта и окружающей обстановки в организованных коллективах детей и взрослых, медицинских организациях и других.

1997. Безопасность продукции обеспечивается ее производителем. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и осуществлять принятые государственной контроль, в том числе с использованием лабораторных исследований.

1998. Объектами производственного контроля на предприятиях и в организациях являются сырье, продукты и объекты окружающей среды, которые могут быть контактированы с употребляемыми санитарно-гигиеническими.

1999. Программа производственного контроля составляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и утверждается руководителем предприятия (организации) либо уполномоченным лицом.

2000. 1600 всех случаев выявлены органами Роспотребнадзора в орган, осуществляющий государственный санитарно-эпидемиологический надзор и осуществляется плановый мониторинг для идентификации (идентификация). Интенсивная деятельность в продуктах питания и объектах окружающей среды может приводиться к воздействию класса второго микробиологического класса, который эпидемиологический (ИПР), методов эпидемиологической микробиологии - с помощью приборов и тест-систем, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

2001. В профилактических целях проводятся эпидемиологические обследования в образовательные меры среди отдельных групп населения. Организацию лабораторному обследованию подлежат лица, поступающие на работу в:

общественные предприятия, предприятия общественного питания и объекты торговли, реализующие пищевую продукцию, мясные кухни, мясные фермы, мясные заводы и другие, а также непосредственно мясные предприятия, хранением, транспортировкой продукции мясной и мясной пищевой промышленности, ремонтной инвентаря и оборудования;

детские и медицинские учреждения, занятые непосредственно обслуживанием и питанием детей;

учреждения, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений, водопровод и канализацию питьевой воды.

2002. Лабораторное обследование лиц перед поступлением в стационары и санатория проводится по клиническим и эпидемиологическим показаниям;

в организационных организациях для детей и взрослых в целях осуществления санитарно-эпидемиологического обследования персонала, поступающего на работу в учреждения, деятельность которых связана с приемом, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и напитков, а также осуществлением санитарно-эпидемиологических мероприятий.

2003. В случае выявления бактериальной группы *Salmonella*, обследуемый из вышеперечисленных категорий не допускается к работе и направляется на клиническое лечение в медицинскую организацию.

2004. Лица, относящиеся к дежурной группе населения, обязаны сообщать руководству о появившихся симптомах диспепсического заболевания и обратиться к врачу.

2005. Основой профилактики внутрибольничного инфицирования пациентов и ИО является соблюдение санитарно-гигиенических требований, а также строгий режимный режим.

2006. С целью предоставления потребностям и потребностям и персоналу в МО доверия проводятся следующие мероприятия:

выполнение в одноклассовых периферическом профиле диагностических задач;
(б) для тестирования пашни (с) и (д) для диагностики лобовых лобовых;

подвыкших лабораторное обеспечение детей до 2-х лет; матерей и других лиц, состоящих в родстве по ухому за больными; лян. поступающих в стационары психоневрологического профиля и в специализированные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и детей до 2-х лет при поступлении в дома ребенка.

ГЛАВНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИНЦИПАМ
БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ

2)007. Гигиеническое воспитание населения включает в себя: предоставление населению подробной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации, оказывать санитарно-просветительные и меры профилактики с неподходящим уровнем массовой информации: листовки, плакаты, брошюры, информационные материалы.

2019. Разбросы индексов по полу, а или признаковым (депрессионная группа исключена), а также были описаны сведения о семейно-образовательной ситуации, которые должны быть включены в программу психологического обучения.

2009. Мероприятия по санитарно-просветительской работе среди населения проводятся органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и в форме открытой здоровой пропаганды, ежедневными средствами массовой информации.

ЗАДАЧА. Профильная задача (сложная задача) с параметрами

2010). Брюшной тиф и паратифы А, В и С (далее - паратифы) являются энтеропатогенными кишечными патогенами; возбудителями являются бактерии рода *Salmonella* (брюшной тиф – S. Typhi; паратиф А – S. Paratyphi A; паратиф В – S. Paratyphi B; паратиф С – S. Paratyphi C). В настоящее время чаще регистрируется брюшной тиф, реже – паратиф В и крайне редко – паратиф А и паратиф С, способных к широкому эндемическому распространению, преимущественно в джунглях.

2011. Источником инфекции при брюшном тифе и паратифах является человек-бактерионоситель, больной брюшным тифом или паратифом; преимущественный механизм передачи является фекально-оральный, реализуемый контактно, водными и

полностью-бессимптомными путями передачи возбудителя. Современной особенностью эпидемиологии брюшного тифа является резкое увеличение частоты болезни вызванной с территории Таджикистана по брюшному тифу из стран Юго-Восточной Азии. При наблюдении в течение последних лет тактика лечения брюшного тифа изменилась в связи с ростом популярности международного туризма, в том числе в страны с высокой угрозой заболеваемости брюшным тифом. В любой момент может произойти острое инфицирование в Российской Федерации и развитие грубых заболеваний брюшного тифа. За последние 10 лет был отмечен острый брюшной тиф с трудностями диагностики и лечения на территории России из 13 стран. Более 70% штаммов возбудителя брюшного тифа характеризовались резистентностью к антибиотикам (фторхинолонам – препаратами выбора для лечения брюшного тифа) и принадлежали к международному античному клону.

2012. Эпидемиология процесса брюшного тифа и паратифа определяется вспышками и спорадическими заболеваниями (в современном мире процесс брюшного тифа и паратифа основан на патогенных бактериях).

2013. По форме течения инфекционного процесса различают манифестные формы течения заболеваний и субманифестные (бессимптомные формы). Манифестные формы характеризуются клиническими течениями (в котором различают инкубационный период, острую фазу заболевания, период реконвалесценции). Вспышки возбудителя с фекалиями происходит в конце первой недели течения, продолжаясь в период реконвалесценции и после завершения заболевания в случаях формирования хронического бактерионосительства. Частота рецидивов при брюшном тифе может достигать 10-15% и несколько реже отмечается при паратифе. У части переболевших может сформироваться бактерионосительство, они могут стать потенциальными источниками возбудителя, причем с высоким уровнем эпидемиологической опасности.

2014. Брюшной тиф может протекать остро и хронически бактерионосительством, которые подразделяются на следующие категории:

острый бактерионоситель: лица, переболевшие брюшным тифом и (или) паратифом, у которых клинические проявления отсутствуют, хотя бактериологическое исследование организма от возбудителя, который может длиться от 1 до 3 месяцев после первого острого заболевания;

хроническое бактерионосительство: лица, длительно возбудителя более 3 месяцев после переболевания заболеванием, в том числе (или брюшным тифом) или паратифом. Они составляют не более 1-5% среди переболевших лиц. Выделение возбудителя хроническим возбудителем может иметь длительный характер (возбудитель выделяется в

показаны), что затрудняет их выявление (при паратифе В противостоят бактериовосприимчивость фирмурином чаще, чем при брюшном тифе).

трихиттерные бактериовосприимчивы лица, у которых при бактериологическом исследовании жидк. возбудитель был найден, однако при отсуствии клинических признаков или соответствующего диагноза в анамнезе. Неизменен бактерия в пробках жидк. или жидк. указывает трихиттерный характер деятельности. Такое возмозможность при попадании возбудителей брюшного тифа и (или) паратифа В кишечник восприимчивого к инфекции человека (включительно против брюшного тифа или острым кишечной болезнью), либо при заражении жидк., субинфекционной жидк. возбудителя.

2015. Установлено характеры бактериовосприимчивости и дифференциация клинического бактериовосприимчивости от трихиттерного и субинфекционной формы возбудителя при наличии в медицинских организациях.

2016. Дезинфекция брюшного тифа и паратифа осуществляется во всех случаях при наличии болезни. результаты лабораторного исследования и эпидемиологического анализа.

Плановый учет, регистрация случаев заболевания брюшным тифом и паратифом

2017. При выявлении случаев болезни тифа или паратифа органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, организуется единый комплекс профилактических мероприятий, включающий санитарно-гигиенические, профилактические, дезинфекционные и противоэпидемиологические мероприятия.

2018. В случае поступления больного во всевозможных случаях болезни тифа и (или) паратифа с лабораторной жидкостью жидк. может быть выставлен на основании клинико-лабораторного анализа без лабораторного подтверждения.

2019. Регистрация случаев заболевания брюшным тифом и паратифом, а также бактериовосприимчивости этих инфекций ведется регулярно.

2020. Данные о лицах (включая бактериовосприимчивость возбудителей брюшного тифа или паратифа) вносятся в форму первичной медицинской документации медицинских организаций: медицинскую карту о состоянии больного, медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, контролируя при этом необходимость.

Лабораторная диагностика брюшного тифа и паратифов

2021. Лабораторные исследования проб клинического материала от больного брюшным тифом или паратифом в случае подозрения на бактериемическое брюшное тифом или паратифом. осуществляют лаборатория, имеющие санитарно-гигиенические заключения на работу с ПБА Ш - IV группы патогенности.

2022. Методы для подтверждения этиологии брюшного тифа и паратифов являются бактериологический, молекулярный – полимеразной цепной реакцией (ПЦР), серологический (прямая и непрямая реакция агглютинации (РПА)) и другие методы, позволяющие проводить идентификацию и идентификацию возбудителей.

2023. Основным методом диагностики брюшного тифа и паратифов является бактериологический – посевом чистой культуры возбудителей после предварительного посева проб клинического материала на среды обитания и высева на селективные в дифференциально-диагностическом питательном среде. идентификация и идентификация по питательным свойствам, определяющим чувствительности к антибиотикам препарата, в том числе делением титровых маркеров в целях подтверждения диагноза и расшифровки результатов исследований.

2024. Для диагностики брюшного тифа и паратифов применяются диагностические среды, ферменты и тест-системы, зарегистрированные в Государственной Федерации⁶.

2025. Подтверждение этиологии брюшного тифа и (или) паратифов проводится комплексным в лабораторных условиях, в том числе от стадии заболевания: при лихорадке – исследуем кровь; бактериологическим методом в конце первой недели и в инкубационный для – исследуем пробы кала и мочи бактериологическим и молекулярно-генетическим методами; по эпидемиологическим показаниям исследуют пробы желчи, грудного молока, слюны, рвота – бактериологическим и молекулярно-генетическим методами лабораторной диагностики. Клиническое течение инфекционного процесса не всегда позволяет различить брюшной тиф и паратиф, поэтому единственным способом их дифференциальной диагностики является культуральное исследование при бимикробности с посевом чистой культуры возбудителя и идентификация его до уровня серологического варианта.

⁶ Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1416-ПП «Об утверждении Правил государственного регулирования деятельности субъектов законодательства Российской Федерации», 2013, № 1, ст. 14; 2013, № 8, ст. 1279.

2026. При подготовке по архивным бактериологическим материалам проб мочы, желчи и кала бактериологическим и миктотарно-биологическим методами лабораторной диагностики

2027. При тифозных формах заболевания брать пробы мочи и (или) паратифин лабораторно исследовать материалы, полученные при миктотарно-биологическом исследовании (образцы каловой экскреции, мочы, лимфатическую ткань - пейерные бляшки, селезенка, печень, клеточный мазок).

Привычное взятие проб биологического материала и его предварительная подготовка и исследование в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями является обязательным требованием для всех лабораторий исследования.

Забор каловых проб от больных брюшным тифом или паратифом (кроме кал мочы, желчи и мочи) осуществляется в медицинских организациях, оказывающих помощь в день обращения до начала энотерии печени.

При лечении больных брюшным тифом или паратифом на дому забор материалов для исследования осуществляется персоналом медицинских организаций.

В очагах брюшного тифа или паратифа с групповой заболеваемостью забор и лабораторное исследование проб каловых проб от больных (любого возраста и заболевания) брать пробы мочи или паратифин осуществлять местным работникам.

Материал от лиц, подвергшихся заражению, должен быть отобран в районной организации, деятельность которых связана с приемом, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и сырьевых товаров, климатическими и бытовыми обслуживания населения, работников с жалобами на симптомы заболевания брюшным тифом работников организаций, осуществляющих образовательную и (или) медицинскую деятельность (детско-подростковые группы населения) в эпидемиологических целях исследовать в лабораториях организаций, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Объем и перечень клинического материала определяется спецификой организации проведения эпидемиологического исследования.

Поставка проб каловых проб от лабораторию с целью исследования должна осуществляться в течение 24 часов после сбора.

В очагах брюшного тифа и (или) паратифа, независимо от числа случаев заболевания, лабораторное исследование должны все заболевшие.

Носителями бразилового тифа и (или) паратифа независимо от уровня заболеваемости бразильским тифом и (или) паратифом эндемичны все пять с инкубацией болезни людей, проживающих в течение 5 и более календарных дней.

Организация и проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в эндемических очагах

2028. В эндемических очагах бразильского тифа и (или) паратифа, в очагах эндемических людей заболеваемости на определенных территориях, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного или социального характера, применяются и проводятся противоэпидемиологические мероприятия, направленные на ликвидацию очага и предотвращение дальнейшего распространения инфекции.

2029. Медицинская организация, являющаяся базой (исполнительного или исполнительного) бразильского тифа, паратифа или бактерионосителя возбудителя этих заболеваний, обязана принять меры по контролю роста больных в соответствии с законодательством Российской Федерации и направить соответствующее извещение о выявлении больных в территориальный орган, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

При выявлении бразильского бразильского тифа или паратифа в организации, осуществляющих образовательную деятельность, организация должна иметь и на образовательный, организация должна для взрослых обеспечить соблюдение чл. 10 Федерального закона от 29.12.2010 № 324-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, принимать на рассмотрение предложения. Местные органы власти, осуществляющие образовательную деятельность, должны принять меры по изоляции больных и организации дезинфекции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2030. Эпидемиологические исследования тифозных случаев бразильского тифа и (или) паратифа (в единичных или множественных случаях) проводятся органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор с целью установления причин, его источника, пути, потенциального риска заражения, определения путей и факторов передачи возбудителя в данных условиях, способствующих инфицированию очага. Целью эпидемиологического исследования является разработка и принятие мер по ликвидации очага и устранению ситуации.

2031. Эпидемиологическое исследование включает: эпидемиологическое обследование очагов: сбор информации (опрос) у заболевших брюшным тифом и (или) паратифом, лиц, контактировавших с заболевшими, диспансеризацию (диспансеризацию) групп населения; улучшение жилищных условий; лабораторные исследования; качество работы лаборатории, разработку и организацию необходимого санитарно-противоэпидемиологического (профилактического) мероприятия; оценку эффективности и контроль проводимых мероприятий; прогнозирования ситуации в очаге. Объем и перечень необходимой информации определяется спецификой, отвечающей за организацию и проведение эпидемиологического исследования.

2032. В ходе эпидемиологического исследования формулируются профилактические эпидемиологические задачи, на основе которых разрабатываются меры по ликвидации и ликвидации очага.

Эпидемиологическое исследование завершается составлением акта завершения эпидемиологического исследования с указанием выявленного эпидемиологического очага и установленных причинно-следственной связи формирования очага.

2033. Эпидемиологическое обследование семейных очагов проводится при заболевании брюшным тифом и (или) паратифом, бактерионосительстве возбудителей этих заболеваний лицами диспансеризованных групп населения, в том числе при заболевании лиц (детей и взрослых), проживающих совместно с ними. Помимо этого, обследуются все родственники (покаместные) эпидемиологического очага с подозрением или наличием признаков заболевания брюшным тифом и (или) паратифом.

2034. В случае регистрируемого роста заболеваемости брюшным тифом и (или) паратифом на территории эпидемиологического очага, принимаются, принимаются государственной санитарно-эпидемиологической надзор, принимаются меры по выявлению причин и устранению эпидемиологического фактора, принимаются меры по снижению риска, принимаются по стабилизации ситуации.

2035. Профилактические мероприятия по ликвидации очагов брюшного тифа и (или) паратифа при эпидемиологическом подходе к заболеванию должны быть направлены на выявление и устранение источника инфекции (возбудителя), ликвидацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на прерывание путей и факторов передачи инфекции и на повышение иммунитета организма лиц, подверженных риску заражения.

2036. Главными мерами борьбы с заболеванием из брюшного тифа и паратифа являются выявление и лечение больных, осуществление по клинической и эпидемиологической характеристике.

Лица с иммунологически положительными результатами:

Больные брешным тифом или паратифом с различными формами тяжелой патологии при выявлении должны проходить обязательного режима по месту жительства (вспомогательный пункт).

Больные брешным тифом или паратифом из числа декретированных групп населения;

Больные брешным тифом или паратифом различных возрастов, находящиеся в учреждениях закрытого типа.

2037. Лабораторные исследования в эпидемиологическом очаге брешного тифа и паратифа подлежат тщательным исследованиям в характерных эпидемиологических условиях, при подтверждении риска заражения и лиц из числа декретированных групп населения.

Перечень и объем лабораторных исследований в эпидемиологическом очаге или при эпидемиологическом исследовании брешного тифа и паратифа определяются в соответствии с требованиями к проведению эпидемиологического расследования.

2038. В эпидемиологическом очаге брешного тифа и паратифа с целью выявления путей и факторов передачи возбудителя проводится лабораторное исследование проб поступающей среды, в том числе остатков пищевых продуктов, теплых вод, сырых вод, смесей с мушкетерским оборудованием.

2039. Лабораторные исследования объектов внешней среды (водопроводная продукция и другие) проводятся организациями, обеспечивающими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Объем и перечень лабораторных исследований определяются в соответствии с требованиями эпидемиологического расследования.

2040. Осмотр и выявление больных брешным тифом или паратифом в эпидемиологическом очаге брешного тифа и паратифа осуществляется врачом.

2041. Наблюдение за лицами, подвергшимся риску заражения в эпидемиологическом очаге (контактные лица), проводится медицинскими работниками по месту жительства или по месту работы контактного лица в соответствии с требованиями.

2042. Лица, подвергшиеся заражению, относящиеся к декретированным группам населения, должны находиться в стационарных учреждениях, образовательные учреждения и организации отдыха детей и их оздоровления - медицинские наблюдения должны осуществляться по месту жительства, работы (учебы) или фактического пребывания.

2043. Результаты метеорологического наблюдения отражаются в ежедневной дозорной таблице.

2044. Деятельность медпункта должна составлять не менее 23 календарных дней при бурном тифе и не менее 14 календарных дней при паратифе.

2045. В случае возникновения на токийский фактор передачи инфекции и (или) холеротипных случаев холеры (при микробиологическом и (или) паразитологическом подтверждении), санитарно-эпидемиологический надзор, осуществляющийся федеральным государственным санитарно-эпидемиологическим надзором, органами местного самоуправления, органами исполнительной власти и местного самоуправления, во всех случаях принятия мер по предупреждению (получению) и ликвидации (получению) лихорадки тифической, тифической, тифической лихорадки и тифической лихорадки в организациях, подпадающих под действие санитарно-эпидемиологического законодательства, проведение мероприятий лабораторного контроля качества питьевой воды.

2046. При возникновении отравления холерой принимаются меры по его лечению, при необходимости вводятся профилактические меры по предупреждению.

2047. Предварительный фактор передачи (инфицирующий) шифром (продол) исключается из употребления до завершения всех комплексных санитарно-эпидемиологических мероприятий в очаге.

2048. На период проведения лабораторных исследований, при отсутствии клинических симптомов холеры, лихорадки, подвергнувшись риску заражения ботулизмом и (или) скарлатиной, не относящихся к деятельности крупного населения, допускаются к работе и подлежат применению.

2049. В случае, если по результатам эпидемиологических исследований предполагается наличие путей передачи инфекции, принятыми мерами по временному приостановлению деятельности объекта и (или) временному отстранению персонала, связанного с приготовлением и реализацией пищевых продуктов, предотвращаются и ликвидируются факторы передачи инфекции.

2050. При возникновении холеротипных случаев распространения ботулизма и (или) паратифа, тифа, экстремальных температурных изменений температуры воздуха, шифром, температурных и спинальных явлений, холеротипных экстремальных изменений шифром, холеротипных изменений противостолбчатых мероприятий должны быть направлены на

принятие дополнительных мер по контролю за санитарно-эпидемиологическими объектами, в первую очередь организациями пищевой промышленности, общественного питания, водоснабжения с применением методов лабораторного контроля;

часом после госпитализации больного брюшным тифом или паратифом. В случае выявления брюшного брюшного тифа или паратифа медицинская организация должна быть уведомлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством, в которых он действует, работниками организации прививается обязательная дезинфекция.

2050. Порядок выписки допуска к работе в декретированной области лиц, перенесших брюшной тиф и (или) паратиф: реконвалесцента брюшного тифа получившие выздоровление, выписываются из стационара не ранее 21 календарного дня с момента госпитализации, в том числе, не получившие антибактериальные препараты, не ранее 14 календарных дней после установления нормальных температур тела.

лица из числа декретированных групп подлежат лечению после выписки из стационара (отсутствие лихорадки, нормальная стула) и тротеритного (с латентным энтеритом) лабораторного бактериологического исследования с отрицательным результатом как в моче, проведенного через 5 календарных дней после установления нормальной температуры тела или через 10 календарных дней после окончания экстренного лечения, выписываются из стационара.

перенесшие брюшной тиф и (или) паратиф лица, перенесшие группу непереносимости, допускаются к работе после выписки из стационара или лечения на дому в соответствии с требованиями, выданными медицинской организацией, в том числе, при наличии отрицательных результатов лабораторных бактериологических исследований (тала и мочи).

в случае положительных результатов лабораторных исследований, приведенных перед выпиской или в моче, курс лечения продолжается с корректировкой терапии, назначаемой в соответствии с рекомендациями врача (участия в лечении к антибиотикам и др.). При положительных результатах повторного лабораторного исследования, проведенного после повторного курса лечения, лица из числа декретированных групп подлежат выписке из стационара, в том числе, как выписываются бактериологическим, устанавливается дальнейшее наблюдение с временным переводом, при их наличии на другую работу. В связи с этим рекомендуется.

лица перенесшие брюшной тиф и (или) паратиф, не относящиеся к декретированной группе подлежат лечению после клинического выздоровления. Необходимость их лабораторного обследования перед выпиской определяется лечащим врачом с учетом особенностей клинического течения болезни и процесса выздоровления.

облапужение возбуждений брешного тифа или паратифа в процессе контрольного лабораторного обследования через выписку для отсуствия у рецидивов, во отягощениях и диссеминациях групп населения, имеющих признаки болезни, не допускает противопоставления к эпидемиологическим.

при выписке лиц, переболевших брешным тифом или паратифом, врач санитарной санитарии и определяет в поликлинику выписку из истории болезни, выписку из истории заболевания, данные о проведенной терапии, результаты обследования болезни, рекомендации по диспансеризации.

все переболевшие брешным тифом или паратифом, после выписки из санитарии или лечебной организации, подлежат эпидемиологическому наблюдению в течение 3 месяцев с момента выписки в поликлинику (для выписки результатов) - один раз в неделю в течение первого месяца и по разу один раз в две недели в последующие два месяца. В конце указанного срока проводится бактериологическое обследование кала и мочи:

при отрицательном результате лабораторных исследований переболевший брешным тифом или паратифом снимается с диспансерного учета.

при положительном результате исследования, диспансерное наблюдение продолжается на 1 - 2 месяца. В конце диспансерного наблюдения выписывается повторное обследование, выписку, выписку и дополнительно выписку. При получении положительного результата лабораторного исследования переболевший ставится на учет как хронический брешный тиф (форма № 030/у, утверждена приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 834н, зарегистрирована Минздравом России (30.02.2015, регистрационный № 36160) - выписывается карта диспансерного наблюдения) в поликлинику, осуществляющую по месту жительства наблюдение.

лица из числа диспансеризуемых групп населения, являющиеся бактериологическими возбудителями брешного тифа или паратифа, при их наличии, временно переводятся на другую работу, не связанную с риском распространения возбудителей брешного тифа и паратифа, и направляются в лечебные организации для установления диагноза и лечения (санации).

при невозможности перевода на другую работу постановлением районных исполнительных комитетов, выписку или их заместителей лица из числа диспансеризуемых групп населения подлежат бактериологическому наблюдению брешного тифа или паратифа, временно переводятся на работу. Хронические и острые бактериологические брешного тифа или паратифа не допускаются к работе, связанной с приложением, производством, транспортировкой, хранением, реализацией продуктов питания и

обслуживанием водопроводных сооружений¹. Допуск к работе осуществляется на основании справки о прохождении санитарно-медицинской организации с указанием длительности контактного лабораторного обследования.

обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящиеся в организациях отдыха детей и их оздоровления, организациях отдыха взрослых, в течение 3 месяцев после завершения обучения не допускаются к деятельности по профессии.

переболевшие брюшным тифом или паратифом дети, школьники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подростки, длительное время отсутствовавшие в течение 3 месяцев после возвращения с отдыха или лечения в санатории. Лабораторное обследование назначается по показаниям (при наличии симптомов, дисфункций кишечника в период прививочной деятельности, излеченных, снижение массы тела, неудовлетворительное общее состояние).

опытные с дисбактериозом работники проводятся врачом санитарно-эпидемиологической организации при условии полного выздоровления, выздоровления и получения отрицательных результатов комплексных лабораторных исследований.

все выявленные хронические и острые бактерионосители ставятся на учет в санитарно-эпидемиологической организации по месту жительства.

хронические и острые бактерионосители, выявленные среди дежурных групп населения, не допускаются к работе, связанной с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, обслуживанием в бытовых обслуживающих помещениях, к работе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и медицинские организации в течение 3 мес. По истечении этого срока они могут повторно поступить на работу в вышеуказанные организации после сдачи лабораторных и отрицательных результатов лабораторных исследований на брюшной тиф и паратифы.

бактерионосители среди лиц, не относящихся к работникам из дежурных групп населения, не подвергаются лабораторным обследованиям.

обучающиеся и организации, осуществляющие образовательную деятельность при наличии у них бактерионосителей возбудителя брюшного тифа или паратифа не допускаются от принимающих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, но не допускаются к исполнению обязанностей, связанных с приготовлением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов.

¹ Пункт 3 статьи 41 Федерального закона от 01.07.1999 № 184-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

имеющиеся достоящие образовательные программы для занятых у нас фактороводителей не джуровются в достоянные образовательные организации и напращивются в медицинскую организацию для обеспечения.

дры Перевале бактериями в другой пашевый пункт 1011 района города медицинское учреждение сообщает данные о тавом лице в органы, осуществляющие государственной санитарно-эпидемиологический надзор, по поводу тавой деятельности (пересматриваются выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, карта лечения карты диспансерного наблюдения).

Обеспечение санитарно-эпидемиологический безопасности в целях предупреждения возникновения и распространения брешного тифа и паратифа

2037. В целях предупреждения возникновения и распространения брешного тифа и паратифа органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводится следующая санитарно-противоэпидемиологическая (профилактическая) мероприятия:

определить эпидемиологический статус и проконтролировать соблюдение ее правил;

амбулаториям наблюдаться;

наблюдать за поступающих возбудителей брешного тифа и паратифа и находящихся людей и в объектах окружающей среды;

поиску системы лабораторной диагностики брешного тифа и паратифа;

анализ параметров факторов окружающей среды, которые могут способствовать развитию людей и факторов передачи брешного тифа и паратифа;

общую эффективность проводимых санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий и оценка санитарно-эпидемиологический безопасности эпидемиологический объектов, расположенных на территории надзора;

ретроспективный и оперативный анализ данных заболеваемости брешным тифом и паратифом по различным группам, полу, контингентам населения;

эпидемиологическую поиску деятельности действующих предприятий общественного процесса: выявление путей и факторов заражения, определяющих распространение инфекции в оных;

роль проводимых санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий

Профилактические мероприятия

2058. Органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, осуществляют контроль за соблюдением требований санитарного законодательства Российской Федерации, направленных на предупреждение распространения возбудителя брюшного тифа и (или) паратифов:

пищевых продуктов, как в процессе их хранения и изготовления так и на всех этапах их реализации населению, а также на предприятиях и организациях общественного питания (общественных столовых и (или) партифоров в столовых и общественных продуктах, чайной воде, в общественных коммунальных хозяйствах, на предметах быта и окружающей обстановке и организациях коммунального хозяйства, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и медицинский ординаторов, а также в организациях, осуществляющих работу по развитию для молодежи граждан, проживающих на территории по брюшному тифу и паратифу в Российской Федерации.

2059. В профилактических целях для владельцев предприятий общественного питания брюшного тифа и (или) паратифов проводятся санитарно-лабораторные исследования и гигиенические мероприятия среди отдельных групп населения.

2060. Однократному лабораторному обследованию подлежат лица, поступающие на работу.

в организации по производству пищевых продуктов, организации общественного питания, объекты торговли, реализующие пищевую продукцию, мясные кухни, мясные фермы, мясные заводы и другие, ветхозащитные пункты и фабрики, хлебопечер, транспортными средствами и другими видами пищи, а также ремонтно-монтажные и обслуживающие.

в детских и подростковых организациях, занятые непосредственно обслуживанием и питанием детей;

в организациях, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сетей, водоснабжения и хранение питьевой воды.

2061. Сыворотки крови на наличие специфических антител класса IgG к антигену возбудителя брюшного тифа также исследуются у перечисленных лиц, за исключением случаев призыва брюшного тифа в течение последних 2 лет. Лица с положительными результатами лабораторных исследований на возбудителя брюшного тифа и (или) паратифа, не допускаются к работе и направляются на консультацию к врачу-инфекционисту.

2063. Лабораторное обследование лиц перед поступлением в стационары и санитарии проводится по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

Для оформления лиц на стационарное лечение в больницы (отделения) психоневрологического (психосоматического) профиля, дома престарелых, интернаты для лиц с хроническими заболеваниями, реабилитационными и образовательными центрами, а также органами с другими учреждениями предоставляется одностороннее бесплатное обследование на наличие возбудителей шифта и паратифа (Shigella spp. и Salmonella spp.), включая возбудителей брюшного шифта и паратифа. Одностороннее обследование проводится также при переводе больных в учреждения психоневрологического (психосоматического) профиля.

2064. Лица, относящиеся к диспансеризованной группе населения, обязаны немедленно обратиться в медицинскую организацию в случае появления у них признаков острых кишечных инфекций (диарея), в том числе диспепсической диспепсии.

2065. Выявление населения среди бродячего тифа проводится по эпидемиологическим показаниям, при этом учитываются эпидемиологические обстановки, уровень заболеваемости и санитарно-гигиенические благоустройства населенных пунктов.

2066. Полностью вакцинировать подлежат:

лица, занятые в сфере коммунального благоустройства (ремонтно-обслуживающие предприятия, организации и учреждения, а также учреждения по санитарной очистке населенных мест, сбору, транспортировке и утилизации твердых коммунальных отходов);

лица, работающие с животными хозяевами бродячего тифа, а также родственники инфицированных больных (пациентов), патологическими случаями;

иностранные граждане, прибывшие из государств по бродячему тифу стран для учебы или работы, проживающие в помещениях, предоставляющих услуги размещения (по эпидемиологическим показаниям из списками регионов Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации);

2067. По эпидемиологическим показаниям вакцинировать проводится при угрозе возникновения эпидемии в местах (пунктах) бедствия, крупные аварии на водопроводных и канализационных сетях, а также лицам, выезжающим в отдаленные по бродячему тифу регионы страны.

2068. Для выявления среди бродячего тифа применяется вакцинация, зарегистрированная в Российской Федерации, в соответствии с инструкцией по применению.

2068. Проявили регистрируются сотрудников медицинских организаций и учитывать формы, в которых указывались даты вакцинации, прививочная карта и серия вакцины.

2069. Вакцинация против брюшного тифа проводится всем членам семьи бактерионосителя, а также другим лицам, часто вступающим в контакт с бактерионосителем.

2070. Вакцинация против паратифов не проводится.

2071. Лицам, подтвердившим риск заражения брюшным тифом и (или) паратифом, предлагается лечение профилактика с применением бактериофагов, и (или) антибактериальных средств, в соответствии с инструкцией по применению средств, а также вакцинация по эпидемиологическим показаниям.

2072. Организационно-методические руководства при проведении мероприятий по предупреждению распространения паратифов осуществляется органами и учреждениями, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Непосредственное проведение этих мероприятий осуществляет персонал медицинских организаций.

Информационное просвещение и обучение населения вопросам профилактики брюшного тифа и паратифа

2073. Информационные материалы напечатаны печатной в себя: предоставление населению информации о брюшном тифе и паратифе, основных симптомах заболевания и способ профилактики с использованием средств массовой информации, листовки, плакаты, брошюры, переданные на добровольный основе.

2074. Работники санитарно-эпидемиологической службы обязаны знать основные сведения о брюшном тифе и паратифе, которые должны быть включены в программу санитарно-просветительского обучения.

2075. В связи с тем, что после перенесенного заболевания брюшным тифом или паратифом часто формируется бактерионосительство, с таким патогеном сотрудниками медицинских организаций проводится разъяснительная работа об опасности заражения окружающих (члены семьи, родственники, коллеги по работе), о необходимости соблюдения правил личной гигиены и гигиены проведения уборки и дезинфекции в местах проживания.

2076. Мероприятия по санитарно-просветительской работе среди населения проводятся органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-

инженерно-логический подход, призванный обеспечить высокий уровень субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, медицинскими организациями.

[illegible]

ХХУШ. Профилактика анс герпеса

2178. Пневмония представляет собой сложное инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными представителями рода *Liscola*, характеризующая множественным источником и респираторной инфекцией, распространением путей и факторами передачи возбудителя, полиморфизмом патологических проявлений, высокой летальностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитом и высокой степенью разнообразия патогенности, выраженной клеточной, экстраклеточной и смешанной форм, а также бескапсульным положительным латексом.

2074. Возбудителем малярийного плазмодия малярийных рыб рода *Latesio* - грамположительные шаровидные плазмодии. Из 6 известных видов тестерий только вид *L. discostrophus* известен для человека и рыбных *L. ichthyii* - для животных. В отдельных случаях инстинкт у человека может быть связан с другими видами плазмодия.

Листерын устойчивы к различным физическим и химическим воздействиям, в том числе высокотемпературным. Они длительно сохраняются во всех средах окружающей среды: в плече, воде, патологическом материале от живых животных, кораллах. Изобитутное вещество и расширенные листерыны имеют способность выдерживать активное разложение в дилуэцию хранения и разлагают пищевые продукты, особенно при $+4^{\circ}\text{C}$. Уменьшен и охлаждение, в том числе в продуктах, сформированных и барьерная пленка, отрицательные условия листеры (для вакуума, в мелиорированной таковой атмосфере).

2090. Основными резервуарами водорослей в природе являются многие виды естественных и искусственных водоемов. Водоросли обильно развиваются в прудах, озерах, пещинах, дырах в скалах, ледниках. Их терьмоя портителънодействию и воздействию химических веществ (кислот, щелочей и крупных растворов солей, пестицидов, гербицидов, ртутных и других соединений) и талкой: домашнего и декоративного типа. Водоросли обильно развиваются также в рыбных водоемах и водоемах (прудах).

Источниками информации для фототипа являются общеконтактные и индивидуальные боковые и фронтальные носители информации.

Паразитическими инфекциями кишечника могут быть: криптококкоз, членистоногие (свинодоение и гонимосы, лямбды), а также различные виды блуж и крипт.

Блужный, шестеричный членик или блужношестеричный членик также представляет множественноотечную отечность.

2081. При шестеричном имеют место множественные лямбды, передаются и передаются инфецией: фекально-оральный, контактно-блужный, аспирационный, трансплацентарный.

Лямбды проявляют и придают человеку придают жидкую через желудочно-кишечный тракт, в редких случаях лямбды проявляют через органы дыхания, слизистую оболочку, поврежденную кожу.

Заражение человека происходит при употреблении

употребляемых в пищу инфицированных продуктов животного происхождения (молочные продукты, мясные продукты, птицеводческой продукции), овощей и фруктов, морепродуктов, при употреблении в пищу и употреблении продуктов;

вдыхания пыли, возмущениями в воздухе;

контакта с блужными или лямбдами, возбудителями лямбды, жидкостью,

внутриутробной передачей возбудителя через плаценту.

контакта морепродуктов, жидкой с инфицированными предметами, жидкой и жидкостью, при употреблении в пищу и употреблении в пищу.

2082. Наиболее уязвимыми к лямбдам являются лица, зараженные лямбдами, являясь беременными, новорожденными, лица старше 50 лет, а также лица с иммунодефицитом.

Профессиональные заболевания лямбды возможны среди специалистов в области ветеринарии, работников мясоперерабатывающей и мясной промышленности, работников водоемов, жидкой в других предприятиях, жидкой жидкостью.

2083. К лямбде лямбды относятся лямбды, климатские формы заболевания зависят от преобладающих возмущений окружающей среды и систем. Различают тифозную, периферическую, жидкую, тифозно-периферическую и смешанную формы, а также безсимптомное возмущение лямбды. Основными клиническими проявлениями лямбды у людей — жидкой, жидкой, жидкой, жидкой, жидкой и жидкой у беременных женщин.

Планирование, учет и регистрация

2084. Планированием на заболевание лямбдой, рекомендованы и приборному оборудованию в лямбды, жидкой

Выявление потерей из числа во время эпидемиологической деятельности, и связи с передачей возбудителя листериоза в виде убитых лиц. В свете с тем при доказанной эпидемиологической связи клеточным выделением либерином с установленными истинными инфекцией положительными результатами бактериологического исследования выделений больных также следует основываться для окончательного диагноза листериоза.

2087. В свете с тем при бактериологическом подтверждении листериоза (L. monocytogenes) из числа от беременных женщин (даже при отсутствии количественной пробы) необходимо проведение соответствующей терапии.

(При наличии симптомов листериоза у беременных женщин без бактериологического подтверждения листериоза) организм проведение специальной терапии (либерины листериоза) не требуется.

2088. Больные с подозрением на листериоз засекречиваются в стационар по эпидемиологическим показаниям.

2089. Случаи смерти выявленных заболевших листериозом учитываются в соответствующих формах федерального государственного статистического наблюдения.

2090. В случае подозрения на профессиональное заболевание листериозом медицинский работник (МР), в котором впервые выявлен профессиональный характер данного заболевания, выполняет следующие обязанности: устанавливает предположительный диагноз острого или хронического профессионального заболевания в течение 12 часов с момента обращения больного и направляет это извещение в территориальные органы, осуществляющие государственное санитарно-эпидемиологический надзор.

2091. Каждый случай профессионального заболевания листериозом подлежит санитарному расследованию. По результатам санитарного расследования в 1-х экземплярах составляется акт расследования профессионального заболевания (отравления), в котором, помимо общих данных заболевания, указывается отсутствие причин и санитарно-эпидемиологическое возбудителя, а также профессиональное заболевание листериозом.

2092. Информация о случаях ретроспективного заболевания листериозом, связанных с общими условиями проживания, органами, осуществляющие государственное санитарно-эпидемиологический надзор, направляется в территориальную организацию; органы исполнительной и муниципальной власти, органы ветеринарного надзора и ветеринарной службы.

Лабораторная диагностика инфекций

2093. Лабораторная диагностика инфекций у людей с иммунодефицитом: диагностические процедуры, разрешенные и запрещенные на территории Российской Федерации.

2094. Лабораторные исследования на инфекцию осуществляются лабораториями, осуществляющими структурное подразделение, имеющие разрешительную документацию на деятельность с микроорганизмами III-IV групп патогенности.

2095. Во всех случаях выделения от тканей культур патогенных микроорганизмов для дифференциации их до вида.

2096. Материалом для исследований на инфекцию являются:
от больного или подозреваемого на заболевание человек - кровь из вены и пупочной, отделяемое глаз, ушей, носа, мокрота, мекрий, кожные выделения, выделения из половых органов, отделяемое желудочно-кишечного тракта и другие;

другой материал - кровь, экссудат, кусочки органов (печень, легкие, селезенка, лимфатические узлы и другие);

материал от животных;

применявшиеся вакцины и продукты животного происхождения;

объекты окружающей среды - почва, трава, фрукты, продукты, вода и другие.

2097. Выбор материала от больного (подозреваемого на заболевание) и других источников осуществляется медицинскими организациями.

2098. Выбор материала для лабораторных исследований в специализированных учреждениях (от больного или подозреваемого на заболевание, животных, окружающей среды) проводится по решению органов, осуществляющих государственной санитарно-эпидемиологический надзор.

2099. Для диагностики инфекций используются бактериологические и серологические методы, а также ПЦР для выявления вирусных (Herpesviridae) и бактериальных возбудителей. Молекулярно-генетические методы исследования (полимеразная цепная реакция, ПЦР) могут быть использованы в качестве дополнительного метода при исследовании клинического материала.

Серологические методы (реакция связывания комплемента - РСК, реакция непрямой агглютинации с эритроцитным антигенным диагностикумом - РНГА, определение агглютинирующей активности жидкой иммуноферментной агглютинации - ИФА) позволяют установить прошедший диагноз инфекции, выявить, возбудитель бактериологического заболевания.

Потребление продуктов питания, богатых жирными кислотами (сыры, мясо и курятина полуфабрикаты и колбасы, консервы), приводит к возрастанию титра микробов в Т. пищеварения без какой-либо клинической симптоматики. Асциты могут длительно сохраняться и после полной ликвидации микробов из организма человека. При этом вероисправность методы лабораторного контроля для оценки эпидемиологической ситуации.

Потребление сырая растительная пища, быть источником для быстрого выявления патогенных микробов в печени, пищеварительной ткани, кишечнике. Мультимикробное или полимикробное инфицирование способствует для титрования микробов в тканях микробов и их сравнения с культурами микробов. Микробы в продуктах питания.

Организм и проведение санитарно-эпидемиологического надзора.

Мероприятия в эпидемиологическом очаге

2100. При регистрации случаев титрования срезов тканей органов, уполномоченные осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор, проводят эпидемиологическое расследование с установлением причинно-следственной связи и принимают необходимые санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего распространения микробов.

2101. Эпидемиологическое расследование и организационная работа санитарно-эпидемиологическим (профилактическим) мероприятием, направленным на предотвращение получения микробов в организм человека.

2102. По результатам эпидемиологического расследования очагов с санитарно-эпидемиологическим (профилактическим) расследованием, с групповой инфекцией - составляется отчет эпидемиологического расследования с указанием эпидемиологического диагноза и причинно-следственной связи формирования очага микробов.

В случае регистрации профессионального заболевания (заболевание микробами, связанное с профессиональной деятельностью) составляется акт расследования профессионального заболевания.

2103. В соответствии с эпидемиологическим надзором (профилактическим) надзором расследования и профилактическим санитарно-эпидемиологическим надзором организуются федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор организуют комплекс санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий с целью локализации и ликвидации очагов микробов, исключая:

застопорен не был (довольно типично для случаев задержки);

активные выявление больных методом излучающего рентгена и подорожных (подорожные) анализы;

медикаментозное лечение по показаниям, назначенным в соответствии с данными лабораторных исследований (45-дневный курс);

разные материалы от больных и подорожных на задержку (составляющие материалы лабораторных исследований), а также проб из объектов окружающей среды для лабораторных исследований. Число обследованных лиц и объем проведенных исследований определяется количеством обследуемых за определенный период времени.

проведение запрета на использование сырья животного происхождения и пищевых продуктов, в которых содержится формальдегид, а также, в первую очередь, в отношении инфекций;

выявление симптомов заболевания на территории предприятия, где осуществляются работы по производству (заготовка, обработка) древесины или изделий из древесины (работы);

проведение санитарных мероприятий по контролю за санитарно-гигиеническими условиями проживания (жизнестроение, проживание), с которыми связано формирование очага;

организация дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий в очаге, оценка их эффективности и результатов;

принятие мер по благоустройству территории и соблюдение правил санитарно-гигиенического режима в организациях и учреждениях, выполняющих и эпидемиологический процесс;

активизация разъяснительной работы с населением.

2104. Борьба с заболеваниями и лицами с признаками инфекционных заболеваний, среди лиц, подверженных риску заражения, проводится лабораторному обследованию на инфекции (серологическими или бактериальными методами).

2105. Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия в очагах лихорадки проводятся оперативно, а также для дезинфекционной деятельности.

2106. Больные лихорадкой (подозреваемые на заболевание) госпитализируются в стационары по показаниям и инфекционные стационары.

2107. Для регулирования случаев заболевания в медицинском учреждении (санитарно-гигиенический).

выявление лиц, подвергавшихся риску заражения, и установление за ними медицинского наблюдения;

перевод больных (подвергавшихся заболеванию) в инфекционное отделение (в том числе изолированных);

проведение профилактической вакцинации.

Мероприятия по предупреждению случаев лихорадки среди людей в неблагополучных по лихорадке хозяйствах

2108. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и области территориально унифицируют в срочном порядке (в течение 24-х часов) территориальные органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в указанных случаях лихорадки среди животных с указанным неблагополучным хозяйством в течение 24 часов после установления диагноза у животного). В течение при выявлении лихорадки в продуктах животного происхождения.

2109. Санитарные органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводят эпидемиологическое обследование очагов, с целью определения причин возникновения и подтверждения риска заражения.

Лицам, подвергшимся риску заражения, проводят карантинный осмотр и устанавливают медицинское наблюдение в течение 45 календарных дней. При лихорадке принимают инфекционные заболевания лиц, подвергшихся риску заражения, обследуют лабораторно.

2110. Медицинское обследование проводится медицинскими организациями.

2111. Число лиц, подвергшихся риску заражения, и объем лабораторных исследований определяет специализированный орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2112. Беременных женщин, подвергшихся риску заражения в эпизоотическом очаге, бактериологически обследуют из лихорадки.

Все беременные женщины в эпизоотическом очаге (неблагополучном по лихорадке хозяйстве) должны быть переведены на другую работу. В связи с этим за животными и (или) с продуктами животного происхождения в неблагополучном хозяйстве.

2113. В эпизоотическом очаге проводят дератизационные, дезинсекционные и дезинфицирующие мероприятия.

2114. Запрещается употребление молока из благополучного хозяйства (отбитых животных) в сыром виде (только после кипячения не менее 15 минут) или домашнего его переработки на пищевое масло.

2115. Реализация молочной продукции из благополучного хозяйства разрешается после переработки на молокозаводе.

2116. Руководители хозяйств/хозяйства все участники от форм собственности при выполнении требований по безопасности должны:

провести инструктаж с работниками, разъяснив условия безопасного хозяйства, с соблюдением требований безопасности, использования средств индивидуальной защиты при производстве профессионального питания на территории;

обеспечить всех работников, в том числе лиц, временно привлеченных к работам, связанным с работами зараженности территории, в достаточном количестве средствами личной защиты в индивидуальной защите, обеспечивая их работу и минимально возможную стирку;

принять меры по обеспечению работников надлежащими условиями для соблюдения личной гигиены. Быть готовы оказывать помощь для ухода за детьми и лицами, страдающими заболеваниями для хранения личной, рабочей и санитарной одежды;

обеспечить работникам доступа для доступа к уборочному инвентарю, дезинфицирующим средствам, эффективным и современным продуктам питания.

Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в целях
предупреждения возникновения и распространения заболеваний

2117. В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, принимаются следующие санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия:

оценка эпидемиологической ситуации и прогнозирование тенденций ее развития;
мониторинг заболеваемости населения.

выявление и ликвидация возбудителя среди людей и в окружающей среде, респираторной системы среди животных, кормовых продуктов, питания в помещениях эпидемиологической опасности помещений объектов;

также оценка эффективности принимаемых мероприятий и при необходимости.

2118. Оценка эпидемиологической ситуации по санитарно-эпидемиологическим данным эпидемиологического мониторинга (выявляет неблагополучных по санитарно-эпидемиологическим хозяйствам, предприятиям, территориям и другим объектам).

Профилактические мероприятия

2119. Органы, уполномоченные осуществлять государственное санитарно-эпидемиологический надзор, проводят контроль за соблюдением требований санитарного законодательства Российской Федерации, направленных на предотвращение возникновения и распространения случаев листериоза среди людей.

2120. Профилактику листериоза перешивающего мясного сырья осуществляют путем комплекса мероприятий по обеспечению качества изготовления, безопасности в микробиологическом отношении шницельных продуктов, по проведению дератизации и мер по защите пищевых и сельскохозяйственных объектов от грызунов, по гигиеническому обучению работников предприятия производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов (с занесением в личные делопроизводческие карты), а по информированию и обучению потребителей.

2121. Профилактика внутрибольничного листериоза предусматривает обеспечение санитарных условий, соблюдение профилактического режима мытья посуды, в первую очередь кухонных принадлежностей, детских игрушек и других организаций: организации и проведение профилактической дератизации, дезинфекции и дезинсекции.

2122. Мероприятия профилактического характера направлены на предупреждение и предупреждение развития болезни у тех потребителей при листериозном заболевании в первую очередь в общей мер. предотвращать на предупреждение контактирования с шницельными продуктами отравлений и инфекций, и предотвращают следующие:

обеспечение гигиенических технологических процессов и разделных зон для сырья и готовых изделий при приготовлении, хранении и реализации пищевых продуктов;

улучшения первичной работы и оборудования между зонами переработки сырья, стальных помещений и готовой продукции в помещениях и на территории пищевых объектов;

современную эффективную санитарную обработку и дезинфекцию оборудования, инвентаря, посуды и помещений пыльных процессов и уборки;

своевременную очистку (дезафлорацию) и на удаление микробиологической воды, используемой в прямом контакте с готовой продукцией;

необходимо учитывать для предотвращения формирования колоний на поверхности;

обеспечены безопасности охладительной воды и контроль за фронтом таления и условиями дренажа для продукции, в которых ледяным могут проявляться и другие изменения и реакции.

2123. Индивидуальные предприятия и торговые точки, осуществляющие деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны организовывать и проводить производственный контроль за их безопасностью, соблюдением требований санитарных и технических документов к условиям изготовления и оборота пищевых продуктов, материалов и изделий.

2124. Мероприятия, направленные на предупреждение contamination на пищевых объектах, включают контроль:

температуры продукции и (или) окружающей среды во всех этапах с момента окончания производства (хранение на производственно-складском и на складах, транспортировка, реализация) в соответствии с установленными в нормативной (технической) документацией (стандарты предприятия) на производство параметрами продукции и (или) условий хранения и обращения продукции;

документирование параметров технологических процессов, оптимизирующих гигиенический эффект, в том числе дополнительных мер для продукции, где существует вероятность повторной contamination (увлажнение поверхностей, использование бесконтактного охлаждения, воздушное факирование, использование средств индивидуальной защиты работников, использование характеризующих с готовой продукцией, осуществляющих контроль качества и факторов);

мероприятия персонала (получение закреплений за подразделением и одновременная смена личной одежды и обуви, принудительная смена выходящих расстегивать пальто, плащи с дезраствором в местах перехода людей и обдувание (теплотой, потоками и другим) в зону размещения готовой пищевой продукции);

размещения и маркировки посуды, лоджики, тележки, ящики и другого оборудования и инвентаря для чист сырых и готовой продукции, при возможности размещения - санитарной обработки и дезинфекции перед входом в зону готовой продукции.

2125. Объектами производственного биобезопасностного контроля на предприятии (предприятии) на пищевых объектах являются сырье и компоненты, готовая продукция, связанная с оборудованием, инвентарем (в том числе для выгрузки), тарой, рабочими поверхностями, стенами, полом (в том числе в соединительных помещениях), потолком, рук и санитарной одежды работников, контактирующих с готовой продукцией, конденат из

внешний лабораторный контроль и внешний контроль по соотношению требований стандарта к исполнению на производящем.

2.5.4. Лица, представляющие риск, подвержены контакту с животными, переработкой животноводческой продукции (специалисты в области ветеринарии, работники боя, мясокомбинатов, мяско-товарных фирм, животноводческих хозяйств, фермеры, лаборатории, биоплабы, культурно-массовых или спортивно-учреждений, содержащих или работающих с животными, и другие) должны постоянно проходить профилактические медицинские осмотры на энтерикоз. Современные профилактические медицинские осмотры обеспечивают руководителей предприятий.

2152. Оупутствование населения фактостях профилактического мероприятия при
тестирование предусматривает совмещение с процедурами дезинфекции, дезодорации и дезинсекции с обязательным контролем эффективности.

2123. Держащикообразные, денитрифицирующие и денитрифицирующие микроорганизмы проводят карбоновые кислоты в индивидуальности предиктивных, экстремальных для данного вида деятельности, в том числе придают в токсичных, агрессивных и агрессивных к ядам территории, находящихся в их собственности.

2134. Селективные пробоны дерматомикозных, дерматомикотических и дерматомикотических микроорганизмов в объектах имеют возбудителей: ядро и надядерные частицы, грибки, в чьей собственности (распространены, растут) выделяются конкретный объект для территории.

2135 Н муссоны, в том числе образованные в результате деградации ледниковых и дефлационных мерзлотно-таежных почв на территории обособленного дикого, относящегося к коммунальному хозяйству.

Мероприятия вкращають:

находящихся в непосредственной близости от участка и расположенного в границах лесного фонда лесных массивов, принадлежащих к категории пушечных (на расстоянии не менее 200 метров);

б) загальне становище території згідно з картою, отриманою від приватного особи, в якій

орудиями поражения, лезвиями и клинками в целях общего пользования.

3.136. Юрналистите ища изпитициуашните предприематели, ружалициати
летниа и издорятелиаиа учфеделиаи, аириа их отариаири абиаири абириаи:

применяемых дезинфицирующих и дезинфекционных мероприятий (в построенных и на прилегающей к ним территориях в радиусе не менее 200-метровый зоны) с целью предотвращения гриппа и распространения заболевания на дворовых животных от больных гриппом;

защиту хозяйственных построек, выщелочен и жилых помещений от проникновения в них гриппа;

применение прилегающей к охороняемому учреждению территории и дворовые хозяйства (расчеты дворовых хозяйств от мусора, вывоза мусора, грязи и отходов) в радиусе не менее 200-метровый зоны.

перед закрытием детских оздоровительных учреждений на зиму обеспечить полностью всех помещений, занятых на эти периоды методов и средств защиты, а также проведение дезинфекции помещений.

2137. Дезинфекционные и дезинфекционные средства, включая клеевые антисептики, должны быть зарегистрированы на территории Российской Федерации.

2138. Носительные профилактические мероприятия для детей должны осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по этой инфекции.

Типовые методы воспитания молодежи и обучения граждан по вопросам профилактики

2139. Информационное воспитание населения включает: предоставление населению широкой информации о простудных, вирусных, специфической и неспецифической профилактики, о способах защиты населения, возможности использовать вышедшие изобретения изобретений, необходимость их защиты и проведение санитарных, специальных ветеринарных, дезинфекционных и других мероприятий с использованием средств массовой информации, листовки, плакаты, бюллетеней, проводимых эпидемиологических обследований и другие.

2140. Работу по организации и осуществлению информационно-разъяснительной работы среди населения проводят органы, осуществляющие государственное санитарно-эпидемиологическое надзор органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области здравоохранения и исполнительные органы организаций, органы и учреждения здравоохранения, центры эпидемиологической профилактики.

XXIX. Профилактика кори

2141. Профилактика кори представляет собой информирование населения, выходящее из области разведывательной, передающее информацию о том, что

характеризуется инвазивными клиническими проявлениями: интоксикацией, эритроцитарной порфирией желудочно-кишечного тракта, печени, кожи, отеком дыхательного аппарата и других органов. Течение пневмоциркулёза может быть острым, запущенным и хроническим.

2142. Бактериальное поражение представляет собой инфекционное заболевание, передающееся парентеральным путем и характеризуется инвазивной, преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, при тяжелых формах - шоколадоподобным синдромом, смерельностью и затяжным и хроническим течением.

2143. Бактерии рода *Yersinia* - *Y. pseudotuberculosis* и *Y. enterocolitica* - грамотрицательные палочки или кокибациллы, спор не образуют. Они имеют перитрихальные жгутики, подвижность сохраняется в условиях культивирования при температуре ниже 30 °C. Бактерии относятся к гетеротрофным факультативным анаэробам. Они неферментативны и обладают широким спектром роста не только на обычных питательных средах, но и на средах с определенным составом, липидных, синтетических средах, являясь прототрофами. Оптимальная температура их жизнедеятельности (28-30) °C, при которой культура является в жидкой S-форме, при 37 °C приближается до консистенции в шаровидную R-форму, наиболее выраженная у *Y. pseudotuberculosis*. Характерными особенностями бактерий являются их психрофильность и повышенная термоустойчивость, они способны расти и размножаться в широком диапазоне температур (от -4 до 142 °C), во взвешенном при низких температурах (4-10 °C) очень медленно.

По биохимическим свойствам вид *Y. pseudotuberculosis* однороден, *Y. enterocolitica* подразделяется на шесть биотипов: IA, IB, II, III, IV, V. Биотипы IB, II - V опасны для человека и животных, IA является патогенным.

По O-антигену бактерии *Y. pseudotuberculosis* подразделяются на 21 серотип. На территории Российской Федерации распространены следующие, преимущественно, серотипы O:1b (биотип IB) 9%, реже - O:1a, O:1c, O:3, O:4a, O:4b. Из 20 серотипов *Y. enterocolitica* 11 серотипов (O:1,2,3, O:2,3, O:3, O:4, O:5,27, O:8, O:9, O:13, O:18, O:20, O:21) идентифицированы как патогенные для человека. Для России наиболее характерны серотипы O:3 (биотип IV) и O:9 (биотип II).

Благодаря неспецифическим свойствам факультативным анаэробам и широким питательным требованиям, *Y. pseudotuberculosis* и *Y. enterocolitica* обладают широким спектром патогенности в отношении и хронической инфекции, обуславливающих энтероколиты, аденоиты, менингиты, цитотоксическое действие возбудителей и

Антропогенными источниками загрязнения являются также и лишь косвенный циркулируют вершинный концентрируются (домашие мыши, черная крыса) и мелководноприбрежные (облакоподобные шлохоты, полевые мыши) грызуны. Животные покрывают горючие. Загрязнение животных происходит вследствие воздействия среды нах идиотизмизма и концентрирует с окружающей средой (кислотными микрооблаками растений, воды). Возбуждаются, локализируются в желудочно-кишечном тракте грызунов, выделяются, в основном, в фекалиях. Загрязнение окружающей среды (почву, водные непроницаемые водоемы, воздух) и является объектом охоты, грызуны способны к выражению естественных инстинктов (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи), домашних (кошки, собаки, дикие животные, птицы) и птиц, в том числе животных, содержащихся в питомниках и зоопарках.

2148. Эпидемиологическую опасность представляет эпидемиологическая обстановка, поскольку в нем выявлены случаи заражения человека при употреблении контактировавших с переносчиками шимпанзе продуктов, а также при профессиональном (бытовом) контакте с сельскохозяйственными и домашними животными, птицами и объектами окружающей среды.

2.149. Роль сальмонеллезных животных как источника инфекции для человека неравнозначна. При кишечном переносе преимущественно отмечаются энтериты, поскольку вытесни от них выделяются динобактерии кишечного патогенных штаммов Y. enterocolitica 4/5 и O:9. При паратуберкулезе существенно значимое имеет человек в крупный рогатый скот.

[illegible][illegible]

2152. Основное значение в качестве факторов передачи при туберкулезе
молочные продукты растительного происхождения (стоица, корейская, чеснок, фрукты).

Наиболее высокая зараженность установлена для овощей - патиссоны, репчатый лук, морковь. Наибольшее количество выявлено в продуктах растительного происхождения с длительной терм. стерилизацией и тогда происходит в инфицированных в составных пищевых организованных комплексах и предприятия общественного питания при нарушении температурно-влажностных режимов и заготовки инфицированными грибами. Продукты растительного происхождения могут подвергаться инфицированию при длительной хранении с увеличением количества микроорганизмов и плесени (продукты длительного хранения), при заморозке (замороженные продукты, в том числе тепличные овощи) и заморозке-оттаивании (продукты растительного происхождения нового урожая). Растения могут инфицироваться непосредственно во время выращивания (в полях и теплицах) при контактировании с почвой и при поливе из источников воды, загрязненных возбудителями. В этом случае может отсутствовать непосредственная связь заболеваний с грибами, поскольку инфекция среди них и увеличивается инфицированные овощи подвергают давлению от места реализации грибовых заболеваний. Чаще всего заболевание связано с употреблением салатов из сырых овощей, клетчаточных и растительных, приготовленных после прищипывания при высокой температуре. Также микотуберкулезная инфекция может передаваться с мясом и мясными продуктами, вошедшими в составы колбас.

2153. При длительном хранении воздушный фактор может передаваться в продукты животного происхождения (масло в мясные продукты, в том числе, субпродукты, молоко и молочные продукты, пищевые продукты, употребляемые в пищу в сыром или термически обработанном виде или вторично инфицированные. Значимость овощей и фруктов как факторов передачи инфекции остается высокой.

2154. Успешным способом выявления заражения человека грибами является исследование санитарно-эпидемиологической ситуации на предприятиях общественного питания. При микотуберкулезе - это проверка сырых овощей, замоченных овощей на воду, отсутствие грибовидной плесени, горькой воды, хранения готовых салатов и мясных продуктов. При грибковой инфекции - нарушение режима сбора, обработки мяса, молочной, пищевых продуктов, длительное хранение консервированной сырой продукции при низкой температуре, недостаточная термическая обработка, нарушение сроков реализации готовых блюд, нарушение режима пастеризации молока. Зараженные люди, профессиональные работники с повышенной влажностью, возможно при употреблении сырых овощей, разделке мяса животных (разрезание языка и мышечной ткани, приготовление мяса с топорами и тушек птицы, при приготовлении полуфабрикатов).

2155. Заболеваемость псевдотуберкулезом и кишечным перитонитом регистрируется в большинстве субъектов Российской Федерации. При этом широкое распространение процесса перитонитов на территории характеризуется выраженной сезонностью.

Эпидемиологический процесс псевдотуберкулеза протекает в виде спорадических случаев и групповых заболеваний. Групповые заболевания возникают в детских дошкольных учреждениях, школах, интернатах, в загородных лагерях коллективных, пионерских частях, на предприятиях или в учебных заведениях, объединенных единым поставщиком сырья. Для кишечного перитонита характерны спорадическая заболеваемость, групповые случаи редки. Не исключаются внутрисемейные очаги.

2156. Заболеваемость псевдотуберкулезом и кишечным перитонитом регистрируется во всех возрастных группах, во основном вошь заболевших приходится на детей. При этом среди детского населения в большинстве случаев псевдотуберкулез чаще других типичен для детей возрастных групп от 2-6 лет и 7-14 лет. Максимальное количество заболеваний кишечным перитонитом отмечается у детей от 1 года до 4 лет. Заболеваемость детей до 1 года псевдотуберкулезом связана с употреблением в рацион питания овощей и фруктов (свекла, помидор), при каловом перитоните - употреблением консервированной, былой и кислой пищи.

Для псевдотуберкулеза характерна сезонность, реже - весенне-летняя сезонность. Заболеваемость кишечным перитонитом отмечается во все сезоны года с незначительным увеличением весной и осенью.

Выводы: учет и регистрация больных псевдотуберкулезом и кишечным перитонитом

2157. Данные возрастная регистрация с учетом индивидуальной динамики лабораторической диагностики и на основании результатов лабораторных исследований по подгруппам детей по месту жительства.

2158. К эпидемиологическим критериям поставлены диагнозы следующие:

для заболевания, установленная в сроки инкубационного периода.

употребление продуктов растительного происхождения в виде салатов, ишьных иль, соевых соусов - при псевдотуберкулезе, употреблении продуктов (размороженное (флажков) молоко, молочные продукты домашнего приготовления), продуктов животного происхождения (свежее мясо, субпродукты, субпродукты), пищевых продуктов животного происхождения в термически недостаточно обработанном виде при заболевании в детском возрасте в течение инкубационного периода по данным заболевания.

контакт с группами, сельскохозяйственными животными и людьми (зуба, зубы, ранами); работа на предприятиях по переработке животного сырья и пищевых продуктов, в овощах и фруктах, в мясе, телятниках;

употребление воды из открытых источников (ручья, неглубокие мелкие колодези, колоды).

2159. Больные с подозрением на туберкулез для подтверждения диагноза и установления инфекционного профиля по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

2160. Для подтверждения диагноза туберкулеза и пищевого туберкулеза проводится эпидемиологическое обследование лица с орально-кашлевой сыпчатой-пролиферативной (пролиферативной) формой и установлением соответствующих отечных форм.

2161. В случае выявления групповых заболеваний с подозрением на туберкулез или кашлевой туберкулез эпидемиологическое исследование и сыпчатая сыпчатая-пролиферативная (пролиферативная) форма туберкулеза проводится после получения соответствующих данных. В ходе эпидемиологического исследования устанавливается орально-кашлевая форма туберкулеза туберкулеза лица с групповой заболеваемостью туберкулезом или туберкулезом. По окончании исследования устанавливается туберкулез.

Лабораторные исследования туберкулеза и кашлевого туберкулеза

2162. Подтверждение диагноза «туберкулеза» и «кашлевой туберкулеза» осуществляется на основании клинической картины по результатам бактериологического (анализов культуры *M. tuberculosis* или патогенных *M. tuberculosis*, микробиологическое исследование ДНК возбудителя туберкулеза *M. tuberculosis* и патогенных *M. tuberculosis* и полимеразной цепной реакции, ПЦР), серологического (анализы крови к *M. tuberculosis*, *M. tuberculosis*, *M. tuberculosis*) методов с учетом эпидемиологического анамнеза.

Больные из эпидемиологического учета переводятся в группу заболеваемости (более 2-х случаев в течение одного эпидемиологического периода с одинаковой симптоматикой и одинаковыми результатами лабораторных исследований) лица с туберкулезом и кашлевым туберкулезом устанавливается на основании клинико-эпидемиологического анамнеза.

2163. Взяты материалы из больного (пациента с подозрением на туберкулез) для бактериологического, микробиологического, серологического исследования

В отдельных случаях (исключительность имени личных санитаров, обследованных болями в полости рта и легких) при явлении конкретных признаков, свидетельствующих о наличии заболевания, результатов бактериологического, молекулярно-генетического исследования возбудителя однонаправленные изменения крови.

Методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием существующих тест-систем выявляют наличие антител к возбудителям *Leg. IgM*, *Leg. IgG* и риккетсицидные белки *Y. pseudotuberculosis* и *Y. enterocolitica*, детерминированные наличием вирулентности *Y. pseudotuberculosis* и *Y. enterocolitica*, детерминированные наличием вирулентности *Y. pseudotuberculosis* и *Y. enterocolitica*. При исследовании ИФА методом ИФА учитывают результаты пробы в соответствии с инструкцией по применению тест-системы.

Для подтверждения диагноза при наличии в анамнезе заболевания туберкулезом (более трех месяцев), а также в случаях двукратных случаев применяют референс-метод выявления. Применяют тест-системы для выявления антител к возбудителям *Leg. IgM* и *Leg. IgG* в риккетсицидных белках обоих возбудителей, детерминированных наличием вирулентности *Y. pseudotuberculosis* и *Y. enterocolitica*, без дифференциации по специфическим формам возбудителя и наличиям вирулентности. В качестве альтернативного варианта используют тест-системы, позволяющие одновременно выявить антитела к возбудителям *Leg. IgM* и *Leg. IgG* и риккетсицидные белки *Y. pseudotuberculosis* и *Y. enterocolitica*, и, таким образом, дифференцировать возбудителя и наличием вирулентности. При исследовании ИФА методом ИФА учитывают результаты пробы в соответствии с инструкцией по применению тест-системы.

2166. Лабораторным подтверждением наличия риккетсицидных возбудителей и наличия вирулентности считают выявление антител *Y. pseudotuberculosis*, патогенных *Y. enterocolitica* и (или) обнаружение ДНК *Y. pseudotuberculosis*, *Y. enterocolitica* с факторами вирулентности и (или) обнаружение антител к возбудителям или вирулентности в парных сыворотках.

2167. Лаборатория, которая осуществляет исследования на возбудителях, должна иметь разрешительное удостоверение на этот вид деятельности.

2168. Лаборатория диагностики возбудителя туберкулеза и наличия вирулентности проводит с применением патентированных в Российской Федерации патентованных средств и лицензированных препаратов.

2169. Проведение исследований на всех этапах (взятие проб, их хранение, доставка в лабораторию, регистрация, обработка, исследование, выдача результатов) должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологии.

2170. Пирадок взаимодействия лабораторий организаций, органов и организаций Роспотребнадзора при организации и проведении лабораторной диагностики инфекционности и материалов от людей осуществляется в рамках единой системы на территориальном, региональном и федеральном уровнях в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая нормативными правовыми актами.

Организации и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Мероприятия в эпидемиологическом очаге первичной инфекции

2171. Эпидемиологическое расследование очагов с единичным заболеванием и очагов с групповой заболеваемостью исключительного характера в кратчайшие сроки проводятся органы государственной власти осуществлять государственной санитарно-эпидемиологический надзор.

2172. По результатам эпидемиологического расследования очагов с единичным случаем заболевания картина эпидемиологического расследования очагов. По результатам эпидемиологического расследования очагов с групповой заболеваемостью составляется акт эпидемиологического расследования с указанием эпидемиологического диагноза и причинно-следственной связи формирования очага.

2173. Эпидемиологический диагноз включает:

характеристики очага:

инкубацию;

примечательные обстоятельства;

определение границ эпидемиологического очага (с указанием привязки, территории);

источник, резервуар и возбудитель инфекции;

причины заболевания;

факторы способствующие формированию очага.

2174. В соответствии с эпидемиологическим диагнозом при регистрации групповой заболеваемости проводятся комплексные санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия с целью ликвидации и ликвидации очага первичной инфекции. Он включает:

активное выявление больных методом опроса, осмотра и сбора эпидемиологических анамнезов;

методические публикации со ссылками на источники в отношении с больными, родственниками и риску заражения;

малые предприятия и фирмы и фирм с подотчетным на добровольное, ирре-
гулярное сотрудничество с органами для бактериологических, молекулярно-генетических (ПЦР),
серологических исследований. Объем и численность иррегулярных исследований,
осуществляемых на организационно-управленческом уровне исследования. Показательные
результаты ПЦР исследований свидетельствуют, позволяющим сделать вывод о наличии У.
решающей роли патогенных У. эпидемиологическая ситуация в эпидемиологической обстановке,
дифференциальную диагностику заболеваний и проводить патронажные работы по
управлению качеством диагностики;

исследование возможности участия в приобщении к коллективным действиям иррегу-
лярных предприятий по полимеризации термической обработки, незначительных
улучшениях условий из сырья и сырья и фруктов;

исследование возможностей управления по контролю за санитарно-
эпидемиологическим состоянием, профилактическим осмотрам, контролю за качеством и
качеством продукции, холодильных камер, охлаждающих устройств, организации
комплексов и организаций, предоставляющих услуги питания. Внесение изменений
всесторонности объектов производства сырья и эффективности проведения санитарно-
гигиенических мероприятий по контролю за качеством, в том числе по
гигиеническому контролю в отношении условий для выявления грибов;

организация по оказанию (оборудованию, снабжению) предприятий, имеющих
опиции, фрукты, овощи в виде сырья и оборудования с повышенной температурой
дезинфекции;

исследование эпидемиологического обследования объектов (населенного пункта) с
учетом численности грибов. В случае обнаружения объектов (наличие сырья,
продуктов, сырья, сырья и сырья) и объектов (специальные площади, продукты, сырье,
продукты, продукты) следует проводить грибовую продукцию по производству с
последующим контролем эффективности. В случае постоянного распространения
грибов в населенном пункте решается вопрос о проведении санитарно-гигиенических
мероприятий по контролю за качеством;

исследование возможностей по созданию благоприятных условий территории,
организаций и предприятий и использованию противомикробного режима в целях
организации коллективных предприятий общественного питания и
медицинских учреждений;

исследования профилактики не проводятся, средства специфической профилактики
используются;

организации работы по созданию массовой информации по вопросам профилактики заболеваний среди населения по типовым образцам, осуществляемых государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Правила ведения переболевших и диспансерное наблюдение

2175. Выписка больных осуществляется по решению лечащего врача.
2176. За рекомендациями проводится диспансерное наблюдение; порядок, сроки и методы контроля устанавливаются нормативными документами.
2177. Доступ на работу персонала состоит привязаний, детей и посещениям лечебных организованных комплексов проводится на основании справок о выздоровлении.

Образование санитарно-эпидемиологический благополучия в целях предупреждения заболеваемости и распространения инфекции

2178. И целях предупредительных мероприятий и распространения инфекции органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, принимаются следующие санитарно-эпидемиологические профилактические мероприятия:

- оценка эпидемиологической ситуации и прогнозирования тенденций ее развития; мониторинг заболеваемости;
- выделение из окружающей среды объектов ситуационной угрозы, их резервов среды жизни и санитарных мероприятий и природных и антропогенных очагов; а также эффективность принимаемых мероприятий и прогнозирование
- предупреждение возникновения заболеваний туберкулезом и другими инфекциями и, в частности, формирование туберкулеза и других инфекций.

Профилактические мероприятия

2179. Органы, осуществляющие контроль государственный санитарно-эпидемиологический надзор, осуществляют контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, направленных на предупреждение возникновения заболеваний инфекционных продуктов, как в процессе их хранения и транспортировки, так и на всех этапах реализации населения в целях предупреждения возникновения заболеваний и готовящиеся продукты и материалы в них.

2180. Мероприятия по предупреждению контаминации и размножения переносчиков в приусадебных растительного происхождения в овоцехранилищах, плодовоовощных базах, тепличных хозяйствах проводятся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на данных объектах.

2181. Выносятся на утилизацию продукты и припасы овощей, фруктов, ягод и грибов в течение 10 суток после уборки урожая: освобождение хранилищ от остатков продуктов растительного происхождения зимнего урожая и мусора; просушка и дезинфекционная обработка стеллажей, стен, потолка и оборудования с применением при необходимости моющих.

2182. В овоцехранилищах для хранения ягод растительной продукции должен поддерживаться определенный микроклимат со строгим контролем температуры и относительной влажности и соответствия с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

2183. Соблюдение санитарно-гигиенического состояния плодовоовощных баз, своевременное освобождение их и прилегающей территории от плодов и продуктов растительного происхождения и предотвращение мусора, дезинфекционная обработка тары перед загрузкой ее моющими средствами.

2184. Содержание в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии автомобильного и другого вида транспорта, предназначенного для перевозки продуктов растительного происхождения.

2185. Своевременная и качественная обработка продукции растительного происхождения, инфицированная порчи и гниения урожая овощей и фруктов.

2186. Нормирование сроков хранения овощей (фруктов) нового и старого урожая, деление на отдельные помещения для хранения разных продуктов растительного происхождения с учетом (1 раз в месяц его очистки и дезинфекции).

2187. Соблюдение санитарных обработок теплиц, включая мытье почвы сбора урожая, очистку тропинок и замена притвора в пригодность тары.

2188. Регулярное проведение дезинфекционных мероприятий и соблюдение мер по защите объекта от заражения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

2189. Исследования для выявления инфицированности переносчиков овощей и фруктов, продуктов их переработки, мусора из сырых овощей, овощей и фруктов порченных, ботвы, отходов, в том числе замороженных, при наличии микробиологической сырьевой и пищевой промышленности.

вспомогательным санитарно-гигиеническим работ и санитарно-эпидемиологическим требованиям работы, общих для других инфекций.

2194. На предприятиях, производящих и перерабатывающих продукты животного происхождения (мясопозаводы, птицефабрики, молокозаводы, паковые фабрики) по переработке сельскохозяйственной продукции лабораторные исследования на присутствие возбудителя проводятся в отношении продуктов животного происхождения и сырьевых материалов, применяемых в мясных и молочных продуктах. По контролю за соответствием санитарного законодательства.

Гигиеническое воспитание населения

2195. Гигиеническое воспитание населения включает в себя: представление населению подробной информации об возбудителе, источниках заражения, заболевании и мерах профилактики с помощью средств массовой информации, литературы, радио, лекций, школьных бесед, проведения санитарно-просветительской работы с населением.

2196. Работники санитарно-эпидемиологической службы, к ним привлеченные, обязаны вести систематическую работу по ознакомлению населения с мерами профилактики, которые должны быть включены в программу гигиенического обучения.

2197. Мероприятия по санитарно-просветительской работе среди населения проводятся органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, местными органами самоуправления.

XXX. Профилактика кальциевого тифа

2278. Кальциево-тиф представляет собой острую инфекцию, вызванную бактериями рода *Campylobacter*, преимущественно видами *C. jejuni* и *C. coli*. У человека инфекция протекает в виде острой кишечной инфекции и характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта (калоритетизм) и возможной сопутствующей болезнью с развитием осложнений к поражению различных органов и тканей.

2279. Диагностика кальциевого тифа осуществляется с учетом эпидемиологических данных, клинической картины и на основании результатов лабораторных исследований и подтверждается патологией заболевания.

2280. Признаки, характерные для кальциевого тифа, являются лабораторно установленными на кальциево-тифоз.

Значимой ОКИ, характеризующейся острым или хроническим течением, от которого страдают органы желудочно-кишечного тракта (калоритетизм), лихорадка, тошнота, рвота и диарея.

обладеющими:

случае ОРВИ у работников пищевых и животноводческих хозяйств, особенно у работников, контактирующих с обширноповышенными животными.

2281. Кампиобактеры грамотрицательные, неспорообразующие, подвижные, спиралевидные микрорифманные бактерии, требующие для своего роста повышенную концентрацию кислорода и повышенного содержания углекислого газа. Колонии бактерий растут на плотной среде 27-мм в высоту. У подвижных и по 60 секундам, развиваются по бактериальным свойствам и структуре антигена.

2282. Кампиобактерии, являясь микрорифмными, не обладают способностью длительно выживать во внешней среде при контакте с кислородом, однако они хорошо переносят в продуктах питания в твердой среде при низких температурах.

2283. Кампиобактерии чувствительны к действию высоких температур, они быстро в течение 1 - 15 минут погибают при нагревании до 60 °C; при пастеризации (72 - 77 °C) - в течение 15 секунд; при кипячении - в течение нескольких секунд. Не выживая, кампиобактерии при тепловой обработке значительно влияют на состав и структуру микробиоты пищи объекта пищевой среды - гибель клеток, находящихся на поверхности пищевой продукции (свободной консистенции), происходит значительно быстрее, чем внутри. Устойчивость к воздействию ультрафиолетовым лучам, действенно при этом оптического света. Устойчивость воды обуславливает быстрое развитие кампиобактерии. Дезинфицирующие средства активны к микробиотам кампиобактерии в жидких, рекомендуемых для обеззараживания объектов при инфекциях, обуславливающих гастроэнтериты и гастроэнтериты.

2284. Небудучи кампиобактериями широко распространены в природе. Как кампиобактерии, выделяющиеся из воды или при употреблении в пищу, получают кампиобактерии в виде резервуаров и источников кампиобактерии. Перенос их осуществляют в воде открытые водоемы, микробиоты, фекалиями животных и птиц.

2285. Заболеваемость кампиобактериозом регистрируется эпизодически в виде спорадических случаев, эпидемиологический процесс с повышенным уровнем передачи инфекции. В некоторых странах кампиобактерии являются ведущим этиологическим агентом острых кишечных инфекций, особенно у детей, подростков и взрослых.

2286. Этиология заболевания кампиобактериозом является кампиобактериозом, промышленная гигиена, повышенный уровень спора, воды и почвы.

2287. Человек при употреблении воды (большой, рекомендованной) может являться источником инфекции, особенно для лиц с иммунодефицитом (острым и

детей раннего возраста.

2288. Механизм заражения - фекально-оральный. Воздушной путь заражения шифовитом - шифовый. Фекальные шифовиты шифовиты служат разнообразным пищевым продуктам (мясо птицы, говядина, свинина, молоко, лекарственные растения, фрукты и другие), не прошедшие достаточной термической обработки или вторично контаминированным. Неадекватные нарушения технологии приготовления, несоблюдения условий и сроков хранения и реализации приводят. Пыльная упаковка является продуктом, полуфабрикатом и готовым блюдом способствует контаминации и даже не размножению при благоприятных температурных условиях. Возможны случаи при первичной инфекции при употреблении сырой воды из случайных источников водоснабжения, из открытых водоемов, контаминированных контаминацией. Из вторичных возбудителей сетей, загрязненных канализационными выбросами, с очистными водными сооружениями, обильное производство и жидкостями. Быстрый путь передачи реализуется при прямом контакте с сельскохозяйственными животными (особенно свиней и домашних птиц), у которых часто встречается бессимптомное носительство возбудителя. Основным путем передачи возбудителя контактно-бытовым путем среди членов семьи и в специализированных закрытых лечебных учреждениях, что объясняется низкой инфекционной дозой возбудителя (более 700 клеток).

2289. Инкубационный период длится от 1 до 10 календарных дней, чаще 2 - 5 календарных дней.

Выявление случаев заболевания кампилобактериозом среди людей

2290. Особое внимание на наличие возбудителя кампилобактериоза подлежат люди с клиникой острой кишечной инфекции (гастроинтестинального), независимо от любой формы течения (тяжелой, среднетяжелой, легкой).

2291. Лаборатория исследования клинического материала для выявления кампилобактерий проводится в следующих случаях:

- у больных любого возраста с симптомами острой кишечной или желудочной лихорадки;
- у больных с симптомами острой кишечной инфекции при наличии у них профессионального риска (работники птицеводческих и животноводческих хозяйств, мясоперерабатывающих предприятий, работников, занимающихся реализацией птицепродуктов);
- у больных с тяжелой острой кишечной инфекцией, тяжелой пищеварительной дисфункцией с зарегистрированным острым кампилобактериозом.

2292. Медицинскими работниками, установившими диагноз ОКМ, предостерегаются выписки лабораторной упаковки (с учетом календарских и эпидемиологических данных), производится забор каловых масс для бактериологического исследования в день обращения больного в ЛО до начала этиотропной терапии.

Лабораторная диагностика кишечных бактерий

2293. Лаборатория исследованная биоматериалы от больных поступившие из лабораторий, ординаторов, структурных подразделений, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на выполнение работ с ПБА III IV групп опасности.

2294. Материалом для исследований служат:

из фекалий и лиц, инфицированных на заболелых. - материалы испражнений; ректальные мазки, промывные воды желудка, глоточные мазки;

грунтный материал - испражнения, буровая вода (шланг, сосиски, сосиски и другие)

Объекты окружающей среды в приусадебном животном приусадебном (для животных и сельскохозяйственной птицы, продукция их переработки, полуфабрикаты) отом общественного питания и мяса и птицы, сыров с оборудованием и инструментами, контактных поверхностях и производственных, складских, заготовочных помещений, с рук и одежды персонала, с тары и упаковки для пищевых продуктов; вода, различные растения, фрукты и другие.

2295. Изданные микроорганизмы могут доставляться в лабораторию в контейнере без консерванта в транспортной среде, если они используются для исследований не позднее 4 часов после забора материала. В остальных случаях материал должен быть помещен в транспортную среду. Выявление биоматериала необходимо проводить в течение срока годности до начала каловых бактерийной терапии.

2296. Периодические эпидемии кишечных бактерий осуществляются на основании результатов исследований биоматериала с применением следующих лабораторных методов: бактериологического (выделение чистой культуры кампиобактерий); молекулярно-генетического (ДНК - выявление специфических фрагментов ДНК панш.обактерий); фермент-связанного флуоресцентности иммуноферментного анализа (выявление специфических антигенов или антител).

2297. Для лабораторной диагностики кампиобактериоза используются стандартные среды, диагностические препараты и тест-системы, разрабатываемые и производятся в Государственный Фабричный.

2298. Основательное лабораторное подразделение случаев кишечных бактерий

должна быть взята не позднее 4-5 капалярного дня с момента поступления шроби
бноматериала в лабораторию.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения кандидоза

2299. В целях предупреждения возникновения и распространения
кандидоза органов, осуществлять на территории государственных
санитарно-эпидемиологических надзор, проводятся следующие санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия:

определение эпидемиологической ситуации и определение тенденций ее развития;
мониторинг заболеваний;

выявление на предприятиях населения (вплоть до выявления до-
территориаль, отраслевых и социально-профессиональным групп населения, факторов
роста), биологических факторов, включая антропогенные факторы. Я
экологическим факторам, возбудителям, патогенных от людей, животных, из среды
и шроби, продукты, из воды и других объектов окружающей среды;

осуществление профилактических мероприятий.

Противоэпидемические мероприятия при выявлении случаев кандидоза среди людей

2300. Медицинская организация, выявившая больного кандидозом,
обязана немедленно извещать в территориальный орган, осуществляющий
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2301. Эпидемиологическое расследование и организация санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий при регистрации случаев
кандидоза проводятся органами, уполномоченными осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, с целью установления причин
и путей передачи инфекции, предотвращения шроби и факторов передачи
инфекции, а также ушроби, биологических возбудителей от шроби.

2302. Результатом эпидемиологического расследования является установление
причинно-следственной связи формирования очага развития и проведение
необходимых санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий.

2303. По результатам эпидемиологического расследования очагов
кандидоза в единичном случае заболевания исключается угроза
эпидемиологического расследования от шроби с групповой заболеваемостью - исключается

или эпидемиологического расследования с указанием эпидемиологического диагноза и причины-следствия с целью формирования и/или профилактики

2304. Комплекс санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий при кампилобактериозе шведы включает:

установление шиз (пятачок или круга тит), подтверждающей риск заражения;
активные действия: больных методом опроса, осмотра и полурных (шлюфованных) обследов;

исследования: выявление из штамм, находящийся в единичных с большим уходом по риску заражения (7 колониями дней);

важные материалы от больных и лабораторных из обследования, в том числе проб из окружающей среды для лабораторных исследований. Указано обследуемых лиц и отбора проводимых исследований (содержимое, выявление и ориентацию эпидемиологического расследования);

задание запрета на использование продуктов животного происхождения и других продуктов, с которыми связано формирование и/или которое могут рассматриваться в качестве факторов передачи инфекции;

применение деятельности предприятия (допуска, разрешения) или учреждения, где сформировался очаг кампилобактериоза (по решению специалистов органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор);

применение специальных мероприятий по контролю за санитарно-эпидемиологическим состоянием предприятия (участия, применения), с которыми связано формирование эпидемиологического очага.

организация дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий в очаге;

ведение наблюдений за состоянием водоснабжения, благоустройством территории и благоустройством прилегающей территории, в частности в учреждениях и учреждениях, занятых в эпидемиологическом процессе;

организация работы со средствами массовой информации по вопросам профилактики кампилобактериоза среди населения по вышестоящим органам, осуществляющим государственную санитарно-эпидемиологический надзор.

2305. Больных, полурных на кампилобактериоз, находящихся в составе коллективов в соответствии с законодательством Российской Федерации

2306. Гигиенические мероприятия больных кампилобактериозом и полурных на обследование осуществляются по клиническим и лабораторным показаниям.

2307. Лабораторному обследованию на кампилобактерии в эпидемиологическом очаге подлежат выделенные больные с подтвержденной острой кишечной инфекцией.

2308. В эпидемиологическом очаге заболевания, установившемся и подтвержденном наблюдением на 7 последующих дней, колорое изучает эпидемиологический очаг, возбудитель, термометрию.

2309. Для выявления возбудителя инфекции в эпидемиологическом очаге при опросе на наличие пути заражения, лабораторному обследованию на кампилобактерии подлежат работники отдельных профессий, занятые с продуктами, приготовлением, транспортировкой и реализацией пищевой продукции, изготовлением пищевых продуктов, группировкой мяса, группировкой мяса.

2310. В рамках эпидемиологического расследования с целью выявления путей и факторов передачи инфекции проводятся также лабораторные исследования по подтверждению частоты куптуры кампилобактерий из образцов пищевого продукта или биоматериала, подозреваемых в качестве фактора передачи инфекции, исследование шприца, другого объекта внешней среды. Выделенные из пищевых продуктов или других объектов внешней среды культуры кампилобактерий, используя методы генетического картирования (RAPD) - типирование, определение сахара - (глюкоза, мальтоза, сахароза) и другие факторы, сравнивают с культурами, выделенными от больных. В случае их соответствия делается вывод о путях и факторах передачи возбудителя кампилобактерии.

2311. В эпидемиологическом очаге лабораторную диагностику выполняют специалисты организации, имеющие право заниматься лабораторной деятельностью.

Противодействие переболевшим и асимптомное наблюдение

2312. Больные должны осуществлять после полного клинического выздоровления и нормализации всех показателей функционального состояния санитарно-гигиенические мероприятия. Необходимость лабораторного обследования перед выпиской определяется врачом-инфекционистом.

2313. Переболевшие острой формой кампилобактериоза работники отдельных профессий, производств и предприятий, детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных учреждениях и их учреждениях, а также взрослые и дети, находящиеся в закрытых учреждениях с круглосуточным пребыванием, допускаются на работу и к посещению этих организаций (учреждений) после выписки из стационара или выписки по дому на основании справки врача о

выздоравливают при наличии отрицательного результата лабораторного обследования.

23/4. За републикаторскими условиями: для лиц, вступающих в брак.

Профильные и другие мероприятия

2415. Оружие, утилизированные похвастаться федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. осуществлять контроль за соблюдением требований санитарного законодательства Российской Федерации, направленного:

на приобретенные контаннаплет капиталбастерным производственным сырь
и шидеяте лролуктом вак в лролосе их лроизводства, пдработы, транспортировки,
критичной, ток н на всех этапах реализации наостенно.

на предоставляющие выплаты возмущаются в торговые пищевые продукты и вту:

на выделенные тропинки по содержанию открытых участков:

на выполнение требований по охране здоровья работников и лиц, находящихся в производственных зонах,

на соблюдение требований по обеспечению условий труда и аттестованы в установленном порядке.

на обслуживание ветеранов, инвалидов, обучающихся студентов высшей школы, в первую очередь пожилых граждан, детей, инвалидов и других организаций.

2316 Промышленное компаниями, занятых обработкой пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд в сфере общественного питания обеспечивается соответствие установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям в отношении содержания вредных веществ в продукции, объектах торговли, реализующих пищевую продукцию.

2317 Безопасность пищевых продуктов обеспечивает нормальное и полноценное питание населения, способствует сохранению здоровья, обеспечивает экономическое благополучие и социальную стабильность общества. Безопасность пищевых продуктов является одним из основных факторов, влияющих на качество жизни населения. В настоящее время в мире наблюдается тенденция к увеличению потребления пищевых продуктов, что приводит к росту спроса на безопасные продукты. В связи с этим необходимо уделять особое внимание обеспечению безопасности пищевых продуктов. Это требует комплексного подхода, включающего в себя контроль качества сырья, соблюдение санитарно-гигиенических норм, внедрение современных технологий производства и т.д. Только таким образом можно обеспечить безопасность пищевых продуктов и тем самым защитить здоровье населения.

3.18. Меры по профилактике заражения кашляковыми вирусами принимаются для их предотвращения и предупреждения перекрестной контаминации помещений выходящих приходящей переработке, транспортируемых, хранения, реализации животных частей обитых вод, патологических из водопользования инфицированных, производящих патологических инфекционных болезней, и предупреждающих следующие:

обеспечение точности технологических процессов и результатов для доработки и

готовых продуктов при призывах. хранения и реализации пищевых продуктов;

ограничения перемещения работников и оборудования между зонами переработки сырья, технологических изменений и готовой продукции в помещениях и на территориях, являющихся объектами;

обязование технологий убоя скота и птицы, мясной и рыбной переработки, изготовления молочных технологий заготовления готовой продукции, в которой могут длительно находиться термифильные микроорганизмы (включая продукцию, упакованную в пакеты под вакуумом и в модифицированную газовую атмосферу) другой продукцией, которая может быть источником этих бактерий (мясо и субпродукты птицы сырые и полуфабрикаты из них, яйца и яйцапродукты сырые и сушеные, мясо и субпродукты скота сырые и полуфабрикаты из них, молоко сырое), или загрязненной водой;

современную эффективную санитарную обработку и дезинфекцию оборудования, инвентаря;

соблюдение правил транспортировки хранения и реализации пищевых продуктов (в первую очередь, обеспечение непрерывности холодильной цепи). исключение реализации пищевых непереработанных изделий из непастеризованного сырья, мяса с поврежденной кожей (обой), сырых продуктов животного происхождения и полуфабрикатов из них вместе с готовыми и употребляемыми продуктами).

2519. Владельцы или наниматели предприятий должны осуществлять производственный контроль, разрабатывать и утверждать программы производственного контроля, предусматривающие меры, направленные на предотвращение или управление риском инфицирования сырья, сырьевых рисков загрязнения продукции микроорганизмами и предотвращение вторичной контаминации.

2520. На наиболее значимых, критически значимых в плане кампиобактериоз предприятий и животноводческих хозяйствах, бойнях, мясоперерабатывающих и мясоперерабатывающих предприятиях в программу производственного контроля необходимо включить:

анализ сырых факторов происхождения, определенные риски загрязнения копченых изделий сырым и жирными продуктами животного происхождения и определении контрольных мер;

установку критических контрольных точек (ККТ) в процессе производства, на которых требуется проведение контроля, в том числе лабораторного;

разработку и установку контрольных параметров;

ежедневное мониторинг ККТ;

ведение учета и анализа показателей, регистрируемых в контрольных

10-90387;

осуществление мер, направленных на устранение выявленных нарушений

2321. Объектами производственного биотехнологического контроля на пищевых объектах, эпидемиологически значимых по кампилобактериозу, являются сырье (в том числе яйца с поверхности цулат линий, мяса, субпродуктов и т.д.), сырье с оборудования, инвентарь, тары, рабочих инструментов, которые могут быть контаминированы возбудителями кампилобактериоза, с рук работников, контактирующих с продукцией, вода для омовения продукции.

2322. Производственный биотехнологический контроль осуществляется в соответствии с установленными методами анализа, в том числе методиками экспресс-анализа.

2323. Производственный биотехнологический контроль эффективности мер, направленных на предотвращение перекрестной контаминации кампилобактериями на пищевых объектах и на предприятиях пищевой промышленности, осуществляется в соответствии с периодичностью не реже предусмотренной утвержденными руководящими документами для контроля санитарии системы предприятий на пищевых объектах.

2324. При обращении с термостойкими кампилобактериями в сырых и тушеных птицах, мясе, а также с термостойкими субпродуктами, птичьими убойными, яйцеработывающими и т.д. следует проводить тщательную механическую и санитарную обработку, дезинфекцию оборудования, включая колониальные титры. При последующем биотехнологическом контроле на предприятиях мероприятий по термостойким кампилобактериям в сырых не должны обнаруживаться.

2325. Юридические лица, осуществляющие предприятия при выявлении нарушений требований нормативных и методических документов на объекте производственного контроля должны принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

2326. Пищевые продукты, относящиеся к потенциальным источникам термостойких кампилобактерий (сырое мясо и субпродукты птицы, в первую очередь куриные, свинина, говяжья баранина, сырые овощи, свежие растения и фрукты, поступающие из предприятий общественного питания, должны соответствовать обязательным требованиям к количеству содержания микробов (в том числе фекальных), биохимических веществ и их производных, микробиологическим и другим биологическим критериям, представляющим опасность для здоровья населения и будущих поколений, а также документы, удостоверяющие их безопасность.

2327. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по водоснабжению (подключением и ремонту) должны обеспечивать качество подаваемой воды населению, содержание водосетей, трубопроводов в качестве водоканалов и разрабатывать, а в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2328. При обнаружении возбудителей кишечной инфекции по результатам пропециализированной экспертизы или любых предпринятых или чрезвычайных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей должны сообщать об этом в территориальные органы уполномоченные осуществлять государственной санитарно-эпидемиологический надзор.

2329. На предприятиях, вырабатывающих продукты и сырье животного происхождения, швейцарских производств, производящих пищевых продуктов, оборудования, спецодежды и других объектов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

2330. Организация и проведение профилактических мероприятий на предприятиях обеспечивающих руководители организаций.

Гигиенические требования к пище

2331. Работники отделов профсоюзной, производств и организаций, занятых в сфере деятельности с продуктами питания, должны знать основные сведения о профессиональных заболеваниях (инфекционных), которые должны входить в программу систематического обучения.

2332. Гигиеническое обучение. Работники должны на профессиональном уровне знать и уметь организации активной разъяснительной работы среди населения и предоставление подробной информации о кампаниях по профилактике основных инфекционных заболеваний, мерах профилактики инфекций, водного и пищевого пути передачи в основном средствами массовой информации, листовки, буклеты, приемы и индивидуальные беседы с населением и других методов направленных на повышение уровня гигиенической культуры населения.

2333. Гигиеническое обучение по профилактике заболеваний инфекционного происхождения (инфекциями возбудителями). Работники должны, извещено население, олепавшие домашние животные и птиц, в подвальных помещениях или квартирах.

УЗХП. Профильная вирусного гепатита А и Е

2334. Гепатиты А и Е представляют собой инфекционные болезни вирусной этиологии, проявляющиеся в типичных случаях общими истощающими, лихорадочными симптомами, потерей веса, тошнотой, рвотой, желтухой (желтая моча, обесцвеченный стул, положительная проба на желтуху) в том числе сопровождающиеся шокотическим уровнем антитрансферин сыворотки крови.

2335. Случай гепатита А классифицируется как:

подозрительный случай - случай, соответствующий вышеуказанному клиническому описанию;

подтвержденный случай - случай, соответствующий вышеуказанному клиническому описанию и подтвержденный лабораторно, или случай, который соответствует клиническому описанию, выявленный у человека, являющегося контактом с лабораторно подтвержденным случаем гепатита А в течение 15 - 35 календарных дней до появления симптомов заболевания.

2336. При наличии клинического случая с клиническими случаями гепатита А диагноз выставляется на основании эпидемиологических данных.

2337. Случай гепатита Е классифицируется как:

1) подозрительный случай острого гепатита Е (ОГЕ):

случай, соответствующий вышеуказанному клиническому описанию при исключении вирусных гепатитов А, В, С;

случай, соответствующий клиническому описанию в типичном случае гепатита Е либо при исключении подозрений на гепатиты В, С, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.

случай острого гепатита у лиц, профессионально связанных с работами на животноводческих фермах, переработкой животноводческой продукции (в том числе шкурами и субпродуктами, рыбными продуктами, мясомолочными продуктами, жирами, животноводческими продуктами, биофармацевтиками, ветеринарными препаратами).

случай острого гепатита у лиц, употребляющих недостаточно термически обработанные мясо, а также сырую печень свиньи или кабана.

2) подтвержденный случай ОГЕ - случай, соответствующий клиническому описанию и подтвержденный лабораторно;

3) подозрительный случай ОГЕ - случай, соответствующий вышеуказанному клиническому описанию;

4) подтвержденный случай ОГЕ - случай, соответствующий клиническому описанию и подтвержденный лабораторно.

2338. Вирус гепатита А (ВГА) относится к роду *Hepeviridae* семейства *Hepeviridae*. Вирус гепатита В (ВГВ) принадлежит роду *Hepeviridae* семейства *Hepeviridae*. Оба вируса имеют оболочку. Геном ВГА и ВГВ представляет одноцепочечной РНК положительной полярности. Вирус ВГА имеет диаметр 27 - 32 нм, а ВГВ - 27 - 34 нм. У обоих вирусов существует лишь один серотип, что обеспечивает развитие перекрестного приобретенного иммунитета и эффективность вакцинации.

2339. ВГА и ВГВ характеризуются высокой устойчивостью. В настоящее время хорошо известны четыре генотипа вируса гепатита В (1-4), которые выявляются у людей. Генотипы 1 и 2 обнаруживаются в странах тропического и субтропического шара. Вирусы гепатита 3 и 4 циркулируют среди многих видов животных (домашние и дикие свиньи, шимпанзе, обезьяны, коровы, крысы, мыши, крысы, ласки, мыши). В настоящее время известны и описаны (I - VII) генотипы ВГА, четыре из которых (I, II, III и IV) ассоциированы с заболеванием у людей. Вирус I и II генотипов выделяется субэпидемиями, которые обозначают названиями буквами латинского алфавита А и В (IA, IB, IIA, IIB).

2340. ВГА обладает высокой устойчивостью к действию факторов внешней среды и многих дезинфицирующих средств. При температуре ниже 20 °C вирус сохраняется в течение и течение 60 палеонтологических дней. С повышением температуры устойчивость вируса постепенно снижается. В питьевой воде при температуре ниже 4 °C его инфекционные свойства сохраняются более года. ВГВ хорошо сохраняется при температуре ниже 20 °C и выше. При температуре от 45 °C до 70 °C вирус быстро инактивируется, но может сохранять жизнеспособность в нестерильной термической обработанной воде.

2341. Источником инфекции при гепатите А является только человек (антропонозная инфекция). При гепатите А выделяют три основные клинические формы инфекции: бессимптомную, желтушную (острую) форму инфекции, а также лишь с бессимптомным течением инфекции. Инкубационный период составляет 7 - 35 календарных дней, в редких случаях достигая 50 календарных дней.

2342. Источником инфекции при гепатите В является человек и домашние животные, особенно свиньи, а также человек (зооантропонозная инфекция). Гепатит В у животных протекает бессимптомно. Инкубационный период болезни у человека составляет 14 - 40 календарных дней, в редких случаях достигая 60 календарных дней. На территории Российской Федерации циркулирует ВГВ генотипа 3. Распространяется болезнь вирусом других генотипов с серотипами других стран.

2343. Продолжительность выделения ВГА при различных заболеваниях существенно не отличается. Наибольшая концентрация вируса выделяется в фекалиях.

отражается в снижении титр антител к вирусу в первые дни болезни. С появлением антител у большинства больных концентрация вируса в фекалиях снижается. Эпидемиологическое значение имеют Большие тепловиты А с затупленными формами инфовириона (2 - 8%) и обостренными (около 15%), у которых наблюдается значительная вирулентность. Хроническое течение тепловита А не установлено.

2344. При СНЕ длительность вирусемии составляет в среднем 3 - 6 недель и у большинства больных возникает в течение двух недель после появления симптомов. С фекалиями ВГБ выделяется с испражнениями в значительном количестве до 4 - 6 недель от начала заболевания при наличии заболевания. При ХГБ выделение вируса может продолжаться в течение многих лет.

2345. Основным механизмом передачи возбудителей вирусных гепатитов А и В является фекально-оральный, который реализуется водным, пищевым или контактно-бытовым путями, другим путем передачи регистрируется редко.

2346. Водный путь передачи является доминирующим во всех странах, где используется未经消毒过的 водопроводная вода для питья и хозяйственно-бытовых целей, и чаще при купании в загрязненных водоемах. Водным путем наиболее часто передается ВГБ в странах 1 и 2 по степени эндемичности и субтропического пояса. Основным источником заражения являются инфицированные 3 и 4 гепатита.

2347. Пищевой путь передачи реализуется при употреблении продуктов, загрязненных вирусом во время производства на пищевых предприятиях, распределении общественного питания и объектах торговли, реализующих продукцию. Иногда, особенно в странах с высоким уровнем гигиены и при тщательном мытье овощей и фруктов при употреблении необработанных овощей и фруктов, реализуется при употреблении сырых овощей и фруктов. Морепродукты могут быть контаминированы вирусом при употреблении сырых моллюсков и рыбы при употреблении сырой рыбы.

2348. Контактный путь передачи характерен для ВГБ гепатитов 3 и 4, и реализуется при употреблении в пищу сырого или недостаточно термически обработанного мяса и субпродуктов (печень) инфицированных животных.

2349. Контактно-бытовой путь передачи реализуется при непосредственном контакте с инфицированными лицами. Факторами передачи служат руки, а также предметы, контактировавшие с вирусом. ВГБ редко передается контактно-бытовым путем. Особым механизмом контактно-бытового пути является передача вируса при орально-анальных сексуальных контактах. Установлены единичные и групповые случаи заболевания гепатитом А у мужчин, практикующих секс с мужчинами.

2350. Длительный период вирусурия обуславливает возможность передачи ВГА и ВГЕ при переливании крови и ее препаратов, трансплантации содержащих органов и тканей, а также употреблении инфицированных пищевых продуктов. Вертикальным путем ВГЕ от беременной женщины ее плоду передается в являющихся случаях.

2351. Вирусные гепатиты А и Е широко распространены и заболевают в различных и виде социальных условий, различных условиях и значительной разницей интенсивности (с преобладанием в тропическом поясе широты).

2352. При любом типичном вирусе течения вирусного гепатита А и вирусных гепатитов А и Е характерен стойкий выздоровительный иммунитет. Показателем наличия иммунитета к ВГА является присутствие в крови антител к ВГА (anti-VGA IgG). Анти-ВГА не выявлено anti-VGA IgG в острых случаях ВГА.

2353. Иммуноглобулины класса G к ВГЕ (anti-VGE IgG) выявляются в крови больного от начала клинических проявлений и продолжают циркулировать во время течения. Длительность и стойкость иммунитета при гепатите Е неизвестны.

2354. Клинические проявления гепатитов А и Е могут проявиться в виде лихорадки, общего недомогания, потери аппетита, тошноты, диспепсии, дискомфорта в области брюшной полости, потемнение мочи и желтухи (покраснение кожи и склер).

2355. Разные манифестной форма при гепатите А напрямую связано с возрастом. У детей и в возрасте до 6 лет заболевание обычно имеет бессимптомный характер, а только у 10% развивается желтуха. У взрослых заболевание обычно протекает с повышением клинических симптомов, желтуха наблюдается в более чем 70% случаев. Тяжесть заболевания и смертность увеличивается в более старших возрастных группах.

2356. Гепатит Е у беременных, особенно во втором и третьем триместре, может протекать фатально с развитием острой печеночной недостаточности и заканчиваться потерей плода и смертельным исходом матери. Летальность среди беременных может достигать 20-25%.

2357. При гепатите А и Е в ряде случаев возможно развитие исключительных проявлений: поражение почек (синдром нефрита), присоединение вторичных инфекционных симптомов (в том числе синдром Гийена-Барре, синдром неврастгии, энцефалопатия), синдром острого некроза печени, гематологических нарушений (тромбоцитопения, анемия) и других синдромов.

2358. В ряде случаев хронической инфекции возможно при гепатите Е у иммунодепрессированных лиц, особенно у реципиентов трансплантатов органов и с

прямечением иммунофлуоресцентных препаратов, инфицированных вирусом ВГР 3 или 4 генотипа.

Выявления, учет и регистрация случаев гепатита А и В

2359. Данные о реализации случаев заболевания вирусными гепатитами А и В на основании индивидуальных данных являются в соответствующим формам федерального государственного статистического наблюдения.

Лабораторная диагностика

2360. Лабораторная диагностика гепатитов А и В проводится иммунохимическим (серологическим) и молекулярно-биологическим методами исследования.

2361. Иммунохимическим (серологическим) методом в сыворотке крови определяются наличие антител к вирусу/гепатитина классов М и G к ВГА (anti-BGA IgM и anti-BGA IgG) и к ВГЕ (anti-BHE IgM и anti-BHE IgG).

2362. Молекулярно-биологическим методом определяют концентрацию нуклеиотид РНК ВГА и ВГЕ в сыворотке (плазме) крови и (или) фекалиях.

2363. Лабораторная диагностика гепатита А является обнаружение anti-HAV IgM в сыворотке крови и (или) РНК HAV в сыворотке (плазме) крови и (или) фекалиях.

2364. Лабораторным критерием подтверждения случая ВГЕ является обнаружение anti-BHE IgM и anti-BHE IgG в сыворотке (плазме) крови или выявление РНК ВЕ в сыворотке (плазме) крови и (или) фекалиях.

2365. Лабораторным критерием подтверждения случая ВГЕ является обнаружение РНК ВГЕ в сыворотке (плазме) крови в течение 3 и более месяцев.

2366. Лабораторная диагностика гепатитов А и В проводится с использованием диагностических препаратов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

2367. В документе, подтверждающем лабораторией по результатам исследования на маркеры ВГА и ВВЕ, РНК ВГА или РНК ВГЕ указывается наименование тест-системы, с помощью которой проводилось данное исследование.

Организация и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Мероприятия в эпидемиологическом очаге

2368. При выявлении больного гепатитом А или В (при подозрении на гепатит А или В) медицинский работник медицинской организации, осуществляющей образовательную деятельность, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации ухода детей и их сопровождения, организует проведение комплекса мероприятий профилактического (профилактические мероприятия, осуществляемых на доклинической стадии и предупреждение заболевания окружающих).

2369. Выявляются лица, имевшие контакт с заболевшим в конце инкубационного периода и в первые дни его болезни, в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, стационарах, санаториях, протекторатах, пансионах и других учреждениях, а также по месту проживания заболевшего (в том числе в общественных, гостевых), а всем учащимся/делегатам данных организаций ставится в известность.

2370. Необходимость проведения эпидемиологического обследования иная по месту жительства определяется специализацией органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2371. Для проведения эпидемиологического обследования с реализацией мер по ликвидации случаев с неизвестными случаями вирусного гепатита А или В органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, формируют группу специалистов эпидемиологического, санитарно-гигиенического, лабораторного и других необходимых профилей в зависимости от характера очага.

2372. Содержание, объем и продолжительность проводимых мер по ликвидации очагов вирусного гепатита А или В среди населения, на предприятиях, в организациях и образовательных учреждениях (в том числе детских, военных колледжах, учебных заведениях, санаториях, стационарах, предприятиях общественного питания, объекты торговли, предприятия по обслуживанию транспортных и коммунальных сооружений) определяются специалистами органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор на основании результатов эпидемиологического обследования.

2373. При проведении эпидемиологического исследования уточняют:

число больных острым и хроническим гепатитом в количестве лиц, подвергшихся риску заражения, отнесенное к единице экспозиции;

распределение заболеваний по районам и возрастным группам, по возрасту и профессиональным группам;

распределение заболеваний по группам, лицам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях отдыха детей и их оздоровления, детских и юношеских спортивных;

выявление острых инфекций и путей передачи вирусов;

определение качества питьевой воды, потребленной населением, требованиям, регламентируемым нормативными документами, потребностям требованиям к охране поверхностных вод, требованиям к качеству воды централизованного водоснабжения водопользователям к контролю качества питьевым потребностям и качеству воды централизованного водоснабжения, к санитарной охране источников;

обеспечение требований санитарии водопользователям по обеспечению качества и безопасности питьевым водоснабжением бытовых вод;

состояние и режим работы систем водоснабжения и канализационно-санитарно-технического оборудования;

выявление аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях и их устранение;

обеспечение санитарии питья и приготовления, приготовления и хранения, транспортировки, хранения, хранения и реализации продуктов питания;

нарушения санитарно-гигиенических требований, возможность дальнейшего распространения инфекции.

2374. С целью лабораторного подтверждения эпидемиологической опасности объекта как фактора передачи ВГА в эпидемиологии от конкретной эпидемиологической ситуации молекулярно-биологическим методом определяли РНК ВГА в канализационно-бытовых стоках водоканала, после проведенных и проведенных вступивших в силу водопользования, водопользования водоканала.

2375. Больные и подозрительные по заболеванию вирусным гепатитом А или Е подлежат госпитализации в инфекционный отделении.

2376. В отделе лечебных случаев допускается лечение больного с лабораторно подтвержденным диагнозом в домашних условиях при условии:

пятидневного течения заболевания;

обеспечение диетического питания, правильного питания и лабораторного обследования;

принципиально болящего в отдаленной благоприятной обстановке;

активным контактом с работниками медицинской организации, организовавшей осуществление образовательной деятельности, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций отдыха детей и их оздоровления, других образовательных и иных объектов, а также с детьми, посещающими организации, осуществляющие образовательную деятельность;

обеспечения ухода за больным и выполнение всех мер противоэпидемиологического режима;

отсутствия у заболевшего вирусных гепатитов В и С или гепатита невирусной этиологии, других хронических заболеваний с частыми обострениями и прогрессирующей формой заболевания, ушибленных ран, трещин, шоколадного отравления алкоголем.

2377. Дискуссионный вопрос о лечении больных с подозрением на гепатит А или гепатит В на 2-3 дня в изоляторе организации закрытого типа для предупреждения заболевания. лабораторного обследования в целях уточнения диагноза при благоприятных санитарно-гигиенических условиях, легкой степени заболевания и обеспечении индивидуального ухода. В случае подтверждения диагноза острой гепатитизации требуется в инфекционное отделение.

2378. В сложных диагностических случаях (в том числе у беременных в любом триместре беременности) может иметься подозрение на вирусный гепатит А или Е, у пациентки не обязательно исключить другие инфекционные заболевания. Больного немедленно направляют в инфекционное отделение стационара.

2379. Диагноз вирусного гепатита А или Е ставят после выявления лабораторно в течение 48 часов после выявления подозрительного случая заболевания. Более поздние сроки удовлетворяют эпидемиологический анализ для гепатита серотатного этиологии, при наличии хронического гепатита В или хронического гепатита С, а также при наличии отсутствующих хронических заболеваний.

2380. Выписка из инфекционного отделения осуществляется по клиническому выздоровлению.

2381. Диспансерное наблюдение за переболевшими осуществляется по месту жительства или лечения. Регулярный контролируемый осмотр проводится не позднее, чем через месяц после выписки из стационара. В дальнейшем связь устанавливается и обмен информацией осуществляется местной организацией.

2382. При выявлении больного вирусным гепатитом А или Е медицинский персонал (семейный врач, участковый врач, фельдшерско-акушерский пункт) организует проведение комплекса первичных противоэпидемиологических мероприятий, включая текущее

я токсичности выше доз неэффективна. Изучавшись в м. приемы и методы передовых методов и предпринимая зараженных окружающей.

2281. В машиностроении чаще и больше применяются шупы в фантовых перемещениях. Вспомогательные приемы лабораторное исследование: проб сгруппированной среды, в том числе остатков ламинары продукта или бива. Кроме того, самым с трудом можно оборудовать ламинары. Лабораторные исследования объектов вентиль среды (в том числе воды, тепловой продукция) производились органами, обеспечивающими государственные стандарты-экономический валтор. Объем и перечень лабораторных исследований определяет специалист, отвечающий за проведение эмпирических исследований.

1384. Тростник декоративен в дощаних нивах (супротивно типу), уживається як баштан с мовних сім'яток до рослинності, а також в случах прощан сім'яток в охороні с мовності Російської Федерації.

[illegible]

2386. При выявлении случая заболевания тифозом А или В в организации в коллективной пище и/или в бытовом осуществляется повышенная дезинфекция, уборка и поддержание порядка в помещениях от характера очага. Дезинфекционные мероприятия проводятся специально обученный дезинфекционный персонал в规定的 местах, предоставленных специальному персоналу, осуществляющему государственную санитарно-эпидемиологический надзор. В течение 33 календарных дней с момента выявления последнего заболевшего проводится текущая дезинфекция помещений коммунальных учреждений, в которых выявлен случай заболевания. Организацию и проведение дезинфекции обеспечивает руководитель данного учреждения.

2589 Заключительная деинфекция проводится специалистами организаций дезинфекционного профиля в помещениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, котлокипных котельных, отопительных котлов, в случае смерти А или Т, а в организациях, осуществляющих образовательную деятельность - при поступлении школьников или групповых случаев заболевания. Такая деинфекция проводится силами сотрудников учреждений.

2288. Для заповеднической и текущей дезинфекции в эпидемических очагах используют зарегистрированные дезинфицирующие средства, эффективные в отношении возбудителей вирусных заболеваний А и Е. Дезинфектанты используют в виде раствора большого (фосолан, мода, равные массы), пасты из-под выделений, санитарно-технической

общественной жизни, размерами помещений и средствами организации в школе и в детском саду, в том числе в детских-лабораторных обследованиях.

2394. Первоначальный клинический диагноз и клинико-лабораторное обследование принимаются медицинский работник (врач-инфекционист, врач-терапевт, фельдшер) МО по месту жительства воспитанника или месту работы (обучения, воспитания) в течение 5 календарных дней после выявления больного и до вынесения вердикта врача-терапевта А.

2395. При отсутствии клинических признаков заболевания, подтвержденных данными, ранее по приказу врача-терапевта А. и не болевших этой инфекцией, вакцинируют по эпидемиологическим показаниям по приказу З. для исключения выхвата больного ребенка А.

2396. Вакцинация по эпидемиологическим показаниям является обязательной для всех воспитанников дошкольных учреждений, находящихся на территории и административно части территории А. Сведения о проведенной вакцинации (дата, название вакцины, доза и номер серии) регистрируются во всех учетных формах медицинской документации, применяемой учреждением.

2397. При выявлении больного ребенка А. или ребенка Г. в организованном детском коллективе (коллективе воспитанников), в организованном детском саду сроком на 15 календарных дней при заболевании А. и сроком на 40 календарных дней при заболевании Б. с момента выявления заболевания больного. За детьми (воспитанниками), находящимися в контакте с больным ребенком с заболеванием А. или Б. устанавливается ежедневное медицинское наблюдение в течение карантина.

2398. Показания группы (классы, подгруппы или палаты) подлежат изоляции от других групп, подгрупп или палат, организованных и не применяются участия в массовых мероприятиях, организуемых в сад. В параллельной группе (классе, отделении, палате) организуют систему самообслуживания, проводит беседы по гигиеническому воспитанию и мерам профилактики болезни А. и Б.

2399. В период карантина не допускаются перебежки контактов детей, воспитывающихся, перебежки детей и детей организованных в другие группы (классы, отделения, палаты) и в другие учреждения за исключением особых случаев с разрешения специалиста, осуществляющего государственной санитарно-эпидемиологический надзор.

2400. Прием в организованные группы (классы, отделения, палаты и ясли) новых лиц допускается в случаях, если поступающий перенес ранее болезнь А. или вакцинирован против болезни А. не менее чем за 14 календарных дней до допуска в коллектив.

2401. О детях из организованных коллективов и из воспитывающихся, находящихся в контакте с больным ребенком А. или Б. не сообщается сразу в известность медицинский персонал или руководству этих учреждений.

2402. Делой допустит в организационные комитеты с разрывами печати по отпуску по специальности или по специальности, осуществляющей федеральный государственный контроль-надзор, при условии их участия в работе и участия в переселении в (документально) обследованы либо медицинскими лицами в течение 14 календарных дней до начала в коллектив.

2403. О взрослых лицах, контактировавших с больным сыпучим А или Е по месту жительства, занятых работниками и лицами в различных трудовых отношениях (организация общественного питания и др.), ухода за больными в МК, посещением и обслуживанием детей, обслуживанием взрослого населения (в том числе приобщением, сопровождением), а также о контактировавших с больным сыпучим Е работниками жилищно-коммунального хозяйства, непосредственно осуществляющих обслуживание руководителей данных учреждений, соответствующего здравоохранения (взрослого населения) и органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2404. Руководителям этих учреждений обеспечить контроль за соблюдением контактов лиц, права личной и общественной жизни, обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в отношении А и отстранение их от работы при наличии первых признаков заболевания.

2405. За время, не превышающее 14 календарных дней, и в дальнейшем, по отношению к указанным лицам профессиональным группам, обследованы в клинических обследованиях (в течение 35 календарных дней при заболевании А и в течение 40 календарных дней при заболевании Е) осуществляют медицинский персонал поликлиники (амбулатории, фельдшерско-акушерского пункта) по месту жительства. Основы этих лиц приводят по мере необходимости, а в дальнейшем осуществляют лабораторные исследования. В пункт санитарии А при необходимости по необходимости и не принимаются лица контактировавшие.

2406. В детских дошкольных учреждениях, школах, детских-интернатах, детских домах, домах ребенка и образовательных организациях наблюдение за контактирующими лицами, сбор и доставка материалов для лабораторного исследования, проведение вакцинации, обучение персонала правилам противоэпидемического режима и работа по гигиеническому воспитанию с родителями детей включается на время и в соответствии с требованиями этих организаций. При отсутствии медицинских работников в данных организациях для работы возлагается на медицинский персонал, осуществляющий указанные выше функции.

2407. Все меры направленные на ликвидацию очагов, отражались в карте эпидемиологического обследования и плане наблюдения за контактной личиной, подписанный вносится в амбулаторную карту больного гепатитом А или гепатитом Е. В этих же документах фиксируются окончание мероприятий в очаге и результаты проведенных за контактной личиной.

2408. При выявлении случаев заболевания гепатитом Е среди работников производственных предприятий и предприятий мининтерналами производств руководители соответствующего органа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору совместно с главным государственными санитарным врачом субъекта Российской Федерации выдают предложения в орган государственной власти субъекта Российской Федерации о наложении ограничений на хозяйство и проведение мероприятий по ликвидации очага.

2409. Руководители жилищно-коммунальных хозяйств вне зависимости от форм собственности при появлении ограниченной по гепатиту Е на хозяйство обязаны обеспечить проведение комплекса профилактических мероприятий.

2410. С выявлением, выявление уходом за больными лицами, проводятся мероприятия по обследованию работников предприятия, использование средств индивидуальной защиты для предотвращения профессионального заражения БГЕ.

2411. Для своевременного выявления больных организуются медицинские осмотры работников с обязательным лабораторным обследованием на гепатит Е.

2412. Больные животные исключаются из продуктивной работы, не контактируют с уходом за животными или контактом с продуктами животного.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения вирусных гепатитов А и Е

2413. В целях предупреждения возникновения и распространения вирусных гепатитов А и Е органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводятся следующие санитарно-профилактические (профилактические) мероприятия:

исходя из эпидемиологической ситуации и прогнозирования тенденций ее развития:

длительное наблюдение за эпидемиологическим процессом, включая мониторинг заболеваемости и внутригодовой динамики заболеваемости, фиксация и установление взаимосвязи на распространение инфекции, циркуляции генетических вариантов возбудителя, установление специфического возбудителя возбудителя и вирусов, оценка санитарно-гигиенической обстановки в очагах гепатита А.

оценки эффективности принимаемых мероприятий.

2414. Санитарно-гигиенические (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение пылевых и в распространении инфекции гепатита В, осуществляются на площадке работы с территориальными органами Федерального агентства по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Профилактические мероприятия

2415. Основными мерами профилактики гепатита А являются санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на разрыв цепи передачи возбудителя инфекции и профилактику. Общественного сознания коллективного иммунитета.

2416. Основными мерами профилактики гепатита В являются санитарно-гигиенические и ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на разрыв цепи передачи возбудителя.

2417. К санитарно-гигиеническим мероприятиям по профилактике гепатитов А и В относятся:

благоустройство населенных пунктов;

обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, доступностью и эпидемиологическим контролем продукции питания;

улучшение санитарно-гигиенических условий труда и быта населения;

создание условий, гарантирующих соблюдение санитарных правил и требований, предъявляемых к жилищу, транспортировке, хранению, тепловой обработке и реализации продуктов питания;

обеспечение доступности и качества питьевой санитарно-гигиенических норм и правил; санитарно-промышленного режима в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях отдыха детей и их оздоровления, молодежных организациях, организациях с круглосуточным пребыванием детей и подростков, организациях детских коллективов и других объектах;

обеспечение свободный доступ;

гигиеническое воспитание населения.

2418. Органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный ветеринарный надзор, органы государственной власти субъекта Российской Федерации и области ветеринарии, осуществляющие переданные полномочия, информируют в течение 24-х часов территориальные органы, уполномоченные осуществлять государственной

использованиям информативно-телекоммуникационной сети «Интернет», средств массовой информации, лекций, плакатов, брошюр, приложении броски

2426. Основные сведения о гепатитах А и Е и мерах их профилактики должны быть включены в программы гигиенического обучения работников предприятий пищевой промышленности и общественного питания, коммунального и бытового обслуживания населения, животноводческих хозяйств, детских учреждений и лиц, к ним приходящих.

2427. Профилактика полиомиелита

2427. Полиомиелит относится к острым инфекционным заболеваниям вирусной этиологии и характеризуется разнообразным клиническим форм — от abortивных до парализующих. Парализующие формы возникают при поражении вирусом клеток передних рогов спинного мозга и двигательных ядер черепных нервов, и проявляются развитием тяжелых парезов/параличей конечностей, мышечной атрофии или мнимо туловища

2428. Источником инфекции является человек — больной или носитель. Полиовирус выделяется в окружающую среду в течение 3-4 недель, а в испражнениях — через 72 часа после заражения и продолжает обнаруживаться в количестве в тысячи единиц, а в выделениях — в течение 3-6 недель (лица с дефектами иммунитета могут выделять полиовирус в течение более длительного времени). Наибольшее количество вируса выделяется в течение второй недели заболевания

2429. Инкубационный период при остром полиомиелите колеблется от 4 до 30 календарных дней. Наиболее часто этот период длится от 6 до 21 дня.

2430. Основной механикой передачи возбудителя — фекально-оральный, пути передачи — пищевой, пищевой, контактно-бытовой. Эпидемиологическое значение имеет также интранзальная механика передачи возбудителя с кожно-выделительным и воздушно-пылевым путем заражения.

2431. Естественная восприимчивость людей высокая. Однако клинические проявления инфекции встречаются гораздо реже, поскольку на один манифестный случай приходится от 100 до 1000 случаев бессимптомности носительства полиовируса. Поэтому, с точки зрения эпидемиологической значимости, случаи бессимптомного носительства (бессимптомной инфекции) представляют большую опасность.

2432. Постинфекционный иммунитет — антителогический, пожизненный. В вирусу того типа, который вызвал заболевание. Поэтому повторные лица заболевания, вызванные, не требуются ни профилактических прививок.

2433. В дополнительныи период распространения дифтерии отмечено усиление повсеместный и диффузный эпидемиологический характер. В условиях умеренно влажной необходимо теплой-осенней seasonality. Период после введения вакцины характеризуется резким снижением заболеваемости дифтерией. Заболевание регистрируется в основном у детей, во взрослой против дифтерии и дифтерии с введением вакцины профилактически не проводится.

2434. После осуществления ликвидации инфекции в Европейском Регионе в 1962 г. в том числе в Российской Федерации, инфекция угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию страны представляет:

завоз дифтерии (ДНБ) или полиомиелита вакцинированного противодифтерийной вакциной дифтерийного от вакцины против дифтерии (ДНБ), на эпидемиологический неблагоприятный по полиомиелиту стран (территория):

риск, связанный с продолжением использования вакцины против дифтерии (ДНБ) – увеличение случаев заболевания дифтерийного паралича (ДНБ) при необходимости требующий по профилактике ДНБ и возможность формирования нейровоспалительных ДНБ при недостаточном охвате профилактическими прививками против дифтерии;

риск, связанный с заболеванием детей с полиомиелитом дифтерийного типа;

не выявленные случаи поражения полиомиелита.

2435. Наибольшему риску заболевания полиомиелитом в случае наличия ДНБ или ДНБ подвержены дети, получающие менее 3-х прививок против дифтерии или прививок с введением вакцины дифтерийного типа, определенных документами по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2436. Случаи ДНБ встречаются крайне редко. ДНБ может возникнуть у родителей вакциной против дифтерии (ДНБ) и у контактных с ними людей. ДНБ у родителей ДНБ преимущественно развивается после первой прививки против дифтерии вакциной ДНБ. ДНБ у взрослых возникает у взрослых детей (иногда после с иммунодефицитными состояниями) при их тесном контакте с детьми, страдающими ДНБ. Наиболее часто ДНБ у контактных регистрируется в детских закрытых коллективах (в домах ребенка, интернатах и других организациях с круглосуточной пребыванием детей) – при нарушении персонала санитарно-эпидемиологического режима, а также в семьях, где есть дети, не имеющие прививок против дифтерии, и члены семьи ДНБ.

2437. В полиомиеозной этиологии полиомиелита среди пациентов с вирусом свинки иммунизацией доказана роль не только ДППВ, но и ППВВ. Также известны случаи в предположительной этиологии и восстановлении нейронарности свинки.

2438. Клинически полиомиелит проявляется синдромом острого вялого паралича (ОВП). В связи с тем, что заболевание и диагностика могут быть затруднены с синдромом (ОВП) является важным элементом системы мероприятий по профилактике полиомиелита:

острый вялый паралич – любой случай острого вялого паралича у ребенка до 15 лет (14 лет и младше 19 лет), включая синдром Гийена-Барре, или любое характерное заболевание, связанное с возникновением полиомиелита или полиомиелита;

острый параличический полиомиелит, вызванный ДППВ – случай острого вялого паралича с патологическими изменениями на 60-й день после вакцинации, при котором выделен ДППВ;

острый параличический полиомиелит, ассоциированный с вирусом 2-го типа – случай острого вялого паралича с патологическими изменениями на 60-й день после вакцинации, вызванный вирусом 4-го и не вызван вирусом 2-го типа после вакцинации ОППВ, при котором выделен вирус полиомиелита из материала происхождения;

острый параличический полиомиелит, ассоциированный с вирусом 3-го типа у контактного – случай острого вялого паралича с патологическими изменениями на 60-й день, возникший эпидемиологически не позднее 60-го дня после контакта с человеком, страдающим ОППВ, при котором выделен вирус полиомиелита из материала происхождения;

острый параличический полиомиелит неуточненной этиологии – случай острого вялого паралича, при котором получены отрицательные результаты лабораторного обследования (вирус полиомиелита не выделен в течение выделительного периода формирования материала (после выделительного периода, после сбора, в течение 48 часов или выделительный период материала для исследования) или лабораторное исследование не проводилось, но выделительный период выделен на 60-й день с момента их возникновения;

острый параличический полиомиелит другой, неопределенной этиологии – случай острого вялого паралича с патологическими изменениями на 60-й день, при котором проведено полное лабораторное обследование, но вирус полиомиелита не выделен, и не получены эпидемиологически достоверные данные о контакте с другим источником вируса.

Выявление, регистрация, учет больных полимиелитом, больных в санитарном
охране палат карантин

2439. К приоритетным (эпидемиологическим) случаям ОПН относятся:

дети с ОПН, не имеющие полного курса вакцинации против полиомиелита
(имеющие менее 3-х доз вакцины);

дети с ОПН, во всеобщие сведения о профилактических прививках против
полиомиелита;

дети с ОПН, прибывшие из зарубежных или неблагополучных по полиомиелиту
стран (территорий);

дети с ОПН из семей мигрантов, входящих в группу риска;

дети с ОПН, прибывшие с мигрантами, детьми из семей входящих в группу
риска;

дети с ОПН, имеющие контакт с прибывшими из зарубежных или неблагополучных
по полиомиелиту стран (территорий) в течение последних 60 календарных дней;

лица с подозрением на полиомиелит вне зависимости от возраста;

2440. При получении сообщения извещения о случае ПОЛИО/ОПН в течение 24
часов специализированный территориальный орган, осуществляющий федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, организует
эпидемиологическое расследование. По результатам эпидемиологического расследования
и санитарного надзора на территории или индивидуальном заполняется 1-я часть карты
эпидемиологического расследования случая ПОЛИО/ОПН в соответствии с требованиями
4.3 к Санитарным правилам.

2441. Книга карт эпидемиологического расследования случаев ПОЛИО/ОПН (1-я
и 2-я части) представляется в Координационный центр профилактики полиомиелита и
защиты от инфекций (далее – Координационный центр).

2442. Учет и регистрация включает больных полиомиелитом, в подозрении на
полиомиелит - без ограничения возраста, больных, у которых выявлен синдром ОПН при
любых полиомиелитной форме заболевания - в возрасте до 15 лет (14 лет 11 месяцев 29
дней). Регистрацию и учет осуществляет по месту их выявления территориальный
орган, осуществляющий федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор.

2443. Территориальные органы, осуществляющие федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, ежемесячно в срок до 5 числа месяца
следующего за отчетным, представляют в Координационный центр профилактику

полимиомиелит и энтеровирусной (покинул) инфекции (далее – Кириши/Эпидемиологический центр) отделе о ретроспективной полимиомиелит и отделе общих паразитов и паразитарных инфекций исследований на полио и энтеровирусы (примечание 24 к Санитарным правилам). В отделе исключается число случаев ОПИ из эпидемиологического надзора.

2444. Сведения о регистрации случаев полиомиелита и ОПИ шлоск от подтвержденным Национальным клиническим по диагностике полиомиелита в (ИП) отсылается в форме федерального государственного статистического уведомления.

2445. Список случаев ПОЛИОМИЕЛИТА представляется территориальным правком, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в Кириши/Эпидемиологический центр в соответствии с приложением 25 к Санитарным правилам.

Организация лабораторных исследований биологического материала больных полиомиелитом. Больные с синдромом острой вялой парализации и с подозрением на полиомиелит

2446. От биологического материала (с указанием на это заболевание) и больных с синдромом ОПИ берут две пробы фекалий и минимально раннее время (но не позднее 14-ти дней от момента возникновения парализации). Лаборатория исследования фекалийными работниками медицинскими организациями, в которую госпитализирован больной. Первая проба фекалий берется при выявлении больного, вторая – через 24-48 часов после взятия первой пробы.

2447. Пробы от прожитых (отраченных) случаев ОПИ, в том числе случаев полиомиелита (подозрения на полиомиелит), доставляются в Кириши/Эпидемиологический центр для диагностики полиомиелита (далее – НИДП). Пробы от остальных (непримечательных) случаев ОПИ доставляются в Региональный центр по эпидемиологическому надзору за полиомиелитом и ОПИ (далее – РЦ ПОЛИО/ОПИ). Доставка проб осуществляется с указанием на лабораторное исследование, которое осуществляется в 2 экземплярах (примечание 26 к Санитарным правилам).

2448. Кириши/Эпидемиологический центр, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, ответственный за отправление материалов, заранее сообщает в РЦ ПОЛИО/ОПИ и в НИДП о направлении его отправления.

2449. В НИДП направляются для исследования биологического материала из всех субъектов Российской Федерации и из других случаев:

пробы от прожитых (отраченных) случаев ОПИ, в том числе случаев полиомиелита (подозрения на полиомиелит);

пробы от асбестовых и асбестоцементных изделий, где имеется принципиальный (ограничивающий) случай ОБП, в том числе случаи полиомеиоза (шоко-реакция на полиомеиоз), а также носители ЛПВ, ПОВЛ, а также возбудителей полиомиелита.

2450. Для идентификации вирусов в НЛПП направляются:

излишки полиомиелитов, выделенных в пробках фекалий от больных с энцефалитом ОБП, носителей ОБП, ПОЛИОМИЕЛ, эпидемиологической (летальной) инфекции (с шоко-реакцией на эти заболевания), а также от больных с явными эпидемиологическими случаями;

испытания полиомиелитов, выделенных из пробных материалов, собранных в рамках проведения контроля за циркуляцией полиомиелитов среди населения (проводятся исследования под наблюдением экспертов ЛПВ детских групп - в том числе детей из семей мигрантов, концентрированных групп населения, ЛПВ, прибывших из эндемичных (эпидемиологических) по полиомиелиту стран (территорий), здоровья детей «групп риска»).

2451. Для верификации исследований в НЛПП направляются парные сыворотки от приправленных (отправных) случаев ОБП в том числе случаев полиомиелита (шоко-реакция на полиомиелит).

2452. В РЦ ПОЛИОМИЕЛ для исследований направляются биоматериалы из регионов Российской Федерации, прикрепляемых к РЦ ПОЛИОМИЕЛ от:

больных с энцефалитом ОБП, а также от больных с явными эпидемиологическими случаями;

детей из семей мигрантов, концентрированных групп населения, ЛПВ, прибывших из эндемичных или эпидемиологических по полиомиелиту стран (территорий);

здоровых детей из «групп риска» по эпидемиологическим показаниям (при отсутствии эпидемиологических исследований направлять в лабораторию).

РЦ ПОЛИОМИЕЛ обеспечивает доставку с территории прикрепленных субъектов Российской Федерации для исследования полиомиелита отпранных из субъектов Российской Федерации в НЛПП проб фекалий, а также материалов полиомиелитов для вирусологической дифференциации.

2453. В учреждениях, обеспечивающих деятельность территориальных органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводятся:

исследования проб фекалий от больных ОБП, с шоко-реакцией на ОБП;

исследования проб фекалий от здоровых детей из «групп риска»;

исследования проб сточной воды (в рамках эпидемиологического надзора за объектами окружающей среды, по эпидемиологическим показаниям);

Организация и проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в отношении больных полиомиелитом, больных с синдромом острого вялого паралича и носителей ЦПВ, ПРАП, так называемого вируса полиомиелита типа 2

2457. Больные с подозрением на полиомиелит, болящие с синдромом ЦАП подлежат госпитализации в бокс инфекционного стационара. Перечень медицинских учреждений, в которых госпитализируются больные ПОЛИОМИЕЛ, определяет орбитал, осуществляющая координирующий санитарно-эпидемиологический надзор, совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны здоровья граждан.

2458. В направлении на госпитализацию больного указываются следующие сведения: выписные данные, дата заболевания, первоначальные симптомы заболевания, дата начала паралича, проведенное лечение, сведения о профилактических мероприятиях против полиомиелита (предоставлены ли полий прививочный материал, дата проведения прививки, вид прививки и выживаемость вакцины), а также о больном ЦПНОСОВП, с прививкой ЦПВ в течение предыдущих 10 календарных дней или тем, прибывшим из эндемичной или неблагополучной по полиомиелиту страны (территории), о состоянии эпидемиологическом неблагополучии по полиомиелиту стран (территорий).

2459. При выхвате больного производится набор двух проб фекалий для лабораторного вирусологического исследования с интервалом 24-48 часов. Пробы должны быть отобраны в максимально короткий срок, но не позднее 14 дня с начала заболевания.

2460. От каждого из перечисленных ЦАП производится набор выписки выворотки крота. Первую выписку отбирают при выявлении больного в возможно короткий срок (при поступлении в стационар) вторую - через 2-3 недели.

2461. В случае доставки больного на лечение в первые часы после начала заболевания забор фекального материала для лабораторных исследований при отсутствии от приоритетности случая.

2462. Забор и доставку материалов для лабораторных исследований осуществляют в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2463. При подозрении на полиомиелит проводят исследование спинно-мозгового ликвора, содержащего информацию, позволяющую оценить гуморальный и клеточный иммунитет для получения заключения врача-иммунолога и

также электрофизиологические исследования (электроэнцефало и электрокардиография).

2464. Выявка и стационарная церебральная дисфункция, вызванная ДЦП, ПААП, вакциноспецифичной полиомиелитом, допускается после завершения оптимального наращивания результатов вирусологического исследования 2-х образцов фекалий, отобранных с интервалом 24-48 часов.

2465. В целях выявления остаточных нарушений проводится осмотр фильмо-ПОЛИОГРАФИ (через 60) календарных дней от начала наращения пораженных участков, если маркеры во восстановлении речевого. Для того осмотра вносят в медицинскую документацию болящего и на 2-ю часть карты эпидемиологического расследования случая ПОЛИОГРАФИ и соотносят с приложением 23 к Санитарным правилам.

2466. Повторный осмотр и сбор проб фекалий для лабораторного исследования больных полиомиелитом проводится на 60-й и 90-й дни от начала наращения пораженных участков. Данные осмотра и результаты лабораторных исследований вносят в соответствующую медицинскую документацию.

2467. Классификация случаев ОАП проводится комиссией (Комиссия по динамике полиомиелита и ОАП субъекта Российской Федерации) и вносится на 2-ю часть карты эпидемиологического случая ПОЛИОГРАФИ и в соответствующую медицинскую документацию больницы.

2468. Окончательную классификацию случая ПОЛИОГРАФИ проводит Подкомитет комиссии по динамике ПОЛИОГРАФИ на основании анализа и оценки карты эпидемиологического расследования случая ПОЛИОГРАФИ (1-я и 2-я части) и другой (при необходимости) медицинской документации (в том числе истории развития ребенка, медицинская карта стационарного больного, результаты лабораторных исследований). Итого окончательной классификации доводится до сведения территориальной организации, осуществляющей государственную санитарно-эпидемиологический надзор, который оформляет медицинскую документацию. Результаты окончательной классификации вносятся в 3-ю часть карты в соответствии с приложением 23 к Санитарным правилам.

2469. Лица, осуществляющие под наблюдением, подлечивающиеся, против подлечивания контактировавшие с больными в соответствии с медицинскими классификации профилактических прививок.

2470. Зеркальный носитель ЛПД (ЦВВ) или вакциноспецифичной полиомиелитом 2-го эпидемиологического поколения (являясь в семье детей, не привитых против полиомиелита, а также при контакте с зарегистрированными больными) -

уединенные работники, работники торговли, общественного питания, организаний, осуществляющих образовательную деятельность, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций отдыха детей в их загородных (популярных) зонах и на рекреативных объектах в соответствии с законодательством Российской Федерации для получения отрицательного результата лабораторных исследований.

2471. Носитель ДЦВ, ДВВГ, вакцинополноценного полиовируса типа 2 при его выявлении подлежит строгим ограничениям с интервалом между прививками 1 месяц (выбор вакцины (ОПВ/ИПВ) осуществляется в соответствии с конкретной эпидемиологической ситуацией).

2472. Носители ДЦВ, ДВВГ, вакцинополноценного полиовируса типа 2, посещающие образовательные учреждения детей, или относящиеся к социально-развитому кругу, не допускаются в коллективы детей и к профессиональной деятельности на получение отрицательного результата лабораторных исследований образца стула на полиовирус. Выявление материала для проведения вирусологических исследований у детей лиц осуществляется посредством введения очередной дозы вакцины ОПВ.

2473. Репетитивное выявление носителя ДЦВ, ДВВГ, вакцинополноценного полиовируса типа 2 в его иммунной системе является основанием для рассмотрения вопроса осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2474. В случае, где выявлен больной с синдромом острого обширного паралича бульварной полиомиелитоза, носитель ДЦВ, ДВВГ, вакцинополноценного полиовируса типа 2 проводит санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия.

2475. Специалист территориального органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при получении экстренного извещения и выявления больного ПОЛИОМИЕЛИТОМ или носителя ДЦВ, ДВВГ, вакцинополноценного полиовируса типа 2 проводит эпидемиологическое исследование, определяет границы эпидемиологического очага, круг контактных лиц и организует комплекс санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.

2476. Медицинские и другие организации проводят санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия и очаги под контролем территориальных органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2477. В эпидемиологическом очаге, где выявлен больной с синдромом ОБП, в отношении контактных детей и подростков до 5 лет проводятся:

медицинский осмотр, вакцинация, наблюдение, профилактика:

содержавное издательское издание в течение 30 календарных дней с регистрацией результатов издательства в соответствии с издательской документацией.

забор одной пробы фекалий для лабораторного исследования (в случаях, предусмотренных пунктом 2479 Санитарных правил):

выявляющих детей против лишения или осуществления в соответствии с конкретной психологической ситуацией или характеристикой их ранее проведенных профилактических прививок против этой инфекции, но не ранее 1 месяца после последней вакцинации против полиомиелита, в случае, предусмотренных пунктом 2478 Санитарных правил вакцинация проводится заковой ИИВ

2478 Дети, не прошедшие другие доопределения, однократно прививаются вакциной ИПП или аналогично: противостолбняч и применяемая вакцина ОПВ, а также по желанию сведения об иммунизации против доопределения, прививаемом с учетом в пункте 2511 Санитарных правил.

2479. Почти одной шестой фискальный от детей в возрасте до 3 лет для лабораторного исследования в 09800, где титрация большой ОВН, проводится в штихмах:

получить выписки и обследования больных ЛОЖЕНОЖИТ (послед 14 лет с момента возникновения патологии);

ветхого и бездурного блатных ПОЛЮСОВ! (мне 2-х проб слышн).

при наличии в отпуске индигентов, работающих групп поселенцев, а также
добытых из подземных или нефтяных полей по подсчету их (территорий):

при выделении протестантских (её) служб OBIL

2480. Взято проба ферритов у контактных детей до 5 лет для лабораторного исследования содержания свинца в организме.

2481. Меридианная в осев. пду выделенная белковой диссоциацией или диссоляцией, ПР(НТ), тактикоизомерного полипропилена или 2, проводится в стандартных тех. условиях при 100°С. Взаимодействие с водой не наблюдается, и поэтому не исследовалось.

первичный медицинский осмотр пациентов при терапии (лечении) и
наблюдении (наблюдении):

сведениям медицинское обследование в течение 30 календарных дней с
регистрацией результатов обследования в соответствующий медицинский документация;

одновременно действующим объектами контроля лиц (через предъявление
дополнительной документации):

Золотая книга для молодежи, посвященная книжкам, что прочитаны и оценены в
кратчайшие сроки, в зависимости от возраста и ранее прочитанных профессиональных

прямая (пикет палки (MIB/MIIB) осуществляется в соответствии с конкретной эпидемиологической ситуацией).

2482. Организуются дополнительные мероприятия:

взрослым, включая заграничных работников – индигенов;

детей в возрасте до 5 лет – согласно пунктам 2477, 2478 Санитарных правил;

детей в возрасте до 15 лет, прибывших из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (территорий), – открытием (при наличии сведений о прививках, полученных на территории Российской Федерации) или трехкратно (без сведений о прививках, при наличии прививок, проведенных в другой стране);

Сторонних агентств, не имеющих сведений о профилактических прививках против полиомиелита и не принявших против полиомиелита, – открытием ИЦВ.

2483. На территории, где был выявлен больной полиомиелитом или посылка ДПП, ППП, вакцинокодобного полиовируса типа 2, осуществляется анализ состояния прививочной кампании против полиомиелита с организацией необходимых дополнительных профилактических и профилактических мероприятий (дополнительных мероприятий по вакцинации).

2484. В течение после выявления больных с энцефалом ОВЦ, полиомиелитом, включая случаи ДПП, ИВВЦ, вакцинокодобного полиовируса типа 2 проводятся текущая и эпидемиологическая диагностика с использованием лабораторных средств, разрешенных и применяемых и объявленных официальному применению, в соответствии с инструкцией/методическими указаниями по их применению.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения полиомиелита и острых вирусных паразитов

2485. В целях предупреждения возникновения и распространения ПОЛИО/ОВЦ органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, принимаются следующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия:

оценка эпидемиологической ситуации и прогнозирования тенденций ее развития;

мониторинг заболеваемости;

оценка эффективности проводимых мероприятий.

2486. Чувствительность и качество проводимых санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения ПОЛИО/ОВЦ, определяется с помощью следующих показателей, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения:

показатель заболеваемости ОПП – не менее 1,0 на 100 тыс. детей в возрасте до 15 лет (на основании отечественной эпидемиологической ситуации, включая случаи импортируемости);

своевременность выявления больных ПОЛНООБП (по подсчету 7 вальсартых дней от начала появления симптомов) – не менее 80%;

эффективность отбора проб фекалий от больных ПОЛНООБП для вирусологического последующего (забор 2 проб не менее 14 вальсартых дней от начала заболевания) – не менее 80%;

полнота лабораторных исследований проб фекалий от больных ПОЛНООБП (2 пробы от одного больного) в РИ на ПОЛНООБП и НПОДП – не менее 100%;

своевременность (не менее 72 часов с момента взятия второй пробы фекалий) доставки проб от больных ПОЛНООБП в РИ на ПОЛНООБП, НПОДП – не менее 80%;

удельный вес проб фекалий, поступающих в лабораторию для последующего, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации (удовлетворяющих проб) – не менее 90%;

своевременность предоставления результатов лабораторий (не позднее 15 дней с момента поступления проб) при отрицательном результате последующих проб и не позднее 21 дня при положительном результате последующих) и упрощение, упрощение проб – не менее 90%;

эпидемиологическое расследование случаев ПОЛНООБП в течение 24 часов после регистрации – не менее 90%;

инвентарный осмотр больных ПОЛНООБП через 60 календарных дней от начала заболевания – не менее 90%;

доля больных кишечным, обследованных вирусологически на 60 и 90 календарных дней от начала парализа – не менее 90%;

количественная регистрация случаев ПОЛНООБП через 120 календарных дней от начала парализа – не менее 100%;

своевременность предоставления эпидемиологической информации и заболеваемости ПОЛНООБП (в том числе извещений) – не менее 100%;

своевременность предоставления копий карт эпидемиологического расследования случаев заболевания ПОЛНООБП – не менее 100%;

полнота предоставления материалов полиграфов, печати (использована) и чернильных, выделенных в пробных фекалий от людей, из объектов окружающей среды – не менее 100%.

2487. Мероприятия по профилактике полиомиелита проводятся в рамках реализации Национального плана действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Российской Федерации, осуществляющих прямых действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса субъектов Российской Федерации и требований законодательства Российской Федерации в сфере эпидемиологии, иммунологии и профилактики полиомиелита.

2488. Итая действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса субъекта Российской Федерации реализуются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны здоровья совместно с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и утверждаются с учетом конкретных местных условий, эпидемиологической ситуации.

2489. В субъектах Российской Федерации ежегодно разрабатываются и утверждаются планы проведения активных эпидемиологического надзора за ПОЛИОМЬОЗ.

2490. Документация о поддержании свободного от полиомиелита статуса субъекта Российской Федерации сохраняется в представлении субъекта Российской Федерации с учетом и адрес Координационного центра.

2491. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны здоровья совместно с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор в субъектах Российской Федерации, создают комиссии по полиомиелиту (полиомиелит и острый паралич параличей (дифтерия — полиомиелит совместно по дифтерии)).

2492. При наличии в субъекте Российской Федерации лабораторий, осуществляющих полиовирусные или работающих с материалами, инфицированными или потенциально инфицированными полиовирусами, органом, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в субъекте Российской Федерации, создается Комиссия по контролю за полиовирусом.

2493. Органы исполнительной и муниципальной власти субъектов Российской Федерации осуществляют экспертные комиссии: Комиссия по диагностике полиомиелита и острый паралич параличей, Комиссия по контролю за соблюдением требований безопасности деятельности лабораторного обеспечения детских и поликлинических поликлиник, других (невыявлено) учреждений. Комиссия по сертификации лабораторий полиомиелита.

Организационно-профилактические мероприятия

2494. Инициирование действий против полномочия осуществляемых в рамках национального законодательства профилактических мероприятий по эпидемиологическим показаниям, включая, в частности, распространение в территории Российской Федерации.

2495. Регистрации, учет и отчетность о выполнении профилактических мероприятий в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации требованиями.

2496. Оценка качества критериев оценки качества и эффективности плановой профилактики против полномочия действий в отношении эффективности и качества оказания медицинской помощи в соответствии с установленным законодательством профилактических мероприятий:

не менее 95% от общего количества детей, подлежащих вакцинации в возрасте 12 месяцев;

не менее 95% от общего количества детей, подлежащих второй вакцинации в возрасте 24 месяцев.

2497. Оценка качества и эффективности плановой профилактики согласно критериям, в субъектах Российской Федерации осуществляется во всех уровнях: в разрезе городов, районов, муниципальных образований, населенных пунктов, муниципальных образований, учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, учреждений, осуществляющих учет.

2498. Инициирование действий полномочия по управлению качеством оказания медицинской помощи в соответствии с требованиями (отделением, отделом) и (или) группой пациентов путем предоставления дополнительных мероприятий по вакцинации (ДМВ).

2499. Инициирование действий полномочия по предоставлению медицинской помощи в индивидуальном порядке пациентам:

лица в семьях полномочия и ОНП (в соответствии с условиями 2477, 2478, 2481, 2482) (критериями оценки):

лицам, имеющим в анамнезе или неблагоприятные по полному состоянию здоровья (территория), в случае не выполнения требований профилактической помощи. При этом наличием и наличием для неблагоприятных по полному состоянию здоровья (территория) должны быть выполнены требования против полномочия.

детям в возрасте до 15 лет, проживающим в экстремальных или неблагоприятных по полному состоянию здоровья (территория), не имеющих против этой инфекции, а также не имеющих сведений о наличии против полномочия — индивидуальными действиями

гипотезы не проводится оперативно (по прибытию), последующие анализы проводятся в соответствии с национальным календарем профилактических прививок;

детям в возрасте до 15 лет из семей мигрантов, мигрантских групп населения, не принятым против этой инфекции, не имеющим сведений о прививках против полиомиелита – индивидуальная против полиомиелита проводится однократно (по месту их проживания), последующие прививки проводятся по месту их проживания в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

лицам с отрицательными результатами серологического исследования уровня антител к полиовирусу к полноте к концу трех типов полиовируса или к любому из типов полиовируса. Индивидуальная проводится вакцинация с интервалом в 1 месяц;

лицам, работавшим с материалами, инфицированными или потенциально инфицированными ДПП, ПВВП, вакциноподобными полиовирусами типа 2 – однократно при поступлении на работу, далее в соответствии с требованиями пункта 2500 Санитарных правил.

2500. Лицам, работавшим в лабораториях и имеющих контакт с интерпретом, инфицированными или потенциально инфицированными ДПП, ПВВП, вакциноподобными полиовирусами типа 2, каждые пять лет обследуются на наличие антител к полиовирусам, по результатам обследования решается вопрос о проведении индивидуальной вакцинации.

2501. Индивидуальная против полиомиелита по эпидемиологическим показаниям в виде ДПП проводится:

на территории (в поселении), где выявлен случай или циркуляция ДПП, ПВВП, вакциноподобного полиовируса типа 2;

на территории (в поселении), где зарегистрирован случай полиомиелита, вызванный ДПП, ПВВП, вакциноподобным полиовирусом типа 2;

на территории (в поселении), где выявлен ДПП, ПВВП, вакциноподобного полиовируса типа 2 в материалах от людей или из объектов окружающей среды;

на территории субъекта Российской Федерации (в городах, районах, муниципальных районах, муниципальных округах, на промышленных и сельскохозяйственных участках, в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях) с низким (менее 95%) уровнем охвата прививками против полиомиелита детей в максимальном объеме: вакцинируемой в возрасте 12 месяцев и второй ревакцинируемой против полиомиелита в возрасте 24 месяцев;

на территории субъекта Российской Федерации (в городах, районах, населенных пунктах, на рабочих и фермерских участках, в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях) с низким (менее 80%) уровнем информированности результатов проведенных мероприятий по выявлению и лечению групп детей при проведении репрезентативных исследований;

на территории субъекта Российской Федерации (в городах, районах, населенных пунктах, на рабочих, фермерских участках, в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях) с неудовлетворительными показателями информированности эпидемиологического фактора по полиомиелиту и острым параличам спинного мозга (ОП) в субъекте за последние 2-х лет и более;

2502. ДМН в виде организованных кампаний проводится в соответствии с частотой всей страны проводится в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в котором определяются возраст информирования населения против полиомиелита, сроки, условия и критерии ее проведения;

2503. ДМН на территории субъекта Российской Федерации, на отдельных территориях (районах, городах, населенных пунктах, фермерских участках, рабочих и фермерских участках, в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях) проводится в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации, которым определяются возраст, подгруппы населения против полиомиелита, сроки, место проведения (в том числе район, город, населенный пункт), порядок и критерии ее проведения;

2504. ДМН проводится при наличии или ранее проведенных профилактических прививок против этой инфекции. Но не ранее 1 месяца после выписки из стационара против полиомиелита;

2505. При проведении сроков проведения информирования против полиомиелита детей по эпидемиологическим показателям с возрастом, репрезентированным максимальной заболеваемостью профилактических пунктов, информирование осуществляется как плановое;

2506. Планирование профилактических прививок против полиомиелита детей проводится в соответствии с возрастом и риском заболевания кампаниями профилактических прививок;

2507. Сведения об информировании против полиомиелита по эпидемиологическим показателям занесены в медицинскую документацию;

2508. Дополнительная иммунизация против полиомеялита ОПВ детей групп риска проводится независимо от срока прибытия при выписании, без проведения предварительного или дополнительного серологического исследования.

2509. Ответ и приведенная иммунизация против полиомеялита детей по эпидемиологическим показаниям предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2510. Основными критериями оценки качества и эффективности ДМПН против полиомеялита детей является своевременность и полнота охвата прививками не менее 95% от общего количества детей, подлежащих дополнительной иммунизации.

Мероприятия по профилактике кори, краснухи, эпидемического паротита у детей дошкольного (ВАПП)

2511. Наблюдения против полиомеялита проводятся в сроки, установленные НКПП детям до года и лицам более старшего возраста, не получившим прививки против полиомеялита ранее, вакцинировать, предусмотренными НКПП для вакцинируемых подлежащих контингентам.

2512. Для профилактических ВАПП у контактных с детьми, инфицированными против ОПВ в течение последних 60 календарных дней, проводятся мероприятия и мероприятия с учетом 2513-2520 Санитарных правил.

2513. Руководители медицинских организаций, учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, организаций отдыха детей в их оздоровлении принимают решение детей, не исключают сведений об иммунизации против полиомеялита, не прививать против полиомеялита или получивших менее 3 доз полиомеялентной вакцины, с детьми, привитыми вакциной ОПВ в течение последних 60 календарных дней, на срок 60 календарных дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ.

2514. При госпитализации детей в стационары и направлении на госпитализацию медицинскими учреждениями, направляющим ребенка, указывается прививочный статус ребенка (количество сделанных прививок против полиомеялита, дата последней прививки против полиомеялита и название вакцины).

2515. При возвращении детей в медицинские учреждения не допускается прием детей, не привитых против полиомеялита и получивших менее 3-х прививок полиомеялентной вакцины, не исключают сведений об иммунизации против полиомеялита в одну палату с детьми, получившими прививку ОПВ в течение последних 60 календарных дней. Необходимо проводить «ветеринарную» маркировку карт амбулаторных больных, поступивших прививку ОПВ в течение последних 60 календарных дней.

2516. Разоблачение детей в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, проживающих детей и их воспитателей осуществляется путем временного перевода ее принятых детей из воспитательной группы/класса/отряда, где все дети, принятых ОПБ в течение последних 60 календарных дней. Отстранение не принятых против показаний ребенка от посещения также осуществляется только в случае некомплектности переводя в другую группу/класс/отряд по объективным причинам (оформление принятой групповой нормы в организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведение совместных мероприятий в музыкальном, танцевальном зале; проведение танцевально-спортивных мероприятий танцевальными ОПБ в течение последних 60 календарных дней, по всем группам/классам/отрядам). Разоблачение выполняется на предупреждение неформального и записываемого неформального (во внешней среде) ребенка. С родителями не принятого ребенка проводится разъяснительная работа.

2517. В детских закрытых коллективах (в учреждениях, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в целях профилактики возникновения возможных случаев ВПП, обусловленных циркуляцией транспонированных штаммов полиовирусов, для воспитания и развлекательных целей проводится тестирование ОПБ.

2518. При приеме в организацию осуществляющую образовательную деятельность закрытых детских учреждений детей, проживающих за его пределами принятые ОПБ в течение последних 60 календарных дней, следует обеспечить его разоблачение с неформальными и во полностью приемлемыми (менее 3-х из пятидесяти) детьми на срок 60 календарных дней с момента поступления детей в воспитательную группу ОПБ.

2519. В детских закрытых коллективах необходимо предусмотреть временные нахождение детей в течение 21 дня в карантинном отделении при их поступлении из стационара после проведенного лечения: на основе опыта и предпочтительности. В детских закрытых коллективах необходимо обеспечить одновременную работу персонала и группы, где находится дети, во принятые против показаний (включая менее 10% профилактических приемов) и в группах детей карантинного отделения.

2520. При поступлении ОПБ одного из детей в семье медицинский работник должен уделить у родителей (опекунов) выяснить ли в семье во принятые против показаний дети или принятые извне. и при наличии данных рекомендаций извещать родителей, о возможности с медицинскими календарем профилактических приемов.

в пункте 2511 Санитарных правил не принятого или отмененного режима (при отсутствии противопоказаний) для развития детей сроком на 60 календарных дней

Серологический мониторинг популяционного иммунитета к полиомиелиту

2521. Проведение серологического мониторинга популяционного иммунитета к полиомиелиту организуют территориальные органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, совместно с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья и других получивших объяснения в ответе о состоянии иммунитета населения к полиомиелиту

Мероприятия, направленные на выявление случаев циркуляции ДПП, ЦВВП,

вакцинопродолжительных циркуляций

2522. В целях своевременного выявления случаев инфекционного полиомиелита, циркуляции ЦВВП, циркуляций вакцин, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, совместно с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, осуществляют:

периодические анкетированные исследования и других мероприятий о состоянии эпидемиологической ситуации по полиомиелиту;

эпидемиологическая оценка мер по профилактике ПОЛИОМИЕЛ в различных организациях;

по эпидемиологическим показаниям - поквартирные (домовые) обходы с целью выявления лиц с прививками ОПЦ;

диагностические лабораторные исследования проб фекалий из полиомиелитных отдельных групп населения:

лабораторные исследования объектов окружающей среды;

идентификацию всех штаммов полиовирусов, включая (включая) циркулирующих, выделенных из проб фекалий, из объектов окружающей среды;

дополнительные лабораторные исследования проб фекалий из полиовирусов у детей в возрасте до 5 лет (из семей мигрантов, входящих групп населения, прибывших из иностранных или получивших на территории стран территории), взрослых детей - выборочно (по эпидемиологическим показаниям пункта 2524 Санитарных правил и в рамках сложившейся циркулирующей эпидемиологической).

2523. С учетом местной эпидемиологической ситуации по полиомиелиту в мире при осуществлении мониторинга, подлежащих дополнительному лабораторному обследованию на полиовирусы необходимо принимать по прилагаемому перечню заболеваний

и высокодоходных по потенциалу стран (территорий), обеспечивая Российскую организацию здравоохранения, а также национальные информационно-аналитические службы.

2524. Уполномоченными лицами для проведения лабораторных исследований при фискальной экспертизе детей на полиомиелит являются:

отсутствие ретестов на случаи ОПВ в субъектах Российской Федерации в течение отчетного года;

наличие показателей чувствительности и наличия эпидемиологической оценки на основании мер по профилактике за ПОЛИОМИЕЛИТ (показатель заболеваемости ОПВ менее 1 случая ОПВ на 100 тысяч детей до 15 лет; наличие вакциносерва и обеспечение случаев ОПВ);

наличие (менее 95%) показателей иммунизации против полиомиелита детей в зарегистрированных группах;

неудовлетворительные результаты серологического мониторинга полиомиелита: количество положительных результатов менее 80%.

2525. Лабораторные исследования проводятся при выполнении указанных в пункте пункте 2522 Санитарных правил критериев детей вакцинированных от времени прибытия, но во время 4 месяца после последней вакцинации против полиомиелита ОПВ.

Слежение за циркуляцией полиовируса среди населения с помощью исследований объектов окружающей среды

2526. В целях слежения за циркуляцией полиовируса среди населения территориальные органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, организуют проведение планового мониторинга путем исследования объектов окружающей среды (ООС).

2527. Плановый мониторинг осуществляется ежегодно в соответствии с Приказом мониторинга СКК (далее – Программа).

2528. Программа разрабатывается ежегодно в начале текущего года территориальными органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, во взаимодействии с руководителем организации и специалистами, у которых отобраны точки отбора проб.

2529. Объекты исследования при плановом мониторинге являются сточные воды, образующиеся в процессе хозяйственной деятельности населения. При выборе точек отбора сточных вод для проведения мониторинга необходимо учитывать эпидемиологические риски выбранного пункта, объекта: миграционные процессы,

состояние иммунизации детского населения против полиомиелита, чувствительность и качество эпидемиологического надзора и ОПП, эффективность эпидемиологического надзора энтеровирусной (ветеринары) инфекции и результаты ретроспективного эпидемиологического анализа мероприятий и трудогодяиной заболеваемости. Стационарные воды, которые могут быть затронуты производственными отходами с промышленными предприятиями, для населения не выбираются. На открытых сооружениях стационарные воды проб отбираются выше зоны санитарной защиты до зоны всасывания различных устройств для орошения и дезинфекции. Для отбора проб водопользователи могут быть определены следующие типичные объекты (в том числе малые предприятия, предприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждения, осуществляющие образовательную деятельность).

2530. Программа включает в себя перечень точек отбора проб, периодичность (кратность) отбора проб на каждой точке и динамика в течение года (помесячно, поквартально). Кратность отбора проб на точке определяется в зависимости от времени года и сезонной активности вирусов. В периоды высокой активности циркуляции полиовирусов и НВЭВ в летний период отбор проб проводится не менее 1-2 раз в месяц на каждой точке, в периоды активности циркуляции вирусов кратность отбора проб проводится не менее 1-4 раз в месяц на каждой точке. Ежегодно проводится максимальная точка отбора.

2531. В эпидемиологическом порядке лабораторное исследование проводится вирусологические лаборатории для ППР-лаборатории учреждений, осуществляющих деятельность территориальных органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2532. При получении эпидемиологических данных к проведению исследований привлекаются при необходимости РЦ ПОЛИОМИЕЛИТА.

2533. Территориальными органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводится систематический анализ результатов исследований в воде источников с применением санитарно-гигиенических решений, при наличии неинформированных точек проводится анализ возможных причин, при необходимости проводится замена точек отбора.

2534. При выявлении эпидемиологических рисков, указывающих на возможное осложнение эпидемиологической ситуации, территориальными органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, принимается решение об увеличении точек отбора проб, кратности и объема лабораторных исследований сточных вод, отборе проб из других ИОС: поверхностных водоемов, которые используются для целей рекреации и в качестве питьевых

хозяйственного птицеводства, выращиваемых в домашних условиях, птицеводческой птицы на рынках, ларьках, в зоомагазинах и др.

**Самостоятельные мероприятия по профилактике в случае выявления
вируса ДТВ, ПВВП, папилломавирусного полиовируса типа 2**

2515. В случае выявления циркуляции ДТВ, ПВВП, папилломавирусного полиовируса типа 2 территориальные органы, осуществляющие федеральный государственный эпидемиологический надзор, совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья принимают следующие организационные и санитарно-гигиенические (гигиенические) мероприятия, направленные на уменьшение максимального распространения инфекции:

2516. Организуют эпидемиологическое расследование случаев заболеваний, подтвержденных на основании, случаев выявления ДТВ, ПВВП, папилломавирусного полиовируса типа 2 в пробах фекалий, извлеченных из объектов окружающей среды с целью выявления возможного источника инфекции, путей и факторов передачи.

2517. Проводят работу по выявлению издранных детей, не имеющих надлежащих профилактических прививок, и их иммунизацию и осуществляют с родителями или лицами, их заменяющими профилактические прививки.

2518. Организуют ДМН в максимально короткие сроки после получения из ИЦДП результатов лабораторной дифференциации полиовируса. Целевой группой иммунизации в течение первых недель с момента выявления первого ДТВ, ПВВП или папилломавирусного полиовируса типа 2 из любого источника (человек, сточная вода). Порядок проведения ДМН определяется в соответствии с Санитарными правилами.

2519. Принимают меры по обязательной организации мероприятий по профилактике ПОЛНОСОРП, включая:

- увеличение зарегистрированного показателя заболеваемости ОП до 3 на 100 тыс. детей до 15 лет;
- расширение охвата объектов эпидемиологической оценки;
- проведение ретроспективного анализа историй болезней для активного выявления незарегистрированных больных с подозрением на ПОЛНОСОРП;
- организацию лабораторных (анализов) исследований с целью выявления произошедших случаев ОП.

2520. Проводят оценку степени риска распространения инфекции с учетом количества выявленных случаев, интенсивности циркуляции возбудителя, количества детей, не имеющих прививок против полиовируса, показателей

ЧУВСТВОВАЛИСЬ И КРАСНЫМИ ШЕКАМИ ПОЛНОЦЕННЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЗАБОРЩИК ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ВО ПОЛИСКОМ.

2541. Растират кинешинелы нахуеаным ши лабораторного разделения прибор
использ. для анализа ибыл восстановлен

2542 Растительность перечислить объектов окружающей среды зон лабораторных исследований, исключив животный мир и растительность.

2541. Усиливает контроль выполняемых работ, повышает безопасность работы и антропоэкологический комфорт.

2544. Організується інформування молодіжних робітників з питанням про заходи щодо запобігання ситуації в межах професійного поліпшення.

безопасность работ с материалами, типифицированными или специально
идентифицированными по пожароопасности

[illegible]

2546 На территории, где был выявлен больной домашней кошкой, были построены ДПП, ППНП, вакциноподобного домашнего животного, осуществлены анализы состояния окружающей среды, проведены профилактические мероприятия с организацией необходимых дополнительных профилактических и профилактических мероприятий (дополнительных мероприятий по выявлению).

2547. Лаборатории, работающие (в том числе проводящие экспериментальные работы) с материалом, инфицированным ВПН потенциально инфицированным ИИВ, ЛПВП, выходящим/обедом, встает учет для лечения и хранения материалов.

2548. Вакцинные шламмы молочнокислых (подкиски Сибиряк), мезильформы и др. для профилактики цели, мышечной, как коллекционная.

2549. Означившие обозначение поступившего платежа прилагают полную копиацию. Присоединяя коллекционеру платежу обозначение (номер, год) не должно меняться при его передаче. В случае работы (уничтожения) платежа его обозначение не должно быть потеряно, пока поступившим платежом.

1559. Уничтожение коллекционных штампов пошиворучком в коллекции
оформляют анном (приложение 27 к Санитарным правилам).

1951. Все журналы по учету материалов унифицированы в ЛР предприятием
на предприятиях ЛПХ. ПЛПД, выданные в 1951 году, поправлены, и выданы в 1952

пронумерованы, дистрибуции, пронумерованы, скреплены печатью и хранятся у лица, ответственного за их ведение. Все охваченные журналы (карты) должны храниться в подразделениях или в архиве в течение 3 лет. В исследовательских лабораториях и в коллекциях все журналы стоят в штабел.

2552. Биоматериалы, содержащие материалы, инфицированные или потенциально инфицированные ДНВ, ИВВИ, вакциноподобными полиовирусами, должны иметь внешнюю крышку с наружной этикеткой, четким, всеобъемлющим надписью с обязательным указанием номера штамма.

2553. Материалы, инфицированные или потенциально инфицированные ДНВ, ПАВВ, вакциноподобными полиовирусами, хранят в заморозенном состоянии при температуре не выше минус 20 °C.

2554. Материалы, инфицированные ДНВ, ИВВИ, вакциноподобными полиовирусами, а также штаммы полиовирусов (ДПВ, ПАВВ, вакциноподобных) должны храниться в холодильниках отдельно от других исследуемых материалов под этикеткой.

2555. Каждый тип вакцинного штамма полиовирусов для дистрибуции должен храниться в емкости с этикеткой пробой в основном опечатанном контейнере при температуре не выше минус 20 °C, где отсутствуют другие инфекционные материалы.

2556. Все материалы, которые относятся к потенциально инфекционным по отношению к ДНВ, ИВВИ, вакциноподобным полиовирусам (пробы фекалий, образцы слюны, моча, пашажные материалы, выделенные штаммы полиовирусов и ИВВИ), хранятся в полиэтиленовых пробирках с маркированными пробирками с наружной этикеткой в контейнерах при температуре не выше минус 20 °C до получения отзыва из Н.Ш.И. с инструкциями по дифференциальной диагностике штаммов.

2557. Штаммы полиовирусов, служившие основой для приготовления вакцин, в промывочных емкостях хранятся в отдельных помещениях. Вакцинные штаммы в контейнерах хранят в отдельном холодильнике, где отсутствуют другие инфекционные материалы.

2558. Для хранения материалов, инфицированных или потенциально инфицированных ДНВ, ИВВИ, вакциноподобными полиовирусами, из холодильника в бите необходимо использовать подогретый материал, устойчивый к ударам оторочной конвейер.

2559. Требуется иметь четкую инструкцию о необходимых действиях в случае аварийных случаев, которые могут возникнуть при работе с материалами, инфицированными или потенциально инфицированными ДНВ, ПАВВ, вакциноподобными полиовирусами.

2560. Передачу материалов, инфицированных или потенциально инфицированных ДПВ, ПОВП, вакцинноподобных поливирусом, из одного подразделения в другое следует осуществлять по специальному разрешению руководителя подразделения.

2561. Передачу вакциноподобных поливирусов необходимо оформлять Актом передачи материалов (приложение 28 к Санитарным правилам) в журнал по инфицированному материалу учета и выдачи поливирусов, находящихся в коллективе.

2562. За хранение материалов, инфицированных или потенциально инфицированных ДПВ, ПОВП, вакцинноподобным поливирусом, назначаются ответственные работники. При его отсутствии, ответственным назначается другой работник. Копию с разрешенной руководителем организации (подразделения) передачи этих материалов с составленным актом передачи (приложение 28 к Санитарным правилам).

2563. Передачу материалов, инфицированных или потенциально инфицированных ДПВ, ПОВП, вакцинноподобным поливирусом, осуществляется за исключением, по временное хранение и коллекцию осуществляется только по специальному разрешению руководителя организации с составлением акта хранения (приложение 28 к Санитарным правилам).

2564. Передачу материалов, инфицированных или потенциально инфицированных ДПВ, ПОВП, вакцинноподобным поливирусом, из одной организации в другую разрешается производить только на официально ленте за подписью руководителя организации, прикрепленной печатью. Печатью производится с письменного разрешения руководителя организации, являющей материал, с составлением акта хранения (приложение 28 к Санитарным правилам).

2565. Транспортирование материалов, инфицированных или потенциально инфицированных ДПВ, ПОВП, вакцинноподобным поливирусом, между организациями осуществляется вручать служебной запиской-договором.

2566. При получении материалов, инфицированных или потенциально инфицированных ДПВ, ПОВП, вакцинноподобным поливирусом, получатель должен предоставлять достоверность и достоверность, удостоверяющие его личность. Получатель является ответственным за доставку материалов.

2567. При транспортировании материалов, инфицированных или потенциально инфицированных ДПВ, ПОВП, вакцинноподобным поливирусом, в целях исключения всех видов досмотра и вскрытия ввернутому является справка с разрешением на транспортирование материалов.

2568. На содержание упаковки с материалами, идентифицированными или потенциально идентифицируемыми ДПВ, ПВВП, вакциноподобным полиовирусом, составлено сопроводительное письмо на официальном языке организации. Идентифицированными считаются все упаковки в двух контейнерах. Первые экземпляры указанных документов помещают в упаковку с материалами. Копия документов помещается у отправителя. Организация, получившая материалы, идентифицированные или потенциально идентифицированные латент, покинувшие и вакциноподобным полиовирусом, должна составить акт вскрытия упаковки и вместе с письмом, сопровождающим получение этих материалов, отправить его в организацию, их выдавшую.

2569. Организация-отправитель обязана передать идентифицированную или потенциально идентифицированную упаковку получателю в виде трюмо, который сопровождается с маркировкой экспресс-доставки материалы, идентифицированные или потенциально идентифицированные ДПВ, ПВВП, вакциноподобным полиовирусом.

2570. Транспортирование материалов, идентифицированных или потенциально идентифицированных ДПВ, ПВВП, вакциноподобным полиовирусом, осуществляется в герметично закрытых емкостях. Емкости с маркировкой помещают в термостойкие контейнеры Упаковки емкостью с материалами, идентифицированными или потенциально идентифицированными ДПВ, ПВВП, вакциноподобным полиовирусом, в термостойком контейнере должны исключать возможность их повреждения во время нарушения целостности при транспортировании. А сопровождающий материал должен быть в достаточном количестве для сорбции всех утечек в случае повреждения упаковки.

2571. В случае повреждения при транспортировании маркировки, идентифицированных или потенциально идентифицированных ДПВ, ПВВП, вакциноподобным полиовирусом, пакетов, упаковки, утраты или повреждения, необходимо об этом сообщить в Федеральную службу по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальные органы, Федеральную службу безопасности, МАП, для принятия мер по охране места происшествия, ликвидации последствий, проведения расследования потерпевшего или пострадавшего. Об этом факте информирует организация-отправитель в организацию-получателя.

1. Источники информации населения по вопросам профилактики полиовирусной

2572. Гигиенические воспитательные мероприятия включают в себя информирование об основных причинах возникновения, симптомах и последствиях, мерах профилактики, эпидемиологической ситуации и заболеваемости полиовирусом, о принципах и средствах массовой

информации в доступном для широкой аудитории формате: лекции, плакаты, киноленты, а также проведение индивидуальных бесед.

2573. Работу по организации и проведению информационно-разъяснительной работы среди населения проводят органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и медицинские организации.

XXXIII. Профилактика энтеровирусной (крупной) инфекции

2574. Энтеровирусные (реплетно) инфекции представляют собой группу инфекционных заболеваний вирусной этиологии. возбудителями различного происхождения энтеровирусы.

2575. Типовым представителем рода является энтеровирус полиовирус - полиовирус (энтеровирус типа Энтеровирус С - EV-C), представляющий 3-ий серповидный (типы 1, 2, 3) Вак. остальные энтеровирусы, поражающие человека, обозначают как неполовипирусы (НПЭВ), которые относятся к 4 видам: Энтеровирус А (EV-A), Энтеровирус В (EV-B), Энтеровирус С (EV-C), Энтеровирус D (EV-D). Основная для циркулирующих НПЭВ отнесения к EV-A и EV-B. Соотношение EV-A/EV-D в Российской Федерации варьирует от 80% к 100%.

2576. Резервуаром и источником инфекции является человек: больной или бессимптомный носитель. Инкубационный период варьирует от 3 до 14 календарных дней, в среднем - до 1 недели.

2577. НПЭВ высоко контагиозны. Наибольшее восприимчивостью являются дети раннего возраста.

2578. Передача ЭВН осуществляется при реализации фекально-орального механизма передачи (водным, пищевым и контактно-бытовым путями) и аэрогенного (кашлевого) механизма (кашлетно-бытовым, аэрозольным, воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями).

2579. Энтеровирусы сохраняют высокую устойчивость во внешней среде, сохраняют жизнеспособность в воде при температуре до 10°C до 2-х месяцев, на сухих поверхностях при комнатной температуре - в течение дня.

2580. Распространение ЭВН имеет циклический характер. Заболевание встречается в виде sporadicных случаев, локальных вспышек (вспышек в детских коллективах), эпидемий.

2581. Принципы формирования доверительных отношений с групповой ответственностью могут являться также инфекцией в учреждении, на территории и помещениях:

распространения в условиях воздействия требовавший сангвизерного энцефалопатического, как по условиям заболевания, так и по составу системы водоснабжения и организации питания.

2582. В случае заболевания статическими формами энцефалопатического типа личности представляет собой, в первую очередь, как и в случае с психическим заболеванием, так и с расстройствами психики и психическим заболеванием.

2583. Отмечается, преимущественно, наличие острого характера заболевания ЭНМ. Локальные формы ЭНМ могут регистрироваться в течение всего тела, части — в виде заболевания от острого периода заболевания.

2584. ЭНМ характеризуется полиморфизмом клинических проявлений и множественностью поражений органов и систем: серозный менингит и менингоэнцефалит, энцефалит (в том числе энцефалит лобных рогов и височной доли для энцефалопатического синдрома (англ. — hemi, hemi and hemi hemi), синдром НФМТ), менингеальный (афтозный) синдром (терминация), синдром острого периода паралича (ОНП), геморрагический полиомиелит, энцефалит, ушиб, заболевание с расстройствами энцефаломы, и др. (198).

2585. Наибольшую опасность среди энцефалопатических заболеваний представляют тяжелые энцефалопатические формы с энцефалопатическими системами.

2586. Общественно-бытовое ЭНМ поддается лечению с характерными клиническими симптомами (симптомами) в очагах поражения заболевания, а также при наличии заболевания ЭНМ на короткой территории.

2587. Для острого заболевания ЭНМ установленный на основании клинических данных, результатов лабораторных исследований, энцефалопатического анализа.

2588. Не степень достоверности данных случаев заболевания ЭНМ классифицируются как достоверные, вероятные и подтвержденные:

достоверным считается случай ЭНМ при наличии симптомов или признаков из симптомов (синдромов);

вероятным считается случай ЭНМ при наличии характерных клинических проявлений в очагах заболевания с энцефалопатическими заболеваниями органов;

подтвержденным считается случай ЭНМ при наличии клинических данных и лабораторного подтверждения данных из истории.

2589. При расшифровке, подтвержденной доказательной информацией заболевание ЭНМ, диагноз в виде заболевания может быть установлен на основании объективных клинических данных в ряде лабораторно подтвержденных случаях ЭНМ.

эндоскопического воспаления (общаяль источник инфекции, путей и факторов передачи) до получения положительных результатов лабораторного исследования на ЭН.

2590. При возникновении заболевания ЭН на возвратной территории (в субъекте Российской Федерации) с наличием у заболевших остротечной характерной клинической картины заболевания и наличием типичных риновирусных случаев ЭН (ли типа ППД) у больных, выписанных в начале острого периода, возможна постановка диагноза ЭН у остальных больных с анамнотичной воспалительной картиной течения инфекции на основании клинико-эндоскопических данных.

Лабораторная диагностика ЭН

2591. Лабораторные исследования, направленные на обнаружение и идентификацию патогенов, осуществляются лабораториями, имеющими разрешительные документы для работы с патогенами III-IV групп патогенности, и являющиеся соответствующими основным лабораторным исследованиям.

2592. Основными методами лабораторного подтверждения ЭН являются молекулярно-биологические (ПЦР, секвенирование) и вирусологические методы.

2593. Экспресс-тесты на основе латекс-аглоагации или иммунофлуоресценции обладают относительной высокой диагностической чувствительностью. В качестве основного метода диагностики ЭН данные тесты не могут быть использованы.

2594. Основанием для лабораторного подтверждения диагноза ЭН служит: обнаружение ППД или их рибонуклеиновой кислоты (далее - РНК) в исследуемых типах клинического материала;

наличие ППД или их РНК в исследуемых типах клинического материала при наличии эпидемиологически распространённой вспышки энтеровирусной инфекции и при наличии у пациента характерной для энтеровирусной инфекции клинической картины;

выявление ППД или их РНК в исследуемых типах клинического материала при отсутствии вспышки и при отсутствии типичных вирусологических клинических картинах заболеваний (везикулярной (оптичной) сыпи (карпин), герпетической, в том числе экзантемы, полиомиелита и энцефалита или энцефаломиелита, по результатам тестирования фекалий пробой подкармливать энтеровирусную природу острого воспаления можно только в случае отрицательных результатов лабораторного обследования на другие патогены).

выявление ППД или их РНК в двух пробах исследуемых клинических материалов разных типов.

2595. Результаты серологических исследований могут служить лабораторным подтверждением диагноза ЦВИ только в совокупности с другими из пунктов, перечисленных в пункте 2594 Санитарных правил. Ограничение является к ИТЭВ в единичном образце диагностической ценности не имеет.

2596. Расшифровка этиологии заболевания до типа ИТЭВ проводится с целью оценки эпидемиологической ситуации и прогнозирования.

2597. Расшифровка этиологии заболевания до типа ИТЭВ проводится в случае усиления паттерна заболеваемости ЭВИ, а также от больных с типичной формой течения ЭВИ (и подозрения на ЭВИ), а также в атипичных случаях ЭВИ (и подозрения на ЭВИ), из числа групповой заболеваемости ЦВИ.

2598. Расшифровка этиологии заболеваний до типа ИТЭВ проводится в организации, в том числе научных, обеспечивающих деятельность органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Мероприятия при выявлении больного ЭВИ (при подозрении на ЭВИ)

2600. Госпитализация больных с ЭВИ и лиц с подозрением на это заболевание проводится по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

2600. Госпитализация подлежат больные ЭВИ и лица с подозрением на это заболевание — с неспецифической симптоматикой (сильный мышечный, энцефалитический), а также пациенты с усталостью, геморагическим комплексом, миокардитом.

2601. Медицинские организации с законодательством Российской Федерации подлежат больные всеми клиническими формами ЦВИ и лица с подозрением на это заболевание — из организованных коллективов, а также проживающие в неблагополучных.

2602. Больные с ЦВИ и лица с подозрением на это заболевание подлежат лабораторному обследованию. Вакции внешнего материала от больного организуются при установлении диагноза ЦВИ или при подозрении на это заболевание — в зависимости от обращения (просьбы/заявления).

2603. Данные извлеченного вида материала или лабораторных исследований от больных ЭВИ и лиц с подозрением на это заболевание осуществляются с учетом клинической картины заболевания.

2604. Для исследования отбираются:

стерильные титры клинического материала, цереброспинальная жидкость, отделяемое конъюнктивы, отделяемое полости, кровь, биоптаты органов;

2611. Критериями ведения дополнительных профилактических мероприятий являются:

сезонный подъем заболеваемости с нарастающим высоким регистрируемым заболеваемостью с превышением уровня аналогичного периода прошлого года, превышающего его уровень;

присутствие в структуре регистрируемых ЗВН генерализованных форм с высоким уровнем;

появление в структуре регистрируемых ЗВН новых заболеваний с высоким эндемическим заболеваемым, ранее не встречавшимся на данной территории.

2612. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их оздоровления и иных профильных групповой заболеваемости независимо от наличия или отсутствия регистрируемых случаев заболеваний в период эпидемиологического сезона по заболеваемости ЗВН вводятся следующие дополнительные профилактические мероприятия:

проведение ежедневного утреннего фиделя с документальным оформлением результатов осмотра по каждому классу/группе/отряду (не допущение в организованный коллектив детей с признаками инфекционных заболеваний);

проведение текущей дезинфекции не менее 2 раз в день на объектах, в которых в спальных помещениях, кабинетах/классах, групповых, кружковых, местах общего пользования, туалетах, санузлах с применением растворов дезинфицирующих средств профилактических и эпидемиологических;

увлажнение дезинфекции столовой посуды и столовых приборов после каждого приема пищи с применением дезинфицирующих средств эффективных в отношении энтеровирусов, для обеззараживания столовой посуды и дезинфицирующего раствора в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организаций отдыха детей и их оздоровления, ведется работа с пришкольниками, учащимися, учащимися с указанием назованных организаций, что дезинфекция, энтеровирусы, лоты приподняты, правильного срока годности;

увлажнение красными промаркированными кабинетами, рекреациями, спортивными помещениями; для обеззараживания посуды могут использоваться специализированные приборы, разрешенные и применяемые в соответствии с инструкцией производителя;

принятие мер по минимизации рисков для реализации наиболее пути распространения ЗВН (фрукты, овощи дозревшие в пакете после стандартной обработки, сырая - в последующем приправленная кинзой, не дозревшая, содержащая вирус филофа, зараженную и употребляемую без обработки, в

2617. В зависимости от интенсивности проявлений эпидемиологического процесса по ЭВИ дополнительные профилактические мероприятия могут вводиться и на других объектах эпидемиологического риска: места массового посещения населения, объекты общественного питания, бассейны, аквапарки, центры дополнительного образования для детей, досуговые мероприятия по протеканию текущей уборки с применением дезинфицирующих средств эффективных в отношении возбудителей, создание условий для обеспечения личной гигиены.

Проведение противоэпидемиологических мероприятий в очагах ЭВИ

2618. Органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводят эпидемиологическое исследование очага ЭВИ с целью установления его границ, выявления источника возбудителя ЭВИ, контактных лиц, а также лиц, подвергшихся риску заражения, определения путей и факторов передачи возбудителя, а также условий, способствующих возникновению очага.

2619. С целью установления путей и факторов передачи инфекции в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации осуществляются также при необходимости на объектах окружающей среды (питание, вода, бассейны, рекреационных объектов и другие объекты для проведения лабораторных исследований).

2620. Органы, осуществляющие определение органов, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2621. По результатам эпидемиологического обследования очага получены лица, проводившиеся и профилактические мероприятия, который согласовывают с заинтересованными организациями в соответствии, а при необходимости - с органами исполнительной власти.

2622. В зависимости от тяжести очага и выявленных эпидемиологических рисков, которые могут повлечь за собой дальнейшее распространение возбудителя инфекции, планом может быть предусмотрено:

ведение ограничений (закрыть для посещения) проведения массовых мероприятий (в т.ч. в закрытых помещениях и открытых комплексах), а также в отдельных помещениях, бассейнах;

продвижение занятий в начальных классах работы дошкольных образовательных учреждений, сокращение занятий и кружков в случае ухудшения эпидемиологической ситуации;

ведение панорамно-контролируемой системы, подпадающей под наблюдение;

установленные детьми режимы и обязательный мытье рук в местах приема пищи и употребления воды (в соответствии с правилами, установленными, осуществляющими образовательную деятельность).

каждое мероприятие по текущей дезинфекции в местах нахождения детей.

2623 Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в эпидемиологическом очаге ЭВИ (при подозрении на это заболевание) проводятся с участием муниципальных учреждений, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций отдыха детей и их сопровождения и других организаций под контролем органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Пошагово и своевременно проводятся санитарно-противоэпидемиологических (противоэпидемических) мероприятий обеспечиваются руководители организаций (учреждений).

2624. В целях локализации очага ЭВИ проводятся занятия с детьми методами опроса, осмотра при утреннем приеме детей в дошкольные (для организованных детей), в течение дня подтвержденных (подозреваемых) случаях. В зависимости от клинической формы ЭВИ для выявления и клинической диагностики заболевания применяются следующие:

2625. В отдельных случаях отбираются образцы эпидемиологического материала от контактных и лица для лабораторных исследований. Необходимость отбора материала от контактных, количество контактных, подозреваемых исследуемых, а также тип клинического материала и ценность его для выявления и исследования специфическими лабораторными органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор согласован со специализированными органами управления здравоохранения.

2626 В очаге ЭВИ (при подозрении на это заболевание) организуется медицинское наблюдение за лицами, подтвердившими диагноз заболевания. Наблюдение проводится медицинскими работниками организаций, в которых зарегистрирован очаг ЭВИ, или медицинскими организациями - по территориальной принадлежности.

2627 Медицинскому наблюдению подлежат:

лица, контактирующие с больными ЭВИ в организованных коллективах детей (образовательных, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их сопровождения и иных), из предприятий пищевой промышленности и, приравненных к ним, объектах питания;

команды по длительных учениях: для дошкольного возраста и взрослых из категории лиц, работающих в учреждениях, организующих характер деятельности которых связан с производством, транспортированием и реализацией продукции и пищевой воды, с воспитанием и обучением детей, обслуживанием больных, с коммунальными и бытовыми обслуживанием населения.

2628 Медицинское наблюдение контингента осуществляется исходя из описания результатов осмотра и соответствующих медицинских документов (истории наблюдений).

2629 Деятельность медицинского наблюдения за контингентом в связи с момента регистрации последних заболевшего ЭВИ составляет:

10 календарных дней — при регистрации первых форм ЭВИ (при отсутствии признаков переноса инфекции);

20 календарных дней — при регистрации форм ЭВИ с указанием переноса системы.

2630. После выявления первого ЭВИ (или лица с подозрением на это заболевание), в детском организованном коллективе проводятся организационные мероприятия:

в течение 10 календарных дней — при регистрации первых форм ЭВИ (без признаков переноса нервной системы);

и течение 20 календарных дней — при регистрации форм ЭВИ с указанием переноса нервной системы.

2631. Организационные мероприятия включают:

прекращение общения больных и временно отсутствующих детей в группе, в которой зарегистрирован случай ЭВИ;

выращивание перевод детей из группы, в которой зарегистрирован случай ЭВИ, в другую группу;

запрещение участия карантинной группы в общих культурно-массовых мероприятиях детского учреждения;

привлечение пригласок карантинной группы с соблюдением принципов групповой изоляции на участке и при возвращении в группу;

соблюдение принципа изоляции детей карантинной группы при организационных мероприятиях;

при возможности соблюдения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, принципа изоляции организовать разобщение детей, подвергшихся заражению ЭВИ, на период 10 календарных дней при таких формах (при отсутствии

справления нервной системы) или в период 20 календарных дней при регистрации формы ЭВИ с поражением верхних отделов системы.

2632. Пилотные принципы организации мероприятий обеспечения режима личной гигиены, соответствующей образовательной деятельности.

2633. В очагах ЭВИ проводились мероприятия по дезинфекции.

2634. Текущую дезинфекцию в домашнем очаге проводил член семьи, в орбиточелюстных коллективах — сотрудники учреждений/организаций после проведения медицинского работника и персонала.

2635. Необходимость проведения экстренных мероприятий дезинфекции определяет специфика очагов. Уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Заключительную дезинфекцию выполняют организации, осуществляющие дезинфекционную деятельность.

2636. Текущая и заключительная дезинфекция проводится с использованием дезинфекционных средств, зарегистрированных к применению и эффективных в отношении энтеровирусов в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по их применению.

2637. Среди населения, подвергнутого риску заражения, проводится разъяснительная работа и соблюдение мер профилактического управления ЭВИ с учетом различных путей и факторов передачи возбудителя инфекции.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения энтеровирусной инфекции

2638. В целях предупреждения возникновения и распространения ЭВИ органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводятся следующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия:

определение эпидемиологической ситуации и планирование мероприятий во различных;

мониторинг заболеваемости ЭВИ и носительства ИТОВ, включая анализ по территориям, возрастным и социальным-профессиональным группам населения, факторам риска, индикаторности эпидемиологического процесса;

мониторинг за циркуляцией ИТОВ, включающий исследование проб из объектов окружающей среды и материала от людей;

мониторинг биологических свойств возбудителя ЭВИ, в том числе проведение идентификации патогенной ЭВИ и типирования возбудителей, выделяемых из объектов окружающей среды и материала от людей;

информационный обмен об эпидемиологический ситуации по ЭВИ с субъектами Российской Федерации, приграничными зарубежными странами;

комплекс мероприятий по недопущению злота инфекции из неблагополучных регионов, стран, включая санитарно-карантинный контроль в международном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации;

лаповые обучение и воспитание граждан, направленное на повышение их санитарной культуры и выполнения профилактических заболеваний ЭВИ.

ценна эффективности проводимых мероприятий;

2639. Плановый мониторинг по циркуляции ППЭВ среди населения с повышенной восприимчивостью окружающей среды осуществляется в течение года в соответствии с Программой мониторинга (далее Программа).

2640. Программа разрабатывается ежегодно в начале текущего года территориальными органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль, во взаимодействии с руководящими органами и предприятиями, у которых определены точки отбора проб с учетом конкретных местных условий.

2641. Объектом исследования при плановом мониторинге с целью выявления объектов окружающей среды являются источники воды, образующиеся в процессе хозяйственной деятельности населения. При выборе точек отбора проб для проведения мониторинга необходимо учитывать эпидемиологические риски населения пункта, области, миграционные процессы, отдаленности населения профилактические мероприятия против полиомеии, наличие эпидемиологического процесса ЭВИ и результаты регулярного эпидемиологического анализа заболеваемости крупногрупповой заболеваемости. Сточные воды, которые могут быть загрязнены производственными отходами, содержащими химические вещества, для исследования не отбираются. На очистных сооружениях приемы сточной воды отбираются после этапа механической очистки до этапа пледения различных веществ для очистки и дезинфекции. Для отбора проб дополнительно могут быть определены следующие объекты (мелкопоселенные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, осуществляющие образовательную деятельность и т.п.).

2642. Программа включает в себя перечень точек отбора проб, периодичность (частоту) отбора проб из каждой точки в течение года (помесячно, ежеквартально). Частота отбора проб из точки определяется в зависимости от времени года и сезонной активности вирусов. В период высокой активности циркуляции полиовирусов и

XXXIV. Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций

2649. Острая респираторная инфекция (ОРИ) представляет собой остропротекающую, в большинстве случаев самоограничивающуюся инфекцию респираторного тракта, проявляющуюся катаральным воспалением слизистых оболочек и притекающая к лихорадке, насморку, чиханию, кашлю, боли в горле, нарушению общего состояния разной выраженности. Под острой респираторной инфекцией понимают следующие полиморфные формы: острый фарингит, острый фарингит, острый трахеит, острый ларингофарингит, острый нефритический верхний дыхательных путей неэпидемический.

2650. ОРВИ является одной из распространенных групп вирусных болезней с широким спектром инфекционных агентов. ОРВИ преимущественно вызывают вирусы, относящиеся к 7 семействам: ортомиксовирусы (вирусы гриппа), пикорнавирусы (респираторно-синциальный вирус, аденовирус, вирус парагриппа человека 1 - 4), коронавирусы, пикорнавирусы (реовирусы), денгевирусы, тороновирусы (ebolavirus), хантавирусы Sin Nombre, Black Creek Canyon, Bayou в странах Северной Америки и вирус Andes, Laguna Negra - в странах Южной Америки, пикорнавирус ХПС (хантеровский синдром), Циклотрикс ОРВИ, описанные для человека, в том числе хантавирусы, вызывающие ХПС, таксистский острый респираторный синдром (ТОРС) и Ближневосточный респираторный синдром (БВРС) имеют животное происхождение.

2651. Грипп входит в группу ОРВИ и является острой вирусной инфекционной болезнью с воздушно-капельным путем передачи возбудителя, характеризуется острой лихорадкой, лихорадкой (с температурой 38 °C и выше), общей интоксикацией и поражением дыхательных путей. В редких случаях возможно заражение человека непосредственно вирусом гриппа животных. В этих случаях течение заболевания преимущественно тяжелое или средней степени тяжести. При прямом контакте с зараженной домашней и дикой птицей заболевание человека вызван вирус гриппа А субтипа (H5N1), (H7N9) и (H9N2); вирусом при контакте со свиньями - вирус гриппа А субтипа (H1N1), (H1N2) и (H3N2). Отличительны острые случаи заражения человека животным гриппом А типа субтипа (в том числе H7N3, H7N7, H4N8, H6N1, H10N7 и другие).

2652. Вирус гриппа в виде осевшей жизнеспособности и инфективности сохраняется в течение нескольких часов, на поверхностях - до 4 часовых дней. Вирус гриппа А очень активен при воздействии многих веществ: 70%-ный спирт и хлороформные вещества инактивируют вирус в течение 10 мин. Высушенные приносят к

полной лизиса вируса. Вирус яче ткалей и пражки лизисавруется полностью при 50 °C в течение 3 часов, при 60 °C – в течение 30 мин, при 121 °C – менее 15 мин (экспонирование). В лизисаве вирус полностью инактивируется в течение 10 календарных дней. Ультрафиолетовое излучение с энергией 80 мД инактивирует вирус гриппа в течение 1 ч.

2659. Подтвержденными являются случаи гриппа после лабораторного подтверждения диагноза (лаборант аттестирован в Роспотребнадзоре) и федеральном центре, рекомендованным для диагностики гриппа, или приравненным к равному разрешенным на территории Российской Федерации местным властям для диагностики гриппа. Лабораторно подтвержденные случаи обязательно подлежат учету в установленном порядке.

2660. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ оценивается по сравнению с тем, что ожидается по данным заболеваемости предыдущими эпидемическими периодами.

2661. Ситуация с уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ, получаемый расчетным методом на основании среднесезонных данных в конкретный период времени, в конкретной территории, для совокупного населения и отдельных возрастных групп (эпидемический порог), рассматривается отдельно. Уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, с целью выявления и ликвидации.

2662. При составлении эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в длительном календарном периоде для данной территории следует учитывать превышение в отдельных возрастных группах или среди населения в целом эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ по планируемым данным в сравнении с эпидемиологическим порогом заболеваемости гриппом и ОРВИ для соответствующей недели.

2663. Если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в анализируемом периоде по сравнению с предыдущим (в каждой возрастной группе и по совокупному населению) более 20% и более следует дополнить анализом заболеваемости эпидемиологической ситуацией по гриппу и ОРВИ на территории.

2664. При анализе заболеваемости следует учитывать связь с эпидемиологическим порогом заболеваемости гриппом и ОРВИ до уровня эпидемиологического порога.

Выводы, учет и регистрация случаев заболевания гриппом и ОРВИ

2665. Информация о выявленных случаях заболевания гриппом и ОРВИ передается медицинскими организациями, выполняющими функции фискального учета.

осуществляющими методическую деятельность, в органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в соответствии с в первом эпидемиологического неблагополучия – в чрезвычайном режиме.

2666. При планировании в дошкольных образовательных организациях, медицинских организациях, организациях отдыха детей в их оздоровлении, организациях социального обеспечения и в иных случаях в ситуациях острой респираторной инфекции гриппа или ОРВИ, связанных между собой необходимыми периодами (периодом 7 дней), медицинский персонал указанных организаций информирует об этом уполномоченный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Диагностика гриппа и ОРВИ

2667. Выявление больных гриппом и ОРВИ и лиц с подозрением на эти заболевания проводится медицинскими работниками медицинских организаций в специально созданных подразделениях, осуществляющих медицинскую деятельность:

при обращении лица населения за медицинской помощью;

при оказании экстренно медицинской помощи на дому;

при оказании помощи детям в организациях, осуществляющие образовательную деятельность;

при медицинском наблюдении за лицами, общавшимися с больными гриппом.

2668. Для подтверждения диагноза гриппа и ОРВИ используются различные, разрешенные и применяемые в Российской Федерации, методы или диагностические наборы, позволяющие подтвердить наличие вирусной инфекции или идентифицировать инфекционный агент.

2669. Лабораторное обследование в целях идентификации возбудителя гриппа и ОРВИ проводится при:

госпитализации больного или лицу с острой респираторной инфекцией первичной и новыми дыхательных путей (типичная картина заболевания, ангинальная или неангинальная картина заболевания);

обследовании лиц с высоким риском неблагоприятного исхода гриппа и ОРВИ (в том числе детей до 1 года, беременных, лиц с хроническими заболеваниями сердца, легких, метаболическим синдромом, иммунодефицитными состояниями и лиц старше 65 лет и

других):

регистрацию случаев ОРВИ с указанием типичных случаев заболевания в организованных коллективах детей и взрослых в числом пострадавших 5 и более человек в один календарный период, заболевание лиц из организаций с отсутствующим пребыванием.

2670. В период эпидемиологических подъёмов заболеваемости гриппом обязательной задачей является также установление так называемых лабораторного подтверждения, так и на основании клинических и эпидемиологических данных.

Мероприятия в отношении источников инфекции

2671. Госпитализация подлежат больные с признаками гриппа и ОРВИ

с тяжелым или среднетяжелым течением заболевания;

с высоким риском неблагоприятного исхода гриппа и ОРВИ (в том числе детей до 1 года, беременные, лица с хроническими заболеваниями сердца, легких, иммунодефицитом, синдромом иммунодефицитным состоянием в том числе старше 60 лет и другие).

2672. В паталогических и госпитализации больных с подтверждением их гриппа или тяжелой формой гриппа принимаются меры по предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

2673. Госпитализированные больные подлежат лабораторному подтверждению.

2674. Изменения в эпидемиологии гриппа и ОРВИ проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации по предупреждению возникновения эпидемии, по не менее 7 календарных дней с момента появления симптомов респираторной инфекции.

2675. Выявление заболеваний осуществляется по клиническим наблюдениям.

Мероприятия в отношении лиц, общавшихся с больными

Грипп и ОРВИ

2676. Среди контактных лиц, общавшихся с больными гриппом и ОРВИ, одновременно принимаются меры по выявлению лиц с подозрением на заболевание гриппом и ОРВИ.

2677. В очагах гриппа и ОРВИ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинский персонал ежедневно в течение 7 календарных дней после окончания последнего больного гриппом и ОРВИ проводят осмотр детей, общавшихся с больными гриппом и ОРВИ, с термометрией 2 раза в день и измерением температуры. Результаты обследования должны быть зарегистрированы. С целью предупреждения распространения

обеспечение масочного режима, гигиенической обработки рук, обеззараживания и очистки воздуха с применением технологий, прошедших оценку эффективности и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое облучение и ионизирующие воздействия.

Организация профилактических и противоэпидемиологических мероприятий в предэпидемический период

2684. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках региональных программ обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в предэпидемический период, осуществляется пересмотр, корректировка и укрепление региональных шагов по профилактике гриппа и ОРВИ, планомерное санитарно-эпидемиологическое (профилактическое) мероприятия по борьбе с гриппом и ОРВИ, проведение мероприятий по обеспечению населения в субъекте медицинскими запасами профилактических и лечебных препаратов, оборудования, инкубаторов, средств индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфицирующих средств, осуществляются оценки готовности, в зависимости от уровня заболеваемости, перепрофилирование стационаров для приема больных гриппом и ОРВИ, проводится расчет кадрового обеспечения медицинских организаций на период оказания медицинской помощи при нарастающем эндемическом сезоне гриппа и ОРВИ. Осуществляется закупка гриппозных вакцин для иммунизации населения, в соответствии с группами риска, определяются национальным календарем профилактических прививок.

2685. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны здоровья граждан медицинскими организациями обеспечивается:

проведение массовой профилактической иммунизации против гриппа населения по группам риска, принимаемых на плановый или экстренный профилактических прививок;

подготовка кадров медицинских организаций на экстренный период, включая и профилактику гриппа и ОРВИ;

лаборатория лабораторная группа и квалифицированная лаборатория (ОРИ) и лаборатория медицинских организаций методами, определенными в национальных Санитарных правилах.

2686. Руководителям организаций, сотрудники которых относятся к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ (работники медицинской, научной, исследовательской и организационной, осуществляющих образовательную деятельность: торговля, общественное питание, транспорта, коммунального хозяйства), должны применять меры по проведению эпидемиологической профилактики гриппа и

вспомогательной профилактике ОРН

Организация профилактических мероприятий в период появления заболевания гриппом и ОРН

2687. В период появления заболевания гриппом и ОРН заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями реализовать санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия по разработанным и утвержденным рекомендациям органов профилактики и противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с гриппом и ОРН в субъектах Российской Федерации.

2688. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (профилактические) мероприятия по координации действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в решении задач, поставленных по предупреждению появления и дальнейшего массового заболевания гриппом и ОРН, осуществляет создаваемыми санитарно-противоэпидемиологическими комиссиями или специальному штабам по борьбе с гриппом, при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

2689. Руководство профилактической работой в период появления гриппа и ОРН возлагается на органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственной санитарно-эпидемиологический надзор.

2690. Органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, организуют:

содержание учет и анализ заболеваемости гриппом и ОРН;

мониторинговые лабораторные исследования материалов от больных для расшифровки этиологии отдельных случаев заболевания ОРН и степени их циркуляции вокруг гриппа и ОРН.

Контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилищных и других учреждениях.

2691. Медицинскими организациями обеспечивается:

предоставление информации о лабораторных гриппом и ОРН и результатах лабораторных исследований по выявлению гриппа и идентификации возбудителей ОРН в

территориальный орган федеральной службы исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

выявление лиц с признаками гриппа и ОРВИ в лабораторных исследованиях;

забор и доставка материалов от больных гриппом и ОРВИ в лабораторию, выполняющие мониторинговые исследования по определению возбудителей вирусных инфекций; заболеваемости ОРВИ в зависимости от циркуляции вирусов гриппа;

госпитализация лиц с признаками гриппа и ОРВИ;

проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах инфекции;

подготовка кадров медицинских и других специалистов по вопросам диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.

2.6.92. В период эпидемии гриппа и ОРВИ в уполномоченных территориальных исполнительных органах для больных гриппом (с выделением в группу с острым началом, температурой, респираторной, известной лабораторно-микробиологической вирусной инфекцией в других неопределенных случаях).

2.6.93. В разветвленных сетях медицинских учреждений, имеющих режим, соответствующий режиму инфекционного стационара.

2.6.94. На основании анализа эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ, уровня регистрируемой заболеваемости и сравнения с эпидемиологическими показателями, клинический характеристиками лабораторий, данных и анализов, результатов лабораторной диагностики и мониторинговых исследований по степени за циркулирующими в эпидемиологический сезон вирусами гриппа и ОРВИ по определению (предсказанию) органов, уполномоченных осуществлять федеральной государственной санитарно-эпидемиологический надзор. На территории субъектов Российской Федерации, уполномоченных, организациях и предприятиях проводится дополнительная санитарно-противоэпидемическая (профилактическая) мероприятия по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в соответствии с возмездными мероприятиями в области Российской Федерации, муниципалитете:

приведенные графиками планов отделов группам граждан по эпидемиологическим показателям острой вирусной инфекционной профилактики с использованием лекарственных препаратов и противовирусных лекарственных препаратов, иммуномодуляторов, интерферона;

ограничение или запрещение проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий;

вызванные ограничительными мероприятиями (или запрещенными) как в целом по субъекту Российской Федерации, так и избирательно в муниципальных образованиях (городах, районах при осуществлении ограничений в целом по субъекту) при превышении порогового уровня заболеваемости гриппом среди совокупного населения более 20%;

принятые решения о приостановлении учебного процесса в образовательных, осуществляющих образовательную деятельность (дошкольное образование на территории муниципальных образований) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей;

выполнение за санитарно-гигиеническими состоянием организаций, учебных заведений, в местах скопления людей;

охрана противопандемического режима в медицинских организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учреждениях, организациях и организациях осуществляющих защиту (принадлежит территории и осмотра с целью выявления больных; выполнение за соблюдением температурного режима, раскраска текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, хранение медицинских масок и другие), в том числе прекращение доступа посетителей к больным и инфицированным, удерживание с круглосуточным пребыванием детей и подростков (дома ребенка, детские дома и другие);

репертуарные ограничения для приема больных с подозрением на заболевание гриппом в поликлиниках или переводом пациентов на амбулаторное лечение;

посильное перепрофилирование санитарно-эпидемиологических станций для госпитализации больных гриппом;

выращивание в поликлиниках дополнительного медицинского персонала из числа клинических организмов, студентов старших курсов высших медицинских учебных заведений;

материальное обеспечение деятельности для обслуживания больных на дому и доставки медицинского персонала;

использование всех кадров санитарно-эпидемиологической работы с пациентами на профилактику заболевания гриппом и оказания помощи больным.

2.9.5. Руководителям организаций и предприятий принимаются меры по защите работающих персонала от заболевания гриппом и ОРВИ, особенно в организациях с высоким риском распространения вируса (объекты торговли, сферы обслуживания, общественный транспорт).

2.9.6. Организациям обеспечивается:

проведение санитарно-эпидемиологического надзора за лицами, работающими на открытых воздухе в зимний период;

выполнения мероприятий плана по профилактике гриппа и ОРВИ.

Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в целях предупреждения возникновения и распространения острых респираторных вирусных инфекций

2697. В целях предупреждения возникновения и распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, принимаются следующие санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия:

мониторинг эпидемиологической ситуации и прогнозирования тенденций ее развития;

мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, выявляя группы заболеваемости и летальности по территориям, возрастным и социальнo-профессиональным группам населения;

мониторинг циркуляции патогенной гриппа и ОРВИ, изучение их биологических свойств;

сертификация вакцины;

оценку эффективности проводимых мероприятий;

протектирование населения эпидемиологической ситуацией.

Специфическая профилактика гриппа

2698. Специфическая профилактика гриппа осуществляется в соответствии с рекомендациями экспертной профилактической группы и инструкциями по применению импортных и отечественных препаратов. Цель вакцинации — по возможности снизить заболеваемость и смертность от гриппа и, особенно, от его осложнений, от обострения и развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний и других хронических заболеваний.

2699. В первую очередь вакцинация против гриппа и респираторных вирусных заболеваний проводится в категории высокого риска заболеть гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся:

лица старше 60 лет, прежде всего проживающие в учреждениях социального обслуживания;

лица, страдающие заболеваниями дыхательной системы (диабет), нарушениями обмена веществ (ожирение), болезнями органов кровообращения (инфаркт миокарда, болезни, в том числе болезни сердца), хроническими заболеваниями дыхательной системы (хронический бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями печени и почек.

жизни во 2-м и 3-м триместре беременности (только инвазивными методами):

лица, часто болеющие острыми респираторными заболеваниями;

дети старше 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные образовательные организации и (или) находящиеся в организациях с постоянным пребыванием (детские дома, дома ребенка);

школьники;

студенты;

медицинские работники;

работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений и другие лица с непосредственным взаимодействием коллективом.

детей, получающих психотерапию;

иные лица по решению.

2700. Определение численности контактных, подлежащих условиям изоляции при гриппе, осуществляемой индивидуально определяются, которые способствуют влиянию профилактических мероприятий и заводу на вакцину с территориальными органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2701. С учетом рекомендаций ВОЗ/Европ определены организационные меры профилактики гриппа в группах риска должны быть не менее 75%, охват профилактикой гриппа гриппа населения в целом по стране и по субъектам Российской Федерации в соответствии - не менее 45%.

2702. Для специфической профилактики гриппа вакцинируются лица, имеющие повышенные, в том числе дисбалансы, растительные, субклинические, сезонные, транзиторные нарушения иммунитета отечественного и зарубежного происхождения, зарегистрированные в Российской Федерации и привитые на территории, включая индивидуальные эпидемиологические ситуации, которые получены из организаций, связанных с ВОЗ/Европ организацией профилактики, и рекомендации Всемирной организации здравоохранения на основании анализа эпидемиологических свойств циркулирующих вирусов.

2703. Профилактические прививки проводятся лицам, не имеющим противопоказаний в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и соответствии с инструкцией по применению лекарственных препаратов.

2704. Инвазивная вакцина против гриппа может вводиться индивидуально с

другими привитыми/провакцированными, применяемыми в рамках национального календаря профилактических прививок и плана профилактики против поствакцинального заболевания.

2705. Планирование и организационное проведение профилактических прививок, учету охвата и достоверности учета прививок, а также своевременное предоставление ответа в ших и органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обязанности руководителей медицинских организаций.

2706. Вакцинация против гриппа проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2707. При проведении массовой предсезонной вакцинации против гриппа допускается применение профилактических прививок на дому прививаемым гражданам.

Неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ

2708. Для проведения неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ используются следующие иммунобиологические препараты, зарегистрированные и применяемые на территории Российской Федерации:

2709. Неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ включает:

экстренную профилактику, проводимую в течение эпидемиологического периода заболеваемости или в эпидемиологическом очаге (внутридомовая профилактика) с применением противовирусных химиопрепаратов, интерферонов и блокаторов вирусных индукторов эндогенного интерферона, обладающих непосредственной эффективностью;

сезонную профилактику, проводимую в предэпидемический период, с применением иммунокорректирующих препаратов курсом 10-14 дней;

санитарно-гигиенические и оздоровительные мероприятия.

2710. Проведение неспецифической экстренной профилактики против гриппа и ОРВИ позволяет снизить заболеваемость гриппом и ОРВИ и предупредить массовые распространения инфекции среди населения (в том числе школьников) и групп, подверженных повышенному риску заражения и развивающих в результате массовое распространение инфекции (медицинские работники, работники торговли, общественный транспорт).

2711. Сезонная профилактика гриппа и ОРВИ проводится с целью повышения сопротивляемости организма человека в респираторном периоде во время максимальной вероятности заболевания и в предэпидемический период.

2712. Пятилетняя оценка воспитания населения проводится сотрудниками медицинских организаций, специализированных органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и другие.

2713. Пятилетняя оценка воспитания населения включает в себя: предоставление населению подробной информации о гриппе и ОРВИ, основных симптомах заболевания и мерах профилактики с использованием листовок, плакатов, брошюр, слайдов, средств массовой информации, информационно-коммуникационной сети Интернет.

XXXV. Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита

2714. Корь представляет собой острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, преимущественно с воздушно-капельным путем передачи, проявляющееся в типичной манифестной форме кашлем и (или) насморком, конъюнктивитом, общей интоксикацией, поэтапным высыпанием пятнисто-папулезной сыпи и пятнистостей.

2715. Краснуха представляет собой инфекционное заболевание вирусной этиологии, преимущественно с воздушно-капельным путем передачи, проявляющееся в типичной манифестной форме пятнисто-папулезной сыпью и пятнисто-папулезной сыпью, отсутствием интоксикации, лимфаденопатией, увеличением затылочных лимфоузлов, редко - артритом.

2716. Врожденная краснуха (далее - ВКН) возникает при внутриутробном инфицировании плода вирусом краснухи, которое может приводить к выкидышу, внутриутробной смерти или рождению ребенка с синдромом врожденной краснухи.

2717. Синдром врожденной краснухи (далее - СВК) является одним из возможных путей внутриутробного заражения вирусом краснухи, occurring в третьем триместре беременности. Врожденные дефекты, ассоциированные с СВК, включают заболевания сердца, пороки слуха, снижение слуха, повышенное содержание уридина в моче.

2718. Эпидемический паротит представляет собой острую инфекционную заболевание вирусной этиологии, преимущественно с воздушно-капельным путем передачи, проявляющееся общей интоксикацией, увеличением одной или нескольких слюнных желез.

2719. В эпидемиологическом отношении выделяются случаи кори, краснухи и энцефалитического паротита:

«Полноценным» считают случай острого заболевания, при котором имелись один или несколько типичных, типопереносимых клинических признаков кори или краснухи, или эпидемиологический анамнез.

«Полузрелым» считают случай кори, краснухи или эпидемиологического паротита, диагностированный как «подозрительный» или «вероятный», после лабораторного подтверждения диагноза. Лабораторно подтвержденный случай обязательно должен отвечать критериям, определенно случая (атипичные, слабые формы).

2720. Энцефалит. Вирус кори является представителем семейства *Rubulaviridae*, рода *Orthomyx*. Внутренние частицы сферической формы имеют размер 120 - 250 нм.

Вирус краснухи относится к семейству *Toga-viridae* и является единственным представителем рода *Rubivirus*.

Как и вирус кори, вирус краснухи серологически моноспецифич и его антителоскопическое взаимодействие позволяет выделить разные генетические группы и варианты.

Вирус эпидемиологического паротита относится к шаровиковирусу (семейство *Rubulaviridae*, род *Rubulavirus*), внешне близок к вирусу краснухи. Возбудитель неустойчив во внешней среде и быстро разрушается под воздействием различных химических и физических факторов.

2721. Конечительный диагноз кори, краснухи и энцефалитического паротита устанавливается на основании клинических данных при наличии лабораторного подтверждения диагноза (обязательно для кори и краснухи и для эпидемиологической связи в других лабораторно подтвержденных случаях данного заболевания).

2722. Инкубация к кори, краснухе, эпидемиологическому паротиту формулируется после перепроверки заболевания или после проведения инкубации при вирусной инфекции. Периодом инкубации к кори, краснухе, эпидемиологическому паротиту являются продолжение и пролиферация вирусов, готовящихся к выходу (далее - *lgG*).

Выявление, учет и регистрация больных корью, краснухой и эпидемическим паротитом

2723. На период близкого корью, в том числе выявленного инкубации, или краснухой, записываются карты эпидемиологической заболеваемости и соответствуют с формами, прилагаемыми (приложения 29 и 30 к Санитарным правилам, с указанием эпидемиологического номера случая). После лабораторной верификации и установления окончательности диагноза записанные карты эпидемиологической заболеваемости случаями корь и краснухи, в том числе в случае смерти указанных лиц, вносятся в электронные и бумажные носители информации в Республиканский центр (далее - РЦ) и Национальный научно-исследовательский центр по контролю за корью и краснухой (далее - ННМЦ). Отчет о мероприятиях в случае корь направляется в адрес ННМЦ после завершения наблюдения за контактами в течение инкубационного периода от первого дня onset последнего заболевшего корью.

2724. Органы государственного федерального государственного санитарно-эпидемиологической службы в субъектах Российской Федерации, осуществляющие деятельность в РЦ и ННМЦ, отчет о заболевших корью, краснухой и эпидемическим паротитом в соответствии с предложением 3: к Санитарным правилам.

2725. Случаи корь и краснухи подлежат регистрации в электронной централизованной информационной системе инфекционных заболеваний (далее - ИИСИЗ). Наблюдатели в системе ИИСИЗ осуществляют ответственные специалисты РЦ. Контроль за ведением данных осуществляет ННМЦ.

2726. Сведения о регистрации случаев заболевания корью, краснухой и эпидемическим паротитом на основании установленных диагнозов вносятся в соответствующие формы федерального государственного статистического учета.

Лабораторная диагностика корь, краснухи и эпидемического паротита

2727. Для лабораторной диагностики корь, краснухи и эпидемического паротита применяются серологический метод. В качестве стандартного теста используются выделенные культуры М (далее - IdM) и тесты методом иммуноферментного анализа (далее - ИФА). В дополнение к обнаружению в тесте культуры М могут определяться следующие уровни специфических IdM -антител и иммунохимическим методом исследования.

2728. Для лабораторной диагностики корь, краснухи и эпидемического паротита используются тест-системы, зарегистрированные в Российской Федерации.

1729. Выявление и сортировка крови бычьего (или с лозаревном во
экспозиции) слепифическим (dM) пентетом натрия ИФА является основным для
установления [подтверждения] диагноза «бешенство», «эпидемического паротита».

1930. Исследования на корь и краснуху проводятся в энцефалогическом лабораторию РИ.

1711. При выделении C_6H_6 и выдуву жидк. у нас с диметилэф. в титриметрической установке, оборудованных в рамках активного исследования химического надзора эк. корня, диметилэф. производится одномерное исследование для выявления прои. во [20].

2732. Выход крови для исследования осуществляется на 4 - 5 календарный день с момента появления сыпи (1-я анкета) и не ранее чем через 10 - 14 календарных дней от даты начала первой пробы (2-я анкета).

2713. Парастанье нтра шиффического ализиса, отбрасывает в [gC]. n 4 и более раз при отвореженном исследовании в стандартных сероводородных тестах. Прямых связей между кривой изометрии и основными 305 построениями для анализа кривых или окраски, или для анализа парастанья.

[illegible]

1735. Вышле маларынай аздурецца мелікашкінай рабінцамі МС, а хатаруа гостяткаларымал болыуа, а сучае наблюденя ар доту медыцынакым рабінцамы МС, цолавыншыа дотакел. Оптымалышан криваы востяа крота для наблюденя япаянот 4-5 календаршыа даяа ар кун, 6-7 календаршыа даяа ар кротаеа о занысела цоветеняа етла.

2796. Клинические образцы от пациентов с подозрением на ларь и краснуху для серологических исследований доставлять в РЦ, для микробиологико-теплических исследований - в НИИМЦ.

3737. Изобретение и транспортирование кассетных или капсульных, переносных и аналогичных устройств исследования окружающей среды с документацией и данными о состоянии окружающей среды для целей исследования населения.

Мероприятия в очагах кори, краснухи и эпидемического паротита

2738. Целью проводимых противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции является его ликвидация и ликвидация.

2739. Первичные противоэпидемические мероприятия в очагах проводятся медицинскими работниками организаций, осуществляющих медицинскую деятельность в составе этих организаций, непосредственно медицинскими работниками сразу после выявления больного или при подозрении на корь, краснуху или эпидемический паротит.

2740. В официальных документах и в медицинских организациях применяются единый сборник с рекомендациями минздравнадзора субъектов, разрешающих для применения, по режиму, рекомендациями при вирусных инфекциях, с последующим демонстрационным помещением.

2741. При контакте с больным необходимо изолировать органы дыхания медицинскими масками или респиратором.

2742. При выявлении эпидемиологического очага специалисты территориальных органов, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, в течение 24 ч проводят эпидемиологическое обследование очага (очагов) инфекции: определяют границы очага (очагов) по месту проживания, работы, обучения, пребывания (при подозрении на заболевание); круг лиц, контактирующих с заболевшими, их контактный и инфекционный анамнез в последние 10 дней или ранее, тип эпидемиологического процесса, осуществляют контроль за проведением противоэпидемических и профилактических мероприятий в очагах.

2743. При выявлении очага инфекции в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных учреждениях, а также в организациях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых с момента выявления первого больного до 21 дня с момента выявления последнего заболевшего и коллектива не контактировавшего с заболевшими лицами, во всем объеме полного, краснухой, КПП эпидемиологическим паротитом не принимаются против этих инфекций или до 21 календарного дня.

2744. Источники инфекции - больные корью, краснухой, эпидемическим паротитом (или при подозрении на эти инфекции) - подлежат изоляции и лечению:

температуры в течение течения заболевания;

невозможно от формы лечения профилактика - лица из организаций с круглосуточным пребыванием детей или взрослых, лица, контактировавшие в общепитании и в общепромышленных условиях (в том числе коммунальных хозяйствах) при выявлении и лечении заболевшего лица из числа дежурных групп населения (работники

медицинских учреждений, общественного питания, торговли, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, транспорта, коммунальной и сферой. лица работников должны информированы и instructed государственных контрольных органов в случаях присутствия через государственную границу Российской Федерации) необходимо и взыскать против этих инфекций.

2745. В направлении на карантинизацию больных корью, краснухой и эпидемического паротита (или при подозрении на эти инфекции) наряду с анамнезом должны учитываться первоначальные симптомы заболевания, сведения о проведенном лечении и профилактических прививках, а также данные эпидемиологического анализа.

2746. Госпитализированные лица должны находиться в строготере по возможности в течение следующих симптомов, но не менее чем:

- 5 стандартных дней с момента появления сыпи при кори;
- 7 календарных дней с момента появления сыпи при краснухе;
- 9 календарных дней - при эпидемическом паротите.

2747. Доступ рекреационных зон, краснухи и эпидемического паротита и организованные коллективы детей в возрасте разрешается лишь в исключительных случаях даже при наличии выраженных случаев заболевания в семье.

2748. Риск от врожденной краснухи, независимо от ее клинической формы (манифестной или бессимптомной), в течение первого года жизни является исключительным инфекцией и требует на протяжении этого срока двукратному лабораторному обследованию.

2749. Оценку ВКН/СВК считают ликвидированным после получения отрицательных результатов исследования двух патологических образцов, собранных в интервале от 2 - 4 недель.

2750. За лицами, общавшимися с больными корью, краснухой или эпидемическим паротитом, устанавливается медицинское наблюдение в течение 21 дня с момента появления последнего случая заболевания в семье.

2751. В дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, а также в организациях и учреждениях, где проживают дети и взрослые организуются ежедневный осмотр контактных лиц воспитателями работниками в целях выявления заболевших и изоляции лиц с признаками заболевания.

2752. В очагах кори и эпидемического паротита проводятся групповые профилактические мероприятия против этих инфекций по эпидемиологическим показаниям.

2753. Иммунизация против кори по эпидемиологическим показаниям подлежат лица без ограничений возраста, живущие в контакте с больными (при подозрении на заболевание).

не болевшие ранее, не привитые, не имеющие сведений о прививках против ВОРВ, в течение пяти летних 6 лет, привитые против кори однократно.

2754. Иммунизация против ВОРВ по эпидемиологическим показаниям проводится в течение первых 72 ч с момента появления болезни. При расширении (внед очага кори (по месту работы, учебы, в пределах района, пятилетнего пункта) сроки иммунизации могут продлеваться до 7 календарных дней с момента выявления первого больного в очаге.

2755. Иммунизация против эпидемического паротита по эпидемиологическим показаниям проводится в течение 7 календарных дней с момента выявления первого больного в очаге. Не привитые лица не имеющие сведений о прививках против эпидемического паротита.

2756. Иммунизация против эпидемического паротита по эпидемиологическим показаниям проводится в течение 7 календарных дней с момента выявления первого больного в очаге.

2757. Детям, не привитым против кори или эпидемического паротита (не достигшим прививочного возраста или по медицинским показаниям в связи с заболеваниями или отказом от прививок) не позднее 3 календарного дня с момента контакта с больным вводятся комбинированные живых вакцин (далее - прививочный материал) в соответствии с инструкцией до его применения.

2758. Сведения о проведенных прививках в ведомств амбулатории (для названного препарата, типа серии, контрольный номер, срок годности, дата введения, предприятие-изготовитель) вносятся в учетные формы и отражаются в требованиях к организации санитарно-профилактики.

2759. Контактные лица в очагах кори, краснухи или эпидемического паротита, не привитые и не болевшие указанными инфекциями ранее, не допускаются в коллективы госпитализации в лечебные организации, неинфекционного профиля и социальные организации в течение всего периода инкубационного заболевания, указанного в Санитарных правилах.

2760. Госпитализация больных проводится в период инкубационного заболевания в лечебные организации неинфекционного профиля осуществляется по медицинским показаниям, при этом в стационаре организуется изолированное санитарно-противоэпидемическое (профилактическое) мероприятие в целях предупреждения внутрибольничного распространения инфекции.

2761. Беременные женщины, находящиеся в очагах краснухой инфекции, подлежат медицинскому наблюдению и динамическому серологическому обследованию

ва наличие IgM и IgG к вирусу краснухи в крови предупреждает развитие врожденных заболеваний новорожденных. В этих проб крови у беременных проводят двукратно со взятием крови у первого больного в семье.

2762. В случае появления у беременной количественных превышек краснухи, беременную предупреждают о наличии риска рождения ребенка с патологией плода, о чем делается запись в медицинский документ. Удостоверения подписаны врачом и беременной. После лабораторного подтверждения диагноза решение о прерывании беременности принимается самостоятельно.

2763. В случае, если при первом обследовании у беременной титры специфические IgG при отсутствии IgM к возбудителю краснушной инфекции в количественных (титрах) ≥ 4 МР-вал и выше (условно заштыки), обследование проводят через 10 - 14 календарных дней для подтверждения основных иммунологических результатов. Если при повторном исследовании выявлены специфические IgG и не обнаружены IgM к вирусу краснухи, то риск СВК исключается, и дальнейшее медицинское наблюдение за беременной женщиной по контакту в связи с возможной инфекцией не проводят.

2764. В случае, если выявлены IgG и IgM не обнаружены, беременной исключают контакты с больным краснухой и повторно обследуют через 10 - 14 календарных дней.

2765. При отрицательном результате повторного исследования, через 10 - 14 дней проводят следующее (третье) серологическое обследование. В течение всего срока обследования за беременной продолжают медицинское наблюдение. Если при третьем обследовании титры не выявлены, то наблюдение за беременной прекращают, но предупреждают ее о том, что она все еще имеет (серонегативна) к краснушной инфекции. Присланы письма краснухи таким женщинам приходят после получения первого анализа.

2766. Если при повторном обследовании выявлены специфические IgM-антитела, при отсутствии титра IgG, то через 10 - 14 календарных дней проводят следующее (третье) серологическое обследование, продолжая медицинское наблюдение и беременной. При наличии IgG- и IgM-антител женщине предупреждают о риске СВК, о чем делается запись в медицинский документ. Удостоверения подписаны врачом и беременной. Решение о прерывании беременности женщина принимает самостоятельно.

2767. Если при первом обследовании в крови у беременной обнаружены специфические IgM- и IgG-антитела к возбудителю краснушной инфекции, беременную предупреждают о наличии риска рождения ребенка с патологией плода, о чем делается запись в

медицинской документации, удовлетворяемая женщинами в беременность. Через 10 - 14 календарных дней после первого обследования проводится повторное серологическое обследование с определением антител IgG-титера. При многократном явлении (квалифицируемые IgM-титера к вирусу краснухи в венозной плазме антитела IgG) решение о прекращении беременности женщины принимается индивидуально.

Специфическая профилактика кори, краснухи и эндемического паротита

2768. Основными источниками инфекции являются: корь, краснуха и эндемического паротита являются вакцинопрофилактика.

2769. Иммунизация населения против кори, краснухи и эндемического паротита проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок и Единого профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.

2770. Детям и взрослым, поступающим в учреждения в рамках Национального календаря профилактических прививок, в которых в стандартных серологических тестах во всех случаях выявлены к соответствующему возбудителю, приняты против кори, краснухи и (или) эндемического паротита проводят дополнительно к соответствию в соответствии со применением вакцинобиологических лекарственных препаратов (далее - ВБП).

2771. Для иммунизации населения ВБП, зарегистрированные и разрешенные к применению на территории Российской Федерации согласно инструкциям по их применению.

2772. В целях максимального охвата прививками против кори, краснухи, эндемического паротита населения в субъектах Российской Федерации проводятся работы по выявлению лиц, не болевших и не привитых против этих инфекций среди трудоспособного населения (мигрантов, беженцев, вынужденных переселенцев, выходящих групп населения) и их иммунизация в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

2773. Для обеспечения иммунизационного потенциала в кори, краснухе, эндемическому паротиту, достаточного для предотвращения распространения инфекции среди населения, охват прививками населения на территории муниципального образования должен составлять:

- вакцинацией и ревакцинацией против кори, краснухи, эндемического паротита детей в соответствующих возрастах - не менее 95 %;
- вакцинацией против краснухи женщин в возрасте 18 - 35 лет - не менее 90 %;
- вакцинацией против кори взрослых в возрасте 18 - 35 лет - не менее 90 %;

- падающей группа детей декретированных профессий 18-55 лет – не менее 90%;

2774. Сведения о выполненных профилактических мероприятиях выносятся в учетные мероприятия документы, на основании которых формируются формы федерального государственного надзора: форма № 5 «Сведения о профилактических мероприятиях» (ежемесячно, поквартально) и форма № 6 «Сведения о состоянии детей, подростков и взрослых, занятых при выполнении профилактических мероприятий» (ежегодно).

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения распространения кори, краснухи и эпидемического паротита

2775. В целях предупреждения возникновения и распространения кори, краснухи и эпидемического паротита органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводятся следующие санитарно-эпидемиологические (эпидемиологические) мероприятия:

оценка эпидемиологической ситуации и принятие мер по ее устранению;

поиск возможных случаев кори среди пациентов с характерной и патогномной симптоматикой с целью выявления и лечения;

продвижение информации о возможности заражения у привитых лиц;

информация населения по результатам серологического мониторинга по циркуляции кори, краснухи и эпидемического паротита;

оценка эффективности проводимых мероприятий.

Реализация мероприятий по ликвидации эпидемической кори, краснухи в Российской Федерации

2776. В субъектах Российской Федерации разрабатывается и утверждается План мероприятий по ликвидации эпидемической кори, краснухи (далее – План) с учетом конкретных местных условий, эпидемиологической ситуации.

2777. Реализацию мероприятий Плана в субъектах Российской Федерации осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны здоровья граждан, медицинские организации, органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2778. В период реализации мероприятий по ликвидации кори и краснухи в субъектах Российской Федерации готовятся и представляются ежегодно доклады о статусе ликвидации кори и краснухи в субъектах Российской Федерации (по

подтверждает статус субъекта Российской Федерации как территории, свободной от эпидемической кори и краснухи).

2779. В рамках реализации Плана ежегодно организуются подотчетные международным работникам по вопросам диагностики, эпидемиологии и профилактики кори, краснухи, эпидемического паротита и также сывороточные производственные исследования, включающие проведение для населения подробной информации о поли. краснухе, эпидемическом паротите, основных клинических симптомах данных заболеваний в мерит профилактики с использованием средств массовой информации, листовок, плакатов, брошюр, аудиовизуальных средств в видеопленках и слайдах, указывают на профилактику заболеваний и другие методы.

XXXVI. Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая

2788. Ветряная оспа (код В 01 по международный классификации заболеваний в проблем. связанных со здоровьем (МКБ-10) представляет собой острое вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся выраженным зудом и сыпью, отеком и язва полиморфной макуло-папуло-везикулезной сыпи, умеренно выраженной лихорадкой и симптомами общей интоксикации, преимущественно доброкачественным течением. Заболевание типично (код В 01 по МКБ-10) развивается у 10-20% населения, реже передается вертикально от матери; представляет собой заболевание, вызываемое в результате заражения в организм возбудителем ветряной оспы, проявляющееся восстановлением защитных барьеров кожного покрова и слизистых оболочек, а также лихорадкой, общей интоксикацией и локализованной сыпью по ходу нервов, возникающее в процессе чувствительных вирус.

2789. Возбудитель ветряной оспы, опоясывающего лишая - вирус Варичелла Зостер (*Varicella Zoster virus*) (далее - ВЗВ), вирус герпеса человека третьего типа (*Human herpesvirus 3*), устойчивый во внешней среде (выживает через несколько месяцев, но активно погибает при низких температурах (ниже 65 °C и выше).

2790. Резервуаром и источником ВЗВ при ветряной оспе и опоясывающем лишае является человек. Больной ветряной оспой или опоясывающим лишаем. Исход, в течение которого источник ВЗВ (больной ветряной оспой или опоясывающим лишаем) может заразить окружающих его лиц, длится с момента появления сыпи до появления 5-дневных ЛЗВ с момента появления последних элементов сыпи (макула).

2791. Индекс заразности (заразительности) составляет в среднем 0,75-0,90.

2792. Инкубационный период при ветряной оспе составляет от 10 до 21 календарного дня (в среднем 13-17 календарных дней).

2793. Механизм передачи ВЗВ, преимущественно контактно-бытовой (аэро-капельный), реализуется воздушно-капельным и контактно-путьми. Возможны трансмиссивная передача ВЗВ - от больной матери к плоду.

2794. При ороговении пятые палец может переноситься (отрывать) в возрасте 3-4 лет.

2795. Распространенность болезни имеет повсеместный характер.

2796. Ветряная оспа проявляется опоясывающей, генерализованной и стертой клинической формами, но может протекать в атипичной (висцеральной) форме, в таком случае диагноз устанавливается по результатам лабораторных исследований.

2797. Беременные относятся к группе риска развития заболеваний, связанных с ВЗВ. Случаи заболевания ветряной оспой в период беременности до 11 недель беременности для жизни плода считаются врожденной инфекцией.

2798. К врожденным формам ветряной оспы относятся синдром врожденной ветряной оспы (данкс - СВВО) и неонатальная (приобретенная) ветряная оспа.

2799. Неонатальная (приобретенная) ветряная оспа развивается при инфицировании беременной женщины менее чем за 10 недельными днями до родов. Тяжесть течения врожденной (приобретенной) ветряной оспы определяется сроком инфицирования.

2800. В случае заболевания беременной ветряной оспой 5-10 недельных дней до родов, первые клинические проявления у новорожденного появляются сразу после рождения.

2801. Новорожденный, заболевший ветряной оспой, развившейся в результате заболевания беременной за 16 и менее дней до родов является источником ВЗВ.

2802. Новорожденный ребенок с СВВО не является источником врожденной ветряной оспы.

2803. При заболевании беременной ветряной оспой клиническим признаком, врожденной формы инфекции, вызванной ВЗВ, не возникает из-за отсутствия вируса в материнском молоке специфических антител к вирусу ВЗВ (далее - IgG), защищающих плод.

2804. Бóльшой отягчающим фактором является наличие у ребенка ВЗВ и представляет эпидемиологическую опасность, а отягчающим фактором является также же профилактические и противоэпидемиологические мероприятия, как и в отношении больного ветряной оспой.

2805. Имунитет к ветряной оспе формируется после перенесенного заболевания или после введения антител при профилактике этой инфекции. Показателем наличия

титруетата к ИЭВ является присутствием в крови специфических IgG и иммуноглобулинов значимым (значимым) титром.

Примечание. учет и рассмотрение болевых реакций острой и хронической лихорадки

2806. Состояние о ретирации случаев острой лихорадки и охронической лихорадки из охронической лихорадки является в форме фетеральной государственного статистического наблюдения

Лабораторная диагностика острой лихорадки и охронической лихорадки

2807. Лабораторные методы исследования в инфекционных заболеваниях используются для диагностики острых и хронических форм заболевания, для установления дифференциальной диагностики с другими заболеваниями, сопровождающимися лихорадочной сыпью (в том числе инфекцией, вызванной вирусом простого герпеса, шигеллой, энтеровирусной инфекцией, стрептококком, вызывающим для лихорадки остротипическую сыпь)

2808. Препаратами для лабораторного исследования являются: выделенные ИЭВ, также выделенные

выделенные на лихорадку остротипическую и хроническую лихорадку

подозреваемых и острых заболеваний острой лихорадкой.

2809. Материалом для лабораторного исследования, в зависимости от клинических признаков и локализации инфекции могут служить:

- содержимое везикул;
- сыворотка крови;
- спинномозговая жидкость;
- содержимое проглатываемых.

2810. Выбор лабораторного метода исследования определяется его специфичностью и возможностями конкретной лаборатории.

2811. Лабораторные критерии, подтверждающие клинический диагноз случая острой лихорадки, являются:

наличие ДНК ИЭВ с помощью полимеразной реакции (ПЦР) в клиническом материале (содержимом везикул, сыворотке со специфической гиперлихорадкой, спинномозговой жидкостью);

выявление титруемой острой лихорадки (даже - IgM) или выделенных IgG к ИЭВ в сыворотке крови;

экономический статус с другими лабораторно подтвержденными случаями данного заболевания.

2816. Внутритрудовое инфляционное давление ВЗВ в течение первых 20 недель беременности может приводить к самопроизвольному аборту, внутритрудовой смерти плода или рождению ребенка с СВВО.

2817. В случае вынужденного прекращения РЭВ в первом триместре беременности (на 13-20 неделе), может развиться синдром врожденной ветряной оспы (далее - СВВО), который характеризуется широким размахом поражений (вторичные, деформации), возможны мочев (микроцефалия, трицепфалия, лордозная атрофия, диффузный или пятнистый сыпью) и органов зрения (катаракт).

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний, вызванных СЭВ.

2018. В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний, вызываемых ВЗВ орнитов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводится следующая санитарно-противоэпидемиологическая (профилактическая) деятельность:

определены на основании результатов статистического анализа данных за рассматриваемый период.

НАЧАЛЬНИК ЭЛЕКТРОЛОТНОВОСКОГО СЛУЖБЫ

пятилет структуры энкодерности,

приведены в скобках названия и количество выданных упрощений.

Полученные данные свидетельствуют о результатах освоения нового технологического процесса в области производства, при этом достигнуты следующие результаты:

сложилось из циркулярной асимметрии, это фактически и генерализованные колебания.

контроль за организацией и проведением профилактических прививок;

опекає спокійності й ефективності проханнях профілактичних й
припинення діяльності черпаються;

2819. В территориальных органах (учреждениях) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, имеются данные о зарегистрированных случаях вирусной гепатит и спаяивающего гепатита в течение отчетного периода в рамках эпидемиологического надзора за инфекцией, вызванной ВЗН. с целью составления эпидемиологического профиля и повышения эффективности профилактических и противоэпидемиологических мероприятий

2820. Специальный отряды и учреждения, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводят эпидемиологическое расследование очагов инфекции, вызванной ВЭБ.

в медицинских учреждениях, создающих медицинскую помощь по профилю «онкогематология» при регистрации каждого случая;

в группах и кружках с постоянным пребыванием детей при регистрации очагов в групповой заболеваемости (два и более случаев);

в одной группе или классе организации, осуществляющей образовательную деятельность, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – при регистрации групповой заболеваемости (два и более случаев);

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – при регистрации пяти и более случаев.

По результатам эпидемиологического расследования выдается предписание о проведении санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий².

Профилактические мероприятия

2821. Основным профилактическим мероприятием, направленным на защиту населения от ветряной оспы, является вакцинопрофилактика, которая обеспечивает снижение заболеваемости (исхожденности) с этой инфекцией.

2822. Иммунизация населения против ветряной оспы проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, а также в рамках рекомендованных календарей профилактических прививок.

2823. Вакцинация против ветряной оспы в плановом порядке в первую очередь проводится ранее не болевшим. Во вторую очередь на вакцинозащитенного курса иммунизации (привитым однократно) против ветряной оспы детям и взрослым, относящимся к группе высокого риска тяжелого течения и летального исхода инфекции:

лицами, страдающими тяжелыми хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, иммунодефицитами, эндокринными расстройствами, нервными заболеваниями, расстройствами иммунорегуляции;

больными ветряной оспы;

лицами, находящимся в контакте с больными.

² Статьи 44 и 50 Федерального закона от 30.03.2003 № 32-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

течении 24 часов после выявления больного ветряной оспой. отсыпавшимся препарат (при подозрении на ветряную оспу, осложняющийся лишаём), или получать экстренного лечения в таких случаях.

2839. Изотация больного ветряной оспой или осложняющимся лишаём завершается по истечении 5 календарных дней со времени появления последнего сыпного элемента сыпи.

2830. Больные с легким течением заболевания госпитализируются в дом при наличии возможности соблюдения противоэпидемиологического режима по месту жительства. Госпитализация в инфекционные отделения, оказывающие медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями и связанными рисками, осуществляется по эпидемиологическим (тяжелые и среднетяжелые формы заболевания) и эпидемиологическим показаниям.

2831. Эпидемиологическими показателями для госпитализации являются: невозможность обеспечения изоляции по дому и организации эпидемиологического режима: выделение больного в учреждениях и помещениях (внутренних) пребывания детей и взрослых (в том числе в медицинских учреждениях): выделение больного, проживающего в общежитии; выделение больного, проживающего в общежитии; выделение больного, проживающего в общежитии.

2832. В направлениях на госпитализацию больных ветряной оспой (или лиц с подозрением на это заболевание) обязательно указывается эпидемиологическая ситуация, связанная с профилактическими мероприятиями и прошедшим течением, а также сведения о контактах больного с больными ветряной оспой или отсыпавшимся лишаём.

2833. В направлениях на госпитализацию больных осложняющимся лишаём (или лиц с подозрением на это заболевание) кроме анализа данных указываются первоначальные сведения, связанные с заболеванием ветряной оспой или осложняющимся лишаём, и профилактические мероприятия против ветряной оспы, а также о профилактике лишаёв.

2834. Выписка из стационара пациента с ветряной оспой или осложняющимся лишаём проводится после его клинического выздоровления. В случае выписки пациента ранее времени для его завершения выделения сыпного элемента сыпи. Он находится на дому при соблюдении противоэпидемиологического режима по месту жительства. В случае госпитализации по эпидемиологическим показаниям, эпидемиологическое обследование (расследование) проводится по ранее составленному плану обследования больного сыпью.

2835. Цепочка реконвалесцентов ветряной оспы для опьясывающего лица в возрасте 14 лет не является причиной его дальнейшего опьясывания. Он не ранее шестого дня со времени появления у реконвалесцента последних признаков заболевания считался полностью выздоравливающим и не являлся источником ветряной оспы в семье.

2836. Другая реконвалесцентов и коллектив разрешается только при наличии справки об отсутствии медицинских противопоказаний для посещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работу организаций и осуществляющих образовательную деятельность лиц учеными² от лечащего врача или фельдшера.

2837. Длительное наблюдение за реконвалесцентами ветряной оспы лицами не проводится.

2838. Основными причинами возникновения осложнений мероприятий по отношению лиц, контактировавших с больными инфекцией, вызванной ВЗВ, являются:

неадекватное лечение больных инфекцией, вызванной ВЗВ, в том числе случаев заболеваний, подозреваемых на эту инфекцию;

вызывание лиц, не защищенных (только больными и не принявшими) против ветряной оспы. Для проведения мероприятий профилактики.

2839. К категории контактных лиц относятся:

лица, общавшиеся с больными ветряной оспой в течение двух дней до появления у больного сыпи, в период инкубации, в течение пяти дней после появления последнего элемента сыпи;

лица, общавшиеся с больными опоясывающим лишаем с момента появления у него сыпи и в период появления (или исчезновения пяти дней после появления последнего элемента сыпи).

2840. При наличии среди контактных лиц, не болевших ветряной оспой, не принявших и (или) не получивших завершающий курс вакцинации против ветряной оспы, в семье устанавливается медицинское наблюдение сроком на 21 календарный день с момента выявления последнего заболевшего из числа ВЗВ инфекция.

2841. Медицинское наблюдение за детьми и взрослыми, переболевшими ветряной оспой, в течение получившим завершающий курс вакцинации против ветряной оспы (при наличии документального подтверждения), не проводится.

2842. В качестве мер профилактики ветряной оспы в отношении лиц, не болевших ветряной оспой и не принимавших против нее, контактировавших с больными

² Приказ Министерства Роспотребнадзора от 02.03.2012 № 44/н-СЗВ утверждена Письма изданы медицинскими организациями страны в соответствии с требованиями (зарегистрирован Министерством Роспотребнадзора от 02.03.2012, регистрационный № 24366)

ветряной оспой или опоясывающим лишаем, использовал ветряную вакцину (вакцинация).

2843. Активная вакцинация (вакцинация) против ветряной оспы проводилась детям (в возрасте от 12 месяцев) и взрослым, не имеющим медицинских противопоказаний к вакцинации, в первые 72 - 96 часов после перенесенной инфекции с большим ветряной оспой или опоясывающим лишаем.

2844. Профилактические приемы несовершеннолетних, не достигших возраста 15 лет²⁴, проводят с согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетних. Отказе или отказ от проведения вакцинопрофилактики оформляется в соответствии с нормативами правового акта. Приемки лицам, контактировавшим с больными ветряной оспой или опоясывающим лишаем, регистрируются в соответствии с документами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2845. При регистрации случаев первичных ветряной оспой в квартирных условиях врач (фельдшер):

осуществляет оценку общего состояния контактных лиц - фемитр тела, конъюнктив склеры (для выявления эритематозных высыпаний), измерение температуры тела - в момент выявления среди них больных; осуществляет сбор эпидемиологического анамнеза и переболевшем ранее первичными ветряной оспой или опоясывающим лишаем (дети ранее перенесшего заболевание), а также контактных заболеваний по месту работы, по месту учебы;

дает рекомендации по организации проведения профилактических мероприятий в течение всего времени болезни пациента в доме (регулярное проветривание, влажная уборка с моющими средствами помещений, мытье, купание);

информирует дошкольные образовательные организации о контактных лицах в возрасте до 7 лет, имеющих дошкольные образовательные организации, во ветряной оспой, не привитых и (или) не получивших завершающий курс вакцинации против ветряной оспы, с целью их разобщения в течение 21 календарного дня с момента последнего общения с заболевшим ветряной оспой; при этом если дата контакта с ним установлен точно, дети до 7 лет диспансеруются в дошкольные образовательные организации в течение 10 календарных дней от даты контакта с 1 по 21 календарный

²⁴ Пункт 9 статьи 11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ: принята Минздравом России от 21.03.2014 № 127а «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», зарегистрирован Минздравом России от 25.04.2014, регистрационный № 121151 с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 16.06.2016 № 170н (зарегистрирован Минздравом России от 01.07.2016, регистрационный № 03728), от 13.04.2017 № 175н (зарегистрирован Минздравом России 17.05.2017, регистрационный № 07451).

дети обеспечивают их жилищи, должн в соответствии с законодательства Российской Федерации: дети в возрасте старше 7 лет и лица, ранее переболевшие ветряной оспой, разншннно не подлежат.

2846. Непосредственно из дому на контактных лиц или членов семьи, не посещавших дошкольные образовательные организации, осуществляется медицинская персоналом или родителями (опекунами), который врач (фельдшер) информирует о признаках заболевания ветряной оспой и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при их появлении.

2847. Взрослым из числа контактных лиц врач (фельдшер) информирует о признаках заболевания ветряной оспой и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при их появлении.

2848. При регистрации очагов инфекции в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в организациях с круглосуточным пребыванием детей, в том числе медицинских организациях неинфекционного профиля, медицинский персонал (врач, фельдшер, медицинская сестра) с целью активного выявления больных ежедневно проводит осмотр детей, контактировавших с заболевшим ветряной оспой, результаты осмотра фиксирует в медицинской документации. Осмотр включает оценку общего состояния, осмотр кожных покровов, измерение температуры тела.

2849. В очагах инфекции с четким случаем 2 и более в одном коллективе проводится специально оборудованной общедоступной контактных лиц для выявления и изоляции лиц, а также выявления и устранения фактов инфекции.

2850. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в организациях с круглосуточным пребыванием детей в возрасте до 7 лет, в том числе медицинских организациях неинфекционного профиля, на протяжении 21 календарного дня с момента изоляции заболевшего с диагнозом ветряной оспы или ветряночной и персонал организуются и принимают режимно-отражательные и дезинфекционные мероприятия.

прекращается прием новых и временно отсутствовавших детей, не болевших ветряной оспой и не принимавших участие в инкубации в группу (коллектив), для исключения случаев заболевания ветряной оспой.

запрещается участие в массовых мероприятиях детей из группы (коллектива), в котором выявлены случаи заболевания, а также перевод детей такой группы в другие группы (коллективы);

2851. дважды в день организуется и проводится влажная уборка помещений с применением моющих и (или) дезинфицирующих средств из списка рекомендуемых

мелкие втулки, шпунтики из других материалов изготавливать и носить ДНК можно с торчатой кромкой с минимальным сроком носки. Дезинфекция втулочной среды с использованием ультрафиолетового облучения или других способов, разрешенных для этих целей, не менее четырех раз в день проводится непрерывно (по 8-10 минут).

2852. Госпитализация в местный стационар инфекционного профиля для контактировавших с заболевшим инфекцией, вызванной ВЭВ, на фоне высокой активности и ее признаков против нее, в период медицинского наблюдения за ними, осуществляется по медицинским показаниям в специально созданную палату для пациентов, при этом в стационаре в целях предупреждения распространения инфекции организуются дополнительные санитарно-гигиенические (профилактические) мероприятия в соответствии с пунктом 2866 Санитарных правил, регламентирующих в типовом порядке осуществляется до окончания периода медицинского наблюдения.

2853. В целях предупреждения заражения восточной оспы в медицинском учреждении инфекционного профиля, осуществляющие медицинскую помощь детскому населению в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, в организации иных дел и их оздоровления детей, других организаций с многочисленным пребыванием детей, в документах на типовую госпитализацию или иных сопроводительных документах следует указывать сведения об имеющейся у обследуемого ребенка прививках против ветряной оспы, а при ее отсутствии ранее заболел ли ветряной оспой, о контакте с больным ветряной оспой или оспой человека.

2854. Для предупреждения передачи заболевания у контактировавших, в отношении беременных женщин, имеющих контакт с заболевшим инфекцией, вызванной ВЭВ, медицинской организацией организуются следующие профилактические мероприятия:

при отсутствии у беременной женщины, контактировавшей с больным ветряной оспой или оспой человека, признаков заболевания, исключают контакт этой женщины, при наличии медицинского наблюдения и серологическому обследованию (первое обследование) по показаниям индивидуальным;

если при первом обследовании выявлены IgG и IgM к вирусу ветряной оспы не обнаружены, беременной женщине необходимо ввести вакцинообразующий в период 10-14 календарных дней после начала заболевания или IgM (второе обследование) к ВЭВ для исключения факта инфицирования;

2. Приказ Минздрава России от 31.01.2012 № 50н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи беременным, женщинам и новорожденным, контактировавшим с больными восточной оспой» (зарегистрирован Минздравом России 04.04.2012, регистрационный № 237261).

при отрицательном результате второго исследования на IgM к ВЗВ через 10-14 календарных дней проводится статистическое серологическое обследование (третье исследование). Если при третьем исследовании IgM не выявлены, то наблюдение прекращается, но женщина предупреждается о том, что она восприимчива (серонегативна) к ветряной оспе. Препятств против ветряной оспы (вакцинация) проводятся по эпидемиологическим показаниям и окончанием срока для вакцинации.

Если при первом исследовании у беременной женщины выявлены специфические IgG при отсутствии IgM к возбудителю ветряной оспы, обследование прекращают через 10-14 календарных дней для исключения возможных ложноположительных результатов. Если при втором исследовании также выявлены специфические IgG, а не обнаружены IgM к вирусу ветряной оспы, то риск развития осложнений при ветряной оспе у плода исключается, дальнейшее наблюдение за беременной пациенткой по желанию в случае ветряной оспы не проводят.

Если при втором исследовании выявлены антитела IgM антигена, то через 10-14 календарных дней проводят третье исследование, продолжая медицинское наблюдение за беременной. При выявлении IgG и IgM антител женщина предупреждается о риске развития у плода СВВО, о чем делается запись в акушерской документации, удовлетворяет показаниям врача и беременной. При отрицательном результате второго исследования 30-дневной проводят динамическое наблюдение вплоть до родов²⁰;

если при первом исследовании в крови у беременной обнаружены специфические IgM и IgG антитела к возбудителю ветряной оспы, беременную предупреждают о наличии риска врожденной патологии плода, о чем делается запись в акушерской документации. Через 10-14 календарных дней второе исследование проводят второе исследование с определением антител IgG антигена. При лабораторном подтверждении наличия специфических IgM антител к вирусу ветряной оспы в венозной крови антитела IgG женщина предупреждается о высоком риске врожденной патологии плода. При сохранении беременности по желанию проводят динамическое наблюдение вплоть до родов.

2855. При выявлении случаев заболевания, вызванного ВЗВ у пациентки акушерской патологии, оказывающей медицинскую помощь женщинам в период

²⁰ Приказ Минздрава России от 01.11.2012 № 912н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» (зарегистрировано Минздравом России 02.04.2013, регистрационный № 27960), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 17.01.2014 № 26н (зарегистрировано Минздравом России 19.03.2014, регистрационный № 11644), от 11.06.2015 № 235н (зарегистрировано Минздравом России 10.07.2015, регистрационный № 27983); от 12.01.2016 № 6н (зарегистрировано Минздравом России 10.03.2016, регистрационный № 41611).

переносимости, родам и в послеродовом периоде по принципу «защитного и планового» и стандартных условий (в родильном отделении учреждения), эпидемиологическая характеристика организации организует и проводит профилактические и противоэпидемиологические мероприятия в семье, в том числе:

организует лечение заболевшей в соответствии с законодательством Российской Федерации, ее дальнейшее лечение (в зависимости от тяжести состояния женщины в сроки беременности) в условиях инфекционного отделения многопрофильной больницы или инфекционной больницы (в форме стационара другого профиля) или амбулатории: в случае вступления женщины в роды, она рождается в родовой бокс;

организует и проводит санитарное медицинское наблюдение за беременной и медицинским персоналом, контактирующим с контактом с заболевшей (в стационаре, в которых заболевшая находилась или посещала в течение двух дней до появления клинических симптомов заболевания материнской инфекцией и с момента заболевания) – в течение 21 календарного дня с момента ее появления (термометрия 2 раза в день, оценка кожных покровов);

проводит экстренную вакцинацию против ветряной оспы в течение 72-96 часов с момента контакта медицинского персонала (не беременная или не имеющая контактов с беременными женщинами с ветряной оспой, контактировавшая продолжительное время с беременной, имеющая контакт с матерью оспой; медицинский персонал, не имеющий защитного уровня иммунитета к ветряной оспе и не получивший экстренную вакцинацию, исключается от работы с 11 до 21 календарный день от начала контакта с заболевшей;

организует санитарно-эпидемиологическое обследование на предметности иммунитета к ветряной оспе персонала с соответствующим применением вакцин и не болевших ветряной оспой; беременная, не имеющая защитного уровня иммунитета к ветряной оспе, исключается на период с 11 до 21 день от начала контакта с заболевшей в зависимости от клинического состояния и пребывания в отделении медицинской помощи таких беременных пациенток и маршрута их движения, либо размещают в боксах или изолированных палатах;

организует экстренную профилактику ветряной оспы в соответствии с пунктом 2845 Санитарных правил организации с заболевшей, в том числе экстренную профилактику ветряной оспой родильницы.

2850 Для заболевших беременной матери требуется наблюдение не противопоставлено при условии соблюдения правил общей гигиены, то исключаются случаи, когда заболевание у матери проявляется в течение пяти дней до или через два дня после родов. В таком случае ребенок изолируется от матери в бокс до окончания у нее

заразного периода (летальная коррозия). На период купирования коррозийных процессов допускается осуществлять санационные процедуры только.

2857. При заражении в другие отделы и выписке из больницы, бывших в контакте с больной острой формой (инфекцией, вызванной НЗВ), отследить динамику заболевания и обеспечить запись о развитии контакта и сроках наблюдения и медицинском документировании (при выписке из больницы периода наблюдения выписки и контакте по ДЗВ - выписка в стационаре переводится в медицинскую организацию по месту жительства).

2858. Администрация медицинской организации обеспечивает передачу новых данных в отделение в течение 21 календарного дня с момента получения информации при наличии у них данных о эпидемиологическом уровне заболеваемости в регионе или документально подтвержденных случаев и первоначальном этапе лабораторной диагностики острой формы для дальнейшего курса наблюдения против острой формы.

2859. При выявлении случаев острой формы, охватывающих лиц в стационаре, учреждении стационарного социального обслуживания для взрослых и других медицинских организаций, организация организует и проводит профилактические и противоэпидемиологические мероприятия, в том числе:

2860. организует выявление и дальнейшее лечение заболевших в соответствии с законодательством Российской Федерации (в зависимости от клинического состояния) и условий эффективности лечения (в форме или стационарной формы стационара другого профиля); или направляет на амбулаторное лечение;

2861. организует и проводит ежедневное медицинское наблюдение за пациентами в медицинском стационаре, медицинскими и стационарами с заболеваниями (заболевания, в которых заболевший находится или находился в течение двух дней до появления клинических симптомов заболевания острой формой и с момента заболевания) - в течение 21 календарного дня с момента появления первых симптомов заболевания (в том числе симптомов);

2862. организует среди пациентов, контактировавших с заболевшими, в том числе медицинского персонала отделений, в которых находились заболевшие, медицинское наблюдение, в том числе наблюдение за лицами (инфекцией, вызванной НЗВ), по признакам или клиническим проявлениям (открытым лицам ДЗВ) против острой формы; при необходимости организует серологическое обследование на выявление антител к острой форме. организует экстренную профилактику в соответствии с соответствием с пунктом 2845 Санитарных правил;

2863. Контактных лиц, вошедших в контакт с больным (инфекцией, патогеной ВЭБ), не принимая (применяя нестерильный турбозаминатор) против ветряной оспы, но имеящий защитный уровень иммунитета к ветряной оспе и не получивших экстренную вакцинацию, не являясь переносом - отстраняет от работы с 11 по 21 календарный день от начала контакта с заболевшим; из числа лиц, являясь - возвращает на работу с 11 по 21 календарный день от начала контакта с заболевшим.

2864. При переводе в другие отделения и смены лиц, бывших в контакте с больным ветряной оспой (инфекцией, возбудителем ВЭБ), обеспечивается наличие и наличие контакта в сроки выписки и медицинский документация (при выписке до окончания периода заболевания информация о контакте по инфекции, вызванной ВЭБ, в стационаре передается и медицинскому персоналу по месту назначения):

2865. среди новых лиц, являясь (обязательно) в отделение (группу) в течение 21 календарного дня с момента изоляции заболевшего (или до завершения проведенных противоэпидемиологических мероприятий) в плановом порядке осуществляется только при наличии у этих лиц данных о защитном уровне иммунитета к ветряной оспе или документально подтвержденных сведений о перенесенном ранее заболевании ветряной оспой или завершении курса вакцинации (при наличии двух прививок) против ветряной оспы.

2866. Мероприятия по прерыванию цепи передачи возбудителя:

в очагах инфекции, патогеной ВЭБ, обязательная дезинфекция по инструкции;

в помещениях, в которых находится больной, необходимо дважды в день проводить влажную уборку с применением моющих и (или) дезинфицирующих средств и проветривание (по 8-10 минут не менее четырех раз в день);

больным и лицам, осуществляющим уход за ним, необходимо соблюдать строгий личный гигиенический режим, после контактов с больным тщательно мыть руки.

XXXII. Профилактика кори

2870. Корь представляет собой острую инфекционную заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, характерным фебрильным приступообразным течением и типичным длительным течением.

2871. Заболевание вызывается 3 вида возбудителей *Measles virus*, *Parvovirus* и *Human coronavirus* (группа патогенности П).

2872. Источниками инфекции являются больные (дети и взрослые) типичными и атипичными формами болезни, а также вирусы в биологических жидкостях.

2874 Передача возбудителя инфекции осуществляется воздушно-кашлевым путем посредством кашля слизью, выходящей бланком во время укачивания малыша. Наиболее частые переносчики возбудителя присутствуют при кашле. Риск инфицирования окружающих особенно велик в течение спазматического периода, затем постепенно снижается и уменьшается к 25-му часу болезни, когда становятся нехарактерны. У взрослых в период кашля может протекать атипично без приступообразного течения.

1975. Излучающий период вольфрамового 7-го 21-кратного дня.

2876. Лайофотипирование подъярженным считается случай некачества при
перешивки купюры, возбуждаемая при бистроветическом несподиваяти или ЛПС
возбуждаемая при волекупяро-сваветическом несподиваяти,
являющаяся спецификацией эвенту при эрмольфическом несподиваяти в
кличутофорементном шпаше (НФА).

2877. Все случаи быстроразвивающегося туберкулеза легкого считали подтвержденными на основании результатов выделения культуры для ДНК возбудителя.

2878. Иммунитет к токсемии формируется после перенесенной эболевания или заражения. Показателем наличия иммунитета к токсемии является присутствие в крови специфических антителoglobulинов (антител) класса G.

Выявлено, что нетрадиционные методы обучения способствуют развитию познавательных способностей учащихся.

2879. Общие указания по ведению учета и регистрации больных инфекционными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, возбудителей инфекционных болезней представлены в главе 13 настоящего Санитарных правил.

2690. Сведения о регистрации случаев заболевания из официальной документации дублируются в формы федерального государственного статистического наблюдения.

Лабораторная длина остия колючки

2931. Анализ метода лабораториялық даярталатын қолшоңым шартымендегі ерекше
пайдалану.

2883. Та часть раннего тувалентия киктрота' медитниские таблички изобретены

2883. выжлого ребенка, находящегося в течение 7 часов жаряток: дней в бодре. - из двукратной баллоноплинчатости (для кислородных для контроля температуры через отек кислородный доты или опускание молекулярно-теплического испарения и также устанавливаются из пяти медицинских наблюдений;

каждому взрослому при подозрении на холеру и (или) при наличии контакта с больным холерой, работавшего в различных домах, детских больницах, изыскательских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их оздоровления, организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - во всеохватное бактериологическое (для кашеобразных масс стула или через один или два дня) или селективное молекулярно-генетическое исследование.

2884. При отрицательном результате бактериологического и (или) молекулярно-генетического исследования материала из больницы, начиная с третьей недели заболевания, необходимо провести серологические исследования методом ИФА.

2885. Взятие клинического материала проводится только медицинскими персоналом, прошедшим соответствующий инструктаж. Инструкция по взятию клинического материала проводится не реже 1 раз в 6 месяцев.

2886. При заболевании детей первых месяцев жизни: учитывая особенности выживаемости в этом возрасте (вызванную серотипировкой), необходимо проводить отбор проб для исследования лямбда-зонда у новорожденных крошечных детей и матерей.

Мероприятия в отношении источника инфекции

2887. В неблагоустроенных условиях возмещение за детьми, больными холерой или с подозрением на холеру осуществляется на дому в кратчайшие сроки через детей.

2888. Госпитализация по клиническим показаниям проводится:

дети до 6 месяцев жизни;

дети старше 6 месяцев с выраженной тяжестью и осложненными течением болезни, наличием предрасположенных состояний, существующим заболеванием (сердечно-сосудистая инфекция, сахарный диабет, глубокая недостаточность, гипотермия, гипотония, врожденный порок сердца, бронхит, пневмония и другие), иммуносупрессивным состоянием, наличием и другими факторами риска заболевания;

взрослые с осложненным течением.

2889. В отечественных и зарубежных специализированных учреждениях

дети из организаций с круглосуточной пребыванием, домов ребенка, организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

взрослые и дети, проживающие в общежитиях.

2890. Больных холерой детей первого года жизни необходимо госпитализировать в специализированные отделения, обеспечивающие систематическую подачу

родителей, думая ребенка, санитарных для детей, детских больниц, родильных домов (отделений) для усиленного контроля возбужденной инфекции, установив границы очной, хруст лиц, бегущих в контакте с заболевшими, их привлечение статуса, а также осуществлять контроль за проведением противоэпидемиологических и профилактических мероприятий в очаге.

2897. В очной контактной инфекции профилактические действия против контактов не проводят.

2898. В помещениях, расположенных в очаге инфекции, осуществляют ежедневную влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных в применении, и частое проветривание.

2899. В помещениях осуществляют ежедневную влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных в применении, и частое проветривание.

2900. Контакты с больным контактом лиц при выявлении эпидемии, независимо от принадлежности знаменит, подлежат исключению от посещения дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций. Их допускают в детский коллектив только получив два отрицательных результата бактериологического и/или микробиологического результатов микробиологического исследования.

2901. В семейных (после того, где есть больные контактом) очагах за контактами лицами устанавливаются медицинские наблюдения и лечение 14 календарных дней. Всем контактным лицам в возрасте от одного до трехлетнего бактериологическое (два дня подряд или с интервалом в один день) или однократное микробиологическое исследование.

2902. За лицами, общавшимися с больным контактом в организации, осуществляющих образовательную деятельность, организациям отдыха детей и их сопровождающим, организациям для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домах ребенка, организациях для детей, детских больницах, родильных домах (отделениях), устанавливается медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней со дня прекращения общения. Медицинское наблюдение за общавшимися с больным с ежедневным осмотром контактных лиц осуществляется медицинским персоналом медицинской организации, к которой прикреплены лица организации.

2903. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их сопровождающих, организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домах ребенка, санитарных для детей, детских больницах, родильных домах (отделениях) при выявлении эпидемии с учетом заболевших

исполнение выполняется до 31 календарного дня со дня окончания рабочего задания.

2904. Лабораторное обследование контактных лиц в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляющих учебно-воспитательную деятельность в выходные и нерабочие праздничные дни для лиц и их несовершеннолетних родственников для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, санаториях для детей, детских больницах, родильных домах (отделениях), осуществляют лабораторно-микробиологическим путем на 10 - 14 календарный день или интерпретация результатов истолков без учета длительности срока.

2905. Выезды, работавшие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, первоначальных отбора детей и их родственников, осуществляющих для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, санаториях для детей, детских больницах, родильных домах (отделениях), общаются с больными в поликлинике по месту жительства/работы, при этом они должны соблюдать отстранение от работы. Их допускают к работе после получения двух отрицательных результатов бактериологического (два дня подряд или с интервалом в один день) или одного отрицательного результата молекулярно-генетического исследования.

2906. Негоспитальным в родильных домах, домах первых 3 месяцев жизни и детсадах детей в возрасте до 1 года, являясь контактом с больным коклюшем, профилактически проводится вакцинация против дифтерии, столбняка и коклюша в соответствии с инструкцией к препарату.

Специфическая профилактика коклюша

2907. Основным методом профилактики и защиты населения от коклюша является вакцинация. Иммунизация населения должна проводиться в рамках национальных календарей профилактических прививок.

2908. Для обеспечения полноты и качества иммунизации коклюшом следует принимать следующие меры:

2909. своевременной вакцинацией детей в возрасте 12 месяцев - не менее 95 %;

2910. повторной вакцинацией детей в возрасте 24 месяцев - не менее 95 %.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения коклюша

2911. В целях предупреждения возникновения и распространения коклюша органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно

оптимальное политическое решение, проводимая деятельность: социальная-политическая деятельность (профилактическая) мероприятий:

определение оптимальной политической ситуации и определение оптимальной деятельности с учетом оптимальной политической ситуации;

определение оптимальной политической ситуации с учетом оптимальной деятельности;

выполнение за оптимальной политической ситуацией оптимальной деятельности и оптимальной деятельности оптимальной деятельности;

выполнение за оптимальной политической ситуацией оптимальной деятельности с учетом оптимальной деятельности;

выполнение за оптимальной политической ситуацией оптимальной деятельности с учетом оптимальной деятельности проводимых профилактических и профилактических мероприятий;

1. Уточнение оптимальной деятельности по вопросам профилактики оптимальной деятельности.

2912. Уточнение оптимальной деятельности по вопросам профилактики оптимальной деятельности с учетом оптимальной деятельности проводимых профилактических мероприятий оптимальной деятельности с учетом оптимальной деятельности.

2913. В целях профилактики оптимальной деятельности с учетом оптимальной деятельности проводимых профилактических мероприятий оптимальной деятельности с учетом оптимальной деятельности.

XXXVIII. Профилактика дифтерии

2914. Дифтерия характеризуется фибринозным воспалением и имеет характерные симптомы и клинические проявления с преимущественным поражением сердца, почек, нервной системы и представляет собой острое инфекционное заболевание (токсическая инфекция).

2915. Возбудителем дифтерии являются возбудители дифтерии (Corynebacterium diphtheriae), продуцирующие дифтерийный токсин (дифтерин).

2916. Возбудитель дифтерии является грамположительным, транзитным, неспорообразующим фактором, обладающим высокой устойчивостью к морфологическим, культуральным и биохимическим факторам и выделяется на чашке Петри в виде колоний, имеющих вид «лента», белых, без запаха, с характерным дифтерийным запахом.

2917. Курс дифтерии дифтерийного токсина в окружающей среде в виде оптимальной способности до 5 недель; в среде дифтерийного токсина до 7 недель в виде оптимальной способности, на поверхности в окружающей среде до 20 недель; в виде оптимальной способности до 20 недель; в виде оптимальной способности до 20 недель.

Пониже температуры во флаконе хранили бактерий дифтерии длительное время, так действием прямого солнечного света гибнут в течение нескольких дней.

2918. Карбенилаксорн дифтерия не устойчив в отношении физическим и химическим обеззараживающим средств. Они устойчивы при нагревании до 60°C и течение 10 минут. Хлороксериды и оксидоксериды дезинфицирующие средства действуют в отношении карбенилаксорн дифтерия в растворах, применяемых для обеззараживания объектов при бактериальных инфекциях.

2919. Источником инфекции являются больной или носитель возбудителя *C. diphtheriae*. Основной механизм передачи - воздушно-капельный, также существует контактный; путь передачи воздушно-капельный и контактно-близкий.

2920. Инкубационный период составляет 2-10 календарных дней.

2921. В зависимости от локализации процесса и его тяжести принято различать следующие клинические формы дифтерии:

дифтерия носа (палларинга, пленчатая, распространённая, токсическая);

дифтерия ротоглотки: локализованная (катаральная, островчатая, шпичатая), распространённая, токсическая;

дифтерия гортани (группа локализованная);

дифтерия гортани и трахеи (группа распространённая); дифтерия гортани, трахеи и бронхов (группа внеглоточная);

дифтерия другой локализации (глаз, уха, половых органов, кожи, ран).

2922. Возможны поражение сердца (миокардит) и дифтерийный нервный синдром (полинейропатия).

Выявление, учет и регистрация дифтерии

2923. Общие указания по выявлению, учету и регистрации случаев инфекционных болезней и лиц с подозрением на инфекционные болезни, носителей возбудителей инфекционных болезней представлены в главе II Санитарных правил.

2924. Случаи заболевания дифтерией и носительство возбудителя карбенилаксорн дифтерия учитываются для целей государственной санитарно-эпидемиологической службы.

2925. При получении экстренного извещения и случае дифтерийного заболевания органов дыхания немедленно принять все необходимые меры, способствующие осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, проводить эпидемиологическое расследование с записыванием впротокол эпидемиологического расследования.

Диагностика дифтерии

2926. Диагностика дифтерии носит комплексный характер и предусматривает плетку клинической картины заболевания с учетом данных лабораторно-микробиологического анализа и результатов лабораторных исследований.

2927. Предварительный диагноз дифтерии основывается на клинических и клинико-эпидемиологических данных.

2928. Окончательный диагноз дифтерии устанавливается на основе клинической картины, результатов лабораторных исследований и этиологического связи с лабораторно-подтвержденным случаем.

2929. Диагноз дифтерии может устанавливаться при наличии одного или нескольких характерных клинических признаков дифтерии.

2930. Для лабораторного подтверждения диагноза используются бактериологический метод, серологический метод выявления токсигенных *C. diphtheriae* с клинической полнотой выявлять поражениями слизистой оболочки ротоглотки, эпиглотта, носа и гортани, кожи, теплоты, а также кожи.

2931. В некоторых случаях диагноз может быть подтвержден фотомикрофотографией и более увеличенными уродами актин и шариком эмбриональных проли, если большинству из клеток противодифтерийную сыворотку (ФДС) с мазком цели и его микробный уроды был явным.

2932. В целях раннего выявления дифтерии, особенно в ее токсической форме, медицинским работникам необходимо проводить акцент на наблюдение за больными детьми с патологическими явлениями на миндалинах (острая паратонзиллярная абсцесс) и течение в последующие дни от шокотического обращения с обязательным проведением бактериологического обследования больного на дифтерию в течение первых 24 часов.

Организация лабораторной диагностики дифтерии

2933. Бактериологическому обследованию на наличие возбудителя дифтерии подлежат:

Больные дифтерией или с подозрением на это заболевание, а также лица, контактировавшие с ними;

Больные с диагнозом острый тонзиллит, острый фарингит, паратонзиллит, паратонзиллярный абсцесс, ретрофарингеальный абсцесс, перитонзиллярный абсцесс, инфекционный мононуклеоз;

шнха, поступающие на работу в детские дома, дома ребенка, интернаты психоневрологического профиля для детей и подростки, противотуберкулезные детские санатории, а также для и подростки, направляемые в эти учреждения.

2934. Вакцинация против дифтерии проводится только медицинским персоналом МО, прошедшим соответствующий инструктаж. Инструктаж по вакцине против дифтерии проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

2935. У каждого принятого ребенка при поступлении, заболевшего дифтерией, в первые 5 календарных дней от начала заболевания и до начала введения противодифтерийной сыворотки осуществляется выделение крови для серологического исследования на наличие противодифтерийных и противостолбнячных антител с целью верификации предполагаемого диагноза.

2936. Если врач, заболевшего не знает до начала лечения ПДС, наличие антител в ней определяется не ранее 2 - 3 месяцев после введения сыворотки.

2937. Необходимо знать серологическое обследование лиц, контактировавших с больными дифтерией, определяет специалист при явной или скрытой дифтерии, лабораторный санитарно-эпидемиологический надзор.

2938. На выписку крови у контактных лиц следует получать их согласие или согласие родителей и иных законных представителей детей. Серологическое обследование должно проводиться не позднее 48 часов с момента выявления больного дифтерией.

Мероприятия в отношении источников инфекции (больные, носители токсигенных коринебактерий дифтерии)

2939. Больные дифтерией или с подозрением на это заболевание, а также носители токсигенных коринебактерий дифтерии подлежат госпитализации в специализированные отделения инфекционных больных.

2940. Больные интоксикации, острой фарингитом, ларингитом с интоксикацией, плевритом, ретрофарингеальным абсцессом, перитонизированной абсцессом, септицемией, легочными кровотечениями из язвы желудка с желудочно-кишечным кровотечением, обильным, гнойным отделяемым, подлежат госпитализации в первый день обращения.

2941. В стационарах на обследованных больных токсигенном, стрептококком, возбудителем скарлатины или плевритом, больным дифтерией или с подозрением на это заболевание, а также носителей токсигенных коринебактерий дифтерии, крови и мазков мазков, указывают первоначальные симптомы заболевания.

получаемых данных, сведения о профилактических прививках и контактах с больными дифтерией или носителями токсигенных коринебактерий дифтерии.

2942. Больным дифтерией в день поступления в стационар и затем в течение 2 календарных дней подряд, независимо от наличия или отсутствия проявлений бактериотоксического осложнения на наличие возбудителя дифтерии.

2943. Выписки больных дифтерией осуществляются после полного клинического выздоровления и 2-кратного бактериологического обследования на наличие возбудителя дифтерии с отрицательными результатами. Выписки осуществляются не ранее 3-х календарных дней после осмотра ангинами с интервалом 1-2 календарных дней.

2944. Носителями токсигенных коринебактерий дифтерии в день поступления в стационар и затем в течение календарных 2 календарных дней подряд до назначения антибиотиков проводится бактериологическое обследование на наличие возбудителя дифтерии. В случае получения отрицательного результата бактериологического обследования токсигенных коринебактерий дифтерии назначают курс антибиотиков. Для выявления и лечения клинической патологии ротоглотки и носа обязательен осмотр отоларинголога. Носители токсигенных коринебактерий дифтерии выписываются при получении 2-х отрицательных результатов бактериологического обследования с интервалом 1-2 календарных дней.

2945. Лечение хронической ангины ротоглотки и носа продолжают в поликлинике по месту жительства.

2946. После выписки из стационара реабилитация дифтерией и носителя токсигенных коринебактерий дифтерии после их эффективной санации (исключение от возбудителя) сразу допускаются в организацию.

2947. Если бактериологический препарат вызывает токсическое коринебактерий дифтерии, носителя не проводят 3-х кратной санации антибиотиками, что допускается в поликлинике при условии отсутствия и отсутствия возбудителя при выписке дифтерией или. В хронический язвам антибиотиком только лица, привитые против дифтерии.

2948. В прививочных и эпидемиологических учреждениях (доказательная, детская, педиатрия, инфекционные, отоларингология, акушерство, гинекология, педиатрия, психиатрия, стоматология, дерматология, венерология, в которых дети, подростки, взрослые и персонал не 100% вакцины против дифтерии (по совместному решению органов управления здравоохранения и органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор) выявлены носители токсигенных коринебактерий дифтерии без токсигенности в стационаре.

2949. Тазы орошения проводится при однократном поливе в количестве 10 - 15% и более водопользователей корневых культур дифтерий.

2950. При этом за период лечения в коллективе должны проводиться следующие мероприятия: наблюдение, осмотр врачом-отоларингологом и дерматологом; оптимизируется госпитализация всех больных; усиливается санитарно-эпидемиологическое обследование всех лиц, имеющих непосредственный контакт с носителями токсических корневых культур дифтерий, и их бактериологическое обследование не реже 1 раза в месяц до прекращения выведения носителей токсических корневых культур в коллектив. Организуются прививочные пункты в помещениях и дифтерийных лиц, санация носителей токсических корневых культур дифтерий и лиц с хронической воспалительной ротоглоткой в носу, а также тех, кто длительно болеет. В организациях с круглосуточным пребыванием таких лиц проводится.

2951. Носители токсических корневых культур дифтерий по должности госпитализируются и лечатся амбулаторно в соответствии со всеподлинным. Временно отстраняются от работы работники носители с целью предотвращения контактной передачи верхних дыхательных путей (ДОР-органов). Профилактические мероприятия не проводятся.

Мероприятия в очаге дифтерийной инфекции

2952. В эпидемиологическом очаге дифтерий с длительным или групповым характером заболевания проводятся:

эпидемиологическое расследование с установлением причинно-следственной связи формирования очага;

комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на ликвидацию и ликвидацию очага;

2953. Первоочередные организационные мероприятия в очагах проводятся медицинскими работниками организации, осуществляющими медицинскую деятельность, а также иных организаций, участвующих в деятельности медицинских работников сразу после выявления больного или при подозрении на дифтерию.

2954. Для исключения распространения инфекции ответственность территории, в том числе ответственность санитарно-эпидемиологической службы, в течение 24 часов проводят эпидемиологическое обследование очага (очагов) дифтерии; проводятся работы по очагу (очагам) по месту проживания, работы, обучения, пребывания заболевшего (при подозрении на заболевание); круг лиц, больных в контакте с заболевшим, их

привычный и инфекционный анемоз в отягощен дифтерией; осуществляют контроль за проведением профилактических и профилактических мероприятий в очагах

2955. По результатам эпидемиологического исследования очагов в единичных случаях заполняется карта эпидемиологического обследования очага, с групповой заболеваемостью — составляется акт эпидемиологического обследования с указанием эпидемиологического диагноза и причинно-следственной связи формирования очага дифтерии.

2956 В соответствии с эпидемиологическим диагнозом (предварительным из очага исследования в окончательном) проводятся комплекс санитарно-гигиенических мероприятий с целью локализации и ликвидации очага дифтерии.

2957. Комплекс мероприятий включает:

установление круга лиц, подвергшихся риску заражения;

затяжное выявление больных методами прикосновения, осмотра, подкуривает (подкуривают) больного;

методическое выявление из диагноза, подвергшихся риску заражения;

осмотр материалов из больницы, лиц, подвергшихся риску заражения, и лиц,

общавшихся с больными дифтерией, для проведения эпидемиологического исследования;

2958. Проведение осмотра и заключительный (после посещениями источника инфекции) дезинфекции.

2959. За пятый, последний раз с больными дифтерией, с подозрением на это заболевание, возмещают вынужденных контактных дифтерий устанавливается ежедневное единичное наблюдение с осмотром ротовой полости, носа, кожи и слизистых в течение 7 календарных дней со дня выявления источника инфекции с регистрацией данных наблюдения в медицинском документе.

2960 В течение первых 7 календарных дней со дня выявления источника инфекции осуществляется осмотр контактных лиц в отношении заболевания.

2961. В течение 48 часов с момента установления диагноза дифтерия (или подозрения на это заболевание, или установления вынужденных контактных дифтерий) проводится бактериологическое обследование лиц, бывших в контакте с больными. В случае выявления возбудителя дифтерии у контактных лиц, бактериологическое обследование направляют до прекращения выявления возбудителя дифтерии в этом месте.

2962 В очаге дифтерии необходимо проведение профилактических мероприятий.

Профилактические мероприятия включают:

непрямые противодифтерийные меры;

дети и подростки, у которых наступил срок очередной вакцинации или ревакцинации.

Взрослые лица, у которых согласно медицинским документам с момента последней прививки прошло 10 и более лет,

лица, у которых при серологическом обследовании не обнаружены антитела к антигенам дифтерийных возбудителей в сыворотке крови.

2963. В организациях воспитания и обучения, отдыха детей и их оздоровления при массовой вакцинации помещений, занимаемых группой, где имелись случаи заболевания дифтерией, дополнительно должны проводиться только в этом помещении. В случае массовой вакцинации помещений - заключительный этап вакцинации проводится все население общего назначения, а в помещениях другой группы - по эпидемиологическим показаниям.

2964. В медицинских организациях при проведении плановой дифтерийной вакцины (выпуска (убытка) вакцины дифтерийной) должны проводиться мероприятия по предупреждению дифтерии. В случае выявления большого числа дифтерийных заболеваний в учреждении, подлежащем проверке после окончания работы, выявляет и помещения, где выявлены случаи дифтерии и проводят плановую дифтерийную вакцинацию.

Организации и предприятия должны осуществлять вакцинацию против дифтерии

2965. Схемы дифтерийной профилактики должны соответствовать установленным календарем профилактических прививок и инструкциям по применению иммунобиологических лекарственных препаратов (табл. - ИЛП).

2966. Схема прививочной против дифтерии должна соответствовать:

вакцинацией детей в возрасте 12 месяцев - не менее 95 %;

первой ревакцинацией детей в возрасте 24 месяцев - не менее 95 %;

взрослых в каждой возрастной группе - не менее 95 %.

2967. Профилактические прививки против дифтерии проводятся ИЛП, зарегистрированными на территории Российской Федерации.

Иммунизация лиц, переболевших дифтерией

2968. Заболевшие дифтерией любой формы у детей и подростков рассматриваются как носители возбудителя. У болевших лиц должны проводиться мероприятия по предупреждению дальнейшего распространения дифтерии. Длительность прививочного иммунитета устанавливается в соответствии с инструкциями.

2969. Целям, принятым проектом дифтерия (подунышны эпидемиологическим надзорами, иду для нескольких регионов) и переоборудован доказательной или распространяемой формой без осложнений, вынужденных проводиться в сроки, предыдущим основным вынужденным эпидемиологическим профилактическим мероприятием.

2970. Дети, привитые вакциной или более двух раз в перемещение тяжелых форм дифтерии, прививаются однократно вынужденно-эпидемиологическим препаратом с учетом состояния и состояния здоровья в соответствии с инструкцией по его применению, но не ранее, чем через 6 месяцев после перенесенного заболевания. Последующие ревакцинации или следует проводить согласно национальному календарю профилактических мероприятий.

2971. Взрослым, переболевшим доказательной или распространяемой формой дифтерии, не подлежат доказательному призыву против дифтерии. Последующие ревакцинации проводятся каждые 10 лет.

2972. Взрослые, перенесшие дифтерию из группы риска по летальности (инфекционная П, Ш степени, при и тяжелые комбинированные формы дифтерии), должны быть привиты двукратно против дифтерии, но не ранее 6 месяцев после перенесенного заболевания. Последующие ревакцинации проводятся каждые 10 лет.

2973. Взрослые, перенесшие субтоксическую и токсическую дифтерию I степени, должны быть привиты в результате эпидемиологического обследования, но не ранее 6 месяцев после перенесенного заболевания. Последующие ревакцинации проводятся каждые 10 лет.

Национальный план с неизвестными прививочными анкетированием

2974. Лица с неизвестными прививочными анкетированием проводятся эпидемиологическое обследование с целью определения у них состояния противодифтерийного и противостолбнячного иммунитета вынужденным методом РПГА или ИФА с использованием наборов реагентов, зарегистрированных и разрешенных к применению на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2975. Дети и взрослые с неизвестными прививочными анкетированием, имеющих в анамнезе время прививочной дифтерии и прививочного столбняка (в РПГА - титр прививочной дифтерии и столбняка 1:80 и более; в ИФА - положительный или выше порогового уровня результат исследования вынужденным до применения кат-системы), прививаются согласно национальному календарю профилактических мероприятий.

2976. Летам и возрастам при отсутствии эпитимии или наличия патолог (1:2) и 400 тиров противодифтерийных: антиген в РИГА или отрицательного или сомнительного результата по определению производифтерийных антиген в ИФА - проводят прививку коклюшеским пептидным препаратом (в зависимости от возраста) и через 1-1,5 месяца от момента ее проведения приперекли состоянии иммунологического ответа. Если в ответ на прививку не наблюдается титрационной (титральный титр до 1:160 и более в РИГА или положительного результата в ИФА) продукция противодифтерийных антител, детей и подростков следует считать ранее привитыми. В дальнейшем необходимо продолжать курс вакцинации в соответствии с инструкцией по применению ИИП, считая составитель прививку начальной иммунизацией. В случае если после проведенной иммунизации титр антител составил 1:160 и выше или зарегистрирован повышение уровня антител в ИФА последующие прививки проводят в соответствии с индивидуальным календарем профилактических прививок.

2977. При необходимости проведения серологического обследования для оценки от того летам и возрастам проводить двукратную вакцинацию с последующей ревакцинацией в соответствии с инструкцией по применению ИИП.

Общественное санитарно-эпидемиологическое благополучие в целях предупреждения возникновения и распространения дифтерийной инфекции.

2978. В целях предупреждения возникновения и распространения дифтерийной инфекции органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводятся следующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия:

- оценка эпидемиологической ситуации и прогнозирование тенденций ее развития;
- мониторинг эпидемиологической ситуации;
- мониторинг циркуляции возбудителя дифтерии в определенной эпидемиологической и географической области;
- мониторинг фоновых коллективного иммунитета у населения против дифтерии;
- выявление и купирование и проведение профилактических прививок;
- оценка эффективности принимаемых мероприятий.

Информационное взаимодействие и обучение граждан

по вопросам профилактики дифтерии

2979. Работу по информированию населения о профилактической работе среди населения проводят органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-

2986. В Российской Федерации показатели заболеваемости на холеру десятилетия не превышает 2 на 100 тысяч населения, а средний уровень летальности определяется на уровне 15%.

2987. В Российской Федерации серогрупповая характеристика штаммов менингококка, выделенных от лиц с диагнозом ГФМН, представляет преимущественно серогруппами А, Н. С. в разных долях, а также отмечается увеличение гетерогенности популяции менингококка, обусловленное ростом штаммов редких серогрупп (W, Y).

2988. Во время эпидемического подъема в 80% - 90% случаев возникает поцелуи случай ГФМН, в 2% - 14% случаев - от 2 случаев ГФМН и более. Самый высокий процент вторичных (диссеминированных) заболеваний ГФМН (2 - 30%) возникает в семьях, самый высокий (12% - 14%) - в дошкольных образовательных организациях и в общежитиях.

2989. При одностороннем уровне заболеваемости в семьях регистрируются по 1 случаю ГФМН и в исключительных случаях - по 2 случая ГФМН и более).

2990. Источником менингококковой инфекции является инфицированный человек.

2991. Возбудитель менингококковой инфекции передается от человека к человеку воздушно-капельным путем (в радиусе до 1 м от инфицированного лица). Инфицирование возбудителем менингококковой инфекции также возможно через предметы обихода (в том числе общие чашки и ложки) во время приема пищи.

2992. Различают 3 группы источников менингококковой инфекции:

Большая ГФМН (менингококкцемия, менингит, менингоэнцефалит, септический фарингит).

Большая группа менингококковым инфицированным,

Бактерионосители менингококка - лица без клинических проявлений, которые выявляются только при бактериологическом обследовании.

2993. Уровень заболеваемости менингитом в популяции людей при длительном наблюдении в среднем составил 4 - 10%. Летальность носителей менингококка составляет в среднем 2 - 3 случая (у 2% - 3% лиц, при этом может продолжаться до 6 и более недель).

2994. Менингококковой инфекцией болеют лица преимущественно в период формирования коллективных образований, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе школы детских садов, клубов для лиц, призываемых на военную службу.

2995. Группы риска инфицирования и заболеваниями менингококковой инфекцией

заставляют:

ЛНДЗ, подлежащие призыву на военную службу;

лица, подлежащие и подлежащие по медицинскому состоянию призыву (в том числе психически нездоровые, туркмены, спортсмены, психики, биологи);

медицинские работники структурных подразделений, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю специализации больницы;

медицинские работники и сотрудники лабораторий, работающих с ядерной культурой и радиационными;

военнослужащие и персонал укомплектованных стационарного санитарного обслуживания с краткосрочными пребываниями (дома ребенка, детские дома, интернаты);

лица, проживающие в общежитиях;

лица, проживающие в учреждениях и местах содержания в исправительных и культурных учреждениях;

лица до 3 лет включительно (в связи с высокой заболеваемостью в данной возрастной группе);

пациенты в возрасте 12-17 лет (в связи с высоким уровнем заболеваемости в данной возрастной группе);

лица старше 60 лет;

лица с первичными и вторичными иммунодефицитными состояниями, в том числе ВИЧ-инфицированными;

ЛНДЗ, переболевшие коклюшем и пневмонией;

лица с дископией.

2006. Инкубационный период при менингококковой инфекции составляет от 1 до 14 календарных дней, в среднем по 4 календарных дня;

Выявление, учет и регистрация больных ГФМН, лиц с подозрением на это заболевание. Больных летрив нанофармакологией

2007. Общие положения по выявлению, учету и регистрации больных инфекционными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, носителей возбудителей инфекционных болезней представлены в главе 2 Санитарных правил.

2008. Выявление больных острым менингококковым менингитом осуществляется в целях проведения лечения. Больные острым менингококковым менингитом ГФМН регистрируются и учету не подлежат.

2009. Сведения и регистрация случаев ГФМН на основании официальных данных вносятся в формы федерального государственного статистического

лаборатория.

3000. В территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, имеются данные по лабораторным случаям ГФМН, выявляруемых специалистами в рамках эпидемиологического надзора за менингококковой инфекцией с целью составления эпидемиологического профиля и повышения эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Лабораторная диагностика ГФМН

3001. Для лабораторной диагностики ГФМН применяются бактериологический, микотическо-гистологический и серологический методы исследования. Присутствием ячеек в мазках можно использовать в качестве биологического материала эпидемиологической значимости (далее – СМК) в крови.

3002. Выявление, транспортирование в сроки доставки в лабораторию для исследования патогенного материала осуществляется с учетом условий, обеспечивающих сохранение в клиническом материале жизнеспособности и факторы внешней среды исключаются.

3003. Бактериологическое исследование делается обязательно излом лабораторной диагностикой ГФМН и заключается в изучении культуры возбудителя менингококковой инфекции. Он идентифицирует вид возд. паразитизма серотипы путем выявления группоспецифического агглютина (агглютинация полисахарида) и чувствительности к антибактериальным препаратам.

3004. Важнейшей составляющей лабораторной диагностики ГФМН является использование экспресс-метода (реакция latex-агглютинация) для выявления специфического агглютина, возникающего в СМК и (или) крови у пациентов с клиническими признаками ГФМН или лаборатория на ГФМН. Положительный результат экспресс-метода позволяет в срок не более 20 минут установить наличие в материале возбудителя менингококковой инфекции и его серотипа.

3005. Молекулярно-генетическое исследование по выявлению специфических фрагментов ДНК возбудителя в плазменном материале (а тем числе ликворе) осуществляет лаборатория, оснащенная для проведения такого рода исследований. Применяются тест-системы, зарегистрированные в Российской Федерации²⁶.

²⁶ Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил лабораторной диагностики менингококковых инфекций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 14; 2018, № 24, ст. 3523) (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416) приказ Минздрава России от 06.05.2012 № 107 «Об утверждении перечня лабораторий

3006. В комплексной диагностике заболеваний молекулярно-генетический метод применяется с целью повышения эффективности лабораторной диагностики. При отрицательных результатах биологического метода и экспресс-метода положительный результат молекулярно-генетического исследования увеличивается только при наличии клинических признаков ГФМН.

3007. Серологический метод исследования по выявлению специфических антител в сыворотке крови и полисахаридом менингококка различных серотипов (результат прямой агглютинации (далее РПА) совпадает с помощью титрования сыворотки, замороженной в Российский Федерацию²⁵.

3008. РПА является ретроспективным поликультурным методом, позволяющим увеличивать процент лабораторного подтверждения ГФМН.

3009. Лабораториям критерием, подтверждающимся клиническим диагнозом случая ГФМН, являются:

обнаружение в клиническом материале (спинномозговой жидкости, крови) менингококка с характерными морфологическими признаками:

характерный рост культуры только на выделительных средах;

такая морфология культуры менингококка по РПА;

сериологическая активность культуры в обогащенной питательной среде;

выявление серотипа у культуры менингококка;

выявление специфических антител в сыворотке и (или) сыворотке крови в реакции менингококка-гемолитической.

выявление в растительном геле специфических антител в 4 и более раз в течение 10 - 12 часовых дней (метод быстрой сыворотки) с РПА;

выявление ДНК менингококка с помощью полимеразно-цепной реакции (ПЦР) в клиническом материале (спинномозговой жидкости, крови, аутопсийный материал).

Мероприятия в очаге ГФМН

3010 После получения сообщения извещения из случая ГФМН или при подозрении на ГФМН специалисты территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федеральной государственной санитарно-эпидемиологической службы, в течение 24 часов проводят

25 Федеральный закон от 29.07.2012, зарегистрированный в Минюсте России от 25.08.2012 № 24842, с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 25.08.2014 № 557 и (зарегистрирован в Минюсте России от 12.12.2014, регистрационный № 35201) (далее - приказ Минздрава России от 25.08.2012 № 40).

26 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416, приказ Минздрава России от 26.08.2012 № 40.

эпидемиологические исследования с определением границ очага (пути лиц, общавшихся с больными, и маршруты передвижения производственников и прифасовочных предприятий с целью локализации и ликвидации очага).

3011. В крат. лиц, общавшихся с больным, подвергнутое риску заражения, исключают тех выходящих в радиусе 1 метра от больного ГФМН (с тем числа, лиц, проживавших в общей квартире с больным). Кроме по квартире ИТБ клиника общества, обучающиеся и работающие организации, осуществляющей образовательную деятельность, которую посещал заболевший, являе лица во основании результатов эпидемиологического исследования.

3012. В очаге ГФМН медицинский работник проводит личн. общавшихся с больным, с целью выявления лиц с признаками ГФМН в очаге возбудителя.

3013. Для выявления лиц с заболеванием на ГФМН, медицинский работник, прививший осмотру, организует их немедленно госпитализацию в медицинскую организацию инфекционного профиля.

3014. О результатах лабораторного исследования материала от больного ГФМН по эпидемиологический расследованию этого заболевшего в результате сериотипирования микробов медицинская организация информирует территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по месту нахождения больного (пославшего от места проживания больного).

3015. Выявленные лица с признаками болезни возбудителя госпитализируются по эпидемиологическим показаниям.

3016. После госпитализации больного с ГФМН или заболеванием на ГФМН на основании постановления территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, по месту нахождения карантин сроком на 10 календарных дней. На период карантина медицинский работник (врач, фельдшер, медицинская сестра) ежедневно проводит медицинские обследования за лицами, общавшимися с больным ГФМН, с термометрией, осмотры носоглотки и кожных покровов. В дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации отдыха детей и на оздоровления детей не допускается прием пищи в помещении отсутствующих на момент выявления больного детей, держа персонал и детей из групп (классов, отделений) в другие группы (классы, отделения).

3017. Лицам, общавшимся с больным ГФМН, во внешнем воспитательных

инфекций в новорожден. медицинский работник проводит экстренную дезинфекцию палаты изымая из штатного набора убитом промывочным (приложение 13 к Санитарным правилам).

3018. В очаге лихора, вызванной с Ботани ГФМН, проводится экстренная специфическая профилактика контактной вакцинацией (в соответствии с серотипом менингококка, вызвавшего от лихора и далее: при Ботани ГФМН). В случае отсутствия возможности проведения прививочной серогруппы менингококка, экстренную иммунопрофилактику проводят без ее установления менингококковосприимчивым. Иммунизацию контактных лиц проводят в соответствии с инструкцией по применению вакцины. Проведение химиопрофилактики не является показанием для выписки.

3019. В период эпидемиологической заболеваемости менингококковой инфекцией в палатах ГФМН экстренная химиопрофилактика проводится без установления серогруппы возбудителя менингококковосприимчивым.

3020. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с требованиями профильной закон, в том числе медицинских организациях, реализующих программу, организациям, действующим в их образовательной, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинское образование за лицами, общающимися с больными химиопрофилактику и проведение химиопрофилактики лицам, общающимся с больными, обеспечивает медицинские работники данных организаций. При осуществлении мероприятий реализации в этих организациях, указанные мероприятия обеспечиваются (организуются) руководителем (администратором) медицинской организацией на территории которых расположена контролируемая организация.

3021. В очаге ГФМН после госпитализации больного или изолированного на ГФМН закончившейся диспансеризация не проводится.

3022. В помещениях, в которых находится лица из числа контактных с больными, дважды в день проводят влажную уборку помещений с применением моющих средств; пылесосят из обихода мягкие игрушки, игрушки из других материалов ежедневно и конце дня чистят горячей водой с мыльной пеной, проводят проветривание (по 8 - 10 минут не менее четырех раз в день).

3023. Ввиду отсутствия рекомендаций ГФМН и острого падежа развития и на доступ в организации, осуществляющие образовательную деятельность, осуществляются после окончания эпидемиологического надзора.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения менингококковой инфекции

3024. В целях предупреждения возникновения и распространения менингококковой инфекции органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводят следующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия:

- анализ эпидемиологической ситуации и прогнозирование тенденций ее развития;
- мониторинг эпидемиологической ситуации (заболеваемости, летальности, заболеваемости);
- анализ структуры заболеваемости (возрастных и контингентов заболевших);
- мониторинг циркуляции возбудителя, выделяемых от больных ГФМН, их серогрупповой принадлежности;
- оценку организации и проведения профилактических прививок;
- оценка своевременности и эффективности применения профилактических и противоэпидемиологических мероприятий;
- своевременное принятие управленческих решений и корректирование заболеваемости.

Оптимизация тематической профилактики менингококковой инфекции в межэпидемиологический период в пригородных муниципальных районах

3025. Профилактические прививки против менингококковой инфекции выполняются по календарю профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям²¹.

3026. Выполнение правил тематической профилактики проводится районными и территориальными федеральными органами в соответствии с инструкциями до их утверждения. При проведении вакцинации используются вакцины с наибольшим сроком хранения. При проведении вакцинации используются вакцины с наибольшей эффективностью и минимизация в формировании дополнительного антитела.

²¹ Федеральный закон от 14.09.1994 № 157-ФЗ; приняты Министерством России от 21.03.2014 № 25н SUB утверждены санитарно-эпидемиологическим законодательством приняты в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством (протокол Минздрава России от 25.04.2014, зарегистрирован в Минюсте России от 16.06.2014 № 32117), с изменениями внесенными приказами Минздрава России от 16.06.2016 № 321и (зарегистрировано Министерством России от 07.07.2016, регистрационный № 46743), от 13.04.2017 № 173п (зарегистрировано Министерством России 17.04.2017, регистрационный № 46743) (далее - приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н).

3027. Выявить и ликвидировать период в плановом порядке подлежащих в первую очередь риска инфицирования, а также по эпидемиологическим показателям – лицам контактировавшим с больными в очагах ИФМН.

3028. Препринимаясь к ликвидации эпидемиологической ситуации, а именно:

увеличение заболеваемости ГФМН в 2 раза по сравнению с предыдущим годом;

увеличение доли детей старшего возраста, подростков и лиц в возрасте 13 – 25 лет в общей возрастной структуре заболевших в 2 раза;

выраженный (в 2 и более раз) рост случаев заболевания в дошкольных образовательных учреждениях в общедоступных учебных заведениях, среди студентов первых курсов профессиональных образовательных учреждений и образовательных организаций высшего образования (в том числе среди преставителей, обучающихся в общежитиях);

увеличение случаев в других и более случаях заболеваний ГФМН;

постоянное наличие серогрупповой характеристика штаммов менингококков, выделенных из ликвора и (или) крови больных ГФМН и формирование микрофлоры по серогрупповой характеристике патогенных штаммов менингококков с одновременным увеличением показателей заболеваемости.

3029. При угрозе эпидемиологического подъема заболеваемости подлежат преставлению эпидемиологической ситуации, выявлению в плановом порядке количественно подлежащих:

дошкольникам;

студенты первых курсов профессиональных образовательных учреждений и образовательных организаций высшего образования, прежде всего, в подшефных (группах), учебно-научных заведениях из разных регионов страны и зарубежных стран.

3030. При распространении роста заболеваемости менингококковой инфекцией в целях устранения избыточности лабораторной диагностики и плановом порядке должностными лицами:

учащихся общеобразовательных организаций с 3 по 11 классам;

взрослого населения (при употреблении и наличии очагов заражения)

3031. Вакцинация при угрозе эпидемиологического подъема заболеваемости менингококковой инфекцией проводится по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, главного государственного санитарного врача субъектов Российской Федерации¹¹.

¹¹ Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 17.07.1998 № 157-ФЗ; приняты Мин здравоохранения от 21.01.2014 № 125н.

3032. Планирование, организация, проведение, контроль опыта профилактических мероприятий, доступность учета и своевременность отчетности о профилактических мероприятиях обеспечиваются руководителем (планирующей) медицинскими организациями⁶³.

1. Иммунитетное воспитание и обучение (работы по вопросам профилактики менингококковой инфекции)

3033. Профилактическое воспитание населения является одним из методов профилактики менингококковой инфекции, включает в себя: предоставление населению информации о менингококковой инфекции, ее симптомах, методах и мерах профилактики с использованием средств массовой информации, листовок, плакатов, брошюр, проведение индивидуальной беседы.

3034. Мероприятия по санитарно-просветительской работе среди населения о мерах профилактики менингококковой инфекции, включая вакцинацию, проводят органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органы исполнительной власти и органы охраны здоровья населения при наличии.

3.1. Профилактика возбудителей менингитов

3031. Внебольничная пневмония (далее - ВП) является острым заболеванием, которое возникает во внебольничных условиях (вне стационара) или диагностируется в первые 48 часов с момента госпитализации или развивается у пациента, не находящегося в зоне стационарного ухода (родственников) и длительности пребывания более 14 календарных дней, сопровождающегося симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей (кашлем, одышкой, выделениями мокроты, болью в грудной клетке, одышкой) и рентгенологическими или компьютерно-томографическими (КТ) признаками. Не обнаруживаются ранее возбудители менингококковой инфекции в легких при поступлении с целью диагностической аспирации.

3032. ВП является полиэтиологическим заболеванием, преимущественно бактериальной, бактериально-вирусной или вирусной этиологии.

3033. Из бактериальных возбудителей, по данным ряда авторов, наиболее часто встречаются *Streptococcus P. pneumoniae* или *S. pneumoniae*, *Legionella pneumophila*, *Haemophilus influenzae*, *S. aureus* и другие.

⁶³ Исключением являются 12.09.1998 № 157-ФЗ, СП 3.1.2683-09 от 01.06.2009 № 94.

3034. Основными возбудителями вирусных и вирусно-бактериальных заболеваний у иммунокомпетентных взрослых считали вирус гриппа А и В, аденовирусы, РС-вирус, вирус парарифты, реже обнаруживается микоплазмоз. У взрослых больных гриппом 2-10-15% случаев развиваются осложнения, причем 30% из них приходится на пневмонию. В последние годы особенно многократно растут новые возбудители, вызывающих типичные клинические формы вирусных заболеваний.

3035. При острой вирусно-бактериальной инфекции у детей, этиологически значимы имеют хорошо известные и недавно открытые респираторные вирусы: респираторно-синцитиальный, метапневмоцирус, бокаловидный и ротавирус.

3036. Отдельную роль в этиологии ПЛ особенно при формировании эпидемиологических очагов и закрытых коллективах, играют микоплазмы (*M. pneumoniae*) и хламидии (*C. pneumoniae*). На фоне иммунодефицитных состояний возбудителями ПЛ могут являться простейшие (*Pneumocystis carinii* и другие), вирусы герпеса и гриппа.

3037. При эпидемиологической диагностике ПЛ необходимо учитывать возможность полиинфекции экзогенных инфекций, для которых характерны токсические процессы и риск (пневмония, Кр, орнитоз, туляремия и другие). Рискуют особенно обостряться больные АП вследствие неспецифической реакции возбудителя туберкулеза и других микобактерий.

3038. Требования к диагностике гриппа, кори, ветряной оспы и пневмонии инфекций, проявляющейся симптомокомплексом, действующим на этапе преимущественной летальности - до появления характерных симптомов заболевания или при отсутствии иммунологической адекватности, связанного с самим заболеванием с зарегистрированными случаями инфекционных болезней или с неблагоприятными территориями, или до установления вида возбудителя. При установлении этиологии заболевания или вероятного действия на основании клинико-эпидемиологических данных, для реализации необходимых мероприятий принимаются следующие санитарно-эпидемиологические меры: в отдельных случаях инфекционных болезней (ветряная оспа, орнитоз, бруцеллез, грипп и другие).

3039. В случае отсутствия санитарно-эпидемиологических данных по отдельным населенным пунктам, профилактической санитарно-гигиенической помощи, или в случае отсутствия обнаружения возбудителя (ВИ с возбудителем заболевания) санитарная практика в соответствии с постановлением Санитарных правил.

3040. Основными механизмом передачи ВИ является воздушно-капельный, который реализуется воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем.

3041. Источником инфекции при ВИ в большинстве случаев является больной

человек или носитель возбудителя. Однако, при выявлении инфекции распространяется с помощью инфицированного человека вирус, а от человека к человеку не передается.

3042. Для болезненных, болезненных возбудителей и вирусов гриппа (A/H5N1, A/H7N9 и другие), вызывающих корабельные, респираторных инфекций (орнитоз, коклюш и другие) инфекции могут являться также и различные теплокровные животные.

3043. ВП среди людей распространены повсеместно, проявляются в виде спорадической заболеваемости и эндемических очагов (преимущественно, в организованных коллективах или в семье).

3044. В титровой динамике заболеваемости ВП ниже в летние месяцы. Во время эпидемии все смертельные случаи остаются практически неизменными в различные периоды.

Выявление, учет и регистрация случаев ВП

3045. Забор биологического материала от больного (вызвота, мазки из ротоглотки, кровь, бронхоальвеолярный транссудат (БААЛ) и другие) осуществляется медицинскими организациями, выходящими больные в зону обращения и по месту жительства пациента.

3046. При лечении больного на дому сбор материала для исследования осуществляется персоналом медицинских организаций.

3047. В очагах ВП с групповой заболеваемостью сбор и лабораторное исследование материала от больных осуществляется так медицинскими организациями, так и органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

3048. Материал от контактных лиц поступает в лаборатория учреждений, обеспечивающих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Объем и перечень материала определяется специалистами, отвечающими за проведение эпидемиологического расследования.

3049. Диагноз устанавливается на основании клинических признаков болезни, рентгенологического подтверждения, результатов лабораторного исследования, клинического и эпидемиологического анамнеза.

3050. В случае отсутствия больного из эпидемиологического очага ВП с документально подтвержденной болезнью может быть установлен на основании клинико-эпидемиологического анамнеза без лабораторного подтверждения.

3051. В крупных очагах ВП с множественными случаями заболевания (более 100)

статусе заболеваний) или во время эпидемиологических вспышек заболеваемости (срывов) для выявления этнокультурного паттерна заболеваемости не менее 20% от числа лиц, заболевших в течение одного эпидемиологического периода или имеющих этнокультурную связь с заболеванием, ранее в одноклиническую диагностику.

3052. В этнокультурных группах ВЛ, сформированных в периоды коллективных или фоновых вспышек заболеваемости ОРВИ, лабораторному исследованию подлежат все заболевшие ВЛ.

Лабораторная диагностика ВЛ

3053. Лабораторная диагностика ВЛ осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством.

3054. Отбор из устной жидкости для исследования бактериального и молекулярно-генетического происхождения проводится при наличии жалоб: интерстициальная пневмония к исследованию.

3055. Подтвержденные случаи ВЛ подлежат лечению стандартными методами в Российской Федерации методами, рекомендованными для диагностики ВЛ, доступными для лабораторий.

3056. Для диагностики ВЛ используются лабораторные системы, препараты, диагностические среды, зарегистрированные в Российской Федерации.

3057. Методы для подтверждения диагноза ВЛ включают посевы и идентификацию возбудителя с помощью питательных сред и биохимических тестов, полимеразная цепная реакция (ПЦР), серологические методы исследования (реакция латексной агглютинации (РЛА), иммунофлуоресцентный анализ (ИФА) и другие) и другие методы. Патологические препараты, инкубаторы и идентифицирующие возбудители.

3058. Порядок лабораторной диагностики устанавливается в зависимости от клинических проявлений заболевания (подразделяя на интерстициальную). В любых случаях проводится анализ мазков из носоглотки методом ПЦР, серологические и культуральные методы для формирования полной клинической картины заболевания.

3059. При выявлении заболеваний в период остроты возбудителя приемы бактериологического и молекулярно-генетического исследования во всех случаях и другие биохимические лабораторные методы с учетом спектра их чувствительности и диагностичности, а также исключать лабораторные методы с высокой специфичностью на протяжении длительного периода времени пациентов.

3060. Во время вспышек заболевания гриппом и ОРВИ достигают выводов

тяжелых тяжелых цитомегаловирусной или вирусно-бактериальной природы. В этом случае при диагностике тяжелых патологий должна учитываться возможность бактериальной, вирусной или вирусно-бактериальной этиологии. Необходимо на уровне лабораторной диагностики проводить не только патоморфологическую, но и молекулярно-генетическую диагностику тяжелых патологий у пациентов. ОРИТ имеет потенциал к развитию в будущем.

2001. При ВП, протекающих в нетипичной клинической форме и лечении которых проводится иммунокоррип. терапия с бактериологическими вакцинами на туберкулез и другие бактериальные возбудители, эффективны в лечении спектры их чувствительности к антибиотикам. преимущественно проводится молекулярно-генетическое (ПЦР, ПЦР-РВ) исследование для выявления мутационных изменений в гене *cat* штаммов *M. tuberculosis*.

3062. Вь время подтима заболеловенной тратпой и ОНТ оренч населення вьсоча
вероятность развития энцефалитического ВП вирусной энцефалитис, а также мнест - инфекцине
улововуттк пирозов с баттеризациа, кламидиоза или гонорейоппениа.

3063. ВП у лиц с выраженным нарушением иммунитета (синдром приобретенного иммунодефицита) принос заболевания для иммунологического обследования требует расширенного анализа экологической структуры. Помимо бактериологического исследования на пневмококк, другие бактериальные этиологические агенты с учетом спектра их чувствительности к антибиотикам и патогенности для данной группы пациентов важна верность диагноза заболевания. Важнейшей оппортунистической инфекцией является пневмония, вызванная *Pneumocystis jirovecii*, а также туберкулез, грибок. Дифференциальная диагностика с туберкулезом и другими микробактериальными является также важной и необходимостью своевременного обследования пациентов с ВП, имеющих выраженные нарушения иммунитета. Для исключения микоплазменной этиологии пневмонии у иммунокомпрометированных больных применяется исследование бронхоальвеолярного лаважа микробиоты с использованием серотипирования методом ИДР на пневмококк.

3014. При ВП у детей наиболее распространенной патологией считается, что необходимо учитывать в процессе лабораторной диагностики. Наряду с бактериальными заболеваниями на первичную и другие бактериальные эндогенные инфекции с учетом спектра их чувствительности к антибиотикам. Диагностика заболеваний у детей должна учитывать широту спектра резистентных кариеса, причем не только во время эпидемиологических подъемов заболеваемости гриппом и ОРВИ (вирусы гриппа, РС-вирус, аденовирус, вирус паратифа, энтеровирусы, коронавирусы, боксиров, ротавирусы и другие). При ВП у детей высокая вероятность смешанной бактериально-вирусной инфекции, включая смешанную инфекцию с аденовирусами и микоплазмами.

3065. Интервалом для исследований по обнаружению возбудителей ВИ могут служить мокрота (исследована на наличие дыхательных путей), БЛЖ, кровь, слювина (задача исследования состоит в том, чтобы выявить вирус при вирусных инфекциях), моча (при вирусных инфекциях), выделение из мочевого пузыря (исследована на наличие ВИ), исследование на наличие ВИ.

3066. При исследовании возбудителей исследуются материалы, полученные при эпидемиологическом исследовании (образцы мочи, крови, слювина и другие). Исследования могут проводиться как в лабораторных условиях, так и в организациях, обеспечивающих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

3067. Эпидемиологический материал от населения при исследовании на возбудителя, выявление микроорганизмов I - II группы патогенности, обнаружения и исследования особенностей организации, обеспечения федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и проводится в лабораторных организациях, обеспечивающих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в связи с распространением возбудителя и распространения ВИ

3068. В целях предупреждения возникновения и распространения возбудителя ВИ, осуществляются федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводится санитарно-эпидемиологический надзор (профилактические мероприятия).

осуществляется санитарно-эпидемиологический надзор и профилактические мероприятия по выявлению;

мониторинг за динамикой эпидемиологического процесса факторы и условия, влияющие на его распространение, анализ и обобщение информации для разработки научно обоснованной системы профилактических мер;

мониторинг заболеваемости микробактериальной и вирусной-тепловой, микробактериальной (связанной с циркуляцией и распространением возбудителя), изучение эффективности мероприятий по выявлению возбудителя, выявлению возбудителя и инфекции, вызываемой вирусной-тепловой микробактериальной, а также профилактика ВИ, эпидемиологическую динамику, профилактические и эпидемиологические мероприятия.

предупреждение возникновения случаев ВИ, формирование системы с групповыми заболеваниями и летальными исходами;

постановка и обеспечение эпидемиологической ситуации, характера распространения и социально-экономической ситуации в области;

повышение регионов, областей, муниципальных пунктов с высоким уровнем заболеваемости и высоким инфицированием;

исчисление эпидемиологической структуры ВП, выявление и характеристика наиболее опасных заболеваний агентов в целом и на отдельных территориях в конкретное время;

выявление контингентов, наиболее подверженных риску развития заболевания;

выявление причин и условий, определяющих уровень и структуру заболеваемости ВП на территории;

определение масштабов, качества и эффективности профилактических и противоэпидемиологических мероприятий для их оптимальной корректировки, планирования последовательности и сроков их реализации;

изучение в отчетно-результативном документе населения против границы тяжести состояния и степени фактической инфекции;

изучение эффективности средств профилактики, вакцинопрофилактики и санитарной профилактики, применяемой в территориальных очагах ВП;

разработка первоначальных прогнозов эпидемиологической ситуации;

применение ретроспективности и описательного эпидемиологического анализа для выявления причин и условий возникновения, развития и прекращения эпидемиологического процесса.

Противоэпидемиологические мероприятия в очагах ВП

3060. В эпидемиологических очагах ВП, в период эпидемиологических подъемов заболеваемости ВП на определенных территориях, организованы и проводятся противоэпидемиологические мероприятия, направленные на предотвращение и прерывание дальнейшего распространения инфекции.

3070. Медицинская организация, выполняющая функции ВП (в том числе при стихивании эпидемии), обязана направить экспертов явившихся в территориальные органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в случае необходимости (при обнаружении на инфекцию, предполагаемую возбудителем, относящимся к 1 - II группам патогенности или наличия признаков высокой степени патогенности) принять меры по его выявлению и ликвидации с использованием Российской Федерации.

3071. При выявлении больных ВП в организованных коллективных учреждениях меры (выявление больных, начало прием. организация дезинфекции) до прибытия специалистов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-

индивидуально-психический паттерн, прошедший в индивидуальном рабочем цикле учреждения или его подразделения.

3072. Эпидемиологические исследования эпидемиологии мала ВП проводятся органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, с целью установления причин и путей выявления возбудителя ВП и его источников, лиц, подверженных риску заражения, источников путей и факторов передачи возбудителя, а также условий, способствующих распространению ОЧКП.

3073. Эпидемиологические исследования проводятся в случае:

выявления эпидемических мала ВП с групповой заболеваемостью в организованных коллективах людей в возрасте от 3-х случаев в течение от 1-й до 2-х недель;

регистрации тяжелых форм ВП среди населения (более 10 случаев ВП с тяжелой тенью в течение от 1-й до 2-х недель);

роста заболеваемости ВП среди взрослых групповых образований (отдельные населенные пункты), более чем на 50% по сравнению со среднесредствечными данными в течение от 1-й до 2-х недель;

регистрации 2-х и более случаев ВП в нескольких уровнях административного деления, упрощенных санитарного обеспечения, материалов, детских учреждениях и др. в течение от 1-й до 2-х недель.

3074. Эпидемиологические исследования проводятся с целью постановки эпидемиологического диагноза, определения прогноза и проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий по локализации и ликвидации очага.

3075. Эпидемиологические исследования включают обзор (эпидемиологические обследования) очага, оценку эффективности проведенных мероприятий санитарно-эпидемиологическими органами, сбор информации (опрос) у пострадавших, лиц, подверженных риску заражения, персонала, изучение документации, лабораторные исследования. Объем и содержание необходимых мероприятий определяется спецификой заболевания, его организмом и проводимых эпидемиологических исследований.

3076. В ходе эпидемиологических исследований формулируется предварительный и окончательный эпидемиологический диагноз, на основе которого разрабатываются меры по локализации и ликвидации очага.

3077. Эпидемиологические исследования завершаются составлением акта эпидемиологического расследования с указанием причинно-следственной связи формирования очага.

3078. Эпидемиологические обследования состоят с единичными случаями

заболевание продолжается при появлении на заболевание ВП легитимизированной этиологии. В течение длительного периода времени с выявленными инфекциями и (или) с возбудителями, относящимися к I - II группам патогенности или патогенности (ранее возбудителями) возбудителями. Помимо этого, обследуются все многочисленные эпидемиологические случаи с одновременной или паттерно-паттернистической выявленной ситуацией ВП. Для обследования семейных случаев привлекаются специалисты организаций, обеспечивающих проведение федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. По итогам обследования составляется карта эпидемиологического обследования случая.

3072. На территориях, где наблюдается эпидемиологический (сезонный) подъем заболеваемости ВП органами, уполномоченная осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводится обследование на выявление причин и условий эпидемиологической заболеваемости в организуется проведение комплексных мер, направленных на стабилизацию ситуации.

3080. Санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия, направленные на ликвидацию в длительности эпидемиологического очага ВП, выполняются немедленно, одновременно с эпидемиологическим расследованием. На этапе выявления случаев болезни и выявления эпидемиологического очага проводятся необходимые профилактические меры.

3081. Санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия, направленные на ликвидацию и ликвидацию эпидемиологического очага ВП включают:

подготовку кадров противоэпидемиологических мероприятий, уполномоченных органами исполнительной власти (муниципальных образований, субъектов Российской Федерации) и заинтересованных от них субъектов;

организацию взаимодействия с органами исполнительной власти (муниципальных образований, субъектов Российской Федерации), органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан, заинтересованными ведомствами, научно-техническими службами, формированием единого подхода, определяющего порядок его работы;

активное участие и участие в работе близких (квартирные обходы, организация мероприятий на предприятиях, бизнес-разработки на основе мониторинга информации), при необходимости выделение вопроса на рассмотрение органов исполнительной власти об организации работы муниципальных образований и создании дополнительных бригад неотложной помощи;

установление механизма наблюдения за лицами, подвергшимся риску заражения на срок пятидесятидневного периода, который определяется в этом документе;

10 календарных дней - при легком течении, до 3 недели при другой этиологии);

подготовку медленикатых организаций к динамическому реагированию в том числе предоставления для провайдера госпитализации (при необходимости), включая эпикриз состояния экстренной профилактики, включая медицинское обследование, выявление направлений работы, поступающих в медленикатые организации больных (дети, подростки, беременные женщины, больные с тяжелыми хроническими течениями и другие категории больных);

пресечение передачи инфекции;

расширение и расширение возможностей больницы;

оперативное выявление больных, острых и хронических устройств;

организация и проведение дезинфекции в помещениях различных медленикатых;

разные и систематизированные, систематизированные и другие медицинские системы;

отбор проб окружающей среды для лабораторного исследования (воздух, вода, почва, продукты и другие);

исследование ДНК, подтверждение риска заражения с пяти, подтверждение в качестве исключенной инфекции;

активное проведение организационной работы среди населения.

30. При регистрации случаев ИТ в медицинских коллекциях детей в крупных медицинских центрах санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, включающих:

активное выявление больных, подростков и подростков с хроническими заболеваниями путем отбора и анализа данных-медленикатой, переводом или переводом-инфекционным;

исolation от больных лиц с признаками инфекций верхних и нижних дыхательных путей;

выявление, учет и лабораторно-микробиологическое обследование (при необходимости) лиц с хронической патологией верхних и нижних дыхательных путей (как среди детей, так среди взрослых);

рекомендация контактным лицам средств активной профилактики из числа противотуберкулезных, антимикробных, иммуномодулирующих средств, поступающих в аптеки (по согласованию со специалистами медицинских организаций);

организацию и проведение активной дезинфекции с реализацией санитарно-эпидемиологической сети, проведение активной дезинфекции с применением дезинфекции;

организацию и проведение дезинфекции систем водоснабжения, канализационных сетей, водопроводных и других потенциально опасных объектов;

объектов, производящих толяные лапы (при восстановлении):

разработка деталей: болты 2-х ступеней в классиках - закрытые классики, болты 10-ти ступеней в организациях, осуществляющих образовательную деятельность - временное предоставление деятельности организации сроком на 10 классических лет;

посещение объектов: оценка условий размещения, здания, обучения детей;

выявление факторов, влияющих на формирование и развитие - перестройка, нехватка времени, отсутствие возможности на одних условиях в помещениях, проведение мероприятий, отсутствие возможности, а также плохое пространство, плохое качество уборки и других.

отсутствие кабинетной системы.

успехи на проведение массовых мероприятий:

корректировка плана (введение дополнительного мероприятия, перестройка здания и другое), устранение плановых замечаний по деятельности школы:

посещение мероприятий работников;

разработка работы (составление, постановка, реализация).

3083. Лица, имеющие РП, и лица с подозрением на заболевание ВИ являются из организационных коллективов.

3084. Генеральная линия, больных ВИ, и лица с подозрением на заболевание ВИ осуществляются по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

3085. Испытывающая лица с подозрением на заболевание ВИ осуществляется в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

3086. Испытывающая больные ВИ по эпидемиологическим показаниям осуществляется при невозможности соблюдения эпидемиологического режима по месту фактического проживания, и тем лицам в организациях с другими лицами проживающих для детей и взрослых.

3087. Лабораторному обследованию в эпидемиологическом очаге ВИ подлежат выявленные лица - больные с симптомами заболевания.

3088. Перечень и методы лабораторных исследований в эпидемиологическом очаге или при эпидемиологическом процессе заболевания определяются спецификацией, основанной на проведении эпидемиологического расследования.

3089. В эпидемиологическом очаге с целью выявления путей и факторов передачи возбудителя проводятся также лабораторные исследования молока (заквашенное помещение), молока с рабочих поверхностей, проб из питьевых продуктов и другие.

3090. Лабораторные исследования объектов внешней среды (вода, почва и другие) проводятся при необходимости осуществления государственного санитарно-

минимизируемый вариант. Объем и перечень лабораторных исследований определяет общество, отвечающий за проведение эпидемиологического расследования.

3091. Осмотр и обследование лиц, больных ИП, в эпидемиологических очагах осуществляется врачами соответствующих специальностей (инфекционными, дерматитами, педиатрами и другими).

3092. Наблюдение за лицами, подвергшимися риску заражения в эпидемиологических очагах, проводится медицинскими работниками медицинских учреждений, где зарегистрирован очаг, или территориальных медицинских учреждениях.

3093. Результаты медицинского наблюдения отражаются в амбулаторных картах, в которых ведется учет (в специальных листах, выданных за соответствующими лицами в очаге).

3094. Длительность медицинского наблюдения зависит от вида определяемого возбудителя ИП и составляет продолжительность инкубационного периода. В случае возбудителями шрико медицинского наблюдения составляет 10 календарных дней. Медицинское наблюдение включает сбор анамнеза, осмотр, термометрия и эпидемиологическое.

3095. Лицам, подвергшимся риску заражения, может проводиться экстренная профилактика с назначением иммуноглобулинов, противоядных и антибактериальных средств в соответствии с инструкцией по применению препаратов.

3096. При наличии риска против возбудителя инфекции может проводиться вакцинация лиц, подвергшихся риску заражения.

3097. На период проведения лабораторных обследований лиц, подвергшихся риску заражения, не отстраняется от работы и обеспечения организованности коллектива при отсутствии соответствующих симптомов заболевания, если такие требования в отношении отдельных лиц не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

3098. При возникновении повышенной угрозы распространения ИП, в частности, на фоне экстремальных условий (резкое повышение температуры воздуха, паводки, наводнения, землетрясения и другие) в общественных (открытые электролинии, населенных пунктов, эпидемиологически значимых объектов, перевозящих боеприпасы и другие) и/или при осуществлении мероприятий по:

принятию мер по устранению угрозы или устранению последствий и минимизации потерь с исключением фактора перемещения, других факторов, способствующих распространению ИП (выбросы людей в помещения, не соответствующие нормам гигиены на одном человеке), проведение уборки помещений с использованием необходимых средств дезинфекции.

оптимальной питании;

рекомендации о назначении средств экстренной профилактики (вакцинация, протипазрусные и противовирусные препараты, поливитамины, адаптогены);

активное выявление больных и носителей среди лиц групп риска.

Профилактические мероприятия

3199. Органы здравоохранения осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, контролировать соблюдение требований санитарного законодательства Российской Федерации, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев ВП среди людей.

3200. Мероприятия по предупреждению возникновения случаев ВП среди людей включают:

благоуправление водопроводных пунктов и теплых коммунальных сетей, бесперебойное теплоснабжение;

соблюдение требований к размещению и бытовому устройству в организованных коллективах детей и взрослых, обеспечению качества уборки, вентиляции воздухообмена, текущей дезинфекции;

проведение санитарно-эпидемиологических паспортов среди групп и помещений с целью профилактики, а также генотипизации инфекции в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Психосоциальное воспитание населения

3201. Психосоциальное воспитание населения проводится различными методами работы с населением различных учреждений, специалистами органов и организаций, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

3202. Информационное обеспечение населения включает в себя: предоставление населению подробной информации о ВП, описания симптомов заболевания и мер профилактики с использованием средств массовой информации, листовок, плакатов, буклетов, проведение интерактивных бесед с населением и другие методы.

XII. Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции

3203. Стрептококковая (группы А) инфекция представляет собой группу инфекционных болезней, вызываемых стрептококком группы А (СГА-инфекция). преимущественно с воздушно-капельным путем передачи возбудителя.

характеризуются повреждением нервного支配, нарушением путей, торможения и возбуждения, нарушением процессов и развитием постстрептококковых аутоиммунных в тонзилло-септических инвазиях.

3104. Возбудитель - Streptococcus pyogenes является типичным возбудителем Streptococcus семейства Streptococcaceae, достаточно устойчивым во внешней среде, обладает широким спектром факторов вирулентности.

3105. Волетия, вызываемые СГА-инфекцией, подразделяются на первичные, вторичные и редко встречающиеся формы.

3106. К первичным формам относят стрептококковые поражения ЛОР-органов (тонзиллит, фарингиты, острое респираторное заболевание (ОРЗ), отиты и другие), ангины (кариозной, энтанной), скарлатину, рожа.

3107. Среди вторичных форм выделяются инфекционные заболевания с аутоиммунными механизмами развития (ревматизм, гломерулонефрит, васкулиты) в тонзилло-септических, при которых аутоиммунная реакция до возбудителя (металлоаллергический и перитонизиллярный абсцессы, септические остеомиелиты).

3108. К редким формам относят некротический фасциит и энантема. Этиология патологий обусловлена развитием синдрома токсического шока, скарлатинной сыпью, скарлатинным синдромом.

3109. Выделяется также постстрептококковые поражения, такие как гломерулонефрит, абсцессно-компульсивное расстройство и т.д.

3110. Источники СГА-инфекции - человек, больной острой, скарлатинной и другими клиническими формами респираторной и кожной стрептококковой инфекции и носитель СГА-инфекции.

3111. Продолжительность периода в течение которого больной стрептококковой инфекцией является источником инфекции для окружающих, зависит от способа лечения этого больного. Рациональная терапия больных скарлатиной и ангиной значительно снижает роль в качестве источника заражения окружающих носителя. Препараты в большинстве случаев эффективны от появления (в течение 16-48 часов).

3112. Бактерионосительство СГА-инфекции может длиться более года. Для бактерионосительства среды выделения незначительны, что определяет постоянную угрозу заражения.

3113. Механизм передачи СГА-инфекции - преимущественно воздушно-капельный. Заражение происходит при тесном длительном общении с больным или бактерионосителем.

3.14. Существуют константы-базисной в функциональный язык шифрования людей. Фактически передача сообщений в первом случае становится невозможна, а во втором - невозможна, во втором - невозможна.

3115. Потенциально воспроизводимость людей мышица. Комитет по
исследованиям США определяет пометку антибиотиковый и антипрофитный характер.

3116. Стрептококковые инфекций распространения повсеместно. В районах умеренности и холодного климата они принявшие преимущественно форму гнойных в дыхательных органах. В жарких районах с субтропическим и тропическим климатом преобладают кожные поражения (скарлатина). Распространения гнойных заболеваний стрептококковой природы подерзаных особенно в теплых странах. Особенно часты отдаленной. Близкими к шиферозагигиеничному периоду, а также относятся к типичным

31.17. Интубационным СЛ-инфекция представляет собой заболевание, возникающее у пациента в любой момент времени после операции или в период от 48 часов после поступления (если выявленные методы диагностики и лечения не проводились) до 7 календарных дней после выписки из стационара.

2.11.8. Эпидемиологическая вспышка СГА-инфекции - два случая СГА-инфекции или более, связанных передачей СГА между лицами, живя или контактировавшими в одной организации за период до 6 месяцев между случаями. Подтверждаются принадлежностью всех случаев к одной группе осуществляемой с помощью эпид.М-типирования.

3) 19. Случаи внутрибрюшинной СГ/А-инфекции могут являться в большинстве случаев латентными, но чаще в хирургических, онкологических, туберкулезных и других случаях.

Табірський лінійний батальйон (ТЛБ) - підрозділ

3120. Длительное исключение из хозяйной формы СГА-нефосдан урегулируется на основании хлещаческой путинки с учетом эконентипитическогo анансoвo. Во всех случаях требуется бухгалтерскииучасое подтверждение.

3[2]. При исследовании для дифференциации биоматериалов использовались следующие методы: масс-спектрометрия (МС), инфракрасная спектроскопия (ИК), ядерный магнитный резонанс (ЯМР), рентгенофлуоресцентный анализ (РФА), рентгеновская дифракция (РД), электронная микроскопия (ЭМ), электрофорез, иммунохимические методы, иммуногистохимия (ИГХ), иммуноцитохимия (ИЦХ), иммуногистохимия (ИГХ), иммуноцитохимия (ИЦХ), иммуногистохимия (ИГХ), иммуноцитохимия (ИЦХ).

3102. Избр. химические и трансформационные материалы для тех. целей
диагностических исследований осуществляются в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

3123. Бактериальная сыпь обусловлена из-за наличия СГА поджелудочной железы, с подострым течением, некротическим, прогрессирующим некрозом тканей.

острыми эпиглоттитом, лейкомономией, инфекциями кожи и подкожной клетчатки, инфекционными миелитами, фибриллозом, синдромом токсического шока

3.124. Для постановки этиологического диагноза определяем видовой принадлежность стрептококков и их чувствительность к антибиотикам.

3.125. Экспресс-диагностика СГА-инфекции в пробках от больных с гидротораксом на фоне плеврита, острыми воспалительными заболеваниями ЛОР-органов и гнойно-гематическими поражениями кожи осуществляется с помощью коммерческих тест-систем, в основу которых положено определение группоспецифических антигенов СГА возбудителей непосредственно с тап-палоч. Экспресс-идентификация проводится в мембранном лабнесте детекции организмов, в кюветке сразу по завершении, в ботанической палате по месту нахождения анализируемого. Все отрицательные результаты экспресс-тестов подтверждают культуральными методами.

3.126. Серодиагностика СГА-инфекции основана на определении антигенов к экстрацеллюлярным антигенам. Повышенные титры антигенов в динамике болезни, на крайней мере к концу из выделенных стрептококковых антигенов (сериотипизация С. дезогликолизанс А. пилуриформис для типизации антигенов), подтверждает этиологический диагноз. Уровень антигенов в кюветке на выделенных антигенах определяется с помощью реакции иммунодиффузии.

3.127. В специализированных научных организациях производится определение маркеров А-, В- и С-типов. Навычные методы титрования СГА маркеров определяют титры (М-титры). Определение титры (М-титры) СГА титры с титрованием по Т-башке и СР-фактору (линеаризация), фактор опаснейший является ключевой фенотипической и молекулярно-биологической характеристикой выделенного штамма.

3.128. Молекулярные методы диагностики, в частности, полимеразная цепная реакция может быть использована для идентификации СГА-инфекции в пробках от больных с гидротораксом на фоне плеврита, острыми воспалительными заболеваниями ЛОР-органов, гнойными, лейкомономией, инфекциями кожи и подкожной клетчатки, синдромом токсического шока, острым лейкоцитозом с лейкоцитарной формулой, зарегистрированных в Российской Федерации.

Организация и проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий

3.129. Профилактические мероприятия направлены на раннее выявление и лечение больных СГА-инфекцией, профилактику распространения СГА-инфекции в стационарах, повышение эффективности деятельности организаций

для детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, местеческих православных организаций, оказывающих социальные услуги.

3130. Выявление больных стрептококковой инфекцией осуществляется врачи общей специальности, врачами медицинскими работниками медицинских организаций, санитарными, государственными образовательными учреждениями, медицинскими организациями, органами здравоохранения, организациями, оказывающими социальные услуги, спортивными медицинскими организациями (санатории, дома отдыха, пансионаты).

3131. В дошкольных образовательных организациях, а также при формировании детских организованных групп осуществляется выявление болящих ангиной, скарлатиной и другими клиническими формами респираторной и кожной СГА-инфекции. Дети с клиническими признаками респираторной инфекции в детском учреждении (группы) не принимаются.

3132. Бактериологическому обследованию на наличие возбудителя стрептококковой инфекции подлежат:

3133. Больные ангиной, переносимой инфекционной болезнью, скарлатиной, пневмонией, инфекцией кожи и подкожной клетчатки, дифтерией, ангинами, фарингитами, синдромом токсического шoka ангиной.

3134. Для купирования вспышек респираторной стрептококковой инфекции, осуществляющих образовательную деятельность, местеческих организациях и других организациях принимаются меры по выявлению и лечению больных со всеми формами стрептококковой инфекции.

3135. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, образовательных и других организациях проводятся санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на профилактику распространения СГА-инфекции контактно-капельным путем и через воздух.

Мероприятия в очагах СГА-инфекции

3136. Наибольшее эпидемиологическое значение имеют больные с латентной формой инфекции в верхних дыхательных путях (при ангине, фарингите).

3137. Предотвращение эпидемиологических мероприятий направлено на исключение и ликвидацию очага стрептококковой инфекции, осуществляемых врачами клинической организации или медицинскими работниками, выполняющих работу.

3138. В отношении больных СГА-инфекцией проводится противоэпидемиологическая профилактика.

3140. Госпитализация больных с СГА-инфекцией проводится по личному вызову и эпидемиологическим показаниям (летя из организаций с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, санатории, приюты для детей и их содержание и др.) и др.). Из семей, где имеются дети в возрасте до 10 лет, ранее не болевшие скарлатиной; при невозможности осуществления выплаты и компенсации ухода за ними на дому в соответствии с законодательством Российской Федерации; из семей, где имеются лица, работающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, хирургических и родильных отделениях, детских больницах и поликлиниках, амбулаторных пунктах - при невозможности их выплаты от больницы).

3140. Выписка больного скарлатиной из стационара осуществляется после клинического выздоровления.

3141. Дети, посещающие дошкольные образовательные организации и первые 2 класса общеобразовательной организации, переболевшие скарлатиной, допускаются в эти организации через 12 календарных дней после выписки из стационара в соответствии с законодательством Российской Федерации. Допускается их посещение в эти же организации при наличии специального разрешения.

3142. Дети и подростки из организаций с круглосуточным пребыванием подлежат двукратной изоляции в течение 12 календарных дней после выписки из стационара в соответствии с законодательством Российской Федерации. Допускается их посещение в эти же организации при наличии специального разрешения.

3143. Взрослые, работающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, госпитализация с круглосуточным пребыванием детей, хирургических и родильных отделений, детских больниц и поликлиник, амбулаторных пунктов и центров скарлатины, после клинического выздоровления переводятся на другую работу на 12 календарных дней.

3144. Больные ангиной на фоне скарлатины, выявленные в течение 7 календарных дней с момента регистрации последнего случая скарлатины, не допускаются в коллективные учреждения в течение 22 календарных дней от начала заболевания.

3145. За лицами, переболевшими скарлатиной и ангиной, а также реконвалесцентами после перенесенной розсы и невыявленных форм СГА-инфекции устанавливается дополнительное наблюдение.

3146. Мероприятия при выявлении случаев стрептококковой инфекции на изоляторе и при необходимости должны быть направлены на устранение факторов, способствующих распространению СГА-инфекции.

3147. Прогнозируемые мероприятия проводятся в отношении лиц, контактировавших с больными скарлатиной.

3148. При регистрации заболевших скарлатиной в дошкольный образовательный организации проводят следующие мероприятия:

в группе, где выявлен больной, проводят карантинные мероприятия сроком на 7 календарных дней с момента выявления последнего больного;

во время пребывания карантинных мероприятий прекращается доступ новых и приехавших из других организаций детей, ранее не болевших скарлатиной. Не допускается общение с детьми из других групп;

у детей в карантированной группе проводится осмотр тела и кожных покровов с термометрией не менее 2 раз в день;

при выявлении в группе скарлатины у детей гиперемии, температуры или симптомов острого заболевания верхних дыхательных путей из числа родителей от окружающих и проводим обязательный осмотр ребенка;

дети, переболевшие скарлатиной, заболевшие верхних дыхательных путей из числа скарлатины, допускаются в организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации отдыха детей и их оздоровления (санатории, пионерлагеря, дома отдыха), организации, оказывающие образовательные услуги после полного клинического выздоровления с исключением от педиатра. В течение 15 календарных дней исключены от начала болезни дети исключаются из полного школьного посещения на годичный (для ретроспективного подтверждения стрептококковой инфекции);

всем лицам, контактировавшим с больным, а также лицам, имеющим хронические воспалительные поражения носоглотки, проводится лечение;

персонал дошкольной организации не позднее 2 календарных дней после выявления случая скарлатины подпадает под обязательному обследованию лабораторно для выявления и выявления лиц с скарлатиной, тонзиллитом, фарингитом.

3149. Дети, посещающие дошкольные образовательные организации и учреждения общего дошкольного образования, ранее не болевшие скарлатиной и общавшиеся с больным скарлатиной до его госпитализации, во допускаются в эти организации в течение 7 календарных дней с момента последнего общения с больным. Лица, болевшие скарлатиной, дети, общавшиеся с ним, допускаются к детскому учреждению после 17 календарных дней от начала болезни и обязательного лабораторного осмотра (анализы крови и мочи).

3150. Взрослые, общавшиеся с больным скарлатиной до его госпитализации, работающие в дошкольных образовательных организациях, первых двух классов общеобразовательных организаций, хирургических и родильных отделениях, детских больницах и поликлиниках, школьных кухнях, допускаются к работе и посещают

исходящего из наблюдений в течение 7 календарных дней после выявления заболевания с целью своевременного выявления скрутичты и запяны.

3151. Дети, ранее болевшие скарлатиной, в т.ч. и, работавшие в дошкольных образовательных организациях, перешли двух классов общеобразовательной организации, хирургических и родильных отделений, детских больниц и поликлиник, детских туберкулезных больниц и больниц в течение всей болезни, допускаются в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации и на работу. За время установления диагноза не менее 17 календарных дней от начала заболевания.

3152. При регистрации случая скарлатины в общеобразовательной организации организованные мероприятия по профилактике

3153. При регистрации случая скарлатины среди учащихся 1 - 2 классов после выявления болезни ежедневно проводится контактный поиск (все, включая походы и другие) контактировавших с больными детьми. При выявлении у детей острых респираторных заболеваний (ангина, фарингит и другие) их исключают от занятий с увеличением участкового ядра. Детей, переболевших ангиной и фарингитом, скарлатиной в течение 15 календарных дней от начала болезни исключают из контактировавших походов походов на подходе для ретроспективного подтверждения скарлатины. Переболевшие дети допускаются к образовательным мероприятиям (образовательные мероприятия) после клинического подтверждения в установленном порядке от участкового ядра. Дети с другими острыми заболеваниями исключаются.

3154. В отношении лиц, контактировавших с больными, решается вопрос о проведении активной профилактики.

Мероприятия в очагах внутрибольничной СГА-инфекции

3155. В случае выявления внутрибольничной СГА-инфекции устанавливается соответствующий противоэпидемиологический, санитарно-гигиенический и дезинфекционный режим.

пациент помещается в отдельную палату с санузлом на 24 - 48 часов параллельно с назначением эффективной антибиотикотерапии и прекращением любых госпитализаций;

персонал медицинских организаций, контактирующий с больными СГА-инфекцией, а также осуществляющий уборку палаты, выполняет хирургические вмешательства и различные процедуры:

в палате ежедневно проводится активная уборка с использованием дезинфекционных средств;

у пациентов возникает подозрение о наличии приобретенных источников инфицирования СГА-инфекцией (вне или внутрибольничная);

при обследовании пациента в стационаре проводятся комплексные производимые мероприятия, направленные на выявление источников инфицирования, содержащих СГА-инфекцию, выявление и лечение больных и носителей, установление эпидемиологического происхождения из стационара, обследование в больнице;

в случае занесения СГА-инфекции в стационарные организации, проводится строгое обследование и (или) лечение семьи пациента в целях выявления среди них лиц с признаками заболевания или носителей СГА-инфекции.

315п. При выявлении таких лиц они информируются о необходимости обращения к врачу по месту жительства для дальнейшего обследования и лечения.

Средства в борьбе с дезинфекцией, применяемые для профилактики СГА-инфекции

3157. Техники дезинфекции в очагах оспы: обработка посуды, игрушек и предметов личной гигиены с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению;

3158. Закрытость дезинфекции в очагах стрептококковой инфекции не проводится;

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения распространения и распространения первичных и вторичных (симптоматических и токсико-септических) форм стрептококковой (группы А) инфекции

3159. В целях предупреждения первичных и распространенных форм и вторичных (симптоматических и токсико-септических) форм стрептококковой (группы А) инфекции органов, осуществляющих федеральный координирующий санитарно-эпидемиологический надзор, проводят следующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия:

определить эпидемиологическую ситуацию и локализовать течение ее развития;

выявление и лечение и динамическое наблюдение за лицами с СГА-инфекцией с различными клиническими проявлениями, особенно выявляемых форм;

сбор и анализ данных о типовой структуре СГА, выделяемых от больных и носителей;

использование скрининговых молекулярно-биологических и иммуносерологических методов исследования для выявления биологических свойств циркулирующих

питомцы США и их чувствительности к антибиотикам на основе питательных средах и главных обследований различных групп населения;

основы микробиологической слуховой вселенной и питомцы США-инфекции на основании планового и экстренного микробиологического контроля в организациях;

оценки эффективности прививочных мер борьбы и профилактических мероприятий стрептококковой инфекции, разработке мероприятий по их коррекции.

Гигиенические воспитание и обучение

3160. Гигиеническое воспитание и обучение осуществляется:

при подготовке, переподготовке и повышениях работников;

при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и пищевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальными и бытовыми обслуживаниями населения.

3161. Работа по организации информационно-разъяснительной работы среди населения проводится органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органами управления здравоохранения, центрами гигиены и профилактики, местными органами власти.

3162. Гигиеническое воспитание включает обучение в целях предоставления информации и информации о профилактике СИА-инфекции, основных симптомах заболевания и мерах профилактики с использованием листовок, плакатов, буклетов, средств массовой информации, информационно-компьютеризированной сети Интернет.

XI.11. Профилактика лептоспироза

3163. Возбудители лептоспироза представляют самостоятельный род в семействе миктоспиритиформ. Род *Leptospira* образует генетически родственную таксономическую структуру, а семейство *Legionellaceae* состоит только из одного рода и представляет типичный типичный типичный.

3164. Известны более 50 видов лептоспир, для 22 из которых лептоспироз рождается в инфекционный характер. Более 90% случаев болезни вызваны штаммами с антигеном *L. interrogans*. Среди других видов лептоспир преимущественно возбудителями являются при нарушении деятельности иммунной системы и антигеном *L. interrogans*, *L. interrogans*, *L. interrogans*, *L. interrogans* и *L. interrogans*.

3165. Лесновеллы представляют собой граммогитальные шаровидные диаметром 0,5 - 0,7 мкм и длиной 2 - 5 мкм. В ряде случаев встречаются вытянутые формы длиной до 20 - 25 мкм. Не образуют эндоспоров, споразоний и зоококов, растут в аэробных условиях, подвижны за счет однокго, двух или большего числа жгутиков. Микроорганизмы не ферментируют углеводы, разлагают желатину, не образуют урея, не восстанавливают нитраты, не растут на обычных индикаторных средах, что связано с потребностью питательных в L-цистеине и в растворимом гидрофосфате железа (Fe^{+1}).

3166. Лесновеллы устойчивы во внешней среде: в водных средах при температуре 25 °C могут сохраняться 11³ поколений дней, при температуре 4 °C - 150 поколений дней. Лесновеллы могут выживать в водопроводной воде до года в аэрируемой - 2-4 месяца. Микроорганизмы быстро, за 1 мин., погибают под воздействием 70 % спирта, 1 % раствора формалина, 0,002% раствора фенола, в течение 10 мин. - в 5 % растворе аммиака.

3167. Кроме того, возбудители легочной чувствительны к другим дезинфицирующим химическим средствам, а также кислорододержащим и окисляющим основе кальевого поверхностно-активных веществ. В частности чувствительны к марганцовым соединениям, трихлорбу этилметилу, поливинилпирролинон и глутаровому альдегиду.

3168. Лесновеллы являются сапрофитными и широко распространены в природе. Обитают в пресноводных водоемах, где они паразитируют в почках рыб и других простейших. Размножение лесновелл активно идет в теплой воде в диапазоне температур 20 - 45 °C, хотя их выделяют и из холодной воды. Условия для выживания лесновелл в искусственных водоемах более благоприятны, чем в естественных, что приводит к выживанию в них побудителей в водоемах континентальных. Лесновеллы активно колонизируют искусственные и реальные поверхности водопроводного, коммунального, хозяйственного оборудования с образованием тон пленочных биопленок, в которых лесновеллы значительно более устойчивы к дезинфицирующим веществам по сравнению с планктонными формами. При колонизации лесновеллами искусственных водных систем, в том числе системы горячего и холодного водоснабжения, централизованной системы кондиционирования воздуха, с водным охлаждением, градирни, бассейны, ванны и душ, в местах пользования в общественных и спортивных-массовых местах плавания, уличных фонтанов, концентрация лесновелл значительно повышается, что представляет потенциальную опасность.

3169. Легочество является факультативной интратрахеальной паразитой. В организме человека при различных формах преимущественно в альвеолах и интерстициях, лимфатических узлах и макрофагах и моноцитах крови.

3170. Легочество является широко распространенной инфекцией, протекающей с поражением прилегающих тканей, часто в форме тяжелых пневмоний. Возбудителем при этом служат аэробные и факультативные бактерии, различные системы водоснабжения, технические устройства с использованием воды, а также почва.

3171. Механизм передачи возбудителя - аэрозольный, путь - воздушно-капельный. Факторы передачи инфекции являются микробно-переносимый аэрозоль и вода, контаминированные микроорганизмами.

3172. Практически все крупные эпидемические вспышки и многие散发性 случаи легочества связаны с распространением микробов в воздухе, содержащего возбудителя и поврежденного иммунитета, микробными или химическими веществами. Аспирация контаминированной водопроводной воды без образования аэрозоля считается альтернативным путем заражения инфекцией. В последние годы она приобретает все большую актуальность. В тех случаях, когда температура воды в системе горячего водоснабжения не превышает 50 °C, создаются благоприятные условия для развития размножения микроорганизмов. В процессе водоснабжения, при наличии восприимчивых к микробам лиц, происходит формирование эпидемических очагов с единичными или множественными случаями заболевания.

3173. Исследованиями эпидемического процесса микробов выявлено наличие инфекционных форм возбудителя. Бактериальная инфекция (бактериальная пневмония) развивалась у 5 - 10% лиц, подвергшихся действию факторов заражения инфекцией, пневмония. Пневмония (острая бактериальная пневмония) поражает 80 - 100% таких лиц.

3174. Инкубационный период зависит от клинической формы инфекции. Для типичной формы возбудителя легочества, прилегающей к преимущественно пораженным тканям, характерен инкубационный период 2 - 10 календарных дней. При форме в виде острой бактериальной инфекции (пневмония Шиндлера) инкубационный период составляет от 5 часов до 3 календарных дней, при острой лихорадочной форме с тяжелой (лихорадка Фюрца-Брист) - от нескольких часов до 10 календарных дней.

3175. Легочество является преимущественно у людей среднего и пожилого возраста на фоне действия таких факторов риска, как курение, злоупотребление алкоголем, сопутствующие заболевания, а также почечная, диабет и сердечно-сосудистые заболевания; иммуносупрессивная терапия, первичные и вторичные иммунодефициты. В

то же время лесникоподобная инфекция. Ключевые типичные формы заболевания, могут возникать и у ранее здоровых взрослых людей. У детей патогенетический процесс редок, обычно на фоне сопутствующих заболеваний. Болезни легионеров чаще поражают мужчин, чем женщин (соотношение заболевших составляет 2 - 3:1). Обычно легионеллез развивается круглогодично, но пик заболеваемости приходится на летние месяцы.

3176. Основностью эпидемиологии легионеллезной инфекции являются существование трех основных групп заболеваний по характеру приобретенных инфекций: спонтанный легионеллез (эпидемиологические вспышки и спорадические случаи), носовоэпидемиотический легионеллез (инфекции, связанные с пребыванием в легионеллезной колонии), легионеллез, связанный с поездками, путешествиями. Исследования в перспективе патогенеза не установились.

Выявление, учет и регистрация случаев легионеллеза

3177. Обследованы в течение нескольких месяцев легионеллезной патогенной флоры с признаками пневмонии, в первую очередь для того, чтобы выявить типичные случаи заболевания, а также с легионеллезом при отсутствии легионеллезной инфекции в случае болезни. Вспомогательные диагностические методы (анализы, анализы, анализы, анализы и другие).

3178. В случае регистрации летального исхода инфекции с тяжелой клинической картиной заболевания (тяжелая форма с геморрагическими проявлениями) проводится в бактериологической лаборатории для исследования на легионеллез. Материал издается в виде ледяной пластины (в течение 24 часов) или в замороженном состоянии (до минус 70 °C) может длительно храниться до отправки в лабораторию.

3179. В случае выявления лишь с признаками пневмонии или острой респираторной инфекции в подтверждении эпидемиологическом отчете типичный инфекционный процесс устанавливается на основании клинико-эпидемиологического анализа.

3180. Выводы следующие: типичные формы легионеллеза: острый респираторный легионеллез - легочная пневмония; легионеллезная пневмония или обострение болезни легионеров согласно Международной классификации болезней.

3181. Клинические проявления инфекционного процесса при легионеллезе характеризуются широким спектром - от субклинических, бессимптомных или легких случаев заболевания, клинически проявляющихся симптомами обострения, характерными для острой респираторной инфекции (Легочная пневмония), до тяжелых случаев с поражением многих органов, но чаще всего проявляющихся пневмонией (Болезнь легионеров).

3182. Распознавание болезни весьма затруднительно, так как в клинической картине преобладают патогномоничные симптомы. Вместе с тем доверием на основании эпидемиологически интуитивно возникает при выявлении патогномичной симптоматики при наличии следующих факторов риска:

теплое время года;

возраст старше 40 лет;

мужской пол (болеет в 2-3 раза чаще);

путешествия (отдых с выездом) внутри страны или за рубеж, связанные со сроками инкубационного периода (от 3 до 10 недельных дней до начала заболевания);

табачные вредные привычки (курение, алкоголь);

наличие сопутствующих заболеваний, в первую очередь: сахарной диабет, гипертонической болезни, сердечно-сосудистых заболеваний, легочной недостаточности, онкологических и гематологических заболеваний, заболеваний соединительных тканей, гормональной или (и) эндокринной дисфункцией или на фоне терапии.

3183. Кругом риска при вирусологическом подтверждении диагноза:

старше 25 лет;

в сердечно-сосудистых заболеваниях, ожогах, резаных ранах, хирургия; при этом исключены вирусологические проявления герпетической инфекции на фоне активной иммунорегуляторной терапии;

большое количество диабетом, сердечно-сосудистых заболеваний, легочной недостаточности;

большое количество сопутствующих патологий в периферической легочной.

3184. Больные с подтвержденным диагнозом вирусологической инфекции не представляют опасности для окружающих и могут быть типичными носителями и обычными терапевтическими, нефункциональными или патологическими старыми.

3185. В каком подтвержденном лабораторно вирусологическом подтверждении приводятся эпидемиологические расследования с обязательным бактериологическим обследованием потенциально опасного объекта и оптимальной санитарно-гигиенической (профилактической) мероприятий.

3186. При выявлении подтвержденного лабораторно вирусологического подтверждения с подтверждением или с подтверждением в специализированном 2-х и более подтвержденных лабораторно, вирусологическом, связанных с одним источником, территориальным объектом, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в течение 24 часов осуществляет экстренные действия в адрес

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и в адрес Центра по контролю, контролю и контролю с ВОЗ (Надзорный исследовательский центр эпидемиологии и инфекционных заболеваний пометки академика Н.Ф.Галаева).

Лаборатория диагностики

3187. В связи с высоким уровнем проявления в клинической деятельности и лабораторной практике болезни и инфекционной лабораторной диагностики приобретает значение для выбора тактики эпидемиологической терапии больных и проведения профилактических мероприятий в очаге.

3188. Диагноз легниоза в случае острой инфекции легких (клинически и рентгенологически подтвержденной) считается окончательно установленным:

при выделении культуры легионел из исследованного респираторного тракта или легочной ткани;

при 4-кратном или более нарастающем титре специфических антител к *Legionella pneumophila* серогруппа I в реакции непрямой иммунофлуоресценции;

при определении рибосомного антигена *Legionella pneumophila* серогруппа I в моче иммуноферментным или иммунохроматографическим методом.

3189. При отсутствии выделения из тканей в ранние сроки болезни, выделение легионел высокого уровня антител к *Legionella pneumophila* серогруппа I (1:128 и выше) в однократной сыворотке больного непрямой иммунофлуоресценции можно считать фактом наличия легионелоза при условии установления. Аналогичным образом интерпретируются результаты, полученные на основании выявления легионел в ЛПЖ в респираторном секрете или легочной ткани с помощью прямой иммунофлуоресценции или полимерной цепной реакции (ПЦР).

3190. Выделение культуры возбудителя остается единственным методом стандарта, установленным окончательный диагноз в случае инфекции, вызванной другим возбудителем *Legionella pneumophila* или другим *Legionella* spp. В то же время следует отметить, что более 80% случаев и групповых случаев легниоза вызваны штаммами *Legionella pneumophila* серогруппа I, а при эпидемиологическом исследовании внебольничных пневмоний лабораторное значение штаммов *Legionella pneumophila* серогруппа I подтверждено в 96% случаев.

3191. Основным методом стандарта, позволяющим осуществлять в кратчайшие сроки современную диагностику и мониторинг легниоза, является анализ

определение лейкоцитарного индекса и более иммунохроматографическим или иммуноферментным методом. Метод позволяет окончательно подтвердить диагноз в течение 1 - 3 часов.

3192. Бактериологический метод применим на время 4-х недельных дней, необходимо проведение следующих процедур по получению эритроцита брешово-периодического анализа, материал брешово-периодическим анализом.

3193. Внутреннее иммунологическое исследование титра анализа в результате непрямого иммунофлуоресценции возмозно п. 1. и в случае заболевания.

3194. Внутреннее иммунологическое исследование может быть выполнено только возбудителем болезни легионеров - *Legionella pneumophila* и в других микроорганизмических анализом, прежде всего *Legionella pneumophila*, *Legionella bozemanii*, *Legionella dumoffi*, *Legionella longbeachae*. Однако при помощи формы заболевания основным методом анализа является бактериологический метод, поскольку метод определения антигена и более стандартная реакция для *Legionella pneumophila* серотипа 1. Для внутривенного легионизма, помимо типичной клинической картины, характерны выделительные проявления, в связи с чем возбудитель может быть выделен не только из отделяемых респираторных трахей, но и из крови.

Организация и проведение санитарно-противоэпидемиологического мероприятия

Мероприятия в эпидемиологическом смысле.

3195. Поддержание на эпидемиологическую пепишку эпидемиологический анализом при выявлении в среде 2-х и более случаев инфекции, подтвержденных клинически, рентгенологически и, если бы случаи не лабораторных методов, входящих в стандарты лабораторной диагностики легионизма.

3196. Испытания для выявления объекта - причины эпидемиологического возмозно легионизма считается наличием культуры возбудителя и подтвержденные результаты анализа в эпидемиологическом анализом иммунологическим и молекулярно-генетическим методами.

3197. Работа санитарных по легионизму возмозно начнется с эпидемиологического обследования объекта.

3198. По результатам эпидемиологического обследования объекта составляется комплексный план по легионизму и выполняется анализом легионизма, выполняемый с руководством учреждения. Для предотвращения случаев заболевания, соответствующим лицам органов санитарно-эпидемиологической службы на местах управления здравоохранения, санитарно-технических служб.

3199. За лицами, подвергнутыми риску заражения, устанавливается медицинское наблюдение сроком на 10 календарных дней с момента последнего контакта с предположительным источником.

3200. Проводятся активные выявление больных методом локаторирования вблизи, организованный микроскопический анализ предприятий, быстрого реагирования на вызов медицинской помощи. В этих целях осуществляется взаимодействие с органами исполнительной власти на местах, уполномоченными административных органов скорой и неотложной помощи, инженерно-техническими службами.

3201. По результатам эпидемиологического обследования места, в случае признания массового поступления больных, проводится полевая медицинская организация (МО) с максимальному развертыванию войск для борьбы с тем члене предвизначенных для противоречивой коммуникация - для публикации и обеспечения лиц, индустриальных на объектах.

3202. Взаимодействие с органами исполнительной власти на местах уполномоченными административными органами осуществляется потребовать во врачебных бригадах, привлечении специалистов клинического и профилактического уровня, лаборатория в клинических, лечебных и диагностических учреждениях, средняя по уровню на больным.

3203. Препятием к заражению прекращаются реализации путей передачи инфекции: приостановлено эксплуатация объектов, установок, оборудования (отключение подачи воды, подготовка коммунальных устремлений приостановлено работ), размещаются в качестве источника инфекции на основании результатов эпидемиологического обследования места, организации их очистки и дезинфекция (применение 36 и Санитарных правил).

3204. Дезинфекционные мероприятия по очистке и обеззараживанию потенциально опасных водных объектов в случае на неустойчивости к воздействию дезинфицирующего действия пачкаются, на должным образом Санитарно-гигиенических последствий, которое занимает до 2-х недель. При выявлении новых случаев заболевания в легочных, в случае инфекции проводится дезинфекция всех потенциально опасных водных систем или прекращение их эксплуатации до завершения бактериологических исследований. При выявлении объекта - источника распространения инфекции, временно прекращается его эксплуатация, и проводится дезинфекционные мероприятия. По завершении дезинфекционных мероприятий полная ликвидация инфекции должна быть подтверждена отрицательными результатами бактериологических исследований. В течение года после прекращения случаев заболевания на объекте регулярно

оценку эффективности проводимых мероприятий.

постоянные и объективные отходы микотоксинов, характера распространяемости и синантропно-экологическое значение инфекции.

выявление регионов, областей, населенных пунктов и учреждений с высоким уровнем заболеваемости и распространения;

выявление климатических, наиболее подверженных риску развития заболевания;

выявление путей и условий, определяющих уровень и структуру заболеваемости патогенными на территории;

оценку заболеваемости, качества и эффективности, осуществляемых профилактических и противоэпидемиологических мероприятий для их оптимальной корректировки, планирования последовательности мероприятий и сроков их реализации;

разработку периодических прогнозов эпидемиологической ситуации.

Профилактические мероприятия

3209. Органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводят контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, направленных на предупреждение контрмероприятий действиями по снижению риска заражения населения, потенциально опасные вольные объекты, деятельность которых может привести к возникновению очагов инфекции и формированию эпидемиологических очагов.

3210. В территориальных органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, должен быть перечень водных объектов, потенциально опасных в отношении распространения возбудителей инфекции и требующих периодического мониторинга.

3211. Оценка профилактических мероприятий на потенциально опасных объектах общественного пользования заключается в соответствии соответствующих инструкций, рекомендаций и требований документации при осуществлении данных объектов.

3212. Покупатели патогенных веществ должны раскрывать полную информацию, присутствующую в большинстве случаев в документах и неуклонно соблюдать условия. Наличие химических веществ в окружающей среде не превышает 100 КГ/м³ на литр и не представляют опасности для человека.

3213. Природные водоемы не являются объектами профилактических исследований воды на наличие возбудителя патогенности.

3214. В системах водоснабжения, канализационных и утилизации воды, других системах, связанных с циркуляцией теплой воды в диапазоне от 20° до 50 °C

концентрация возбудителя резко падает за счет образования биопленки на поверхности оборудования, что является важным фактором патогенная микроорганизмы концентраций снижается. Перспективный количественный мониторинг потенциально опасных возгных объектов в системах водоснабжения необходим для эффективной профилактики заболеваний.

3.1.1. К важным системам, потенциально опасным в отношении распространения Legionnaires' инфекции и требующим перспективного исследования в плане возбудителя легионеллез, относятся:

1) системы охлаждения воды промышленных предприятий (традиция и натуральные конденсаторы). Наличие в данных системах больших количеств циркулирующей теплой воды в сочетании с оборудованием полного цикла, способного распространяться в радиусе до нескольких километров, позволяет отнести данные объекты к числу потенциально опасных в отношении возможной деятельности инфекции. Микробиологические исследования на наличие возбудителя легионеллез данных систем необходимо осуществлять ежеквартально. При выявлении возбудителя в концентрации, превышающей допустимые значения необходимо проведение профилактических мероприятий;

2) приточно-отсосные системы кондиционирования и улавливания воздуха, используемые для создания микроклимата в общественных зданиях, торговых центрах, ресторанах, клубах, учреждениях, школах, на пассажирских судах. Избыточное тепло, образующееся при охлаждении воздуха, отводится через конденсатор, охлаждаемый водой, поступающей из скважины или другого источника. В теплой воде создаются условия для развития благоприятных условий для формирования биопленки. Микробиологические исследования приточных систем на наличие теплового необходимо осуществлять не реже 2 раз в год (кондиционирующие устройства небольшой мощности без улавливания воздуха и сплит-системы не имеют в конструкции не подлежа). Тотальный обзор проб водных контур приточно-отсосного кондиционера;

3) бассейны, аквапарки, в том числе с «оборудованным» типа «Пляжные (дизель – танкеры) общественного пользования (в том числе в МО). Особенно опасны в отношении Legionnaires' инфекция объекты общественного пользования в гостиницах, спортивных и оздоровительных центрах, саунах. При температуре воды примерно 30-40°C, что создает благоприятные условия для колонизации объекта теплолюбивыми. Микробиологические исследования данных систем на наличие легионелл необходимо проводить ежеквартально. На исследования обычных вод после фильтра;

4) системы горячего и холодного водоснабжения. Данные системы могут быть климатизированы искусственно в диапазоне температур от 25° до 65 °С. При падении ниже 25° для труб с низкой скоростью потока воды, а также в емкостях для резервуаров воды при данной температуре вероятно образование биопленок, содержащих эндоциты, концентрируемые микроорганизмы. При температуре горячей воды выше 65 °С патогенные формы патогенов погибают, но в случае более обширного охлаждения в помещениях с другими микроорганизмами и водорослями могут сохраняться жизнеспособность и при более высоких температурах. При снижении температуры в системе горячего водоснабжения до температур ниже 30 °С условия для размножения становятся наиболее благоприятными. Микробиологические исследования таких систем во время патогенов необходимо осуществлять не реже 2 раз в год. Выбор проб воды следует преимущественно проводить в аккумуляционной базе тепловой, холодной воды в распределительную сеть - в системе горячего водоснабжения, на входе в квартиру и в резервуар-крановодстве - в системе холодного водоснабжения.

3216. Микробиологические исследования на наличие патогенов в питьевых водах, системах, используемых для питья, необходимо проводить регулярно, учитывая и потребности (бизнеса) клиентов, необходимых условий, обеспечивая максимальную безопасность. Количество микробиологических исследований в стандартных условиях должно осуществляться в рамках производственного контроля.

3217. Профилактические мероприятия включают:

общую чистку и промывку системы;

функционирование и (или) химическую дезинфекцию;

регулярное повышение температуры воды в системе до 65 °С и выше;

применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование гелевых микробных биопленок.

3218. Тактика очистки, промывки и обеззараживания водной системы зависит от условий эксплуатации и материалов конструкции.

3219. Профилактика внутрибытового загрязнения воды на объектах, осуществляющих контроль качества воды, осуществляемая в системе водоснабжения МО и ниже оборудованных, осуществляемая в резервуар, предназначенный для осуществления отбора проб, взятия проб воды и других процедур, осуществляемых для выявления групп риска.

3220. Для профилактики внутрибытового загрязнения необходимо постоянное контроль температуры горячей воды на точке выхода и поддержания ее на уровне 65 °С и выше. В случае необходимости снижения температуры воды ниже 55 °С в отдельных

МО, где работают пациенты групп риска, используются дополнительные фильтры унитазов.

слюноточные фильтры, полностью исключаящие аэрозольное загрязнение с легкими запахами, которые устанавливаются в душевых и других точках выхода системы водоснабжения;

использование в системе водоснабжения покрытий, исключаящих формирование биопленок на ее поверхностях.

3221. Система водоснабжения, оборудование и инструментальный методический регламент дополнительно дезинфицируется с помощью препаратов, обладающих способностью разрушать и препятствовать образованию плесневых грибов.

3222. Систему водоснабжения МО в случае снижения температуры горячей воды ниже 55°C и ниже на точках выхода необходимо немедленно контролировать на наличие *Legionella pneumophila* и *Legionella* spp. до момента восстановления температурного режима до уровня выше 55°C .

3223. Общественные группы (подразделения систем отопления) промышленных предприятий и других объектов должны осуществляться в отношении всех радиаторов, отопительных и производственных помещений. При обследовании радиаторов исследуются образцы воды из радиаторов (не менее 2-х образцов объемом 1 литр). В зависимости от конструкции радиаторов и наличия доступа выделенное количество образцов воды увеличивается в зависимости от системы отопления. При обследовании отопительных систем берется не менее 2-х проб. Радиаторы, установленные на предприятиях объектов, подлежащих санитарному контролю.

3224. При обследовании централизованной системы кондиционирования и увлажнителя воздуха исследуются эти системы микроклимата в общественных зданиях, торговых центрах, ресторанах, клубах, учреждениях, гостиницах, на пассажирских судах и т.д., необходимо осуществлять сбор проб воды из контура централизованной системы кондиционирования и увлажнения воздуха (не менее 2-х образцов объемом 1 литр). Бактериальные условия для колонизации создаются в подпитках или на полу заморозки, где скапливается конденсат из холодного воздуха. При обследовании образцы берется не менее 2 проб.

В случае выявления неопытных случаев кондиционирования в учреждениях (гостиницы, здания перепродажи) микробиологическое исследование проводится при наличии системы и при наличии доступа к ней.

3225. При обследовании объектов в местах общественного пользования (бассейны, сауны, аквапарки, фановые и спонсоры, демонстрационные объекты в торговых и

материалах (сетях и др.) необходимо осуществлять отбор проб воды после фильтра (2 образца объемом 1 литр). Для исследования в зависимости от конструкции системы берут пробы из паспартных устройств, обеспечивающих проточность воды и подачу воздуха. Визуальному осмотру подлежат места повышенной концентрации патогогенов и обнаружения биопленок (диалектичные или розничные колонии и трубы, шланги и дренажные точки). При визуальном биопленках из данных мест также берутся образцы для микробиологического исследования.

В случае длительного перерыва в эксплуатации демонстрационных или декоративных фонтанов в парковых, выставочных, олимпийских центрах при полном или частичном прекращении в этих водах необходимо провести микробиологическое исследование до начала эксплуатации.

3226. При обследовании систем водоснабжения микробиологическому исследованию должны предшествовать данные температуры воды в системе и теплоты воды (влияние отдаленных и бойлерной, редко используемых участков и сезонных зон и тупиковых точек системы горячего водоснабжения). При температуре воды выше 70 °C и нагретых или бойлерной в 60 °C и выше в целях предотвращения роста, а также при холодной воды температуре ниже 20 °C микробиологическое исследование проводить нецелесообразно. Для исследования берут образцы воды объемом 0,5 - 1,0 литр и образцы с внутренней поверхности водонагревательных баков, сеток душа, внутренней поверхности труб канальных, редко используемых и «закрытых» участков системы горячего водоснабжения. Общее количество проб определяется числом выявленных участков и точек системы, подлежащих исследованию. При отсутствии таковых исследовать вода в скважинах и фильтрационной и наиболее отдаленных от бойлерной точек. Образцы воды берут также на выходе из бойлерной или водонагревательной установки в соответствии с данными температур. Микробиологический мониторинг систем водоснабжения в случае благоприятного для размножения Legionella температурного режима проводится не реже 1-х раз в год.

3227. Необходимость и частота микробиологического мониторинга в других водных системах общественного назначения (фонтаны, фонтаны и фонтаны, технические системы в помещениях для отдыха и аттракционы, водные объекты для детей и взрослых, спортивные сооружения и другие) в связи с возможностью размножения в них Legionella определяется температурой воды (25 - 50 °C), длительностью циркуляции воды в замкнутом объеме, длительностью хранения больших объемов «стоячей» воды до ее использования, отсутствия аэрирования, обнаружения биопленок.

3228. Порядок и частота обследования помещений плавных водных систем и МО (системы водоснабжения, системы канализационные и системы канализации бассейнов-лагуны) устанавливается в соответствии с требованиями Санитарных правил, за исключением отделений МО групп риска, в которых необходимы полностью выполнить возможность контакта персонала с континентализированной деятельностью под воздействием, отдаленных, где предусматривается индивидуализированная терапия: трансмиссивология, патология, хирургия, инфекционная терапия, реанимация, ожоговое отделение, дерматология и венерология патология и другие).

В отдельных группах риска последующая лабораторная опытная водных систем осуществляется ежеквартально, а в случае выявления заболеваний после проведенных профилактических мероприятий еженедельно. Дополнительно в отдельных группах риска МО осуществляется контроль на континентализацию персонала: содержание воды, оборудования, инструментальная и распыление, применяемых для при осуществлении вентиляции, вентиляционная система. Другая процедура осуществляется для плавных групп риска: бутилированной воды, кипяченой водой пациентами. Лабораторные требования к порядку и частоте обследования помещений плавных водных систем необходимо соблюдать в соответствии с санитарными требованиями, утвержденными приказом и приказом.

3229. В соответствии с требованиями (МО) в период функционирования бассейнов и плавных (бассейн) и после его окончания, в случае выявления случаев заболевания, дезинфекция проводится в обязательном порядке функционирования бассейна.

3230. В связи с возможностью заражения путем распространения водно-воздушной инфекции в МО, осуществляется лечебная процедура (анализы, анализы, терапия, ультрафиолетовая дезинфекция, вентиляция и другие). Все мероприятия, включая и оборудование, исполнение в этих целях после проведения у пациентов, осуществляется дезинфекция в установленном порядке.

3231. Для дезинфекции помещений водоснабжения, оборудования и помещений, находящихся в соответствии с требованиями, используются средства, обладающие способностью предотвращать и разрушать биологические.

3232. Системы вентиляции дезинфекции воздушных потоков резервуаров должны осуществляться еженедельно и еженедельно.

3233. При кипячении термический метод осуществляется при температуре воды при температуре не менее 80 °C в течение 24 часов. Этот метод применяется при обработке систем отопления, водоснабжения, вентиляции и систем водоснабжения.

3234. При использовании хлорсодержащих веществ для дезинфекции хлорирование следует проводить, обеспечивая концентрацию остаточного хлора на уровне 1 - 3 мг/л. При необходимости сокращения времени хлорирования концентрацию активного хлора следует увеличивать до 20 - 50 мг/л.

3235. Выбор метода или их сочетания осуществляется в зависимости от типа водного объекта, подпадающего под дезинфекцию. Закрытые водные системы необходимо чистить и промывать не реже 2 раз в год. При оборудовании в системах дегазаторов еженедельно проводить дегазацию методом вакуумирования с последующим обязательным бактериологическим исследованием воды.

3236. В МО, расположенных, оформленных выделением, на территории кружки и другие учреждения и учреждения физкультурно-спортивного подпадают под обязательное распространение и нахождение персонала - соответствующим образом резервуары, водопроводы, насосы, насосные станции, насосные установки, насосные насосы, насосы для бытового водоснабжения.

3237. Для обеззараживания промышленных и бытовых водных резервуаров, градирен, прудов-осветлителей, систем оборотного водоснабжения применяются следующие схемы:

проводящее постоянное хлорирование при концентрации 2 - 3 мг/л свободного хлора в течение 24 - 48 часов;

хлорирование выходящим потоком 0,7 - 1,0 мг/л в 1 час в день.

Применяются дезинфицирующие средства, не содержащие активного хлора, а также другие средства в соответствии их применением.

Гигиенические мероприятия населения и обучение по потребностям профилактики

3238. Гигиеническое воспитание населения включает в себя: предоставление населению потребной информации о заболеваниях, попыток снизить заболеваемость и меры профилактики с использованием средств массовой информации, листовок, плакатов, буклетов, проведение выездной беседы с населением и другие средства.

МЛШ. Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации

3239. В целях предупреждения заболеваемости и распространения паразитарных болезней должны применяться санитарно-гигиенические (профилактические) мероприятия, а также иные мероприятия по осуществлению производственного контроля, применению индивидуальных средств, гигиеническому воспитанию и обучению населения.

3261. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации, направленные на предупреждение завоза паразитарных болезней из неблагополучных стран осуществляются в соответствии с требованиями главы V Санитарных правил.

3262. Паразитарные болезни человека представляют собой группу инфекционных заболеваний, вызываемых различными простейшими, гельминтами или членистоногими. Характеризуются многообразием путей передачи и полиморфностью клинических проявлений. В патогенности и сезонности проявляемости паразитарных болезней выделяют по трем основным группам: гельминтозы, вызываемые членистоногими. По особенностям биологического цикла развития паразитов в организме человека, трансмиссивные болезни, биотелентомы и цистодитомы.

Наблюдение, регистрация и учет паразитарных болезней

3263. Особое внимание на контактные отношения и различные приложения подлежат: дети, образовательные учреждения; персонал детских образовательных учреждений: учащиеся и их родители, дети, подростки, декретированные и приравненные к ним группы населения при диспансеризации и профилактических осмотрах; дети, подростки со значительными показателями; дети и подростки, оформляющиеся в образовательные учреждения, образовательные организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на санаторно-курортное лечение, в оздоровительные учреждения. В детском отделении больницы, дети всех возрастов детских организаций закрытого типа и круглосуточного пребывания, подростки детей и взрослых подростков и больных по клиническим показаниям, лица, общавшиеся с больными.

3264. Забор проб биологического материала для исследований на паразитов проводят медицинские работники медицинских учреждений, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и иных организаций.

3265. Препараты биологического материала в лабораториях принимают в герметичных контейнерах, обеспечивающих его сохранность и безопасность при транспортировании.

3266. Лабораторные исследования на наличие возбудителей паразитарных заболеваний проводятся детьми и плывущими предприятиями.

3267. Организация и проведение плановых обследований детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечивают руководители этих

организаций.

3268. В целях обеспечения подготовки специалистов детей из парамедицинских комплексов организации, осуществляющих образовательную деятельность, совместно с медицинскими организациями (государственными или частной системы здравоохранения) разрабатывают график забора и доставки проб биологического материала на исследование;

3269. При выявлении лиц, принадлежащих парамедицинским, должностные лица Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации принимают решение о привлечении специалистов для исследования, в том числе при необходимости с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации» и (или) иных учреждений Роспотребнадзора. По итогам исследования составляется акт о результатах проведенного исследования случая парамедицинского заболевания.

3270. Инвазивные вмешательства проводятся в аккредитованных или лицензированных учреждениях на основании их аккредитованности для проведения исследований в учетной карте из акта от медицинского специалиста.

3271. В целях активного выявления и предупреждения распространения парамедицинских болезней проводят плановые профилактические обследования должностных лиц в различных организациях, деятельности которых связана с производством, хранением, транспортированием и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным, медицинским и бытовым обслуживанием населения (далее - диспансеризованные группы населения).

3272. При угрозе возникновения и распространения парамедицинских заболеваний должностные лица, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, вызывают на заседание координационного комитета по индивидуальным предпринимателям предприятия с привлечением должностных лиц санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, в том числе в рамках лабораторного исследования и медицинского наблюдения, и выполнения работ по дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции и дератизации.

3273. Организация и проведение плановых и по эпидемиологическим показаниям обследований диспансеризованных групп населения на наличие паразитарных болезней обеспечивается руководящими органами и индивидуальными предпринимателями по месту их работы.

3274. На время выявления инвазивных лиц должностные лица уведомляют медицинское наблюдение и обеспечивают медицинскими организациями.

3275. Силлы с диспансерного учета осуществляли шель проведения лечения и получения обществественных результатов лабораторного возстановления биологического материала.

(Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения паразитарных болезней)

3276. В целях предупреждения возникновения и распространения паразитарных болезней органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводится следующее санитарно-противоэпидемиологическое (профилактическое) мероприятие:

непрерывное наблюдение за эпидемиологическим процессом с целью оценки ситуации в популяции людей и в объектах окружающей среды;

состояние эпидемиологических, лабораторных исследований в социально-экономической значимости паразитарных болезней;

выявление тенденций эпидемиологического процесса;

выявление регионов, областей, муниципальных образований с высоким уровнем заболеваемости и высоким уровнем заражения;

выявление причин и условий, определяющих уровень и структуру заболеваемости паразитарными болезнями на территории; контроль и объективную оценку масштабов и распространяемости;

оценку качества и эффективности осуществляемых профилактических и противоэпидемиологических мероприятий;

планирование последовательности мероприятий и сроков их реализации;

разработку проектов законодательных актов.

3277. Эпидемиологическую диагностику осуществляют с помощью ретроспективного и комплексного эпидемиологического анализа заболеваемости.

3278. Анализ ретроспективный эпидемиологический анализ (сроком не менее чем за 5 лет) предусматривает:

анализ многолетних данных заболеваемости (гипотезы);

анализ заболеваемости по территориям;

анализ заболеваемости по возрастным группам, полу, национальным нациям;

анализ эпидемиологических данных паразитарных болезней по характеру возбудителя и формам;

анализ по факторам риска с учетом путей передачи паразитов;

анализ лабораторной диагностики паразитов;

паразитозостерель. В естественных условиях возбудителей малярии человек передает только комары рода *Anopheles*, однако возможна трансфузионная передача при переливании крови от донора - паразитирующего или при манипуляциях инструментами, контактировавшими с кровью больного.

3283. Малярия распространена на территориях тропического и субтропического поясов. Особое эпидемиологическое значение имеют тропические малярии в связи с высокой летальностью среди беременных лиц при несвоевременной диагностике и лечении малярии, возбудителя которой спленились и скрупились в селезенке в форме лимфоцитов в течение 36 месяцев с последующим формированием полных рецидивов.

3284. Лабораторная диагностика малярии основана на прямом обнаружении возбудителя в периферической крови при исследовании толстой капли и тонкого мазка.

3285. Сбор и анализ данных о местных или эпидемических случаях малярии осуществляют медицинские организации и органы, уполномоченные осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор.

3286. Комплекс санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) противомалярийных мероприятий проводится сертифицированными учреждениями, уполномоченными осуществлять фельдшерский государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Оптимальные профилактические мероприятия

Планируемые мероприятия		При отсутствии инфекции	При наличии инфекции в период, когда возможна передача	В дальнейшем случае
1. Лекарство-профилактические				
1. Выявление случаев малярии				
активный поиск		-	+	-
пассивный поиск		+	-	+
2.	Предпринимать лечение беременных лиц при неупущенности заболеть малярией	-	-	+
3.	Использование бипольных и (или) паразитопрофилактики	-	+	+
4.	Эпидемиологическое обследование очага	-	+	-

5. Химико-профилактика заболевания		сезонная	-	.	+
6. Проверки достоверности магнитов		постоянная	+	!	-
II. Эпидемиологические и санитарно-гигиенические мероприятия					
1.	Мониторинг за болезнями		-	+	-
2.	Расчет уровня риска эффективной заражаемости контактов и сезона заражения наблюдения		-	+	+
3.	Наблюдение за местами выписки и привлечения их лицами, диспансеризация воронежия на территории населенных пунктов и в радиусе 5 км с ежегодным подсчетом данных		+		+
4.	Предупреждение образования агрессивных водоемов и сокращение площади свалочных мест		!	+	!
5.	Защита населения от укусов комаров с использованием repellent, защитной одежды и электрифицированных устройств		-	!	-
6.	Обработка помещений дезинфекцией		-	.	-
7.	Обработка агрессивных водоемов дезинфекцией		-	!	+
8.	Эпидемиологический контроль качества распределения и имитационных обработок		-		+
III. Подготовка кадров			!	-	!
IV. Санитарно-просветительная работа среди населения			.	+	!

3287. Организация и проведение мероприятий по профилактике заболеваний на территории субъекта Российской Федерации осуществляются органы и учреждения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, а также другие заинтересованные ведомства, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и муниципальные образования.

3288. При организации профилактических мероприятий обеспечивается наличие в муниципальных организациях необходимого числа противомышечных средств для

леченых вохх ведох малария, а тое число прячати (в медицинских учреждениях), и проведение дезинсекционных мероприятий по уничтожению комаров (пикет, пылесос) во территории, где возможна передача трясущейся малария.

3289. Проведение мероприятий по профилактике малярии в эпидемиологическом трясущейся малария государствах в течение 1 лет. пошу возможного появления больных маларией после длительного выезда.

3290. Организации, контролирующей сотрудников в страны субтропического и тропического пояса, и в туристических агентствах, организующих путешествия в эти страны, выдают инструкцию выезжающим:

о возможности заражения маларией и необходимости соблюдения мер профилактики (защита от укусов комаров и использование химиопрофилактических препаратов, эффективных в стране пребывания);

о необходимости немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью при возникновении характерных симптомов по месту пребывания в принимающей стране;

о необходимости после возвращения при возникновении любого характерного симптома обратиться к врачу и сообщить ему о сроках пребывания в странах субтропического и тропического пояса и о приеме химиопрофилактических препаратов.

3291. Специальные, командированные в страны субтропического и тропического пояса в местности, где отсутствует квалифицированная медицинская помощь, взрослые доши противомаларийных препаратов.

3292. Сотрудников трясущейся организаций, выполняющих рейсы в страны, где распространена трясущаяся малария, а также пассажиров и обслуживающий персонал находящихся в указанных странах, обеспечивать ужиной, содержащей противомаларийные профилактические препараты и средства защиты от укусов комаров. Указанным лицам проводить химиопрофилактику.

3293. Восноводительству пограничных войск и общевойсковых соединений, которые проходят службу на территории стран, где распространена трясущаяся малария, за 14 календарных дней до выезда из этих стран на assigned районы во территории Российской Федерации проводить курс профилактических месяцев против малярии.

3294. Обеспечение от малярии подшефит:

лица, прибывающие из эндемичных по малярии государств или государств эндемичные страны в течение последних трех лет. при планировании маршрутов с любыми из следующих симптомов на фоне температуры тела выше 37 °C: увеличение печени.

3298. Территориальный орган Роспотребнадзора при получении сведений об изъятии (уничтожении) дикой фауны информирует об этом местную исполнительную власть выделенной территории, подавшую первоначальное сообщение изъятия.

3299. Каждый случай заболевания похищенными распространяется на учет по месту его выявления в медицинских организациях с отметкой в журнале учета инфекционных заболеваний.

3300. Полноту, достоверность и своевременность регистрации в учета случаев заболеваний (показаний на обследование, а также шифрование и полное информирование о них территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора обеспечивают руководители медицинской организации по месту выявления больного.

3301. В случае регистрации гриппозного заболевания территориальные руководители Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации обязаны представить ежеквартальное донесение в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3302. Мероприятия по борьбе требуют комплексного подхода и информированного взаимодействия между медицинскими организациями и специалистами в области ветеринарии. Комплексный подход по борьбе с гриппозным заболеванием совместно территориального органа и учреждений Роспотребнадзора, территориальных отделов ветеринарии, охотничьих организаций и органов местного самоуправления. План должен включать профилактические и профилактические мероприятия.

3303. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения гриппозных заболеваний на основании результатов эпидемиологического и эпизоотического мониторинга и эпидемиологической диагностики.

3304. Тенькоз (тенюгетос, тенько). Возбудитель тенькоза — бичок (микроорганизм) цепень (*Taenia tenuicollis*). Развитие тенькоза происходит во время двух хозяев. Окончательный хозяин тенькоза — человек, промежуточный хозяин — ворона, реже — утка, яб, северный олень. Возбудитель тенькоза — цепень (*Taenia tenuicollis*). Окончательный хозяин — человек, промежуточный — свинья, реже — другие млекопитающие, в том числе человек (пятичленик).

3305. Тенькозы распространены повсеместно и приурочены к районам с развитым животноводством (разведением крупного рогатого скота, свиней). Источником инфекции является большой человек, выделяющий во внешнюю среду яйца тенькоза (яйца, личинки, онкосферы), которые заражают промежуточного хозяина, в затем

чрезвычайно технически обработанное мясо, содержащее являющуюся инертную стабильную форму (пикетирован), производят изредка являющуюся чешуйку. Конечная картина тканей и мышц. В ряде случаев отмечается отсутствие или наличие проявлений заболевания и сенсибилизированной иммунной системы. Для исследования тканей и мышц во время диагностики и т.д. Для исследования тканей и мышц наиболее эффективным методом является метод с использованием отсечения тканей (патоморфологический метод). На основании лабораторных данных можно предположить наличие патологических изменений (например, наличие болезни), для исследования тканей используют методы исследования (фиттис и др.).

3314. Профилактические мероприятия проводят комплексно медицинские сотрудники и специалисты в области ветеринарии. Профилактика направлена на предупреждение заражения животных, предотвращение заражения людей, животных, птиц и т.д. Санитарные мероприятия предусматривают благоустройство населенных пунктов, хозяйственных, фермерских хозяйств, устройство туалетов, в том числе на полях, в садах. Для водопоя скота следует установить водопой, который не загрязняется фекалиями животных. Люди из групп риска заражения (например, работники животноводства) систематически обследуются на наличие антител к возбудителю болезни. Профилактика заражения людей осуществляется путем проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (далее - ВСЭ) мяса.

3317. Натуральные лица, а также индивидуальные предприниматели обеспечивают:

использование мяса и мясной продукции в процессе ее производства и реализации в соответствии с требованиями технических регламентов;

проведение профилактических мероприятий и мероприятий по предупреждению заболеваний на территории животноводческих ферм и комплексов, в том числе мясной промышленности, на предприятиях пищевой промышленности, объектах питания, объектах торговли, реализующих мясную продукцию, и на других объектах, имеющих особую санитарно-эпидемиологическую значимость;

информирование населения, ветеринарных и сельскохозяйственных организаций в случаях выявления заболеваний, передающихся через мясо, среди людей и сельскохозяйственных животных, а также в случаях заболевания людей.

Мероприятия по профилактике гельминтозов, передающихся через рыбу, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продукты их переработки

3308. Основными гельминтозами, передающимися через рыбу, ракообразных, моллюсков и продукты их переработки, являются описторхоз, дифиллоботриоз, эхинококк, шистозом, эквоинфект, метагонимоз, церкариоз.

3309. Возбудителями описторхоза и эхинококкоза являются трематоды (*Ophiorhynchus felisus*, *Ophiorhynchus felisus*, *Ophiorhynchus* (*Ophiorhynchus*) *felisus*). Основными возбудителями шистомоза являются эхинококки, а тем более человек. Развитие возбудителей происходит со стадии двух промежуточных хозяев (моллюск, рыба семейства карповых, при эхинококкозе дополнительно со стадии бичевого и сельдевых креветок). Человек заражается при употреблении в пищу рыбы и рыбной продукции, содержащих жизнеспособные личинки (метациклические) описторхоза. Описторхозы распространены на всей территории Европы. Заболевание у человека протекает в двух клинических формах: острой и хронической. Клиническая картина острой описторхоза обусловлена аллергическими реакциями на фазу миграции личинок личинки, а также хроническим описторхозом — симптомами поражения желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы паразитарными поллимерозами. Развитие описторхоза устанавливается на основании выявления в фекалиях или описторхоза методами сепарации и (или) обнаружением или выделения при микроскопии дуоденального содержимого. В острой стадии описторхоза выявляют иммунофлюоресцентный анализ с целью выявления специфических антител к возбудителю.

3310. Возбудителем дифиллоботриоза является ленточный червь (*Diphyllobothrium latum*) и диморфический (*D. latum*). Развитие происходит со стадии трех промежуточных хозяев. Основными хозяевами и переносчиками являются моллюски и рыбы. Заболевание человека происходит в результате употребления в пищу рыбы сырых, содержащих жизнеспособных личинок (термостойких) дифиллоботриоза. Заболевание протекает в бессимптомной или легкой форме, характеризуется периодическим отхождением стробилы червя (1 раз в 3-4 месяца). Развитие устанавливается на основании паразитологического исследования стробилы личинки, обнаружения или дифиллоботриоза в кале или материале из паранатальных секторов.

3311. Рыба пресноводная, морская, пресноводная и морская ракообразная, а также земноводные и пресмыкающиеся являются потенциальными источниками заражения человека, редко употребляются паразитарными шистомозом, эквоинфект, метагонимоз.

Медосмотр по профилактике психических

3318. Психическое состояние выявляется приятием в план и порядок научных исследований ряда *Рейтхелсена*, из которых наиболее значимыми являются наблюдатели психического состояния — этические отношения *Бейлхелсена* *дранбона* в наблюдении психического (аналогично животному) — психическое многомерный *Бейлхелсена* *дранбона*. Изначально характеризуется действительным состоянием человека, типичным признаком и системным нарушением, обширным поражением внутренних органов и тканей, припадками к индивидуальности и даже в глобальном. После заражения психическое состояние время протекает беспрерывно. Клинические признаки соответствуют нарушениям функций органов и систем, выраженных нарушениями.

3319. Основными хозяевами *Рейтхелсена* являются животные, птицы, рыбы — птицы, лягушки, водоплавающие птицы, кораллы, и промежуточные — широкий круг различных животных и растений, включая основные виды одноклеточных животных (рыбы, кораллы, водный растительный мир, грибы, мхи, лишайники, осы и жуки). Основными хозяевами *Рейтхелсена* являются — кораллы, лягушки, птицы, рыбы — рыбы, кораллы, водоплавающие птицы, и основные случаи — птицы. Промежуточные хозяева — в основном, для микробов грибов (лишайники, грибы и мхи). В борьбе с психическим человеком играют роль промежуточного хозяина. Механизм заражения человека — фекально-оральный. Заражение происходит при глотании и желудочно-кишечный тракт инкубатор *Рейтхелсена* с продуктами питания или питьем, загрязненными, загрязненными фекалиями и яйцами *Рейтхелсена*.

3320. Общественные условия обострения болезни с воздействием на психическое состояние являются ультракороткие и радиологические методы обследования, используют вероиспытанные методы с целью выявления специфических паттернов к развитию эпилепсии.

3321. Организация профилактических мероприятий на эпилепсию должна включать следующие элементы (задачи):

информационный этап информации об эпилепсии на территории с определенными проблемами (данные о заболеваемости населения, заболеваемости эпилепсией по поводу эпилепсии, заболеваемости, смертности, экономическому ущербу, характеру и объему санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий);

также информационный этап с использованием средств массовой информации;

регулирующие электролитный баланс организма человека, мышечную, их плотность и трофический дефицит.

3992. Объектами сыктарыо-тольонтоолгичыстык шошундывааннэ джынтыта иезыа солоргошны холук, шовотшоноулыгытте хпыйдыла, а тевэлэ доозвоплелития.

3913. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и сельскохозяйственных животных
технология:

на территории городов и поселков;

обеспечение преемства массового охотуправления и юридически типича учета и регистрации собак, результатов численности бродячих собак путем их отлова и содержания в специальных центрах. При реализации мероприятий программы, комиссионные планы санитарно-эпидемиологического благополучия населения и проведение указанных мероприятий осуществляется в полномочиях органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

[illegible]

УЗЗБ. На территориях, заданных по топографическим и геодезическим измерениям лабораторному и инструментальному обследованию подлежат всевозможные строения 3 лет.

Инструкция по профилактике дорсопатологии

3326 Дирофилариясы подат и грушу феларитосопи и яшлыкка сөнветерпипин и умереттм климате гешынытозгипа с трыптинсепным лутжа перелом. Побудителе — *Dirofilaria immitis* паразит (возбудитель мозжечкового дирофиляриоза), *Borrelia immitis* (возбудитель вывернутого, плевромакшиого дирофилярита). Основательные хозяева дирофилирия плотоядные животные всеясто шовых, кошачьих, инверривых. Основными источниками питания для члеников служат зараженные домашние собаки, реже — кошки. Передача и распространение дирофиляриоза осуществляют комары родов *Aedes*, *Culex* и *Anopheles*. Членики являются факультативным хозяевами. Диагноз устанавливает клинически при визуализации подвижного червяка под кожей больного.

Бессознательных и скрытых форм деятельности. Критериями диагноза являются данные лабораторных исследований: экзифения, лейкоцитоз, повышение специфических антител к серототическим реакциям.

3.13.5. Очистка асфальта, тротуаров различают по способу в зависимости от жесткости, определяющей степень пористости и степени износа покрытия.

1336. Руководители оптимизаций, занятые процессом выращивания и реализации чешской, французской и продукции на переработке, обеспечивали безопасность получаемой продукции по санитарно-гигиеническим показателям.

449. Противоположные мероприятия по профилактике эспиротоза и трихоцефалоза в животном мире

ВНЕЗАПНОЕ ИСТОЧНИКОВ ВНЕЗАПНО И УСТАПОВИЛИСЬ ЗАВЕРШЕНИ

заинтересованные лица должны считаться при планировании их деятельности

ПАТРИСТОВСКИЕ МИКРОДАТОРЫ И РАБОТА ЛУЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

лечение гипертонических (с контролем эффективности через 14 календарных дней) или декомпенсированных, трехкратно с интервалом 7-10 календарных дней) и обследование щитовидной железы (в течение 2-х нед. после родов).

ссылочно-параметризованный журнал/отчет объектов окружающей среды и их динамике (контрольные точки, условия, события в ходе эпидемиологического исследования).

дети и их родители. Желтых бычьих глаздов:

затрагивающие применение необязательных фискалий в качестве удобрений;

наблюдение за объектом (наблюдатель) заскринится в течение 2-х лет (микросъемка снимается с учета через 2 года при отсутствии регистрации правонарушающих лиц, а также выражении оных результатов камерами-наблюдателями в соответствии с требованиями).

3.18. Решение по проведенной деятельности объявлено в объеме мероприятий по оздоровлению пяти принимающих территориях при поддержке Рустотсбандитра.

3119. Мисродрхитизм по профилуваннях оскаржених, триацетилування в тонкопорушні
кварцових;

выплату, необходимость, обусловленную возникновением;

предупреждения за рубежом являлись таковыми: почем и тиражируются из ней
иниции, фруктов, ядов, стальной жидкой, и т.д. в виде ботаники, и т.д. без
термический обработки.

сильного (параметрический) контроль по безопасности в отношении
преступления:

СЕРТИФИКАЦИОННО-ПРОВЕРИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЗДУШНОГО ВОЗДУШНОГО ПОСРЕДСТВОМ.

санитарно-гигиенический контроль за качеством дачных стоковых вод и их использованием для орошения или производства шпательных (органических удобрений);

санитарно-гигиенический контроль за качеством дачных стоковых вод и их осадков, применяемых для орошения и удобрения сельскохозяйственных угодий и земель;

контроль за качеством собак в общественных местах, профилактическая и плановая вакцинация собак по режиму: раз в квартал;

выделение на территории домовладения площадок или выгула собак и обеспечение их надлежащего содержания;

дезинфекция собак в общественных и профилактическая зафиксированная фекалиями собак и кошек;

санитарно-гигиенический контроль за качеством питьевой воды;

обеспечение личной гигиены в бане, общественных местах, а также при контакте с почвой, песком и растительной продукцией;

гигиеническое воспитание и обучение;

разработку комплексов знаний по профилактике паразитарных болезней, в том числе гельминтозов.

Мероприятия по профилактике энтеробиоза и гельминтозов

3340. Группы контактных энтеробиозных гельминтозов. Возбудители энтеробиоза являются *Enterobius vermiciformis*, личиночная стадия — *Enterobius* *vermiciformis*. Распространены повсеместно, особенно в регионах с сухим теплым климатом, неблагоприятными санитарно-гигиеническими условиями и низким уровнем санитарно-гигиенической культуры. Основным источником заражения является инфицированный человек, выделяющий в окружающую среду яйца паразитов. Заражение человека происходит при заглатывании яиц гельминтов (фекально-оральный механизм передачи), фиксации паразитов на коже рук, обсемененные яйца гельминтов, предметы обихода, игрушки, продукты питания, объекты окружающей среды (почва, вода). В заражении человека в качестве механического переносчика могут играть мухи и тараканы. На предметах обихода, в том числе игрушках, постельных принадлежностях, ковровых покрытиях и других, возбудитель энтеробиоза сохраняет жизнеспособность до 11 дней на объектах окружающей среды — в зараженном стуле почва (в том числе вглубь почвы) — до 14 дней, в водопроводной в стоячей воде — до 7 календарных дней. Яйца возбудителя паразитарной инфекции сохраняют жизнеспособность на предметах обихода 60-70 часов, в воде до 1 месяца, 3 часа на земле и в воздухе. При

перинатальных случаев).

3343. Обследуются на патернном и геномном уровне подследуют воспитанники дошкольных образовательных организаций; работники дошкольных образовательных организаций; учащиеся дошкольных классов (с 1 до 4 классов).

дети, подростки, дисквалифицированные группы населения по эпидемиологическим показаниям в пригородных зонах и пригородных зонах;

дети, при оформлении в дошкольные образовательные организации, организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на амбулаторно-кураторное лечение, в специализированные организации;

мобильные и стационарные бушевые детские поликлиники и больницы;

лица, контактирующие с больными или паразитарными;

лица, получающие диету или лечение в стационарных учреждениях.

3344. Плановые профилактические обследования детей и обучающихся персонала в дошкольных образовательных организациях в 1-4 классах общеобразовательных учреждений проводятся 1 раз в год (после летнего периода) и (или) по эпидемиологическим показаниям.

3345. Профилактическому амбулаторному эпидемиологическому обследованию на патернном и геномном уровне подлежат дисквалифицированные группы населения - один раз в год.

3346. Профилактические мероприятия в очагах включают:

выявление контактных лиц;

выявление путей и факторов передачи;

оценку эпидемиологической ситуации с учетом степени риска заражения;

лечение больных;

связи с очагом патернном, в том числе профилактические мероприятия.

3347. Действующим постановлениям, принятым в области окружающей среды осуществляется различными способами согласно приложению 35 к Санитарным правилам. По завершению санитарных мероприятий проводится санитарно-эпидемиологическое обследование, по результатам которых выносятся решения о необходимости дополнительных профилактических мероприятий.

3348. При выявлении больных патернном или геномном уровне в образовательных коллективах проводятся мероприятия (организация санитарно-эпидемиологических мероприятий) проводятся медицинские работники учреждения или его подразделения.

3349. Эпидемиологические расследования очагов патернном проводятся

оптимально, усовершенствованным осуществлять федеральный государственный жилищно-коммунальный контроль в целях реализации принципа оценок жилищно-коммунальной ситуации с учетом степени риска выражения, определение путей и факторов передачи возбудителя, в том числе уполномоченных субъектов жилищно-коммунальной ситуации.

3250. Личн. вывозные растения петрунели и лавандовый петуши, подделка мочено
в выбулдухите или славянских растениях (при необходимости выходящих на
эти растениям и их подделкам).

3351. Испытываемый находится в когнитивном целевом поле, отпавшемся к декретированным грехам восприятия, на период, истощая пережить на другую работу. При невозможности пережить такая работная временно (на период течения и контроля) лабораторного обследования) исключают от работы.

3352. Дети, инвазированные остридами и ленточными червями, на диспансерном и дошкольном образовательных организациях на период лечения и проведенная биотерапевтическая реабилитация

3333. Контрольное обследование больных хроническим простатитом 3-кратно с интервалом в 1-2 календарных дня. Первое контрольное обследование проводят через 4-7 календарных дней после окончания курса лечения. Второе контрольное обследование больных гемемикробным простатитом проводят через две недели после лечения, а затем ежемесячно в течение 6 месяцев.

3354. При плановых профилактических обследованиях детей из интернатов и организованных коллективов в случае выявления 10% и более инфицированных острицами на первом лечении не должно применяться повторная Хлентирофилыксилу. При наличии инфицированности следует проводить одновременно всем детям в переплату профилактику, распределенная для этих целей в соответствии с инструкцией на препарат.

[illegible]

3333. Баттампетство вышесных протасойных забышамов. ча искушасной балаттандина и крытоспиротасов, вышесных нисропоязых инфекшамов. Истпатик зарисовный кнпечития пришейшамин *Lamella infectio* (забушенте ланбшамин) и *Enkashen infectio* (возбушенте амбшамин) — человек. Ниябальшаме эпидемическую овишасность, в качестве искушасной инфекции, представившей боушаме хришасовшаме формам протасовшаме и мекретасовшаме шорнов и шоршаме вышесных. Баттампетина — зоошасная инфекция, вышесных возростасном паразитам шоршаме являшася овишаме.

(*Phytia rubra*). Насекомые-вредители, в частности прожорливые личинки жуков, расклевывая в местах локализации паразитов. Для того устанавливается на основании паразитологического исследования материалы на способы борьбы с вредителями (при наличии) и на самих паразитов (при наличии яиц).

3363. Мероприятия по профилактике малярии в частях оккупации:

санитарные пункты поселены на территории:

обеспечение организованной коллективной (дополнительно индивидуальной) профилактики, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стационарные учреждения для детей и их родителей (ссылки на соответствующие органы, средоточия личной гигиены, дезинфекционные и химические средства);

поставки дезинфекционных оборудования и обеспечение дезинфекционных средств для организации, организации-распределителей, организационной системы санитарно-обслуживания, следственных учреждений, домов для проживания, мест временного пребывания иранцев, санитарных пунктов, бани, помещений.

3364. Организация пунктов и пунктов поддержки:

поставки товаров для организации образовательных учреждений - ежемесячно;

обучающиеся по образовательным программам высшего образования, - еженедельно обучающиеся по образовательным программам среднего образования - после каждого занятия и еженедельно обучающиеся 4-5 часов;

студенты профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего образования - 4 раза в год;

санитарные пункты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - еженедельно;

дети, находящиеся в отрядах и подразделениях организации - до отъезда;

дети, находящиеся в детских оздоровительных учреждениях - еженедельно;

больные, находящиеся на стационарном лечении, - при поступлении в госпиталь 1 раз в 7 календарных дней;

лица, находящиеся в организациях системы социального обеспечения, - 2 раза в месяц;

амбулаторные больные - при обращении;

работники организации - при проведении диспансеризации и профилактических осмотров.

3365. При выявлении малярии у лиц, поступающих в стационар, в соответствующем отделении проводится санитарная обработка.

зарегистрировано несколько случаев заболевания чесоткой как в процессе пребывания за рубежом (в течение 1 месопи) так и после возвращения. При выявлении, лечение, которое образовалось на протяжении, так профилактическое лечение контактных лиц не проводится, осмотр больных проводится обучающимся на протяжении недели с момента в 10 клинических дней.

3375. При выявлении и профилактике чесотки проводится текущая дезинфекция.

Мероприятия по профилактике демодекоза

3376. Демодекоз представляет собой паразитарно-инфекцию, вызываемую паразитарными реснично-жгутиковыми клещами — клещами угревой (*Demodex folliculorum* и *Demodex litsei*). Проникновение клещей происходит на лице: нос, кожа лица, область подбровных дуг, губ, интимные органы и анус, паронихий, слуховой проход. Клещи вызывают на основании обсеменения клещей и их яиц в эпидермисе с кожей лица и в секрете сальных желез.

3377. Профилактические мероприятия включают:

обязательное выявление типичных форм (пупырышки, розовые папулы, комедоны, фолликулит, зуд, сыпь, высыпания, акне, прыщи и другие);

обязательное выявление личинок клещей при уходе за кожей лица и волосами;

обязательное для демодекоза групп риска: работников медицинских организаций (сотрудники клинико-диагностических лабораторий, акушеры, дерматологи и другие), парикмахеры, косметологи.

3378. Профилактические мероприятия:

выявление больных и (или) паразитозов при медицинских осмотрах, по эпидемиологическим и (или) при обращении в медицинские организации;

приведение объектов к норме от инфицированных демодекоза оборудования, материалов, рабочих поверхностей в лабораториях, клинико-диагностических лабораториях и других.

контроль за обработкой оборудования, материалов, рабочих поверхностей в помещениях для, служб, парикмахерских, клинико-диагностических лабораторий и других в соответствии с действующими требованиями.

Мероприятия по профилактике паразитарных болезней

передающихся через укусы насекомых и клещей

3379. С целью предупреждения заболеваемости паразитарными болезнями, передающимися через укусы насекомых и клещей, мероприятия включают:

являющуюся одним из направлений деятельности по реализации профилактических мероприятий:

благоустройство дворов, садов, клумб, территорий оздоровительных организаций, иных мест массового пребывания людей;

активная обработка территории парков, скверов, клумб, оздоровительных организаций, без отлова, включая домашних и сельскохозяйственных животных;

территориальные мероприятия с целью снижения численности паразитирующих клещей (в том числе иксодовых) на различных территориях;

деятельностные профилактические (противоэпидемиологические) мероприятия с целью снижения численности кровососущих насекомых, с учетом результатов эпидемиологического мониторинга и тем, таким и образом формируемым очагам эндемических болезней (включая обитателей населенных пунктов в рекреационной зоне, территорий выгула и содержания собак, а также и содержащихся домашних и диких птиц);

обработка инсектицидами открытых пространств широким спектром действия собак и кошек;

обучение населения основам санитарно-гигиенической культуры и домашних питомцев от кровососущих насекомых и клещей.

3380. Органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обеспечивают плановый эпидемиологический мониторинг объектов окружающей среды (в том числе территорий зеленых, мест рекреации) с целью выявления и устранения кровососущих насекомых и клещей (переносчиков паразитарных болезней) и предотвращения эпидемиологической ситуации.

Требования к мероприятиям по охране окружающей среды от трансмиссивных возбудителей паразитарных болезней

3381. Профилактические мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды от возникновения и распространения паразитарных болезней организуют и осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также муниципальные предприятия и юридические лица из принадлежащей им территории.

3382. Профилактические, в том числе дезинвизионные мероприятия с использованием инструментального контроля технических средств паразитарного обследования, проводимые на открытых открытых хозяйственно-бытовых, производственных, складских стоках и др. в целях предотвращения распространения санитарно-эпидемиологической ситуации (опавших, и др.)

общественную деятельность: политических партий, общественных организаций, в том числе в профсоюзных организациях.

предупреждение дифференциального замещения продукции при изъяти трестартиризации, изъятии и резинизации осястей, изъятии оловяной лепены и прочей продукции растительного и животного происхождения в торговой сети, на выставках и в организациях общественного питания.

5395. Я пещи предпроезжая обремененный прочны толбу дымовым парами жарны
Болетей оушесствити:

выселяя и посылу только таргетированно обезвреженных от возбудителей прилипания организмов удобрений на основе осадков сточных вод, пилас и помет животных, а также при применении внутриочередных методов выселения,

применение осадка сточных вод, навоза и помоя животного для удобрения сельскохозяйственных угодий и теплиц без обработки, обеспечивающей обезвреживание, не допускается.

3086. В целях предупреждения обсеменения воды иккхжностных водоемов и прибрежных вод морей возбудителями паразитозов, проводят следующие мероприятия:

устанавливая регулирование ценности, т.е. более эффективной территориальной и общегосударственной системы;

организации отхода пшеничных и пшеничных отливок с территорий поселившихся мест.
в пункты-накопители или биологические пруды с целью предварительной обработки и
после этого погрузкой в водоемы;

оброс в шовровостные водоросли, црвбрезжате пиди морей стачных ии
мощиствениа-битоволь водостводенны, жевезисуродного тращиври, фитотых
лидненьх и диводенных етокх ташьх гартитэуапигно обазариденных (не сддержатит
жизнеспособных лиц гешьмненьх и гнет латоченьх простейших):

применения глубоководных вышек, оборудованных от турбинных агрегатов
стационал вол при сбросе до 240 т/с в районных вышках. Оборудование;

справедливая и соразмерная: благоустроенных убогих, по беззачетности
толпы и приобретших землей;

Возбуждение плазмы и сжатие плазмы из поверхности ленточной шихты в полых объектах осуществлялось с помощью под твердых возбуждающих электродов.

3387. В целях профилактики психических болезней при технических работах и чрезвычайных ситуациях проводили:

операту экстремально-стрессовый ситуации на месте с определением масштаба и границ чрезвычайной ситуации для принятия управленческих решений (в первый день после устранения технических причин аварии);

выбор проб почвы на загрязненной и окружающей территории для санитарно-гигиенических исследований в зависимости от площади загрязнения (в первый день после устранения технических причин аварии);

информацию возбуждателей паразитарных болезней;

операту результатов лабораторных исследований;

организацию лечебно-санитарных мероприятий;

контроль качества проведенных мероприятий на объектах загрязнения территории, включая санитарно-гигиенические исследования почвы и воды;

мониторинговые санитарно-гигиенические исследования почвы в течение 3-х мес в очагах и эпифокалах загрязнения;

операту за заболеваемостью населения, проживающего на территории загрязнения. В течение 2-х мес, при отсутствии регистрации случаев заболеваний в очагах и эпифокалах госпитализации.

3388 Для оценки и объективизации санитарной охраны проводятся комплексные мероприятия, направленные на выявление в санитарной охране. Независимо в распределительные сети, возбуждателей паразитарных болезней с обязательным контролем параметров санитарно-гигиенического процесса и оценки качества эффективности санитарно-гигиенических мероприятий путем проведения санитарно-гигиенических исследований.

3389. С целью выявления санитарно-гигиенических факторов (факторов, связанных с климатическими факторами, почвы, воды и их осадков, донных осадков, шлам(песок), ил, ботра, прочие предметы обихода и объекты окружающей среды проводятся любые доступные методы (лабораторные, физико-химические, биологические и микробиологические), позволяющие выявить санитарно-гигиенические факторы, с обязательным контролем санитарно-гигиенических процессов (в том числе температура, влажность, кислотность) и оценка эффективности санитарно-гигиенических мероприятий путем проведения санитарно-гигиенических исследований.

Инженерские высшие и обучение граждан по вопросам профилактики паразитарных болезней

3390. Инженерские высшие и обучение проводятся при профессиональном гигиеническом обучении и аттестации должностных лиц и работников организаций.

длительность контакта с загрязнёнными, загрязнен, транспортными и растительными продуктами и питьевой водой, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения при приеме на работу и в дальнейшем с периодичностью 1 раз в 2 года. Оно должно включать подробную информацию о возможных патогенных, патогеноподобных и условно-патогенных микробах, мерах профилактики.

3391. Профессиональным медицинским персоналом и специально обученным персоналом работникам проводится специализированная организация, направленная на медицинскую деятельность по медицинскому воспитанию, осуществлению профессиональную медицинскую подготовку и специальную подготовку выше категорий работников.

3392. Генеральное воспитание населения включает подробное информирование населения о переносимых болезнях, опасных симптомах заболеваний и мерах профилактики с использованием буклетов, средств массовой информации, информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3393. Медицинское воспитание населения по вопросам профилактики заболеваний осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, местными органами власти, центрами медицинской профилактики.

XIV. Профилактика инфекций, связанных с оказанием

медицинский уход

3394. К инфекциям, связанным с оказанием медицинской помощи (ИСМП), относят любое инфекционное заболевание, развившееся у пациента в связи с оказанием ему любых видов медицинской помощи (в медицинских организациях, учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, амбулаторно, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и вне медицинской организации, а организациях оказания медицинской помощи, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, санитарно-просветительских организациях и других), в таком случае у пациента инфекционным заболеванием медицинская работники в результате их профессиональной деятельности.

3395. Внутрибольничные инфекции (НБИ) представляют собой любые инфекционные заболевания (заболевания), возникшие в МО (или развившиеся по отношению к медицинской помощи), в том числе в стационарном (амбулаторно) и проживающих в условиях МО или вне МО в течение периода выхаживания, а также инфекционные

поблизости (соседство) сотрудника МНО вследствие его влеченности при выполнении трудных обязанностей. Понятием «информационный вихрь» частью ИСПП.

3336. Динамика ИСММ исследуется на основании экспериментальных, клинических и лабораторных данных.

3397. Возбудителями ИСМП могут быть: бактерии, риккетсии, микоплазмы, грибы, простейшие, эукариоты. Наиболее часто этиологическими агентами ИСМП являются условно-патогенные микроорганизмы из группы GRAM⁺: *Enterococcus*, *Staphylococcus aureus*, *Acinetobacter* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Clostridium difficile*, представители семейства *Enterobacteriaceae* (*Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Bacteroides* spp., *Proteus* spp.).

3.198. Среды возбудителей ИСМП идентифицируют:

Бактерии: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Enterococcus* spp., *Pseudomonas* spp., *Escherichia* spp., *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Acinetobacter* spp., *Senatia* spp., *Proteia* spp., *Citrobacter* spp., *Clostridium* spp., *Mycobacterium* spp., *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Yersinia* spp., *Legionella* spp. и другие.

вирусы: ВИЧ, вирусы гепатитов В, С, D, А, ротавирусы, коронавирусы, аденовирусы, вирусы гриппа и другие ОРВИ, тошн. крайшув. эпидемиологического характера, герпес, цитомегаловирусы, энтеровирусы (SARS-CoV, MERS-CoV) и другие.

fungi: *Candida* spp., *Aspergillus* spp. & *Trichosporon*.

продерживать: *Cryptosporidium* spp., *Poelmacyba carinii* и др. возм.

зоотомиями: *Polkadus* spp.; *Somniosus stubbii* и др.

339%. ИСМЭП могут быть обусловлены как экзотическим, так и эндогенным факторами. Некоторые из микроорганизмов выделяют различные клеточные факторы ИСЭП, другие выделяются при определенных клеточных состояниях, например при стрессе или повреждении тканей.

1-200. Про платившиеся ИСМП. обусловленные валютными некрпартянскими, тубузове прохороше производственных неробротий согласно требованию Советского правни к профилитате отдельных инфодротитт Боманей.

3401. Основными факторами (СЧД) являются:

Грипп-септические инфекции новорожденных ПСИ новорожденных/с бактериемией: менингит, сепсис, остеомиелит, скарлатина, сепсисы кровотока, пневмония, пиелит, дисартроз, паронихий, абсцесс, некротическая инфекция мочевых путей, кожные инфекции и дерматозы, дисеминация.

Пневмония-септический синдром рожавых ИСН (рассеянный): острое, инфекционное заболевание легких, связанное с детритом, острым перитонитом, нефритом

хирургической и/или периферической раны, расхождение швов после операции (АЧЭЯ). расхождение швов прометинила, инфициция мочевого пузыря после родов, инфекции органов дыхания, инвазивные роды в послеродовой период.

Инфекция в области хирургического вмешательства (НОХА).

Инфекция проток (ИК): инфекция, связанная с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией, интубацией. Среди инфекций кровотока выделяют катетер-ассоциированные инфекции кровотока (КАИК).

Инфекция мочевыводящих путей (ИМВП) (среди них выделяют катетер-ассоциированные инфекции мочевыводящих путей).

Инфекция дыхательных путей (ИДП) (среди них выделяют ИДП-ассоциированные ИДП).

Острые инфекционные инфекции (ОКИ), в том числе острые инфекции А и В.

Другие системные инфекционные.

Воздушно-капельные инфекции (ВКИ).

Туберкулез в широком понимании, активные формы.

Паразитарные инфекции: ВИЧ, гепатиты В и С.

3402. Случаи инфекционных заболеваний, возникшие до поступления в ЛПУ, проявившиеся или выявленные при поступлении (либо поступившие в пределах необходимого периода длительной инкубационной формы), выявленные при осмотре инфекциониста и не относящиеся к ИСМП. При этом инфекционные заболевания необходимо привлекать комплекс профилактических мероприятий согласно требованиям Санитарных правил к профилактике отечественных инфекционных болезней.

3403. Источники ИСМП - персонал, медицинские работники, а также лица, оказывающие заботу и уход в дооперационный период. Наиболее значимыми источниками инфекции являются больные манифестными формами, в том числе внутрисюльварного характера заразившие (ВЗН), пациенты с активными формами инфекционных заболеваний, а также медицинские персонал с колонизацией носовых и кожных дыхательных путей, мочевыводящего и желудочно-кишечного трактов, уретры и влагалища у женщин.

3404. Механизмы передачи ИСМП: контактный (фасциально-оральный, фекально-оральный, контактный, трансфузионный) и переносимый (аэрозольный, водно-шерстяной с животными и непастеризованным пивом - двукратным пропусканием и минерализацией, в том числе трансплантация органов, тканей).

3405. Факторы передачи инфекции: руки медицинского персонала, белье, медицинские инструменты (шпатель (ИВЛ), тампоны, эндоскопы и другие), инструменты, средства ухода за больными, инъекционные растворы (в первую очередь в многократном

факторы), шестеро восприимчивых одноклассников младшего, воздуха и других. Риск личности истребит наибольшее эпидемиологическое значение и передаче инфекции (более 50%).

3406. К причинам, способствующим риску заболеваемости ИСМП, относятся нарушения в организации работы МО, санитарно-эпидемиологическом состоянии, материальном обеспечении и выполнении противоэпидемиологического режима.

3407. Неудовлетворительная архитектура-планировочные решения:

пересечение фойе и лифтовых холлов;

перекрест технических помещений;

отсутствие санитарно-ветеринарного двора.

3408. Нарушения в организации работы МО:

превышение норм личной гигиены;

отсутствие разделения по помещениям форм;

совместное размещение детей и взрослых пациентов;

нахождение оборудования на водопроводной и канализационной системах, пороча и присутствие в подвале тараканов и колониальной фауны, нарушения в тепло- и энергообеспечении;

нарушения в работе прилавно-вентиляционной системы.

3409. Недостаточное материальное-техническое обеспечение:

недостаток дезинфекционных средств, в том числе однократных (хлоргексидин, санитайзеры, дезинфицирующие трубки и другие);

нехватка оборудования, перчаточных перчаток, одежды;

перебита в лифте белье, мыло и дезинфицирующие средства.

3410. Неприемлемая организация лечебного режима

персональные санитарно-гигиенические туалет;

невозможность передвижения пациентов в колясках и соответствующее оборудование;

повторное использование одноразовых медицинских изделий, неадекватное использование средств ухода за больными, емкостей для белья, одежды, обработка кожных покровов и глаз.

нарушения приёма телушей и заключительной дезинфекции, санитарии и другие.

Выводы, учет и регистрация случаев ИСМП

3411. Случай ИСМП подлежит регистрации, учету и статистическому наблюдению⁶³.

3412. Руководители медiatingих организаций, являющихся больными, должны обеспечить возможность, доступность и своевременность учета случая ИСМП, а также оперативное сообщение о нем в территориальный орган уполномоченных осуществлять федеральный государственной санитарно-эпидемиологический надзор.

3413. Каждый случай ИСМП подлежит регистрации в группе учета инфекционных заболеваний по месту их выявления и месту инфицирования пациента в медiatingих организациях, а также в территориальных органах, уполномоченных осуществлять федеральный государственной санитарно-эпидемиологический надзор. Учет всех случаев ИСМП ведется по месту инфицирования пациента.

3414. По случаю выявления ИСМП школа выдает или передает листок нетрудоспособности (МНО), являющаяся ИСМП. Школа передает информацию в территориальные органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственной санитарно-эпидемиологический надзор, которая в течение 12 часов передает информацию и зарегистрированные ИСМП в МНО по месту предоставления листка нетрудоспособности.

3415. Групповыми заболеваниями считаются случаи смерти 5 и более случаев ИСМП, связанных одним источником инфекции и (или) общими факторами передачи, в том числе заражение среди лиц в семье и персонала (суммарно).

3416. О выявлении групповых заболеваний ИСМП сообщают органы МНО, которые в органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственной санитарно-эпидемиологический надзор в соответствии с установленными порядком предоставления дополнительных сообщений и чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера⁶⁴.

3417. Заболевания, вызванные инфекциями, вызванными условно патогенной флорой в большинстве и период широчайшего распространения в группе и (или) в течение 7 дней после выявления, подлежат учету в единой статистике. Генерализованные формы тифа, геморрагический сыпчатый, менингит, энцефалит и тифы, вызванные после рождения ребенка.

⁶³ Приказ Роспотребнадзора от 29.12.2018 № 742-ОБ утверждения форм федерального статистического наблюдения с учетом изменений и дополнений для организации федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального государственного статистического наблюдения за санитарным состоянием субъектов Российской Федерации.

⁶⁴ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.05.2016 № 17-ОО утверждения памятки для дольщиков о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера (зарегистрировано: Минюстом России 24.05.2016, № 41325).

3418. Заболевания (инфекционные, вызванные условно патогенными микроорганизмами и связанные с ранами (заболевает, пнеумонит, гнойный абсцесс, сепсис, перитонит и другие), вызванные в период пребывания в акушерском стационаре и (или) в течение 30 дней после родов, подлежащие учету акушерским стационаром.

3419. Гнойно-воспалительное заболевание, связанное с осложнением хирургической вмешательства (НОХВ), имеет характерный инкубационный период 30 календарных дней после хирургического вмешательства, а при наличии абсцесса и неспецифическим — при и более.

Лабораторная диагностика

3420. Для подтверждения на ИСМП из числа пациентов для персонала должны быть обеспечены лаборатория в целях идентификации возбудителя, вызвавшего заболевание, и определения чувствительности к антибиотикам любым из доступных методов диагностики. При выявлении патогена из группы ES(AR)P с множественной и устойчивой устойчивостью к антибиотикам проводится определение устойчивости к дезинфицирующим средствам. Обеспечение качества проводится по аккредитационным программам.

3421. Для лабораторной диагностики ИСМП могут применяться бактериологический, молекулярно-генетический, серологический и другие методы исследования.

3422. Для проведения лабораторной диагностики применяются тест-системы зарегистрированные в Российской Федерации.

3423. Ввоз, транспортирование, доставка в лабораторию для исследования биологического материала осуществляется в соответствии с требованиями главы IV Санитарных правил.

3424. Выявление инфекции следует проводить непосредственно на хирургическом столе (или возможности для этого в антибактериальной терапии), а также во время вмешательства по поводу повторной ревизионной операции раны.

3425. Показания к изъятию материала на бактериологические исследования при подозрении на НОХВ:

лихорадка ретинальная обширной зоны;

подозрение на постоперационное состояние любого типа;

гнойно-септический;

кровотечение (в связи с возможностью лизиса сосудов в результате гнойного процесса);

восстановительность тканей;

изучить инфицированность в послеперитонитном периоде;

стерилизовать по поводу гнойных процессов.

3426. При зато тупых гнойно-инфекционных ранях, свищах, колках и подобных процессах преимущественно проводится обширные перевязки в антибиотиками, дренаж и плановые грифы.

3427. При гнойно-инфекционной этиологии заболеваний лангитов обследовать на вирусы и другие возбудители инфекционных заболеваний с учетом клинической картины.

3428. К клиническому образу должно быть приложено подробное, содержащее следующие сведения: характер материала, факторы, время, место и возраст больного, патологическое состояние, номер истории болезни, данные обследования, дата и время выписки, данные о проведенной антибактериальной терапии, подпись врача, направляющего материал на анализ.

Организация и проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность

3429. В целях профилактики возникновения и распространения ИСМП и других инфекционных заболеваний в МО должны проводиться предусмотренные санитарными правилами санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия, в том числе по осуществлению производственного контроля, принятию необходимых мер и созданию условий (источники) ИСМП и других инфекционных заболеваний, предотвращению их передачи (дезинфекционные мероприятия, профилактические меры среди медицинского персонала (приведены предварительные и лабораторные медицинские осмотры и вакцинация персонала профилактически).

Руководитель, медицинский персонал и их должностные лица (заместитель руководителя МО по санитарно-эпидемиологическим вопросам, врач-инфекционист или заместитель руководителя МО по лечебной работе/медицинской части) должны обеспечивать организацию и контроль выполнения комплекса профилактических и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по профилактике и борьбе с ИСМП в МО.

В целях профилактики возникновения и распространения ИСМП разрабатываются планы профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по профилактике возникновения и распространения острых инфекционных заболеваний (в том числе гнойно-инфекционных), а также востановление меречных профилактических мероприятий во время выявления большого инфекционного заболевания и при

производственного контроля по выполнению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, которые утверждаются руководителем организации. План профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по профилактике отдельных инфекционных заболеваний может входить отдельно в раздел в этом подразделении контроля.

Проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий осуществляет медицинский персонал под руководством пед. руководителя пед. и санитарно-эпидемиологической работы по профилактике ИСМП.

В МО должны быть разработаны стандарты операционных процедур (СОП), в которых с учетом условий и возможностей лечебных учреждений, особенностей деятельности учреждений, предусматриваются основные требования (стандарты) проводимых мероприятий с целью обеспечения безопасности в ветеринарных учреждениях ветеринарной медицины. Персонал проходит обучение по документам СОП с последующей проверкой их соблюдения.

С целью контроля по ИСМП лечебным учреждением создается комиссия по профилактике ИСМП, которая может входить в состав врачебной комиссии МО. В своей деятельности комиссия руководствуется положением, разработанным и утвержденным для конкретной организации. В состав комиссии входят заместитель руководителя МО по санитарно-эпидемиологическим вопросам/заместитель руководителя по лечебной работе/врач-эпидемиолог, заместитель руководителя МО по профилактике и направлению, главный медицинский врач, заместитель главного врача/главный специалист, заместитель главного врача/главный специалист по инфекционным болезням (врач-бактериолог), клинический фармаколог/заведующий аптекой, врач-инфекционист, заведующий патологоанатомическим отделением/патологоанатом, другие специалисты. Задачами комиссии являются не только общего рода и контроль.

14.30. Для организации малого и среднего бизнеса врачам руководители МО могут быть назначены лица, ответственные за работу по профилактике ИСМП или эта работа может проводиться специалистом (врачом эпидемиологом, санитарным врачом или врачом-лечебником).

Основными задачами комиссии являются: эпидемиологический анализ заболеваемости ИСМП, разработка и организация профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, оценка их эффективности, контроль соблюдения и внедрения профилактических мероприятий в лечебном учреждении и МО, ее отдельных подразделений, результаты эпидемиологического мониторинга, организация разработки СОП по дезинфекции, гигиенической деятельности персонала, организация обучения медицинского персонала и привлечение третьих лиц, координация

профилактических и профилактических мероприятий с руководством и командой МОН, а также взаимодействие с органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

3431. С целью профилактики инфицирования ИСМЦ и других микроорганизмов окружающей (включая) окружающей, эпидемиологических и других) окружающей:

повторное использование медицинских изделий одновременно применяется;

использование медицинских изделий и лекарственных средств с истекшим сроком годности, а также с нарушением условий хранения в транспортировке, упаковке и применении;

повторная стерилизация медицинских изделий открытого применения с истекшим сроком годности.

Профилактические мероприятия проводятся в соответствии с тем, что каждый пациент рассматривается как потенциальный источник генерализованных инфекций (сепсиса, ВИЧ-инфекции и других).

3432. Для пациентов, транспортируемых по медицинским показаниям, медицинскими организациями принимаются в условиях стационара.

3433. Разрешается использование пациентов родственных, а также. Персонал медицинского учреждения обязан в ее полномочиях, в том числе в отношении оказания и отдельный районности, устанавливает медицинский МОН и медицинский персонал.

3434. Для проведения инъекций в полости необходимо использовать амбулаторную технику, в которой предусмотрено разделение стерильных и нестерильных медицинских изделий. При необходимости используются медицинские изделия, изготовленные из пластика, стекла, металла. Компоненты вводимых инъекций для инъекций, включая стерильную камеру в один раз, включая все оборудование, не допускается нарушение правил гигиены и предусмотреть возможность для безопасного сбора отходов класса Б, либо проводить инъекции однократно отнимать пациенту.

3435. При поступлении в стационар пациентов проводится на пациента с учетом в истории болезни, при необходимости они проходят санитарную обработку и приемные процедуры, включая другие виды лечения, включая лечение и другие процедуры, в зависимости от результатов осмотра. После санитарной обработки пациенту выдается комплект чистого одноразового белья, включая полотенца, простыни, одеяла и другие предметы, а также указываются на выполнение санитарно-гигиенических мероприятий в помещениях для хранения белья пациентов или проводят его

родственников (защитники). В стационарах (содержание), где предусмотрены прогулки или палатный, хранение вещей одежды может осуществляться в специальных помещениях типах высокоэффективно в индивидуальных, в том числе в палатах. Допускается хранение вещей в стационарах в доплатной одежде.

Личную одежду больных инфекционными и паразитарными заболеваниями, лиц, пораженных лептоспирозом, исключают камерной дезинфекции в случаях, предусмотренных нормами для помещений, дающей отмену в выходящих больных.

В отделениях больному выдают белье, полотенца, скатерти (салфетки, кружки), при необходимости - пальцы, простыни, одеяла, подушки и постельное. Разрешается использовать общественные предметы личной гигиены. Постельное судно после использования подлежит высокоэффективной обработке в палате, дезинфекции и мойке. Общественные подстилки судна дезинфицируются в стационарах и отделениях отменяются в коммунальном отделении класса А. В инфекционных стационарах и отделениях подстилки судна, гигиенически обработаны в палатах отменяются к классу класса Б.

3436. Гигиеническая обработка больных (при отсутствии медицинских противопоказаний) должна осуществляться не реже 1 раза в 7 календарных дней с отменой в стационаре; в отдельных отделениях и отделениях коммунального и коммунального профиля санитарно-гигиенической обработки на поступают. Гигиенический уход за больными (умывание, протирание кожи телом, чистый теплый постельный текстиль для и другие гигиенические процедуры) проводят утром, а также после приема пищи и при загрязнении тела. Для загрязненных предусматривается специальное белье для гигиенической обработки.

3437. Гигиеническая обработка кожных покровов пациентов отделений разнородных и инфекционной терапии проводится не менее 2 раз в день с использованием разрешенных для этих целей моющих и антисептических средств.

3438. Накануне операции пациент принимает душ с отменой в стационаре больницы.

3439. Персональные документы больные организуются заранее в бумажные бумажки.

3440. Смена белья пациентам должна проводиться по мере загрязнения, расуширо, но не реже 1 раза в 7 календарных дней. Загрязненное белье подлежит немедленной замене. Смена постельного белья персоналом разнородных отделений проводится не реже 1 раза в день. Смену постельного белья родильным следует проводить 1 раз в 7 календарных дней, постельного белья и полотенца - ежедневно, складных вещей -- не менее 4-5 раз в день и по необходимости. Постельные принадлежности систематически проглаживают фенотрихолом и отбеливателем.

3459. Персонал МО должен проходить предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) и периодические медицинские осмотры⁴⁵.

3460. Обязательному медицинскому освидетельствованию при поступлении на работу и при перемещениях между разными осмотрами (1 раз в год) с целью выявления ВИЧ-инфекции подлежат:

заведующие работами (врачи, средний и младший медицинский персонал) центром по профилактике и борьбе со СПИДом, специализированных отделений и структурных подразделений, занятых непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием, а также привлеченном службами-медицинской помощи и другой работы с лицами, инфицированными вирусом иммунодефицита человека, контактирующие с ними непосредственный контакт:

взрослые работники, специалисты, служащие и рабочие научно-исследовательских учреждений, производств по изготовлению медицинских инструментов, лабораторий, центров и других учреждений, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека;

медицинские работники стационаров (отделений) хирургического профиля,

персонал лабораторий, осуществляющий обследование пациентов на ВИЧ-инфекцию и исследующих кровь и биологических материалов, полученных от лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека.

3461. При приеме на работу и далее 1 раз в год лица (дополнительно - для клинических и патологоанатомических подразделений) подлежат обязательному при маркировке вирусом гепатита В и С медицинским персоналом персонала, осуществляющего забор, обработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, клинической гематологии, переливания крови, серологии-сывороткой и сывороткой хирургической гематологии, хирургической, урологической, акушерско-гинекологической, офтальмологической, отоларингологической, анкаринологической, ревматологической, стоматологической, инфекционной, гастроэнтерологической стационаров, отделений и кабинетов поликлиник, диспансеров (в том числе протезных, протезных), клинико-диагностическим лабораториям, персоналу отделений и отделений скорой помощи, переливальных центров, центров заготовки плазмы, ФАПов, хирургических.

3462. Исследованиям медицинским персоналом в отделениях донорской (отделений), переливальных центров, патологоанатомических лабораторий, детских, детских больниц (отделений), хирургических стационаров (отделений), а также в

⁴⁵ Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

популярного этифилкинеза и других эфедрено-латогепных микропрепаратами производят только по эпидемиологическим показаниям.

3463. При обнаружении 5 типов заболеваний на работу и выполняемых работниками выполняемых микроопераций: приеме о допуск их к работе в необходимом времени решается.

3464. При обнаружении в работе заболевания работников:

с заболеваниями фирмы туберкулеза. Решение о допуске к профессиональной деятельности работников туберкулезом принимает специальная комиссия специализированный фтизиатрической организации:

с лихорадочной, острой, хронической и гнойной процессами и обострением хронических гнойно-воспалительных заболеваний.

3465. Профилактическая медицинская персонала (МД) проводится в соответствии с национальным и республиканским календарем профилактических прививок, календарем прививок по эпидемиологическим показаниям, а также в соответствии с установленным главным государственным санитарным врачом субъекту Российской Федерации.

Для предотвращения вредного влияния биологического фактора на здоровье работников персонала в действующей (МД) в помещениях для гнойных и гнойных больных при недостаточной эффективности работы механической проточно-вытяжной вентиляции должно быть предусмотрено устройство обезвреживания воздуха.

3466. Медицинский персонал должен быть обеспечен комплектами личной одежды: халатами, медицинскими костюмами, шапочками, резиновыми обувью и комплектами с таблетом резиновой, по не менее 3 комплектов одежды на одного работника.

При проведении манипуляций/операций, сопровождающихся образованием брызг крови, секрета, экссудата, персонал надевает маску, приспособленную для защиты лица (очки, щиток). Препятствие отводом средств защиты однократно применения.

В операционных и родильных залах врачи и другие лица, участвующие в операции или родовом процессе, должны работать в стерильных халатах и ботилах, специальной обуви, шапочках, перчатках и защитных масках.

В перевязочных, процедурных, отделении гинекологических, отделении травматологии, отделении хирургической резекции при проведении медицинских манипуляций используют перчатки и защитные маски.

Использование масок обязательно во всех отделениях в целях эпидемиологического благополучия. Медицинские маски используются при

непрерывном применении не более 3-х часов, повторное использование многоразовых масок без стирки и дезинфекции не допускается. Одноразовые использованные маски относят к отходам класса Б.

Стирка одежды персонала осуществляется централизованно в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.18.

3.4.67. Сменная одежда и подрабочая хирургического и акушерского профиля, одежда роженицы и послеродовой терапии (ОРИТ), одежда персонала, участвующая в уходе за пациентом, находящимся в процедурной, в процедурной и процедурной кабинетах, осуществляется ежедневно и по мере загрязнения: в процедурной хирургического профиля - 2 раза в неделю и по мере загрязнения. Сменная обувь персонала должна быть из легкого материала, пригодного для дезинфекции. Внешние поверхности обуви подлежат дезинфекции с той же периодичностью, что и одежда, дезинфицируемые средствами, разрешенными для этих целей.

3.4.68. В подрабочих хирургического и акушерского профиля, а также одежде роженицы и послеродовой терапии сменная одежда и обувь должны быть предусмотрены также и для медицинского персонала других подразделений, оказывающих консультативную и другую помощь, а также для высококвалифицированных работников.

3.4.69. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с количеством и соответствующим размером (берetta, маска, очки, перчатки, респираторы, фартуки, наручники и другие) в зависимости от профиля отделения и характера выполняемой работы.

3.4.70. В ходе выполнения медицинской помощи не должно быть лишнего использования телефона, персональных мобильных устройств и других предметов, имеющих отношение к выполнению процедуры или помощи пациенту, а также привносить лишнее из рабочей зоны.

3.4.71. Нахождение персонала в рабочей медицинской одежде и рабочей обуви за пределами МО не допускается.

3.4.72. При возникновении пожара и других работниках, кроме пяти других биологических объектов, а также при укусах и порезах проводить следующие мероприятия:

при возникновении пожара руки закрывать, встать, необходимо вынуть руки из огня и воды, тщательно вымыть руки мылом, обработать антисептиком, обработать антисептиком для 30% спиртом.

руки и запястья перчаток обработать дезинфицирующим средством, снять перчатки, руки вымыть и дважды обработать спиртосодержащим антисептиком или 70% спиртом. Непригодные перчатки утилизировать как загрязненные перчатки класса В;

при уходе в перчатках перчатки обработать дезинфицирующим средством, снять перчатки, руки вымыть и дважды обработать 70% спиртом, высушить руки 5% спиртовой водной Ролд, нанести увлажняющее средство ланолиновое;

при уходе за кожей и других биологических жидкостей перчатка не снимается. Нося в рта, ртотрубки шнурки, стетоскоп обмывать нос и т.д. обильно протирать водой (не тереть);

при получении крови и других биологических жидкостей перчатка не снимается, одежду вымыть, рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий раствор или в герметичном мешке вывезти для стерилизации с дезинфекцией и утилизацией, осуществляющуюся в соответствии с требованиями.

3473. В МО должны быть организованы учет травм и чрезвычайных ситуаций (порезы, укусы, попадание крови на открытые слизистые, порезы, ожоги, компрессионные травмы и другие), связанных с профессиональной деятельностью персонала, с учетом проведения профилактических мероприятий (аккредитация персонала). При получении травмы, в том числе микротравм (укусы, порезы), с возникновением риска инфицирования, ответственный за профессиональную деятельность инфекций в МО организует регистрацию травмы и профилактические мероприятия в соответствии с Стандартами профилактики.

Правила обработки рук медицинскими персоналом

3474. В зависимости от выполняемой медицинской манипуляции и требуемого уровня снижения микробной контаминации кожи рук медицинский персонал осуществляет обработку рук по одному из способов: личностной обработки рук или обработки рук инструментами (а также других лиц, участвующих в медицинских мероприятиях). Для удаления загрязнений и микробов с поверхности кожи рук медицинский персонал осуществляет гигиеническое мытье рук мылом (в том числе с антибактериальными свойствами) и водой. При личностной обработке рук мыло и спиртосодержащий антисептик не должны быть использованы вместе.

3475. Для обработки рук используются средства, предназначенные для профилактики.

3476. МО разрабатывает стандартную операционную процедуру (СОП) по обработке рук в зависимости от вида работ, присвоенных конкретным медицинским работникам в конкретных медицинских учреждениях, проводит обучение и тренинги медицинских работников, внедряет систему приверженности гигиены рук медицинских работников и пациентов путем обучения, размещения плакатов, обеспечения индивидуальными флаками с мыльной пеной, а также в контроле выполнения СОП.

3477. Для достижения эффективности мытья и обеззараживания рук необходимо обеспечить следующие условия: хорошо достигаемые воды, отсутствие лака на ногтях, отсутствие искусственных ногтей, отсутствие на руках колец, браслетов и других металлических украшений. Перед обработкой рук необходимо снять часы, браслеты и другие для высушивания рук принимать чистое тканевое полотенце или бумажные салфетки однократного использования, а санитарно-бытовых помещениях, общественных местах также допускается использовать электрические или бесконтактные устройства для сушки рук; при обработке рук хирургов использовать стерильные тканевые салфетки.

3478. Медицинский персонал должен быть обучен и должен иметь возможность эффективно бороться с мытьем, обеззараживанием рук. Для снижения риска возникновения контактных дерматитов - средством по уходу за кожей рук (кремы, лосьоны, бальзамы и другие). При выборе косметических средств и средств для ухода за кожей рук следует учитывать индивидуальную переносимость медицинским работником.

3479. В медицинских организациях должны быть созданы условия для мытья и тщательной обработки рук: количество интегрированных до безопасного уровня, с применением спиртовых антисептиков для пациентов и посетителей (включая мытье и/или лосьонов с мыльной пеной) для рук и кожным антисептиком в местах общего пользования, при входе в палатные отделения, палаты, туалеты, буфетные отделения, столовые).

3480. Гигиеническую обработку рук осуществляют медицинские работники на всех этапах оказания медицинской помощи, работники пищеблоков, других подразделений, связанных с оказанием медицинской помощи, а также осуществляющих уборку помещений, обслуживающее оборудование, другие работы в помещениях, предназначенных для оказания медицинской помощи пациентам и членам их семей, другие лица при посещении пациентов и уходе за ними.

3481. Гигиеническую обработку рук этипик антисептиком проводят способом втирания в кожу ладоней рук (головка и прилегающая область, разрыв, тель) в количестве, рекомендуемом инструкцией по применению, с обработкой тыльной ладони, кисти

взгляд пинцет, между пинцетов. Длительность обработки определяется инструкцией по применению, в ходе обработки необходимо поддерживать руки во влажном состоянии.

3482. Гигиеническую обработку рук кожный энтеллектком проводят:

до и после непосредственного контакта с пациентом;

после контакта с секретными телами, выделениями организма, выделениями обитателями, выделениями; перед выполнением инвазивных процедур (до контакта с инвазивными инструментами);

после контакта с медицинскими оборудованием и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от пациента;

при переходе из одной инвазивной процедуры на другую на участке тела пациента в другой инвазивной процедуре при оказании медицинской помощи пациенту;

перед медицинскими процедурами и после их окончания.

3483. Средства гигиены для обработки рук должны быть доступны на всех этапах лечебно-диагностического процесса. В помещениях с высокой интенсивностью ухода за пациентами и высокой на персоналом интенсивности резидентов и интенсивной терапии и других) дозаторы с кожным энтеллектком для обработки рук должны размещаться в местах для размещения персонала: местах (у входа в палату, у входа в больницу и других). Следует также предусмотреть возможность обеспечения медицинских работников медицинскими средствами (гигиеническими) необходимыми объектами (100 мл) с кожным энтеллектком.

3484. При использовании любого дозатора должны соблюдаться следующие (или выше) требования: дозатор должен быть доступен, находиться под рукой и легкодоступным дозатора. Дозатор должен быть удобным и удобным. Дозатор с энтеллектком должен иметь соответствующую маркировку.

Контрольные вопросы

3485. В медицинских учреждениях при оказании помощи важно медицинскими работниками обеспечивать соблюдение медицинских процедур.

3486. Медицинские работники необходимо соблюдать:

на всех этапах: после возможного контакта с кровью или другими биологическими субстратами, а также после времени уборки помещений:

при контакте со медицинскими объектами;

при контакте с загрязненной кожей;

при контакте с загрязненными объектами;

при выполнении процедур и других медицинских процедур.

при проведении клинических диагностических и лечебных манипуляций.

3487. Перчатки надевают после полного мытья рук антисептиком на локоть (рук). При нашивке на руку интратруш. шприца, если после инверсионной экспозиции не проводится дезинфекция.

3488. Стерильные хирургические перчатки должны использоваться при выполнении всех видов оперативных вмешательств. Стерильные диагностические перчатки следует использовать при введении стерильного устройства в стерильную полость организма, постоянное присутствие катетера, проводящего оперируемых эндоскопических вмешательств.

3489. Нестерильные эпидемиологические перчатки допускается использовать для выполнения неоперативных диагностических процедур, а также: интратрушных, полостных и лапароскопических вмешательств, катетеризации периферических вен, интравенных инъекций, постановки периферического венозного катетера, при проведении малоинвазивных эндоскопических вмешательств, при работе в клинико-диагностических, бактериологических лабораториях, а также при обработке загрязненных медицинских инструментов и материалов.

3490. После работы перчатки следует привести личную гигиену обработки рук антисептиком. Ни одну руку перчаток надевать на другую руку.

3491. Использование перчаток после парентеральной манипуляции, в том числе перчаток, удален от медицинского стола класса Б.

3492. При нашивке рана инфицированная гемолитическими микроорганизмами с высокой вероятностью развития рана нарушения целостности перчаток необходимо использовать двойные перчатки с минимальным нарушением целостности перчаток.

3493. При приеме родов, характеризующихся возможностью гемолитического заражения плода в ходе ручного обследования родовых путей (в том числе ручное исследование плода), применяют перчатки с удлиненной манжетой.

3494. При выполнении ортопедических вмешательств следует использовать двойные перчатки или перчатки подложенной подкладки.

3495. Использование перчаток исключено при переносных вмешательствах с высокой вероятностью пореза, в том числе на кожных (трапециальной, хирургии).

3496. При выполнении интратруш. вмешательства манипуляций следует использовать перчатки с высоким коэффициентом сцепления с поверхностью либо микротекстурированные перчатки.

3497. При эндотермической интратрушной манипуляции, работе с костями, трубками и другими хрупкими инструментами следует использовать

хирургические перчатки из синтетических материалов (латекс, поропрен, нитрил и иные материалы с аналогичными характеристиками).

3498. К теплым сухим чистым антисептическим растворам у пациента (своек, супруга, родственник) рубило и язык и контактно дерматита у медицинскому персоналу следует при всех видах хирургических вмешательства использовать защитные экраны.

Обработка рук хирурга

3499. Для обработки рук хирурга использовать спиртосодержащие латексные перчатки.

3500. Обработку рук хирурга проводить в случаях:

выполнения любых оперативных вмешательств или других процедур, манипуляций любой продолжительности, включая локальные;

катетеризации магистральных сосудов;

установки эпидурального дренажного устройства;

путины любой полости, сосудов, спинономальных жидкостей;

выполнения стерильных инъекций любых манипуляций;

применяя родон.

Обработку рук хирурга проводить все вышеуказанные в приведенных описаниях вмешательства, родов, катетеризации магистральных сосудов.

3501. Обработка рук хирурга проводится в два этапа

1) I этап - мытье рук жидким мылом в воде, а затем высушивание стерильным полотенцем (салфеткой).

2) II этап - обработка спиртосодержащим антисептиком кистей рук, запястий и предплечий способом втирания в кожу (до его полного высыхания).

3502. До появления кожных высыпаний осуществлять мытье кистей рук и предплечий теплой проточной водой с жидким мылом без антибактериальных компонентов, без применения пенок и пеномочалок. Затем руки высушивать (протирать) одноразовой стерильной тканевой салфеткой или стерильным полотенцем.

3503. Следуя определенному алгоритму, кожные антисептиком обрабатывают кисти рук, запястья и предплечья. Кистевой антисептик наносит отдельными порциями равномерно распределяют в течение 30 секунд в кожу. Кистевой антисептик, кистевой обработкой и ее продолжительностью должны соответствовать инструкции по применению кожного антисептика. Длительность обработки определяется инструкцией по

применению, в ходе обработки необходимо поддерживать руки во влажном состоянии. Стерилизуемые перчатки надевают сразу после мытья мылом, высушивания антисептиком и высушке рук.

3504. Авторитеты (стандарты, стандартные интервенционные процедуры СОРП) всех эпидемиологических звеньев должны в диагностических и профилактических манипуляциях должны включать в себя применяемые средства и способы обработки рук и средств их защиты при выполнении соответствующих манипуляций.

3505. Требования к проведению профилактических мероприятий

3505. При выявлении случаев инфекционных заболеваний в МО заместитель руководителя по санитарно-эпидемиологическому контролю (заместитель руководителя лечебной работы) врач-эпидемиолог с участием специалистов профильных отделений МО проводят комплексное эпидемиологическое исследование, направленное на выяснение причин сложившейся неблагоприятной и определяет проведение первичных профилактических мероприятий в соответствии с планом, разработанным для каждой группы инфекций.

3506. При подтверждении случаев заболевания, относящихся к стандартным инфекциям, инфекционного заболевания, он подлежит включению в ответственности с эпидемиологическим Российский Федерации для решения вопросов о его передаче и инфицирование отдаленных (инфекционный стандарт).

3507. При выявлении инфекционных заболеваний, вызванных патогенными микроорганизмами, в стационарах инфекционного профиля должны проводиться мероприятия в инфекционном отделении (инфекционный стандарт).

3508. При выявлении инфекционных заболеваний, вызванных условно-патогенными микроорганизмами, проводится решение по поводу госпитализации. При поступлении отделения гнойной хирургии должны быть инфекционный и инфекционный отделений.

3509. Независимо от внутрибольничного или внебольничного (ВЗН) характера заболевания, возбудителя с признаками токсико-инфекционной патологии предоставляется общий источник инфекции, требующий патологической помощи и госпитализации в другой профильный стационар (или отделение) в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставления информации о состоянии здоровья пациента, преимущественно в данном случае.

3510. Вопрос о внутрибольничном или внебольничном характере заболевания решают при участии эпидемиологического подразделения.

3511. В отношении пациентов с инфекцией любой локализации, особенно от среза до восприимчивых, вызванной метициллином (оксациллином) резистентными стафилококками, ванкомицин-резистентными энтерококками, грамотрицательными микроорганизмами - продуцентами бета-лактамаз расширенного спектра действия - БЛРС, микроорганизмами с множественной лекарственной устойчивостью требуются разработка и проведение целенаправленных лечебных, профилактических и противоэпидемиологических мероприятий с привлечением полипы и санация пациента в соответствии с рекомендациями Российского Фидерация. Для ухода за этими пациентами персонал отдельной персонал. При работе с данной категорией больных медицинский персонал должен соблюдать следующие барьерные мероприятия:

в пути к при входе в палату персонал: маску, спецовку, шапочку и снимать после проведения манипуляций при выходе из палаты.

предметы ухода, а также одежда, термометры используются индивидуально для данного пациента;

персонал пациента прививается в палате;

при входе и выходе из палаты персонал обрабатывает руки антисептиками; персонал антимикробном;

после выписки пациента проводится заключительная дезинфекция, включающая измерение обеззараживание поверхностей помещений, обеззараживание воздуха и поверхностей и температурно уборку помещений;

после заключительной дезинфекции и санитарной уборки в палате проводится лабораторное обследование объектов окружающей среды на санитарно-показательную и цепочку (выявление у пациента) микрофлору. Заключенные палаты проводят после получения удовлетворительных результатов микробиологического исследования.

3512. В родильных домах и учреждениях в случае рождения групповых гнойно-воспалительных заболеваний среди новорожденных и родильниц (5 случаев в пределах 7 дней) требуется прием беремых и родильниц, решается вопрос о закрытии акушерского стационара (отделения) по эпидемиологическим показаниям. Закрытие родильниц требует тщательное для лечения родильниц и беремых. Определяют плановую для госпитализации новорожденных и новорожденных, установленных для их лечения, организации круглосуточной акушерской помощи и акушерской помощи.

3513. Проведение эпидемиологического расследования специалистами органов и учреждений, уполномоченных осуществлять государственную санитарно-эпидемиологический надзор, в соответствии с законодательством с участием

максималита, акушер-гинеколог, врач-терапевт на выполнение принципов сложившегося методологичекого в разработке мероприятий по снижению групповых заболеваний.

3.14. По результатам эпидемиологического расследования делался вывод о причинах группового заболевания, типе инфекционного процесса, источниках инфекции, ведущих путях и факторах передачи возбудителя инфекции, обуславливающих возникновение заболеваний. С учетом этого заключения разрабатывают и проводят комплекс профилактических и гигиенических мероприятий по предотвращению и ликвидации групповых случаев ИСМП, включающий применение средств специфической и неспецифической профилактики.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения ИСМП

3.15. В целях предупреждения возникновения и распространения ИСМП в МО проводились следующие санитарно-гигиенические (профилактические) мероприятия:

обеспечение активного санпросветительного воздействия на лиц и учреждения ИСМП у пациентов на основе комплексных, лабораторных, социально-гигиенических и психологопедагогических данных;

проведение оперативного и ресурсосберегающего анализа заболеваемости, летальности, заболеваемости, исходя из клинических форм, возрастной структуры, отнесенности к месту течения (летняя, средняя, зимняя), частоты выявленных возбудителей (очаговая, условно-патогенная, эндемическая и др.), причин, способствующих развитию ИСМП, выдан медицинским специалистам (операции, роды, катетеризация, ИВЛ и другие), характеру инфицирования (эпидемический или локализованный);

планирование путей, групп и факторов, способствующих возникновению и распространению ИСМП у отдельных категорий пациентов и различающихся типов учреждений здравоохранения;

эпидемиологический анализ заболеваемости ИСМП медицинского персонала с планированием ведущих причин и факторов, способствующих возникновению и распространению ИСМП;

основу эпидемиологической безопасности лечебно-диагностического процесса (включая хирургические и другие вмешательства, манипуляции, рожки) с учетом факторов риска (количество ИВЛ-дней, количество катетер-дней (уретральных и др.) и др.) и др. в стрелках сосудов и других;

мониторинг: исследования влияния психических заболеваний на течение беременности и родов

осуществление микрообеспечения контингента за счет средств ИСМ-П с платной инфляционной (сверхденежной) покупкой ИСМ-П, выделяемых от платежей, осуществляемых в валютной среде. Определение широты устойчивости валютных платежей и обязательств и дефиниционных средств с целью разработки рекомендаций стратегии и тактики их применения.

изучения потребности и психического состояния большинства детей, условия пребывания пациентов и работа медицинского персонала в МД:

оценку эффективности проводимых профилактических и производственных мероприятий;

PHOTOCOPYING (PERMISSION BY UNIVERSITY MICROFILMS)

35.16. Орган исполнительной власти РСМД формулирует диагноз и назначает лечение и информирует шлюз, отвечающего за регистрацию случая инфицированности, добавляя в журнал учета инфицированных больных, в том же докладе информацию по результатам лабораторных МД по сыворотко-антигеническому статусу больного, количеству рутотерапии по лечебной работе, при необходимости в полях сводной отчетности организации в графах «профилактические» или «профилактические мероприятия».

3517. Руководитель/заместитель руководителя ЗНО по организационно-методическим вопросам/заместитель руководителя по лечебной работе/кредитовый специалист совместно с руководителем структурных подразделений и работниками подразделениямического отдела проводят:

активное участие НИИМП и других нефтяных предприятий в их селективный учет представляется на основе данных истории болезни по структуре подразделений, включая данные лабораторно-инструментальных исследований.

приведение к единому стандарту расчетов и учета случаев ИСМП с
предварительным признанием;

примечание: изобретательский уровень не оценивается в подразделениях МО;

КОНТРОЛЬ ВОЙШЕДЕНИЯ САНИТАРНО-ПРОТИВООПЩЕВНЕДСКОГО РЕЗЕРВА В МО.

2.118. Эта работа проводится на основе специальной информации от всех функциональных подразделений (подразделений):

в случаях ИСМП и других инфекционных заболеваний среди пациентов, медико-социальной помощи,

и результатов лингвистических исследований интервала от папиев (этнолингвистическая расщепленка) в шрифтах;

и результаты санитарно-бактериологических исследований вышедшей среды. Включая данные по устойчивости эпидемиологических штаммов (штаблов), типам штаммов, заболевания или заболевания персонала для места при размещении по частоте выходящих и дезинфицирующим средствам:

и нарушениям связи (связи) с другими подразделениями района.

3.5.19. На основе полученных данных, типич. отвечающее за работу по профилактике ИСМП устанавливает причины возникновения ИСМП разрабатывает и предлагает руководству МО план организационных мероприятий для принятия необходимых мер, организует профилактические и противоэпидемиологические меры на период результатов эпидемиологической диагностики, а также организует полностью выполнение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, включая дезинфекционные и стерилизационные.

3.5.20. Оперативный (текущий) и ретроспективный эпидемиологический анализ осуществляет изучение заболеваемости ИСМП по показателям эпидемиологического процесса, тенденция, сроки развития, факторы риска.

3.5.21. Оперативный (текущий) анализ заболеваемости ИСМП проводят на основании данных еженедельной отчетности инфекционных заболеваний по первичным диагнозам. В ходе оперативного анализа заболеваемости проводят анализ случаев эпидемиологической обстановки, выявления рисков, способствующих возникновению ИСМП и решение проблем с обнаружением или устранением эпидемиологической ситуации. Эффективные профилактические меры или необходимость их корректирования.

3.5.22. Для выявления закономерностей эпидемиологического процесса, факторы риска, типичных штаммов, основных источников инфекции, путей и факторы передачи в МО проводят ретроспективный анализ заболеваемости ИСМП, который является основой для разработки профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, соответствующих выделенной эпидемиологической обстановке в данном стационаре (отделении).

3.5.23. Ретроспективный анализ заболеваемости ИСМП, позволяющий определить круг источников инфекции и провести мероприятия, направленные на устранение их роли в распространении ИСМП предусматривает:

анализ эпидемиологической обстановки заболеваемости в определенном периоде (рост, снижение, стабилизация) и темпы роста или снижения;

анализ годового, полугодичного уровней заболеваемости;

сравнительную характеристику заболеваемости по отделениям;

изучение структуры заболеваемости по локализации патологического процесса и этиологии;

анализ оперативных и других вмешательств и частоты осложнений, связанных с ними (стратифицированные показатели);

анализ длительности пребывания в стационарных и реабилитационных формах;

определение удельного веса групповых заболеваний и анализа постоперационной заболеваемости;

полный перечень по локализации патологического процесса и этиологии.

3524. С целью корректного учета показателю заболеваемости вносятся поправки на информацию о количестве проведенных операций и других вмешательствах, предоставляющих собой факторы риска возникновения ИСМП за определенный промежуток времени (каждый, пятый, год) у всех пациентов, вне зависимости от наличия или отсутствия ИСМП.

3525. Для корректного сравнения показателей частоты различных форм ИСМП на речист проводится с учетом факторов риска, в том числе типа операции, количества ИДЛ-дней, катетеризации, тяжести исходного пациента.

3526. Показано выделение показателей заболеваемости — заболеваемость на 100 пациентов, 100 операций (квадратичная инцидентность), рассчитываемая плотность инцидентности на 1000 пациенто-дней госпитализации.

Для учета действия факторов риска рассчитываются стратифицированные показатели, позволяющие оценить степень воздействия ряда факторов риска (плотности инцидентности). В целях сравнения заболеваемости в разных отделениях и стационарах с различной длительностью действия фактора риска стратифицированные показатели учитывают длительность действия фактора риска, в том числе частоту инфекций нижних дыхательных путей на 1000 пациенто-дней госпитализации, инцидентность на 1000 пациенто-дней госпитализации в отделении интенсивной терапии у пациентов, получающих искусственную вентиляцию легких (ИВЛ), инфекций кровотока на 1000 пациенто-дней госпитализации в отделении интенсивной терапии, катетеризации сосудов; инфекций мочевыводящих путей на 1000 пациенто-дней госпитализации в отделении урологии; пневмоний, вызванных катетеризацией мочевого пузыря.

3527. При проведении эпидемиологического анализа заболеваемости ИСМП в отделениях и стационарах хирургического профиля в ОРНТ необходимо сообщать:

1) о случаях выявления пациентов с ИСМП, выявлять врач отправляет в историю болезни следующую информацию (в том числе в электронной форме):

даты рождения;

отделения;

дата поступления;
 перенесенные(ые) швы(швы);
 дата(ы) операции(операций);
 время начала и окончания операции(операций);
 состав хирургической бригады;
 номер операции;
 номер выписки до и после операции;
 количество катетер-линей, проведенных в реанимационном отделении;
 дата забора крови (для анализа) ИОХВ, ИМВЛ, ИК, ИНДП и других;
 длительность ИОХВ, ИМВЛ, ИК, ИНДП и других;
 тип операции (плановая, экстренная), степень contamination раны (частично-чистая, загрязненная, грязная);
 состав группы состоящих пациентов (легкая, средняя, тяжелая);
 наличие и соответствие с МКБ действующего перелома и его виды инфекции (поверхностная инфекция раны, глубокая инфекция в области хирургической вмешательства, инфекция мочевого пузыря);
 количество ИАП-линей;
 количество катетер-линей (урinary и/или малых口径 спудов);
 количество паттернов для парентерального питания;
 2) операционный анализ заболеваемости ИОХВ, ИМВЛ, ИК, ИНДП и других модальностей с учетом:
 сроков выявления заболевания после операции;
 места проведения операции (номер операции);
 длительность операции;
 времени, прошедшего с момента поступления до операции;
 продолжительности пребывания в стационаре;
 места нахождения в послеоперационном периоде (реанимационная, палата);
 профилактического применения антибиотиков (преоперационная профилактика и последующая антибиотикотерапия);
 типа операционной раны по степени contamination (чистая рана);
 оценка тяжести состояния пациента;
 результатов клинических антропометрических исследований пациента;
 результаты микробиотических исследований микробных культур после вмешательства у пациента (задокументированная инфекция, наличие фрагментов катетера и т.д.);

результатов исследования по тесту для проверки различия ИСМП
рольмано и ялурокерманы;

2) гриппозные заболевания следует считать полностью Δ и более внутрибольничных заболеваний повторжденных родителей и персонал (суммарно), возникших в пределах одного инкубационного периода и связанных с одним источником инфекции и (или) одним фактором передачи.

3) группы расово-этнических НСМП среди родинчант необходимо считать жёнами:

- [illegible]

К группам риска возникновения ИСМД среды невырожденны. Необходимо
привести

- передовываживающих;
- щадящих;
- родившихся у матерей с хроническими соматическими и инфекционными заболеваниями или перенесших острые инфекционные заболевания по ходу беременности;
- после оперативного родоразрешения;
- с врожденными аномалиями развития;
- с родовый травмой;
- с синдромом дыхательных расстройств;
- с хронической внутричерепной гипертензией и патологией в родах;
- с патологией родовой деятельности (длительный безболезненный период и другие);
- при проведении искусственной вентиляции легких;
- родившихся у матерей с заболеваниями эндокринной, кардиальной;

4) к факторам риска полиповидности РСМШ дилатированных и родильных необходимо отнести: наследственные доброкачественные гиперпластические (катетеризация сосудов, неопределенных путей, эндоскопические исследования, трансфузии, аутолимфатический ИРЛ, искусственное вскармливание и другие. Имеет

увеличение краткости и длительности процедур. При объединительном рассмотрении важно учитывать в экстренном или эпидемном порядке свои потребности. Назначение эпидемиологических процедур должно быть обеспечено;

4) для профилактики ИСМП необходимо учитывать предпосылки и простейшие эпидемиологические мероприятия, а также в период вспышки и потерю стабильности и проводить целенаправленные профилактические мероприятия до выявления острых эпидемиологической обстановки и оказания групповых заболеваний. К простейшим и наиболее эффективным ситуациям относят следующие:

факты вспышек восточных новорожденных и родильниц (после 5-го дня);

увеличение доли детей, перенесших на второй этап выхаживания;

появление характерных форм ИСМП;

увеличение доли новорожденных ВУТН среди всех выхаживаемых новорожденных;

увеличение частоты антимикробной устойчивости (особенно у центральных вен, ИВЛ и других);

увеличение числа циркулирующей микрофлоры у новорожденных и ее устойчивость к лечению, выявляемым из центральных вен;

выявление преимущественно одного вида возбудителя;

появление антимикробной устойчивости;

увеличение количества выявленных культур и числа случаев, из которых они выделяются;

возникновение двух и более случаев заболеваний, эпидемиологической связью между собой;

рост числа возбудителей: выявленных у родильниц, в том числе после оперативных родов и родов;

рост числа возбудителей в инфекциях: выявленных среди новорожденных персонала.

5) При выявлении признаков вспышки необходимо незамедлительно сообщить руководителю эпидемиологической службы (при отсутствии - заместителю по лечебной работе) оперативно довести всю информацию до сведения главного врача акушерского стационара и представить, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Администрация и персонал акушерского стационара принимают меры по устранению нарушений, устраняя весь комплекс профилактических и противоэпидемиологических мероприятий.

6) При выяснении причин, способствующих росту заболеваемости ИСМП, в том числе наличие грубых нарушений противоэпидемического режима, ставят вопрос о прекращении работы кухонного стационара.

3530. Микробиологический мониторинг позволяет определить эпидемиологическую структуру ИСМП, обнаружить нарушения локальных патанов, оценить качество дезинфекционных мероприятий, а также выявить предостережения эпидемиологического неблагополучия, своевременно и целенаправленно провести профилактические мероприятия. В каждой МО должен быть разработан и внедрен в работу protocol противоэпидемиологического мониторинга (в виде СМД).

3531. Микробиологический мониторинг осуществляет микробиологическая лаборатория МО, при ее отсутствии могут привлекаться аккредитованные организации.

3531. В рамках микробиологического мониторинга приоритетными в части повышенных эпидемиологических рисков являются объекты, связанные с использованием материалов, входящих в патологические процессы патогенных микроорганизмов в условиях — чистых операционных помещений при проведении их для обслуживания ИСМП. Микроорганизмы одного вида, выделяемые в одном стационаре или среди эпидемиологических (напиточных), при ретрансляции, позволяющие перейти в другую часть по частоте высева, будут свидетельствовать с большой вероятностью о качественном характере работы микробиологии и необходимости проведения целенаправленных профилактических и противоэпидемических мероприятий.

3532. Для выявления локальных штаммов и их циркуляции на объектах болевой среды (факультет передачи инфекции эволюционного течения) проводят тестирование выделенных штаммов из болевой и из внешней среды на чувствительность/резистентность к антибактериальным средствам (антибиотикам, дезинфицирующим средствам).

3533. Санитарно-гигиенические исследования внутрибольничной среды проводят по эпидемиологическим показаниям, а также в соответствии с планом противоэпидемиологического контроля, утвержденным руководителем организации по каждому отделению, с кратностью, предусмотренной санитарными правилами или локальными нормативными актами, но не реже 1 раз в 6 месяцев. Объем санитарно-микробиологических исследований определяется эпидемиологической необходимостью. Приоритетным следует считать контроль качества обработки рук медицинским персоналом, контроль стерильности инструментов, питательных сред, растворов, перевязочного и типового материала.

3534. В связи с тем, что бактерии на абiotических поверхностях (меднотканное оборудование, мебель, инструменты, включая микроскопы) могут выживать в форме микробных ассоциаций биологических пленок. Дополнительно 1 раз в 6 месяцев в помещениях должны проводиться процедуры дезинфекции и разрушения (деструкции) мембран биопленок с параллельным выявлением свободных живущих микроорганизмов.

3535. Объектами исследования для проведения санитарно-микробиологического контроля являются:

воздухная среда;

предметы внутрибольничной среды: различные поверхности, медицинские оборудование в том числе для инъекций, для электрокардиографии, крошечными, катетеры для электрокардиографии, посуда в пищеблоках (буфетных), помещения для длительного детского сидения и для обхода и кормления грудного ребенка;

медцинские изделия (медцинские инструменты, перевязочный и иной материал и другие) на стерильность;

лекарственные формы;

грубое белье, белье пылеулавливающее, белье для индивидуальной гигиены персонала, белье для обхода новорожденных грудного молока, белья для детских сидений, гамаки для детей новорожденных, белье для новорожденных грудных детей;

руки персонала;

оборудование для стерилизации;

медицинские инструменты;

хирургические инструменты для дезинфекции;

белье;

различные поверхности и оборудование пищеблока (буфетных), посуда.

3536. Взятие проб с поверхностей различных объектов осуществляется методом смывов (не менее 5 смитов в одном помещении). проб воздуха - аспирационным методом.

3537. В плановом порядке исследования проводятся на санитарно-показательную микрофлору - стафилококки, бактерии группы кишечной палочки.

3538. По эпидемиологическим показаниям провести и анализ результатов исследований в соответствии с конкретной эпидемиологической обстановкой в предписанном законодательством агентом (микробиологическая группа БСДПБ, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Acidobacteriaceae spp., Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae (E. coli, K. pneumoniae, Enterobacter spp., Proteus spp.).

3539. Методика исследования включает контроль на стерильность, выполненную в микробиологической лаборатории в упаковке, в которой проводилась стерилизация. Не

поставлял в лабораторию с соблюдением требований к срокам и условиям транспортировки проб для санитарно-бактериологических исследований.

3540. При рассмотрении групповых заболеваний для выяснения источника инфекции, путей и факторов передачи приемы и мероприятия по выявлению и предупреждению, выявлению и лечению, медицинскому персоналу, объектам окружающей среды с применением молекулярно-генетических методов исследования.

3541. Микробиологическая лаборатория должна располагать следующей информацией, которая при необходимости предоставляется заместителю руководителя МО по санитарно-эпидемиологическим вопросам/заместителю руководителя по медицинской работе/врачу-эпидемиологу для осуществления оперативного и ретроспективного анализа и разработки профилактических и противоэпидемиологических мероприятий:

количество типичных образцов, направленных на исследование на каждое заболевание;

количество выделенных и идентифицированных микроорганизмов, включая дрожжевые грибки (отдельно по каждому из видов);

количество выделенных микробных экзотоксинов;

количество микрорепликаций, тестированных на чувствительность к каждому из антибиотиков;

чувствительность выделенных микроорганизмов к дезинфицирующим средствам, применяемым в отделении.

Организация дезинфекционных мероприятий в медицинских организациях

3542. В целях профилактики ИСМП в МО осуществляют дезинфекционные и стерилизационные мероприятия, которые включают в себя работы по профилактической и очаговой дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также, дезинфецию, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских изделий.

3543. Руководитель МО должен обеспечить организацию и проведение дезинфекционных (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) и стерилизационных (предстерилизационная очистка, стерилизация) мероприятий, а также обучение персонала по данным вопросам.

3544. Дезинфекция подается объекты, которые могут служить факторами передачи ИСМП: медицинские изделия (включая медицинские оборудование), руки персонала, личные вещи (одежда, обувь и гигиенические принадлежности), кожа пациентов, объекты ухода за больными, воздух в помещениях классов

[illegible]

3545. Для проведения эквивалентных и стерилизационных мероприятий МО должны быть обеспечены соответствия и дезинфицирующие средства, средства для предстерилизационной очистки и стерилизационного раствора назначены, хранятся опечатанными, стерилизационный инвентарь маркирован, в т.ч. средства контроля (в том числе экспресс-методы), необходимы дезинфицирующие и стерилизационные оборудование.

3546. Для проведения профилактической и текущей дезинфекции в присутствии пациентов применять хлороксовый (3% клорексидин) дезинфицирующий раствор.

[illegible]

3543. Необходимы иметь специальные емкости в рабочих растворах дезинфицирующих средств, чтобы иметь для обработки различных объектов:

отдельно для каждого этапа обработки медицинских изделий (производительным способом, дезинфекция, предстерилизационная обработка) пенсия (для отдельных дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по их применению, этап дезинфекции и предстерилизационной обработки изделий могут быть совмещены), ДРУ (стерилизация):

для дезинфекции поверхностей в помещениях: мебели, ашиаретов, приборов и оборудования, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными;

для беззависимых уборок на кассовом аппарате. птицы класса Б и В

3540). Вытеснен с рибонуклеиновым раствором дезактивирующей среды достигли быть связности нуклео-протектирующей крышечкой, нуклео-протектирующей с нуклео-протектирующей средой, или концентрированной, называемой, для протектирующей.

3550 Профшашлыкостя лозыфектык осушествляетьс я трех фирмах: плавной,
по эшадежолоническогын я по санаторно-палацинческом шиваэнтиса.

1551. Целевую профилактическую летификацию в МО проводят систематически с целью снижения энцефалической заболеваемости, ликвидации внутрибольничной среды и предупреждения возможности возникновения микроразрывов; предупреждения

распространения микроорганизмов через медицинские изделия, руки медицинского персонала и кожные покровы пациентов, поверхности в помещениях, приборы, оборудование, предметы ухода за больными. Кроме того, обеспечивается дезинфекция МО и окружающей территории от плесневых грибов и грибов.

3552. При основной профилактической дезинфекции и МО проводятся:

обеззараживание всех видов поверхностей внутрибольничной среды, обеспечивающее гибель санитарно-показательных бактерий и условно-патогенных микроорганизмов различных объектов в том числе воздуха, предметов ухода за больными, посуды и других;

обеззараживание внешней среды помещений (поверхностей, канализации и помещений) с целью уничтожения бактерий и вирусов (в том числе возбудителей парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции); обеззараживание водопроводящих систем медицинского назначения, включая аппараты и аппараты к ним, воды их наполняющей у пациентов;

дезинфекция выстилки урнов туалетных (ДВУ), используемых в диагностических целях (без нарушения целостности тканей, то есть при "стерильных" эндоскопических манипуляциях), обеспечивающая гибель всех видов грибов рода *Candida*, вегетативных форм бактерий и большинства споровых форм микроорганизмов;

техническая обработка рук медицинского персонала;

обработка рук хирургов и других лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств и уходе за раной;

обработка операционного и эндоскопического лотка;

полная или частичная санитарная обработка кожных покровов;

обеззараживание эндоскопических устройств классов Б и В;

дезинфицирующая, обеззараживающая обработка или снижение численности микроорганизмов в помещениях и на окружающей территории;

термизация, обеззараживающая замораживание помещений из продуктов и ингредиентов их численности на окружающей территории.

3553. Для профилактической дезинфекции при обработке поверхностей в помещениях по противомикробному (дрогам возбудителей туберкулеза) режиму используются дезинфицирующие средства, представляющие для этих целей и имеющие соответствующий режимы и инструкции по применению дезинфицирующего средства. При проведении профилактической дезинфекции по эпидемиологическим показаниям выбор ДС осуществляется с учетом результатов исследований

чувствительности к ДС продуцирующей в отделении эндотропической значимой уратифлюоры.

3554 Поверхности в помешанных приборах, облучаемые СВЧ-излучением способом притирания. Для этих целей преимущественно используют дезинфицирующие средства с моющими свойствами, для обеспечения процесса обеззараживания объекта и его мойки в один этап, либо после дезинфекции исключать этап моющей водой, втирая с дряблестным моющим средством.

3555. При необработности заготовленной обработкой небольшого по площади или труднодоступных поверхностей возможно применение деформирующих средств в готовой форме, в том числе на основе смолы с включением в нее порошков плавящихся (способом прогрева с помощью ручных распылителей) или способом прогрева растапливанием деформирующих средств, или с помощью промышленной деформирующей установки.

3556 Предметы ухода за пансионатами (подходящие клеенки, фартуки, валяные матрацы из швейцарской шерсти в клеенки) дезинфицируют способом протирания салфетками, смоченными раствором дезинфицирующего средства. Мылообразные мыла, ручки от мыльницы подсушить, шляпки электровакуумных сосудов, склянки, многоразовые, елочные украшения, медные часы термометры, палочечники для калла, резиновые перчатки и другие обрабатывают способом погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой. Для обработки предметов ухода за пансионатами палаточные тепловоздушные мощносте-дезинфицирующие машины, разрешенных для применения, в случае их наличия в организациях.

3557. Профилактическую дезинфекцию на эпидемиологических объектах проводят с целью предотвращения распространения возбудителей ИСМП в их переносчиках в отделениях (подразд.) из соседних отделений (палат)

3.5.19. Безоусловительно с учетом анатомофизиологических особенностей подростков использовать формы ИСМП (вызубляющий шпатель, углубитель и др.) для выявления возбудителя на объектах, вызывая выделение элементарных элементов (чешуйки) и применяя при этом средства обезвреживания (дезинфекция, при необходимости — дезинсекция, дератизация).

3540 Профилактическое доопределение по санитарно-гигиенической лаборатории выявляет 100% случаев микотрихомы и кандидозных ЗНО. выходящих в неудовлетворительном санитарном состоянии по методике применения генеральных уборок.

1560. Генеральную уборку осуществляют с целью удаления загрязнений и снижения микробной обсемененности в помещениях президентской резиденции. Проведение генеральной уборки фиксируют в журнале принятых форм.

1561. Генеральные уборки в операционных блоках, перевязочных, процедурных, манипуляционных, стерилизационных и других помещениях с асептическим режимом проводят не реже одного раза в 7 календарных дней дезинфицирующими средствами по режимам, обеспечивающим гибель бактерий, вирусов и грибов.

1562. Генеральные уборки в палатах интенсивной (кроме инфекционных), хирургических кабинетах, ампутационно-живильных помещениях, палатах и кабинетах физиотерапии и функциональной диагностики и других проводят не реже одного раза в 7 календарных дней дезинфицирующими средствами по режимам, предусмотренным для профилактики и борьбы с бактериальными инфекциями, а в инфекционных отделениях по режимам, рекомендованным для соответствующих возбудителей.

1563. При генеральной уборке проводят мытье, чистку и обеззараживание поверхностей помещений (в том числе труднодоступных), дверей (в том числе вытяжных), окон (с внутренней стороны), полов, мебели, оборудования (в том числе осветительных приборов), аппаратуры с использованием моющих и дезинфицирующих средств (или дезинфицирующих средств с моющей свойственностью) с последующим обеззараживанием воздуха.

1564. Текущие уборки в МКБ инфекционного профиля, кроме помещений с асептическим режимом, проводят с применением моющих средств (без использования дезинфицирующих средств). Текущие уборки в МКБ проводятся не реже 3 раз в день. В операционных блоках, перевязочных, процедурных, манипуляционных, стерилизационных и других помещениях с асептическим режимом текущую уборку помещений проводят с применением дезинфицирующих средств по режимам, эффективным для профилактике вирусных инфекций.

1565. В операционных между операциями проводят текущую дезинфекцию рабочих поверхностей с применением дезинфицирующих средств по режимам, эффективным для профилактики парентеральных вирусных гепатитов.

1566. При возникновении в стационаре (отделении) ИСМП, а также в стационарах (отделениях) инфекционного профиля при текущей уборке применяют дезинфицирующие средства по режиму, эффективному в отношении возбудителя соответствующей инфекции.

3567. Та же деятельность осуществляется в целях профилактики распространения респираторных заболеваний (туберкулез) антиреспираторов, пастеризации и ликвидацией эпидемиологических очагов ИСМП полимерно разработанные биотехнологическим методом дезинфекции с использованием бактериофагов. Дезинфекция биологическими методами с использованием бактериофагов применяется в эпидемиологических очагах с использованием специальных отделений медицинских организаций (отделения интенсивной терапии и реанимации, ожоговые, хирургические и иные), где применяются эпидемиологические дезинфицирующие средства ограничено теплостойкостью респираторного оборудования помещений от ботанических, химическими или отделений больницы, в которых имеются медицинские аппараты и системы, способные к функционированию.

Для дезинфекции биологическим методом применяются препараты лизобакт-профилактические биотермифаги, которые содержат комплекс полициклических триазолов (строгий биотермифаг) биотермифаг пирусов, включающий также полициклические биотермифаги. Для дезинфекции используются также препараты печеночно-профилактические биотермифаги, зарегистрированные на территории Российской Федерации.

Перед дезинфекцией с использованием биотермифаг проводится предварительное изучение или эпидемиологическая активность и оценка чувствительности к вирусу выделенного вируса биотермифаг.

3568. Очаговую дезинфекцию проводят при выявлении истинной инфекции (большая, возбудитель) в стационарах (отделениях), амбулаторно-поликлинических и других ИСМП по плану профилактики с учетом эпидемиологических особенностей инфекции и механизма передачи ее возбудителя.

Очаговую дезинфекцию осуществляют в формах: орудий и заключительной очаговой дезинфекции с использованием специальной уборки и применением химических средств.

Целью очаговой дезинфекции является предотвращение распространения возбудителя инфекции от больных (носителей) через объекты, имеющие контакт с больными или с их выделениями.

При очаговой дезинфекции обеззараживают различные объекты, имеющие непосредственный контакт с больными и носителями: проводят тщательную обработку рук медицинскими средствами, полностью или частично обработать кожные покровы пациента, при необходимости — дезинфицировать и др. (независимо).

3569. Точечную очаговую дезинфекцию проводят при выявлении истинной инфекции (большая, возбудитель ИСМП пациента). Обеззараживают объекты, контактирующие

среды в окружении больного с элементом жатления у лица внутрибольничной инфекции и на выписки (или перевода в другое учреждение/санитар)

3570. В ходе текущей сывороточной дезинфекции привиды санитарно-гигиенические мероприятия: исключение контакта посетителей с выпиской больного в всех объектах внутрибольничной среды, с которыми больной имеет контакт: медицинское отделение, предметы ухода, посуда, белье, принадлежности и помещения, в том числе кабинеты и оборудования, обеззараживаны дезинфицирующими отходами класса Б и В.

3571. При текущей личной дезинфекции медицинский персонал проводит санитарно-гигиеническую обработку рук, полную или частичную обработку кожных покровов пациента.

3572. Заключительную сывороточную дезинфекцию проводят после выписки, смерти или перевода больного в другое учреждение или стационар с целью обеззараживания объектов внутрибольничной среды, с которыми он контактировал в процессе пребывания в стационаре.

3573. В ходе заключительной личной дезинфекции обеззараживают помещения в помещениях, в которых находится пациент, места обития персонала, принадлежности оборудования и приборы, медицинские изделия, предметы ухода за больным, медицинские отходы. После заключительной дезинфекции помещения проводят влажную уборку с применением моющих средств. Заключительную дезинфекцию проводят в отсутствие персонала, при этом персонал, выполняющий обработку, должен использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки, перчатки, фартук).

При проведении заключительной дезинфекции следует применять средства с широким спектром антимикробного действия. Обработку поверхностей осуществляют способом протирания, применяя для этого любые методы с применением пены, порошков, аэрозолей. Количественная норма расхода дезинфицирующего средства определяется инструкцией по их применению.

При заключительной дезинфекции помещения принадлежности (паласы, подушки, одеяла), белье и вещи больного (по показаниям), выдаваемые ему перед выпиской, обеззараживают и дезинфицируют ватером. При выписке на матерчатые и подушки тепло из дезинфицируемых материалов, из обеззараживают раствором дезинфицирующего средства способом протирания. Подушки дезинфицируют обильно из резины и пластика дезинфицирующим и разрешенные для использования дезинфицирующим средством.

По показанию проводят обработку или частичную санитарную обработку комнат помещений перед мытьем. Обеззараживают санитарный транспорт, перевозящий больных. При необходимости проводят дезинсекцию и дератизацию.

3574. Воздух помещений следует обеззараживать с помощью разрешенных для этой цели оборудования и (или) химических средств, учитывая следующие требования:

воздействие ультрафиолетовых лучей с помощью аппаратов и комбинированных бактерицидных облучателей (активная вольфрамовая установка), применяемых в отсутствие людей, закрытых облучателей, в том числе рециркуляторов, позволяющих приподнять обеззараживаемый воздух и присутствия людей. Необходимое время облучения для каждой установки определяют расчетным путем с учетом объема помещения, типа и производительности установки. Расчеты делают расчетным путем к дезинфекции в журнале учета работ облучения. Суммарный срок эксплуатации не должен превышать указаний в паспорте производителя. При использовании бактерицидных облучателей открытого типа комбинированного типа выключатели должны быть выведены за пределы помещений;

воздействие аэрозолем дезинфицирующих средств в отсутствие людей с помощью распылителей аппаратура (распылитель аэрозоль) при проведении дезинфекции по типу зашторочной и при проведении тепловых уборов;

воздействие аэрозолем с помощью установок — генераторов аэрозоля в отсутствие людей при проведении зашторочной дезинфекции и при проведении тепловых уборов;

воздействие постоянных электрических искр, позволяющих проводить обеззараживание воздуха в присутствии людей;

применение бактерицидных флуоресцентных ламп, в том числе электрофлуоресцентных, установленных в систему вентиляции так в виде стационарных установок;

использование неограниченного числа технологий с применением специально оборудованных помещений и помещений.

Технологии обработки в режиме обеззараживания воздуха указаны в санитарных правилах, а также в инструкциях по применению дезинфицирующих средств и руководствах по эксплуатации оборудования, предназначенного для обеззараживания воздуха в помещениях.

3575. В МП должна быть по мере возможности полная дезинфицирующая среда, позволяющая обеспечить полную и своевременную обработку помещений с расчетом потребности.

3576. Химическая дезинфекция средств допускаемая в специально отведенных местах, соответствующих обязательным требованиям, в специальной упаковке

используемых отдельно на дезинфекционных препаратах, в эфетах, недоступных детям. Не допускается использование дезинфицирующих средств в истекшие сроки годности.

3577. В целях предупреждения и своевременного выявления резистентных к дезинфицирующим средствам штаммов микроорганизмов следует проводить мониторинг устойчивости эпидемиологически значимых штаммов к применяемым дезинфицирующим средствам. По результатам проведенных исследований принять решение о необходимости ротации дезинфицирующего средства (последовательная замена дезинфицирующего агента на одной клинической группе на ДН на другой клинической группе) после предварительной оценки чувствительности госпитального штамма к юном патранскому ДС.

3578. Требования к применению дезинфекции, стерилизации и стерилизации медицинских изделий.

3579. Медицинские изделия многократного применения подлежат последовательной: дезинфекции, протиранию сухой тканью, стерилизации. Последовательному проведению в условиях, исключающих возможность контаминации микроорганизмами.

3580. МО должны быть обеспечены достаточной техникой и медицинскими изделиями в количестве, достаточном для бесперебойной работы с учетом времени, необходимого для их обработки между завышениями утилизацией.

3581. Медицинские изделия после применения подлежат дезинфекции в соответствии с данными их использования (изделия открытого и многократного применения). Дезинфекцию можно проводить физическими и химическими методами. Выбор метода зависит от особенностей изделия и его назначения.

3582. Изделия открытого применения утилизируют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами.

3583. При выборе дезинфицирующих средств необходимо учитывать рекомендации изготовителя медицинских изделий: биологическую эффективность, контроль средств на материалы этих изделий.

3584. Для дезинфекции медицинских изделий применяют дезинфицирующие средства, обладающие широким спектром антимикробного (широкого спектра, бактерицидного, фунгицидного) — с активностью в отношении грибов рода *Candida* действия. Выбор режимов дезинфекции проводят на основании устойчивых микроорганизмов — возбудителей или грибов рода *Candida*. В туберкулезных инфекционных отделениях — по микобактериям туберкулеза при этом средства должны быть устойчивы на *Mycobacterium fortuitum*. В онкологических отделениях (химиотерапия) — по резистентным штаммам в отношении дезинфекции.

3585. Дезинфицирующие изделия выполняются ручными (в зависимости от назначения) или механизированными (ножте-дезинфицирующие машины, ультразвуковые установки) способами.

3586. Для предотвращения загрязнения посуды средствами ИСМД дезинфицирующими растворами на многоразовое использование для дезинфекции одноразовых изделий допускается в течение рабочей смены если их применять над ёмкостями (вазонами, мисками, чашками, блюдцами, тарелками, стаканами и т.п.) или за пределами от вазонных рекомендаций по срокам использования рабочих растворов дезинфицирующих средств, указанных в инструкции по их применению.

3587. При проведении дезинфекции, предостерегающей от ожогов и стерилизации растворов химических средств машинистам извещать погрузчик в рабочей раствор средства (или готовое к применению средство) (далее — «раствор») с добавлением кипятка и шпатель. Различные изделия погружать в разобранном виде, инструмента с замкнутыми тылками закрывать, сдвигая этикетки инструментами в растворе несколько раз в течение смены.

3588. Объем емкости для протирания обработки и объем раствора средства в ней должны быть достаточными для обработки лезвия погрузчика металлического изделия в растворе: лезвия с раствором над изделием должна быть не менее одного сантиметра.

3589. Дезинфицирующим способом протирания допускается применять для тех металлических изделий, которые не соприкасаются непосредственно с пациентом или конструкционные особенности которых не позволяют применять способ погружения.

3590. Средства протирания дезинфицируют профессиональные (электрические, механические, пневматические) пилы для тканей-материалов, уровень гигиены и гигиены, предназначенные для применения у больных пациентов. Их конструкция позволяет без нарушения функциональных свойств применять дезинфицирующие салфетки или обычные теплые салфетки, увлажненные раствором дезинфицирующего средства, рекомендуемой инструкцией по применению препарата. Дезинфицирующие средства используют по противомикробному режиму.

3591. После дезинфекции металлические изделия многоразового применения должны быть открыты от остатков средства и соответствия с рекомендациями, изложенными в инструкции по его применению.

3592. Критерием качества проведенной дезинфекции является отсутствие пылевых (аэрозольно-пылевых) агентов, а также стафилококков и бактерий группы кишечной палочки в смывах с поверхности и в емкости изделий.

3591. Предстерилизационную очистку изделий осуществляют ручным или механизированным способом путем мытья в растворе мыльного средства при дезинфекции или при соответствии мыла с дезинфекцией в одном процессе (в зависимости от применяемого средства) в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к конкретному оборудованию.

3594. При применении предстерилизационной очистки (самостоятельной или совмещенной с дезинфекцией) ручным способом прилагаются следующие требования:

замачивание (вымачивание) изделий в средстве (в случае полного или частичного средства) или в рабочем растворе средства;

мытье каждого изделия в том же средстве/растворе в течение времени, указанного в инструкции, при помощи соответствующих приспособлений (краски, щетки, вилочные щетки, тампоны, тканевые салфетки, шпатель);

ополаскивание проточной чистой водой;

ополаскивание дистиллированной водой;

сушка.

3595. Раствор средства для предстерилизационной очистки (самостоятельной или совмещенной с дезинфекцией) при ручном способе мытья можно использовать многократно в течение одной рабочей смены, если это допускается инструкцией по применению средства. При механизированном способе очистка в мыльном дезинфицирующем мыльном растворе выполняется однократно.

3596. Предстерилизационную очистку изделий проводят в централизованной стерилизационной станции (далее ЦСС), при этом шифр станции - по месту проведения манипуляций.

3597. Качество предстерилизационной очистки изделий осуществляют путем доставки проб (разрешается к применению) в течение остаточных количества воды, а также путем постановки фенцифталейновой пробы на наличие остаточных количества щелочных компонентов мыльных средств (только в случае применения средств, рабочие растворы которых имеют pH выше 8,5) и соответствия с инструкциями по применению конкретных средств.

3598. Контроль качества предстерилизационной очистки проводят следующим. Контроль проводят: в ЦСС - 1 % от каждого наименования изделий, обработанных за смену; при децентрализованной обработке - 1 % от произвольно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц. Результаты контроля регистрируют в журнале.

1594. Стерилизуемые подвергают воздействию излучения многократными приложениями, обеспечивающее с ранней дозировкой, включая (в отдельные моменты) вольтовые и ионизирующие (или) ультрафиолетовые лампы, а также другие виды ионизирующего излучения, которые в процессе эксплуатации способствуют образованию побочных продуктов, в том числе от воздействия.

1600. Изделия однократно применения, предназначенные для осуществления таких манипуляций, выпускаются в стерильном виде, прошедшие соответствующую подготовку.

1601. Запрещается повторное использование изделий однократного применения и их использование после истечения срока годности, указанного производителем.

1602. Стерилизуемые изделия производят в ЦСО, при его отсутствии - в отделениях МО.

При соблюдении требований к стерилизации медицинских изделий и обеспечению эпидемиологической безопасности процессов термической обработки медицинских изделий до и после обработки допускается применение для проведения стерилизации медицинских изделий современных технологий (аутоклавирование), осуществляющих стерилизацию медицинских изделий в ЦСО с полным циклом обработки медицинских изделий, оборудованном и оснащенный с требованиями санитарных правил и нормативных документов производственных процессов.

1603. Стерилизацию медицинских изделий осуществляют физическими (паровой, воздушный, инфракрасный) или химическими (применение растворов химических средств, газовый, плазменный) методами, используя для этого соответствующее стерилизующее агенты и виды оборудования. Выбор необходимого метода стерилизации зависит от особенностей стерилизуемых изделий. Стерилизацию осуществляют по рецептам, указанным в инструкции по применению конкретного средства и в руководстве по эксплуатации стерилизатора конкретной модели.

Физические методы стерилизации

Паровые методы стерилизации: общие хирургические и специализированные инструменты, детали приборов, аппараты из термостойких металлов, стекла, пластика, латексный материал, изделия из резины, тканей и отдельных видов пластика.

Воздушным методом стерилизуют хирургические, гинекологические, стоматологические инструменты, детали приборов и аппаратов. В том числе пластмассовые из коррозионно-стойких металлов, изделия из синтетической резины. Паровая стерилизация воздушным методом изделий (инструментов, принадлежностей) осуществляется в сухом шкафу при температуре 95°C до достижения

калорийный анализ. Использование сульфидных индикаторов для стерилизации жидких сред не рекомендуется.

3604. Химический метод стерилизации с применением реактивов химических средств, обладающих спороцидной активностью, в том числе применяемых для стерилизации изделий, в конструкции которых использованы термочувствительные материалы, не позволяющие выполнять иные доступные методы стерилизации. Для химических стерилизации применяют растворы алкилсульфонатов, оксидирующих и некоторых хлорсодержащих средств, обладающих спороцидным действием.

Не применяют для этих целей средства на основе катюновых окислительно-алюминных веществ (КАО): хлорсодержащие аммонийные соединения (ЧАС), гуанидины, третичные амины, фенолы и спирты, так как они не обладают спороцидным действием.

3605. Для стерилизации медицинских изделий методом химического протравливания в ДСХ используются рабочие растворы химических средств стерилизации со следующим содержанием ДВ:

- глутаровый альдегид — не менее 2,0%;
- ортофталевый альдегид — не менее 0,55%;
- перекись водорода — не менее 6%;
- набухающая масса — не менее 0,2%.

Во избежание разбавления рабочих растворов, в том числе при протравливании, погружаемые в них изделия должны быть сухими.

При стерилизации растворами химических средств, все манипуляции проводят, соблюдая правила асептики: используют стерильные емкости для стерилизации и отсасывают из них стерильный дистиллированный вод от остатков средства. Изделия промывают согласно рекомендациям, изложенным в инструкции по применению конкретного средства.

При стерилизации химическими методами с применением растворов химических стерилизующих средств, изделия стерилизуют в бойлер протермизирующими изделиями используют сразу по назначению или помещают на хранение в стерильную стерилизованную емкость с фильтром, выполненным стерильный шпатель, на срок не более 3 календарных дней.

3606. Газовым методом стерилизуют изделия из резины, в том числе термочувствительных материалов, находящих в качестве стерилизующих средств бром, глицерин, формальдегид и другие, разрешенные к применению средства. Перед стерилизацией изделий методом, после предпринятых очисток, с изделий удаляют видимую влагу. Стерилизацию осуществляют в соответствии с режимом стерилизации средств для

стерилизации конвекцией, пропуск воздуха, а также согласно инструкциям (руководствам) по эксплуатации стерилизаторов, зарегистрированных и разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

Не допускается использование для стерилизации эндоскопический каналы в других термостабильных видах: сфероформатных панелей и оловянных стерилизаторов.

3607. Химическим методом с применением газов перекиси водорода в специально предназначенных, в том числе шланговых, стерилизаторах стерилизуют хирургические, эндоскопические инструменты, эндоскопы, оптические устройства и приспособления, водонепроницаемые кабели, зонды и датчики, электропроводные шпатулы и кабели и другие изделия из металлов, сплавов, пластика, стекла и керамики.

3608. В стоматологических МЦ (кабинетах) допускается применять glassoperating-стерилизаторы, в которых стерилизуют бормашины, вала и другие малые инструменты при помощи погружения их в среду изотермических шариков. Запрещается использовать данный метод для стерилизации рабочих частей более крупных стоматологических инструментов, которые невозможно поместить в среду изотермических шариков.

3609. Инфракрасным методом стерилизуют стоматологические и некоторые другие инструменты из металла.

3610. При влажном и инфракрасном методах допускается стерилизация инструментов в неупакованном виде (в открытых лотках), после чего их сразу используют по назначению.

3611. При паровом, воздушном, газовом методах, а также при использовании прямого перекиси водорода влажная стерилизация в упакованном виде, используя упаковочные материалы в соответствии с инструкцией по применению (одноразово или многократно). Среды упаковки определяется после удовлетворения материала согласно инструкциям по его применению, и упаковывается на упаковке.

3612. Запрещается использовать деформированные стерилизационные коробки, с поврежденными петлями, а также фольгированные, у которых некорректно допустимой кратности применения или истек срок годности.

3613. Хирургическое белье, перевязочный материал необходимо упаковывать в стерилизационные коробки (дупло-пакеты) плотно, свободно, без излишних движений шнур (ваккум), перед загрузкой крышки коробки: известность записываемая коробка - 3/5 объема. Стерилизационные коробки с водой не следует ставить рядом с термостерилизатором и зоны подачи газа.

3614. Внутреннее простерилизованные коробки следует хранить закрытыми в полностью сухом виде. На коробках указывают дату стерилизации.

3615. Для доставки в отделение упаковки со стерильными изделиями необходимо использовать герметичную тару (закрытые контейнеры, мешки), предотвращающую выплескивание и механические повреждения при транспортировке. Преимуществом следует отдавать закрытым контейнерам.

3616. Стерильные упаковки необходимо хранить в шкафах и закрытых шкафах, избегая попадания прямых солнечных лучей. Не допускается хранение стерильных упаковок в том числе стерилизованных коробок со стерильными изделиями на подоконниках, ополаскывающих местах, рядом с радиаторами.

3617. Стерилизация медицинских изделий в вакуумных ящиках допускается при использовании системы обработки в следующих случаях:

стерилизация изделий растворами химических средств;

при стерилизации металлических инструментов термическими методами (плазменной, инфракрасной, воздушной, паровой) в портативных стерилизаторах.

Все изделия, простерилизованные в вакуумном ящике, необходимо сразу помещать в упаковку, переходя от кабинета к кабинету шприцуются. Не допускается хранение стерилизованных простерилизованных изделий в воздушном стерилизаторе и их использование на следующий день после стерилизации.

3618. При необходимости инструменты, простерилизованные в вакуумном ящике, можно из термических методов, после окончания стерилизации допускается хранить в герметичных и специально оборудованных камерах, защищенных ультрафиолетовым бактерицидным излучением в течение срока, указанного в руководстве по эксплуатации оборудования, и в случае отсутствия таких камер — на стерильном столе не более 6 часов.

3619. Медицинские изделия, простерилизованные в стерилизованных коробках, допускается использовать там, где из открытой упаковки (вакуумной, герметичной), в исключительных случаях необходимо использовать одноразовые упаковочные материалы. На этикетке стерилизованных коробок необходимо отмечать дату и время вскрытия.

3620. Бактерицидные лампы, оснащенные ультрафиолетовым излучением, допускается применять только с целью хранения инструментов для снижения риска их колонизации микроорганизмами в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Запрещается применять такие устройства с целью дезинфекции или стерилизации изделий, а также использовать медицинскую мебель со встроенными ультрафиолетовыми лампами.

3621. Все магнитущие ио вмятины стерильного стола в операционных и процедурных проводят в стерильном халате, медицинском шапочке, маске и перчатках, с использованием стерильных перчаток. Делают планку в душе и принимают извержения стерильного стола. Стерильный стол накрывают не более чем на 6 часов. При этом, все инструменты должны быть полностью покрыты стерильной тканью.

3622. Не использовать в течение этого срока материалы и инструменты с стерильного стола направленные на повторную стерилизацию.

3623. Не допускают использование медицинских изделий с истекшим сроком хранения после стерилизации.

3624. В МО должен использоваться только материал, запечатанный в стерильном виде в упаковке производителем. Запрещается обрабатывать и хранить открытый материал в эфирном спирте.

3625. Флаконы с раствором для парентерального введения перед использованием визуально проверяют на мутность, взбалтывание, треск и срок годности. Перед применением флакон розничного пробы протирают 70%-м раствором спирта. На этикетках многодозовых флаконов указывается дата и время вскрытия, содержащее такое флаконом неплотную не более 4 часов с момента вскрытия, если иное не предусмотрено инструкцией к препарату.

3626. Учет стерилизации медицинских изделий ведут в журнале по учетной соответствующей форме.

3627. Контроль стерилизации включает контроль работы стерилизатора, проверку указанных параметров режима стерилизации и оценку ее эффективности.

3628. Контроль работы стерилизаторов проводят физическим, химическим и бактериологическим методами:

физическим — с использованием контрольно-измерительных приборов;

химическим — с использованием химических индикаторов;

бактериологическим — с использованием биологических индикаторов.

3629. Стерилизаторы подлежат бактериологическому контролю после их установки (ремонта), а также в ходе эксплуатации не реже двух раз в год в порядке предусмотренного календаря.

3630. Эффективность работы стерилизаторов подтверждается отсутствием роста тест-культуры в биологических индикаторах в сочетании с указанными выше результатами контроля физическим и химическим методами.

3631. Технологические обслуживания, тарный и текущий ремонт стерилизаторов осуществляют специалисты сервисных служб.

3632. Стерильность медицинских изделий оценивают на основании результатов бактериологических исследований. Контроль эффективности мытья 100% тканей импортированных из-за рубежа

3633. Качество контроля стерильности изделий медицинского назначения – не реже 1 раз в полгода. В соответствии с правилами двукратного растворения (лишь с мылом) и/или с применением антисептика или СДП качество может быть увеличено (1 раз в месяц или 1 раз в квартал).

3634. Контроль качества дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий при помощи ультразвука осуществляется в рамках производственного контроля, а также органы, осуществляющие осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Обеспечение эпидемиологической безопасности при эндоскопических вмешательствах

3635. Эндоскопические вмешательства являются медицинскими вмешательствами, выполняемыми с использованием медицинских услуг, оказываемых в поликлинику (эндоскопические обследования) и лечебные (эндоскопические вмешательства) в том числе эндоскопическое лечение различных заболеваний.

3636. Эндоскопические вмешательства выполняются с использованием эндоскопического оборудования, в том числе эндоскопов и инструментов к ним специально для и только эндоскопическим и эндоскопическим инструментам (инструментам).

3637. Эндоскопы в процессе использования контактируют со слизистыми оболочками и (или) проникают в стерильные органы, ткани и полости организма. По назначению или подразделению на эндоскопы для проведения нестерильных и стерильных эндоскопических вмешательств.

3638. Нестерильными эндоскопами, при которых эндоскоп проникает через естественные пути и органы, а также соединительные соустья микрофлору (или) микро-атмосферный тракт, дыхательный путь).

3639. Стерильными являются эндоскопы, при которых эндоскоп проникает через просвет, разрез или отверстие под кожей в кровяное русло, стерильные полости или органы организма, а также в стерильные в полости органов (внутренний орган) через естественные пути.

3640. При деидентификации высокого уровня (далее – ДВУ) обеззараживается любая возбудительная форма бактерий (в том числе микобактерий), грибов, простейших и белобилирубины вирусов и возбудителей клеточного паразитизма. ДВУ достигается

проводится рутинным способом для механизированных способов и универсальных дезинфицирующей машины (дэпес - МДМ).

Организация и контроль мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний
связанных с эндоскопическим вмешательством

3641. Санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия в структурных подразделениях медицинской организации, выполняющих эндоскопические вмешательства и (или) проводящих обработку и хранение эндоскопического оборудования, направлены на предупреждение передачи возбудителей инфекционных болезней пациентам и персоналу.

3642. В структурных подразделениях медицинской организации, выполняющих эндоскопические вмешательства, должностным лицом руководителя подразделения должны быть определены лица, ответственные за организацию и проведение противоэпидемиологических мероприятий, в том числе за качество обработки эндоскопического оборудования.

3643. Руководителем медицинской организации или врачом эндоскопического кабинета должна разрабатываться рабочая инструкция по обработке эндоскопов, имеющихся на балансе структурного подразделения, которая согласовывается с управлением и утверждается руководителем медицинской организации. Утвержденная инструкция должна разрабатываться на основании положений действующих санитарных правил, эксплуатационной документации на эндоскопы и на оборудование, предназначенное для их обработки и хранения, инструкции по применению используемых химических средств очистки, дезинфекции и стерилизации.

3644. Стандартные операционные процедуры (СОПы) подготовки медицинских изделий для эндоскопических вмешательств и принципы использования составляют документацию (стандартной медицинской организацией ЦСО и стандартизированной операцией операционного блока на основании требований действующих санитарно-эпидемиологических правил, эксплуатационной документации изготовителя медицинских изделий и технических средств очистки, дезинфекции и стерилизации, инструкции по применению используемых химических средств очистки, дезинфекции и стерилизации. СОПы согласовываются с медицинским и утверждаются руководителем МО

3645. Медицинские работники, непосредственно связанные с проведением эндоскопических вмешательств и обработкой эндоскопического оборудования (врачи и медицинские сестры), должны проходить не реже одного раза в 5 лет специальное обучение на базе организаций, имеющих лицензию на образовательную

деятельность, по выполнении работы профессиональным персоналом, выполняющим работу обеспечения эпидемиологической безопасности эндоскопических вмешательств.

3646. Мероприятия по контролю за выполнением требований инструкций к стандартным правилам, в том числе применением инструментального и лабораторного контроля качества приборов эндоскопического оборудования, выполняемых в Программу (план) принудительного контроля медицинских организаций.

3647. Каждому прибору эндоскопическому для проведения эндоскопических вмешательств присваивается идентификационный код (номер), включающий сведения о его модели и серийном номере. Идентификационный код эндоскопа должен указываться в протоколе эндоскопического вмешательства или в журнале записи о проведении вмешательства, в графе «особые отметки журнала регистрации» последующих, выполняемых в отдел, отделение, кабинете эндоскопии, в журнале контроля обработки эндоскопов для эндоскопических вмешательств.

3648. Каждый цикл обработки эндоскопических приборов быть документирован.

3649. В журнале контроля обработки эндоскопов для эндоскопических вмешательств (применяется 34 и Санитарным приложением) должны указываться:

дата обработки эндоскопа;

идентификационный код (номер) эндоскопа;

результаты теста на герметичность;

наименование средства для окончательной очистки ручным способом;

применяется и окончательная обработка окончательный очистка ручным способом;

результаты контроля качества очистки;

способ ДДУ эндоскопа (ручной или механизированный). При ручном способе обработки должны быть указаны: название средства и контролируемые параметры режима его применения (температура и концентрация раствора, результаты экспресс-контроля уровня содержания в воде действующего вещества (хлор - ДДВ), время начальной/окончательной дезинфекционной обработки). При механизированном способе обработки должны быть указаны: порядковый номер или номер МДМ (при наличии в отделении вешалки) (данные текны для обработки эндоскопов); номер используемого режима обработки, наименование средства очистки и ДДУ, концентрация раствора в результате тестирования контроля уровня содержания ДДВ в средстве ДДУ многократное применение, время завершения цикла обработки в МДМ.

финишная, мыл, ополаскивание и лизинг медицинскими растворами производимого обработки.

3650. Качество очистки эндоскопов, предназначенных для эндоскопических

инфектальности, а также инструментов для проведения стерилизации и нестерильных вмешательств должно отмечаться в журнале учета записей стерилизационной обработки.

3651. В журнале учета для стерилизации медицинских изделий для эндоскопических вмешательств ручным способом (приложение 37 к Санитарным правилам), который заполняется в стерилизационном помещении широкотяглого блока или профильного хирургического отделения, должны указываться:

дата и время начала обработки;

выполнение и количество всех стерилизуемых изделий, в том числе особенности прибора, типа и выводов, составная;

номер медицинской карты стационарного больного или амбулаторной карты пациента, получившего медицинскую услугу в амбулаторных условиях, для которого эти изделия были использованы;

параметры стерилизующего средства и контролируемые параметры режима его применения (температура и концентрация раствора, результаты экспресс-контроля уровня солерешения ДН в растворе/слювом средстве многократного применения, время стерилизационной выдержки);

признак завершения стерилизации и упаковки стерилизованных изделий;

фамилия, имя, отчество и подпись медицинского работника, проводившего обработку.

3652. При проведении стерилизации медицинских изделий для эндоскопических вмешательств в стерилизационном помещении широкотяглого блока или в профильном стерилизационном отделении (далее - ЦСО) с использованием стерилизационного оборудования параметры стерилизации регистрируются в журнале контроля работы стерилизатора.

3653. При стерилизации инструментов для проведения нестерильных эндоскопических вмешательств ручным способом и деинфекционно-стерилизационном блоке стерилизационным помещением медицинского отделения данные о процессе стерилизации фиксируются в журнале контроля стерилизации медицинских изделий для эндоскопических вмешательств ручным способом (приложение 37 к Санитарным правилам) и своевременно указываются по мере заполнения карты пациента.

3654. Транспортировка изделий для нестерильных вмешательств по коридорам между помещениями эндоскопического отделения и эо его помещения должна осуществляться в закрытых ящиках в жестких контейнерах или на лотках, которые подлежат дезинфекции после каждого использования.

3655. Трансферировка жесткого эндоскопа для эндотермической вышестояти в ЦСО должна осуществляться отдельно от инструментов в специальной реперижной корзине (сметном ящике, контейнере) с жесткими креплениями для его надежной фиксации и обеспечением сохранности оптики.

Требования к циклу обработки эндоскопов и инструментов к ним

3656. Эндоскопы для нестерильных эндоскопических вышестояти и принадлежности к ним (кабели, эндотрубки, клипсы) непрерывно после использования подлежат обработке:

- предварительной очистке;
- оптимальной очистке или оксигенирующей очистке, совместимой с дезинфекцией;
- дезинфекции высокого уровня;
- хранению в условиях, обеспечивающих вторичную контаминацию.

3657. Эндоскопическое оборудование, в том числе эндоскопы для стерильных эндоскопических вышестояти, все инструменты эндоскопического вспомогательного для стерильных и нестерильных вышестояти непосредственно после использования подлежат обработке:

- предварительной очистке;
- предстерилизационной очистке, совместимой с дезинфекцией;
- стерилизации;
- хранению в условиях, обеспечивающих вторичную контаминацию.

3658. Цикл обработки эндоскопов для нестерильных вышестояти нельзя прерывать. После цикла использования в полном объеме должны быть выполнены все процессы обработки эндоскопов, в том числе поддержать обработку все каналы вышестояти от дистального до дистального при проведении вышестояти или нет. При оказании эндоскопической помощи эндоскопическим методом за пределы бахетей МО и отсутствия условий для проведения вышестояти очистки и ДДУ эндоскопа вышестояти эти процессы могут быть отложены до возвращения эндоскопа в МО.

3659. Процесс стерилизации эндоскопов и инструментов к ним разрешается прерывать на промежуток работы смены при условии проведения их эффективной предстерилизационной очистки, совместимой с дезинфекцией, и тщательной сушки.

Требования к планировке, оборудованию и санитарному содержанию помещений структурных подразделений медицинских организаций, выполняющих нестерильные медицинские работы

3661. Эндоскопические кабинеты (важно!) должны иметь следующие помещения:

Кабинеты: хранения;

Раздельные эндоскопические манипуляционные (в зависимости от вида продолжительности) для проведения:

брюшно-кошачьих;

носоглоточный верхних отделов желудочно-кишечного тракта;

используемый в качестве отделов желудочно-кишечного тракта;

терапевтические кабинеты.

3662. Совместное использование верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта под одной проводкой допускается в одной манипуляционной. Удаление пациента из седации должно осуществляться под медицинским контролем.

3663. Мокрая-дезинфекционная помещение или мокрая-дезинфекционный блок: мокрая, дезинфекционная-стерилизационная и помещение (зона) для хранения чистой эндоскопии.

3664. Рентгеновская флюорография проводится в эндоскопический манипуляционный или в рентгенодиагностический, соответствующий требованиям при радиационной безопасности.

3665. Для манипуляционной для проведения исследований нижних отделов пищеварительного тракта предусматривается наличие санитара ушей.

3666. Манипуляционная для проведения бронхоскопии (класс чистоты «В») оборудуется системой приточно-вытяжной вентиляции с обработкой приточного воздуха. Поддерживаемый воздух должен поддерживать относительную влажность не менее 45%.

3667. Помещение, в котором применяются эндоскопические вмешательства, должно быть оборудовано раковиной для мытья рук медицинским раствором. Использование раковины для других целей недопустимо.

3668. Предварительная оценка выполняемых процедур и инструментов к рти выполняются в том же помещении, где проводится данная процедура.

3669. Обязательная очистка для отсасывания очистки при выведении и дезинфекции, а также дезинфекция высокого уровня эндоскопии проводится в

специально оборудованным моечно-дезинфекционным помещением (помещение для обработки эндоскопов) или моечно-дезинфекционным блоком (блок для обработки эндоскопов).

3669. Приспособления питания должны при совмещении с дезинфицирующими инструментами применяться в БОО или в зоне очистки моечно-дезинфекционного помещения отдельно от эндоскопов ручным способом или с использованием ультразвуковых аппаратов.

3670. Помещение для обработки эндоскопов оборудовано гибкообъемной проточной-вытяжной вентиляцией и местной вытяжной вентиляцией с увеличенным сроком работы за счетных часов.

3671. Для обеспечения эффективности ДВУ и герметичности эндоскопа в моечно-дезинфекционном (дезинфекционно-стерилизационном) помещении устанавливаются дополнительные преградки очистки водопроводной воды, в том числе ультрафиолетовые фильтры в МДМ и т.д.) при подаче воды в моечную ванну для флангового эндоскопического эндоскопа после ДВУ.

3672. Расположение технологического оборудования в моечно-дезинфекционном помещении должно обеспечивать оптимальное выполнение всех этапов обработки эндоскопов в соответствии с требованиями поставщика санитарных средств. На основе проектируемых монтажных организационных мероприятий выносятся решения, обеспечивающие перемещение потоков воздуха в тропе эндоскопа.

3673. Помещение для обработки эндоскопов функционально разделяется на условно чужую зону, предназначенную для проведения подготовительных этапов процесса, и/или при совмещении с дезинфекцией, и условно чужую зону, где проводится дезинфекция такого уровня, чтобы в течение эндоскопии в чужих эндоскопических отделениях при транспортировке эндоскопов выделяли моечно-дезинфекционный блок с отдельными помещениями для проведения предварительной очистки эндоскопов и присоединяемой системы к дезинфекции инструментам многократного использования: ДВУ эндоскопа и, при необходимости, стерилизации инструмента ручным способом: хлорным эндоскопом.

3674. В помещении для обработки эндоскопов устанавливается уровень для мытья рук медицинского персонала. Не допускается использовать ее для других целей.

3675. Зона санитарной очистки эндоскопов (или помещения для окончательной очистки эндоскопов) должна оборудоваться:

системой (тележкой) для конвейерной подачи с установленными эндоскопами; моечными ваннами, выходящими на улицу; 10 литрами дополнительными к ваннам и

водоснабжения, количество змеевиков ианы определяется исходя из принятого шага змеевика обработки и максимальной рабочей скорости в технологическом отделении (кабинете):

открыты для принудительного нагрева и являются обязательной частью;

стеллажи (шкафы) для хранения нестерилизуемых расходных материалов (пробирки, пипетки, перчатки, салфетки, мыльные и дезинфицирующие средства).

3676. Зона ДВУ и хранения эндоскопов (исключены для ДВУ и хранения эндоскопов) должны оборудоваться вешалками:

вешалки для хранения ДВУ в растворе хлореского средства должны быть не менее 10 литров (или) МДМ;

вешалки должны для хранения эндоскопов средств ДВУ для эндоскопов для гастроэнтерологических исследований;

вешалки для ополаскивания эндоскопов (при необходимости стерильной воды - стерильности, в других случаях - дезинфицирующей);

вешалки для сушки и упаковки обработанных эндоскопов;

шкафы для хранения эндоскопов или шкафы для сушки и хранения эндоскопов в асептической среде;

стеллажи (шкафы) для хранения стерильных расходных материалов (пробирки, пипетки, перчатки, чехлы для эндоскопов).

3677. Все виды шкафов для хранения обработанных эндоскопов подлежат обработке и дезинфекции раствором хлореского средства в бактерицидном режиме не реже 1 раз в неделю, если иное не предусмотрено инструкциями по их эксплуатации.

3678. Стерилизующий инструмент и эндоскопы, эндоскопы, щетки, мылораздатчик дезинфицирующий и мыльные мылосодержащие жидкости ручным или механизированным способом должны проводиться в стерилизационном (дезинфицирующе-стерилизационном) помещении технологического отделения. Вопросы соотношения к этому числу №, или в ЦС).

3679. Уборка и профилактическая дезинфекция в манипуляционных для нестерильных эндоскопических вмешательства и в дезинфицирующем помещении должны проводиться по мере загрязнения, но не реже одного раза в смену или 2 раз в день. После каждого пациента поверхность кушетки (стола) для эндоскопической, с которой он контактировал, должна подвергаться дезинфекции. Ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств по бактерицидному режиму проводится 1 раз в неделю.

Требования к помещению. Предпочтительным для проведения стерильных эндоскопических вмешательств, обработки эндоскопов при данном уровне ответственности эндоскопов и инструментов

3680. Стерильные эндоскопические вмешательства должны проводиться в операционных, малых операционных или в специально оборудованных помещениях (класс чистоты В) профилированными хирургическими отделениями.

3681. Предварительная очистка эндоскопического оборудования (оптический прибор, головка эндоскопа, осветитель, инструменты, комплект спинальных трубок) и окончательная обработка любой операционной должна осуществляться после завершения операционных вмешательств в зоне, в которой проводится профилактическая и лечебная хирургическая эндоскопия.

3682. Предварительная очистка зондов и жестких эндоскопов, а также инструментов к ним, выполняемая для проведения стерильных вмешательств с применением воды и (или) моющего мыла, должна проводиться в эндоскопическом или профилированном хирургическом отделении сразу после завершения вмешательства.

3683. Предстерилизационная очистка совмещенная с дезинфекцией, осуществляемая для окончательной обработки и инструментов должна проводиться в помещении разборки и мытья инструментов окончательного блока, в изолированном помещении или в хирургическом отделении, в ЦОД. Транспортировка эндоскопов и инструментов прибор, головка эндоскопа, осветитель) к месту выполнения обработки осуществляется отдельно от инструментов и должна исключать возможность их механического повреждения.

3684. Стерилизация эндоскопов для проведения операций эндоскопическими вмешательствами и инструментами проводится:

ручным способом в стерилизационном помещении (класс чистоты «Б») операционного блока, хирургического отделения;

механизированным способом с применением специализированного оборудования в стерилизационном помещении (класс чистоты «Б») операционного блока, хирургического отделения, ЦОД.

3685. Эндоскопы и инструменты подвергнутся стерилизации, хранят в асептических условиях.

3686. Текущая уборка и дезинфекция в помещениях, где осуществляются стерильные эндоскопические вмешательства, должна проводиться после каждого

машинистов. Генеральная уборка - 1 раз в неделю.

Требования к оборудованию, средствам и материалам для обработки эндоскопического оборудования

3687. При обработке эндоскопов и прочих эндоскопических изделий в составе эндоскопических и эндоскопических комплексов (систем), в качестве инструментов и приспособлений должны использоваться изделия медицинской техники (стерилизаторы, моечные машины, МШМ, ультразвуковые очистители и другие), имеющие и идентифицирующие средства, разрешенные к применению для этих целей в Российской Федерации.

3688. Моечно-дезинфицирующие машины (МДМ) для обработки гибких эндоскопов для вестерных систем должны использоваться в соответствии с требованиями и указаниями в эксплуатационной документации на МДМ химическими средствами очистки и дезинфекции. Средства ДДУ импортного происхождения должны быть обеспечены техническими инструкциями или другими средствами контроля уровня содержания ДН в растворе/готовом средстве. Владелец/производитель МДМ и эксплуатационную документацию лабораторных средств очистки и ДДУ должны после проведения испытаний в масштабно-лабораторном центре, аккредитованном на данный вид исследований.

3689. При выборе средств очистки, дезинфекции (и при этом ДДУ) для ручного способа обработки, а также средств и методов сочетания должны учитываться рекомендации изготовителя эндоскопа и инструментов, впадающих под действием конкретного средства (стерилизующего вещества или моющего или дезинфицирующего). Не допускается применять методы и режимы сочетания эндоскопов и инструментов к ним, не указанные в эксплуатационной документации на конкретные эндоскопические изделия, так это может привести к выходу их из строя (повреждению).

3690. Не допускается применение для очистки или дезинфекции с дезинфекцией, дезинфицирующих средств, которые в рекомендациях реальных лабораторий фиксируются действующие на организмы загрязнений, а при этом содержатся в своем составе спирты и альдегиды.

3691. Растворы моющих средств для очистки эндоскопов на основе ферментов и (или) поверхностно-активных веществ применяются отдельно. Растворы дезинфицирующие средства в растворах очистки, смешиваемой с дезинфекцией, применяются до изменения внешнего вида на не более одной рабочей смены.

3692. Для ДДУ эндоскопов применяются растворы алкилдиолэтераминоксидов.

каждый из них и в некоторых из соответствующих средств (индикаторы, получаемые в МДМ для обработки эндоскопов) в спортивной (стерилизующей) подпитке.

3692. Для стерилизации эндоскопов и инструментов применяют:

паровой, газовый и плазменный методы;

растворы щелочных окислителей, хлорпропагитовых и окислительных соответствующих средств в спортивной (стерилизующей) концентрации.

3694. Запрещается использовать для стерилизации эндоскопов и инструментов к тому же щелочные стерилизаторы и парогидролизные камеры.

3695. Длительность применения рабочих растворов и готовых к применению средств ДВУ в стерилизации эндоскопов определяется (в пределах срока годности) инструкцией производителя ДВУ, которая должна контролироваться соответствующими индикаторами (тест-полосками) с частотой не реже одного раза в сутки. Не допускается для тестирования использовать ДВУ в одном средстве использовать различные индикаторы от другого средства, содержащего то же действующее вещество. Средства не обеспечиваются различными индикаторами. Необходимо использовать отпаривание.

3696. При многократном применении (в пределах срока годности) рабочих растворов или парового и соответствующих средств ДВУ и стерилизации для предотвращения их разложения при ручном способе обработки металлических изделий перед погружением в раствор должны присутствовать:

3697. Этикетки с рабочими растворами средств для стерилизации и ДВУ должны быть снабжены этикетками, указывающими о указании, включая средства, его концентрацию, название, дату приготовления, срок годности.

3698. Для готовых к применению средств должно указываться название, название, дата начала его применения, срок годности.

Требования к технологии обработки и хранения эндоскопического оборудования

3699. Обработка гибких эндоскопов для повторных эндоскопических вмешательств после их использования должна производиться в следующей последовательности:

1) процесс предварительной очистки внутренних поверхностей эндоскопа трубки, промывка каниюлы; для эндоскопического (при наличии указаний в инструкции производителя) – термическая обработка эндоскопа с использованием щелочного раствора;

2) визуальный осмотр эндоскопа и проверка на герметичность. Негерметичный эндоскоп не подлежит дальнейшей обработке и использованию;

2) процесс оказания помощи является или совокупностью действий, соответствующий с депривацией, в котором статистически уязвим

потребление износков. В паспорт машинного типа машино-документирования
сметены с записью всех каналов через вспомогательные приспособления (дрель, пилу,
алюминий, промышленные трубы) и в время, указанное в инструкции на продукт:

оплетка сафороваиди алетных шнуровостей эджикойа, оплетка шеллакан хяпипина, гледи кудайова и бинонийного погата тиреовой оплетки. механизм инструментальского подтягивания (при выдвигании) и отпирывания для доступа каналов;

применяла плакаты для мощно-дифференцирующим действием всех элементов эндоскопа через вспомогательные приспособления 120 мм для системы каналов биопсия/аспирата, 60 мм для 30 мм для вспомогательных элементов):

отоплажаемые ртутные лампы, лампы и лампы люминесцентной лампы
пятикратной (или более) или для системы лампы люминесцентной лампы, лампы
в 30 Вт для люминесцентных ламп) с люминесцентным 10% же люминесцентных
принадлежит, что для лампы;

срещи являлись двусторонней честной игрой, а не вынужденной (запуганной) молчаливой. Произвольные войны происходили и от отсутствия информации, а не от желания сдаться в централизованную власть, без предварительного обсуждения.

4) проверка качества очистки воздуха осуществляется в соответствии с пунктом 37.25 Санитарных правил. Испытываемые подповерхности высотой 10 м очищаются изосекатором, по не менее 1 п. секунду;

5) пришедшее ДРЗ* издевается при ручной обработке обработкой включений швабром

дегидрифицированная задержка при плавном погружении тандемства в раствор дегидрифицированного средства в соответствии с требованиями Санитарных правил. Все каналы должны быть искусственно заполнены раствором, извлечен воздуха с поверхности гиперхлористой должны быть удалены сафлором;

оптиковолоконная эндоскопия проводится с помощью оптического шлангового прибора по принципу конусового среза (ва, преимущественно для ЛОРУ). Система жидкой биопсии: всасывания и вытеснения воды (протаскивается не менее 90 мл воды, допустимые потери воды не более 10 мл воды). Эндоскопы для интратрахеальных исследований (жидкой биопсии) оптимизированы в виде не являющегося качеством, бронхоскопы - в виде сферической или овальной в виде оптимизированных фильтров. Порция воды для оптимизации эндоскопии всегда используется оптимизировано;

удаление тканей с внешней поверхности эндоскопа при помощи стерилизованного материала из канавок - продувкой воздухом или активной аспирацией воздуха. Для более тщательного удаления слизи из канавок эндоскопа обработка лопаточками производится 70% этиловым спиртом, а также по необходимости фармакологической статикой. При 70% этиловым спиртом 2 класса микробиологической чистоты и продукцией пылеуловителем;

6) обработка эндоскопом механическими способами производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации на оборудование. Перед каждым циклом обработки эндоскопа в МДМ проводится еще обязательная очистка ручными способами, если в инструкции к МДМ нет других указаний. При отсутствии в МДМ функции промывки спайками, этот цикл проводится вручную после завершения цикла обработки;

7) обработка в МДМ определенных моделей эндоскопов производится при наличии адаптера для подключения всех каналов к оборудованию. При отсутствии в МДМ адаптера для подключения дополнительного канала (универсального, для подачи ОУ, или воды) этот канал должен пройти полную обработку вручную по тем же циклам в МДМ;

8) после завершения обработки эндоскоп подлежит дополнительной обработке для хранения в условиях, обеспечивающих непрерывную дезинфекцию;

9) в течение рабочей смены обрабатываемый эндоскоп в собранном виде может храниться в защитном устройстве до очередного использования не более 4-х часов. Эндоскоп, не использованный в течение указанного периода повторно подвергается ДДУ;

10) между рабочими сменами эндоскоп должен храниться в разобранном виде, упакованным в стерильный материал или герметизированным в шлейфу для сушки и хранения эндоскопов в защитной среде. Срок хранения эндоскопов в шлейфу для сушки и хранения в защитной среде указывается в инструкции по эксплуатации шлейфа. Срок хранения эндоскопов, упакованных в герметичные упаковочные пакеты, не должен превышать 72 часа. После истечения указанного срока хранения эндоскопы подлежат ДДУ повторно.

11) во время хранения эндоскопы в шлейфах или в контейнерах должны храниться устьями/фигурными дужками или на крючках/петлях и открытым выхлопом;

12) емкость (контейнер, бакет) для воды, предназначенная для очистки лопат, крючков и соединительные шланги к ней в конце рабочей смены подлежат очистке, сушке и стерилизации. Перед использованием в далее в течение рабочей смены емкость закрывается стерильной крышкой;

13) аспирационная банка в процессе работы заполняется не более чем на 3/4 объема. После достижения порогового уровня жидкости с помощью погружения и очистки. На остаток аспирационной банки предусматривается не менее двух банок.

9.7.3. Обработка гибких эндоскопов для проведения стерильных эндоскопических

испытательные листы на непотопляемые лотки проводятся в следующей последовательности:

1) визуальный осмотр эндоскопа и проверка на работоспособность. Непотопляемый эндоскоп не подлежит дальнейшей обработке и эксплуатации;

2) процесс предстерилизационной очистки, совмещенный с дезинфекцией, выполняется одновременно процессу механической очистки, совмещенной с дезинфекцией;

3) проверка качества предстерилизационной очистки эндоскопа осуществляется в соответствии с пунктом 37.05 Санитарных правил (естественную пену мыла пажурый обработанный эндоскоп);

4) стерилизация гибких эндоскопов производится в растворах химическим средством ручным способом или механизированным способом в высокотемпературных стерилизаторах, которые не имеют ограничений к использованию для конкретной модели и серия эндоскопа (по материалу: количеству, типу и диаметру канала);

5) процесс стерилизации эндоскопов ручным способом включает следующие этапы:

стерилизующим раствором в растворе дезинфицирующего средства при лотках погружении эндоскопа и принудительном всасывании канавок через водонепроницаемые приспособления, а также удаление воздуха с наружных поверхностей;

оптимальное количество стерилизующей воды в соответствии с инструкцией по применению конкретного стерилизующего средства. Наружные вводы эндоскопов через водонепроницаемые приспособления не менее 40 мин стерилизуют водой комнатной температуры. Стерильная вода и стерильные контейнеры для воды используются однократно.

сушка наружных поверхностей эндоскопа стерильными салфетками, канавки - ватными палочками или ватными шариками. Документальная сушка канавок шприком не проводится;

6) отходы от палочек стерилизующего средства и высушенные изделия перекладываются в специально оборудованную корзину, выложенную стерильной тканью. Допустимый срок хранения простерилизованных изделий не более 72 часов.

37.01. Обработка жесткого эндоскопа гибкая производится в следующей последовательности, состоящий из комбинированного оборудования для стерилизации эндоскопов включает предварительную очистку, предстерилизационную очистку, совмещенную с дезинфекцией, и стерилизацию.

37.02. Обработка жесткого эндоскопа гибкая производится в следующей последовательности:

1) предварительная очистка эндоскопа производится эндоскопом от внешних

загрязнений проводится при помощи безворсовой салфетки в воде или растворе нейтрального моющего средства. Каналы (при наличии) промываются при помощи соответствующих приспособлений (спринцевальные груши, промывочные шприцы или ирригатор с насадками);

2) предстерилизационная очистка при соединении с дезинфекцией жестких эндоскопов и принадлежностей к ним проводится ручным способом и механизированным способом по МДМ. Предстерилизационная очистка, соответствующая дезинфекции, механизированным способом выполняется в МДМ химическими средствами или ультразвуком с применением и термическими методами, которые рекомендованы изготовителем эндоскопического оборудования. Эндоскоп должен быть помещен в соответствующую корзину (соответств. лоток), надежно зафиксирован эластичными креплениями и подвешен в системе ирригации шлангами (при наличии каналов). Процесс предстерилизационной очистки, соответствующий дезинфекции, при ручном способе обработки эндоскопа после полного дезинфекции его основных деталей выполняется:

дезинфицирующую пилерку в много-дезинфицирующем растворе при помощи пилерки в раствор и при необходимости зашлифовки пилерки (при наличии);

механическую очистку внутренних каналов (при наличии) и съемных деталей эндоскопа при помощи шпателя и проволочных очистителей соответствующего размера;

промывку каналом при помощи соответствующих приспособлений;

осмотривание эндоскопа во время пилерки в растворе и дезинфицирующей водой, в том числе каналов (при наличии) при помощи специальных приспособлений;

наружные поверхности эндоскопа просушиваются мягкой тканью, каналы - ватными тампонами при помощи воздушного пистолета. Дополнительно 70% спиртом просушиваются наружные поверхности, если это указано в инструкции изготовителя.

3) после завершения предстерилизационной очистки, соответствующей дезинфекции, производится контроль качества очистки в соответствии с пунктом 3.7.25 Санитарных правил, в которых качество изображений в эндоскопии с микрокамерой или эндоскопией выполняются процедуры ухода.

4) перед автоматическим циклом стерилизации эндоскоп тщательно сушится и упаковывается в стерилизационный контейнер, разработанный изготовителем для обеспечения эффективности выбранного метода стерилизации и сохранения качества во время процесса стерилизации, а также в процессе шестичасовой инкубации и хранения;

5) процесс стерилизации эндоскопов ручным способом должен проводиться в соответствии с Санитарными правилами.

применяются ручными или механическими способами. Перед стерилизацией системол тщательно сушится. Стерилизуемые поверхности дополнительно просушиваются 70% спиртом, применяется функциональный тест. Стерилизуемые световоды стерилизуются методом, указанным в пункте 3695 Санитарных правил. Жидкостные системы стерилизуются в вакуум методом Шля и растворяют в жидком средстве.

3707. Предстерилизационная очистка, соответствия с дезинфекцией, антипригарный багет и коаксиальное многослойное силиконовое кольцо, которое является принадлежностью к стерилизатору (применяющему тепло или давление), после каждой эндоскопической операции проводится ручным или механизированным способом, стерилизуют - паровым методом по режиму: режим-автоматический; изготовителя.

3708. Обработка эндоскопических трубок ручным способом должна проводиться в соответствии с пунктом 3712 Санитарных правил.

3709. Шланг после отключения от сети промывается салфеткой, смоченной в растворе дезинфицирующего средства, не содержащего спирта.

3710. Обработка эндоскопического прибора с принадлежностями проводится в следующей последовательности:

3711. Препир шланг отключают от сети протиранием одноразовой салфеткой, смоченной в растворе дезинфицирующего средства, не содержащего спирта. Использование одноразовых анисептических CO_2 -газовых фильтров относится к медицинским отходам класса «Б».

3712. Коаксиальное многослойное силиконовое кольцо обрабатывается:

предварительной очистке в растворе моющего средства;

предстерилизационной очистке, соответствия с дезинфекцией, ручным или механизированным способом с использованием специальных приспособлений для фиксирования и прижимают внутреннюю поверхность трубок способом механической дезинфицирующего средства: разбрызгивающий держатель давления и шлангом для дезинфекции в растворе и разбрызгивающей воде;

осветлению ультрафиолетовой лампой;

сушке внутренней полости воздухом и внешней поверхности спиртом;

контролю на целостность, целостности и проверке на герметичность;

упаковке и стерилизации паровым методом.

3713. Коаксиальные трубки для эндоскопии всегда помещаются повторно в Б и подлежат повторной обработке. Коаксиальные эндоскопические трубки не подлежат повторной обработке и после использования утилизируются как медицинские отходы класса Б.

3714. При подготовке эндоскопического оборудования к хирургическим

аэрокотипическим индикаторными в целях предотвращения инфицирования пациентов и contamination прибора на каждую операцию на резусе дог инсифицирующей утилизацией однократный стерильный антибактериальный CO₂-газовый фильтр.

3715 Для предотвращения инфицирования персонала во время проведения лапароскопических вмешательств должны использоваться устройство для фильтрации аэрозольных частиц, выделяющихся при брошенной шее вместе с CO₂ через трокар и процесс десифициции.

3716. Срок хранения простерилизованных эндоскопов и инструментов к ним определяется выбранным методом стерилизации, типом и сроком годности эндоскопической наработки

Требования к технологии обработки инструментов и эндоскопов

3717. Обработка инструментов должна проводиться удаленно от эндоскопов. Для дезинфекционной обработки инструментов непосредственно после использования погружаются в раствор нейтрального моющего средства. Рабочие часы инструментов к сложным эндоскопическим комплексам, в том числе эндоскопам у роботов, непосредственно после использования погружаются в дезинфицирующий раствор с окончанием работы до начала проведения простерилизации инструмента и эндоскопа.

3718 Простерилизованный эндоскоп, помещенный в дезинфицирующий инструмент к эндоскопам осуществляется ручным и механизированным способом.

3719. Простерилизованный эндоскоп, помещенный в дезинфицирующий эндоскопический эндоскоп, выполняется в ультрафиолетовых лучах (длина - 250) или в МДМ. Не допускается использование УФ для очистки эндоскопических эндоскопов с сложными эндоскопическими деталями.

3720. Процесс простерилизации эндоскопа, помещенный в дезинфицирующий, при ручном способе обработки проводится в следующей последовательности:

дезинфекционная выдержка в растворе шее-дезинфицирующего средства при полном погружении разобранного инструмента в принудительном выполнении турбинных чашек и полостей (для чашки).

очистка наружных поверхностей инструмента с помощью салфеток, шее; прямых и изогнутых концов (для чашки) при помощи эндоскопической щетки (для эндоскопических трубок, эндоскопических шее и эндоскопических чашек) в соответствии с инструкцией;

механическая очистка эндоскопических чашек (при наличии) при помощи шее и

применимы операторы:

используют промывки внутренних каналов (при наличии) раствором мыло-дезинфицирующего средства при помощи сбалансированных гидростробилов;

используютте дезинфицирующей жидкой наружных поверхностей и промывки внутренних каналов (при наличии) гидростробилов при помощи спейсальных приспособлений.

3721. Наружные поверхности инструментов сушатся тканью, на средние положены - высушены при помощи воздушности пистолета с нагревом.

3722. После завершения предстерилизационной очистки инструментов к ответственному осуществляем контроль качества их упаковки в соответствии пунктом 3723 (литературный обзор). Проводит осмотр на целостность, функциональные части и процедуры ухода в соответствии с инструкцией изготовителя.

3723. При выборе методов стерилизации учитываются рекомендации изготовителя инструментов. Процесс стерилизации инструментов в автоклавах ручным способом должен привлекаться к процессу, установленному пунктом 3700 (литературный обзор).

Контроль качества пылевой, дезинфекции высокого уровня
и стерилизации эндоскопов и инструментов к эндоскопии

3724. В медицинской организации должен осуществляться контроль качества очистки, ДДУ и стерилизации эндоскопов и инструментов к ним.

3725. Для оценки качества очистки эндоскопов и инструментов к ним ставится экспериментальная или другая регламентированная для этой цели проба. Для оценки качества дезинфекции изделий от эндоскопических растворов ставится фенолфталеиновая проба.

3726. Процесс стерилизации/предстерилизационной очистки в МДМ медицинских изделий, предназначенных для привнесения микроорганизмов на изделие, в том числе эндоскопов для вестеральных и стерильных материалов, должен быть защищен. Для этой цели используются методы, разрешенные к применению на территории Российской Федерации.

3727. Плановый бактериологический контроль качества обработки эндоскопов для вестеральных материалов проводится в соответствии с планом производственного контроля ежеквартально. Контроль осуществляется ДДУ в виде отсутствия роста бактерий группы кишечной палочки, энтерококков, стафилококков, синевой от воды, плесени и дрожжевых грибов, а также других условно-патогенных и патогенных микроорганизмов. При этом уровень обсемененности объектов микробной обсемененности биологическим материалом должен быть менее 50 КОЕ/шт.

3728. Вредительные багровато-розовые клещи, перелазящие с одного растения на другое, для воздержания выщипывать их можно приподняв их пальцами или наружные термические аппараты, после чего ремонт или по эстетическим причинам.

[illegible]

3730. При проведении микробиологических исследований образцов шриб с обработанного эмалировки по энциклопедическим показателям в качестве сырьевой жидкости используют стерильный пептизатор и применяемому средству ДЭУ. Дополнительно проводим микробиологическое исследование проб воды, используемой для фидальности сырьевой смеси. Объем исследуемой определяется эндемичностью.

3731. Критерием эффективности стерилизации эндоскопов, по мнению авторов, является отсутствие роста микрофлоры на смывах, отобранных с простерилизованных эндоскопических изделий в асептических условиях.

3733. Планируем (не реже 2 раз в год) микробиологическому контролю подвергать качество сточной инфекции МПМ. Связан с разлитиях участках масштабы уборки несоразмерно более потерянны опыты самодинамических давлений, смещения в окружающей дестабилизованной воде. Трудная дифференциация - оторванные роста темпозависимых форм микробиологических в водородных образцах смитов.

1753. По титлантеским повелениям цитки и разныи учения МДМ отбираются после завершения очередного цикла обработки малых и средних, сменными и сепаратором нейтральности к шрифтовому средству ДРУ. Контроль на предмет чистоты кинематической подложки разлит в средстве (готовое к шрифтовому средству) ДРУ минимизировать цитки и вода для фактически отодвинуть.

Пирарток производства эфиромнополиэфирами растительными (лучше диферукиновыми) и обильными, предшествовавшими фазам и эфиромнополиэфирными веществами.

3734. При плазменном источнике инфракрасного излучения, предложены следующие способы в зависимости от исходных данных, должны производиться следующие операции:

расследование.

3.7.15. При расследовании случая инфекции, вызванной патогенным фактором

1) устанавливаются следующие информационные источники: для фекальных, результаты бактериологического исследования клинического материала с характерной выделенной штаммом энтеробактерии, серологических и других лабораторных методов исследования; даты (или даты) индивидуального воздействия в период инкубационного периода заболевания;

2) проводится обследование подразделений медицинского учреждения, выполняющих аналогичные вмешательства, в ходе которого оцениваются возможности фактической обработки медицинских работников санитарных правил, рабочих инструкций для СОПов, установленных в медицинском учреждении, применяемых средства очистки и Дезу, обеспечение контроля параметров шпота Дезу/стерилизации; качество предоперационной очистки и дезинфекции инструментов; компетенция персонала, проводящего обработку медицинских изделий; наличие у них знаний/версий о возможности контаминации по воздействию профилактической профилактики, связанных с медицинскими вмешательствами;

3) анализируются результаты планового микробиологического контроля эффективности обработки медицинских изделий, проводящий эпидемиологическому расследованию;

4) для установления происхождения источника инфекции в медицинском учреждении, в том же учреждении проводятся, что в поликлинике, проводятся следующие мероприятия:

на основании данных журналов контроля обработки медицинских изделий, журналов регистрации вмешательств, выполняемых в учреждении, журналов выписок, журналы патологических вмешательств в стационаре составляется список пациентов, которые были обследованы (оперированы) до пострадавшего пациента тем же медицинским, в пределах срока операционного вмешательства в соответствии с установленной технологией;

устанавливаются инфекционные случаи пациентов, выполняемых в медицинском учреждении, по данным санитарной документации и дополнительно проведенных лабораторных исследований (исполнители, инфицированные микроорганизмами того же вида, рассматриваются в качестве предполагаемого источника инфекции;

осмотр и при необходимости лабораторное обследование медицинских работников, непосредственно участвовавших в проведении медицинского вмешательства пострадавшему пациенту, в обработке медицинских инструментов и инструментария;

микроскопически показывать файлы с разбавных утилизе эмпнны и проб работетт раствора дезинфицирующего средства (при микроскопии прилагать) и воды для финального ополаскивания на предмет микробной contamination. Выделение из обработанных проб энтерококков является необходимым подтверждением инфицированной биоматериала у диспансеризации под осмывание (исследовать МЦМ) при фактор переноса инфекции.

3736. Исследования случаев инфекций, вызванных условно-патогенными бактериями (далее - УПБ) и связанных с диагностическими лабораторными исследованиями или хирургическими вмешательствами, трансплантацией энтерококков доступом, применением по отношению к инфицированию, полученным патогенными бактериями. Дополнительно оцениваются данные об эпидемиологической обстановке в регионах микробиологической лаборатории по медико-санитарной ориентации в целом. Инфекция, вызванная УПБ, подлежит регистрации при возникновении в период от 48 часов до 30 календарных дней от момента проведения хирургического вмешательства.

3737. Для обеспечения полноты учета случаев бактериальной инфекции, выявленных из клинического материала от инфицированных пациентов, а также в случаях с предположительных факторов передачи инфекции, проводится сравнение их культуральных свойств, антимикробной резистентности, а при наличии возможности дополнительно используются молекулярно-генетические методы исследования.

3738. При эпидемиологическом расследовании случаев инфицирования пациента вирусом гепатита В (ВГВ) или вирусом гепатита С (ВГС), предположительно связанного с перенесенным энтерококковым вмешательством, необходимо брать следующие данные и данные: дата забора крови, дата окончания предполагаемого пребывания, исследованы сыворотки крови на маркеры вирусных гепатитов и (или) выделены нуклеокапсидовые белки (далее - ДНК) и (или) рибонуклеиновой кислоты (далее - РНК) с документально подтвержденным отрицательным результатом, наличие заболевания вирусом гепатита В (даты выявления болезни и смерти) дата (даты) энтерококкового вмешательства в период максимального риска инфицирования.

3739. При рассмотрении энтерококка как вероятного фактора заражения возбудителя инфекции должны проводиться следующие мероприятия:

использовать все методы обработки энтерококков:

осуществлять работу энтерококковых культур (очередность проведения исследований различных видов) и по журналу контроля обработки энтерококков для предотвращения возможности заражения пациентов, выявляемых в отделе, отделении, кабинете микробиологии, или журналу учета перенесенных исследований в стационаре выявляемых пациентов, которые в течение 3-месячного (для ВГВ) или 2-

исследовано (для ВГС) срока до даты эндоскопического вмешательства инфицированности пациента обследоваться (обсервироваться) тем же эндоскопом.

научных медицинских документация выявлены пациентов для получения данных о наличии инфекции у лиц группы В (С) до момента достижения и исполнения организационных, а также, по возможности, таких сведений, проводится документально исследование на маркеры ВГП, при необходимости - полимерно ДНК (РНК) и тепловый анализ.

3740. Пациент, у которого ранее выявлено что же гепатит, что и у пострадавшего, был выписан до даты эндоскопического исследования пострадавшего, может рассматриваться как предполагаемый источник инфекции. Для доказательства его роли связи с пострадавшим необходимо провести молекулярно-генетическое исследование вирусов по определению их идентичности.

3741. Серонегативные результаты, подтверждающие после предполагаемого (установленного) источника инфекции с момента выявления в пределах 3-х недель для ВГВ и 3-х недель для ВГС, рассматриваются в качестве лиц, пострадавших после инфицирования наравне с пострадавшим. Выявление у лиц в пределах контактного инфицирования после эндоскопического исследования маркера ВГП является основанием для проведения углубленного эпидемиологического обследования с использованием молекулярно-генетических методов верификации вируса для подтверждения (подтверждения) связи с источником инфекции и инфицированными пациентами.

3742. Если эндоскопическое исследование проводилось с использованием одноразовых приборов, используется одноразовый препарат и их расфасовка (размещение, упаковка). При использовании общего флакона препарата для обследования и других пациентов исключено от него проведение эндоскопического исследования проводится исследование их крови на маркеры ВГП, а у серонегативных лиц - исследование ДНК (РНК) вируса. Для доказательства связи между пациентами, инфицированными вирусом гепатита, дополнительно используются молекулярно-генетические методы исследования.

Грибковая и вирусная инфекция являются структурных патологий медицинскими организациями, выполняющими эндоскопические вмешательства.

3743. Перед доступом к работе, связанной с использованием эндоскопических вмешательств или обработкой эндоскопического оборудования, медицинским работникам следует пройти специальную подготовку по правилам обработки эндоскопов.

и инструктаж на рабочем месте по охране здоровья.

3744. Медицинские работники структурных подразделений, выполняющие эндоскопические вмешательства, должны быть обеспечены медицинской одеждой (халаты, шапочки, перчатки) в соответствии с таблицей одежды (не менее трех комплектов на одного работающего) и средствами индивидуальной защиты (водонепроницаемые фартуки, наручники, очки или маска, маска или респиратор, одноразовые перчатки) в достаточном количестве.

3745. Смена медицинской одежды (халат или пижама, шапочка) персонала отходящая (убывающая) внутрикласпальной эндоскопии должна производиться по мере загрязнения, но не реже 3 раз в неделю, персоналу хирургических (эндоскопических) отделений (кабинетов), выполняющих хирургические эндоскопические вмешательства, - по мере загрязнения, но не реже 1 раза в день.

3746. Перед проведением каждого эндоскопического вмешательства персонал, участвующий в нем, проводит тщательную обработку рук в перчатках, надевает предельно защищающий шлем (защитная маска, защитные очки/очки, одноразовые медицинские перчатки, водонепроницаемые апат или одноразовый фартук).

3747. Перед проведением каждого эндоскопического вмешательства персонал, участвующий в нем, обрабатывает руки по методике обработки рук мылом, надевает шапочку, маску, стерильные апат и перчатки.

3748. Персонал, проводящий эндоскопию, должен носить предельно защищающую одежду, включающую: одноразовые перчатки из синтетического материала; защитные очки/очки, маску; халат или пижаму (с длинными рукавами, непромокаемые) или одноразовый водонепроницаемый фартук с рукавами (защитными).

3749. Для предотвращения образования и распространения микробной флоры при обработке эндоскопов и лаважных инструментов процедурами ручная чистка проводится при помощи пирогенной воды в растворе, в том числе при использовании методов высокого давления жидкости в полости, усиливающих на этикетках достаточное увлажнение. Сушка лаважных эндоскопов для эндоскопических вмешательств после проведения окончательной очистки проводится способом вентилирования или продувки воздухом после закрытия сапунного клапана вклада лаважки.

3750. Для снижения риска инфицирования персонала и обеспечения безопасности обработки эндоскопов для эндоскопических вмешательств применяется дезинфицирующий способ с использованием МДМ. При большом объеме эндоскопической (одновременное проведение обработок трех и более эндоскопов одного вида)

несимметричный способ обработки эндоскопии является обязательным.

3751. Для предотвращения травм от инструментов и эндоскопии с календарными данными необходимо минимизировать контакт персонала с необработанными инструментами, используя календари с перфорированными тыльными МДМ и УЗС. Запрещается использовать тыльные ялы для забора истолковательского материала из биопсий биопсийных ялов.

3752. Случаи травмирования медицинского персонала на всех этапах подготовки и осуществления эндоскопии в стационаре и в амбулаторно-офтальмологическом отделении должны регистрироваться в журнале учета травм и аварийных ситуаций.

3753. Медицинский персонал при наличии ран на руках, незащищенных перчатками, не должен работать с инструментами до тех пор, пока раны не будут защищены от воздействия эндоскопических инструментов, обработаны антисептиком и перевязаны ватой.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению мероприятий по профилактике ИСМП и противоэпидемиологическим мероприятиям в стационарах (отделениях) хирургического профиля

3754. Профилактические и противоэпидемиологические мероприятия в отделениях ИСМП должны проводиться по всем видам ИС (отделений, кабинетов), использующих хирургические методы лечения и диагностики. Для комплексной и эффективной профилактики мероприятий по профилактике ИСМП (ИСМП) в хирургических отделениях (отделениях) необходимо учитывать, как санитарно-эпидемиологические требования, так и клинические случаи.

3755. В целях обеспечения эпидемиологической безопасности следует проводить следующие мероприятия:

на догоспитальном уровне обеспечивать выделение и лечение пациентов с острым воспалением хронического воспаления;

максимально сокращать сроки пребывания пациента в стационаре (отделениях) и при необходимости переводить;

при госпитализации или при выписке обеспечивать соблюдение всех правил профилактики, проводимых на догоспитальном уровне, чтобы не допустить повторного заражения пациента и его пребывания в стационаре.

3756. Сроки выписки пациентов из хирургического стационара (отделения) определяются состоянием их здоровья.

3757. Состав и длительность профилактических мероприятий хирургического профиля определяются в зависимости от вида и профиля ИСМП.

профилактики ИОЖВ следует вводить внутривенно в интервале от 30 до 60 минут до разреза кожи или в течение 2 часов до разреза при применении аппозиционной. Максимальная продолжительность профилактического введения антибиотиков не должна превышать 24 часа после окончания операции. В исключительных случаях для эффективной профилактики достаточно одной дозы антибиотика. Дополнительные дозы могут быть введены при продолжительных (более 3 часов) операциях. Придание профилактики после хирургического вмешательства до 48 - 72 часов возможно при кардиоторакальных операциях, трансплантации органов, эндопротезировании суставов.

3765. В клинической практике разрабатывают и утверждают руководящие принципы периодической антибиотикотерапии на основании результатов в контролируемых исследованиях, рекомендациях в отношении длины локального микробиологического мониторинга.

3766. При выборе схемы ИОЖВ для профилактики до лечения, необходимо с учетом данных микробиологического мониторинга микрофлоры пациента учитывать чувствительность микроорганизмов к антибиотикам.

3767. Антибиотикотерапию назначают по протоколу антибиотикотерапии, разработанному для профилактики и не подлежащему изменению.

3768. Участие лечащего специалиста, клинического фармаколога, бактериолога и микробиолога, разбору истории болезни по вопросам тактики лечения и выбора пациента с ИОЖВ является обязательным.

3769. В зависимости от степени contamination раны микроорганизмами во время операции выделяют:

чистые раны (ненеинфицированные образованные раны без признаков заражения) - в результате плановых операций; характеризуются тем, что не обладают собственной микрофлорой;

условно чистые раны (операционные раны, расположенные в плановых путях, плановый тракт, плановые или запланированные пути) - в результате плановых плановых операций, обладающих собственной микрофлорой;

загрязненные (контаминированные) раны - раны при экстренных операциях, развившиеся в результате травмы с нарушением кожных покровов и слизистых оболочек (в том числе с нарушением целостности желудочно-кишечного тракта и других органов, обладающих собственной микрофлорой);

грязные (инфицированные) раны (операционные раны, в которых микроорганизмы, вызывающие послеперитонейную инфекцию, присутствуют в значительном количестве до начала операции) - в результате операций по поводу гнойных процессов.

3770. Особенности профилактики ИСМП (НОИВ) в операционных блоках и перекрестках.

3771. Операционные блоки должны быть размещены в павильонах, оборудованных приточной системой приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, обеспечивающей нормируемые параметры микроклимата и чистоты воздуха. При размещении операционного блока исключаются от других лечебных корпусов возможность присутствия удобных транспортных переходов, соединяющих операционный блок с другими лечебно-диагностическими и лечебными подразделениями. Очистительные для вытяжной системы могут размещаться в составе приемных отделений.

3772. При условии соблюдения зонирования помещений по чистоте, обеспечения эффективной работы механической приточно-вытяжной вентиляции, принятых параметров микроклимата и микробиологической чистоты воздушной среды, разделение технологически потоков, применяемых отделочных материалов, предназначенных для стерильных помещений, операционные блоки допускается не разделять на стерильные и асептические.

3773. В операционной допускается размещение одного операционного стола. Использование различных методов, где технологией предусмотрено удержание сразу нескольких столов, при этом должны быть обеспечены принципы перекрестного дифференциальных потоков.

3774. Зону избыточного режима (линее шлюза) следует отделить от остальной размещенной операционного блока черновой штрихой. Вход персонала других отделений из черновой чертух запрещен. При необходимости персонал других отделений должен проходить в операционный блок через санитарные пропускники с соблюдением всех требований санитарной обработки.

3775. В операционных блоках предусматривают различные входы для персонала (через шлюз) и персонал (через санитарный пропускник). В операционные персонал должен через предусмотренные шлюзы доставлять через шлюзовые помещения отходы (мусорная) и из территории операционного блока.

3776. Для входа и эвакуации персонала организаций в павильон операционные анбулаторно-поликлинических организаций, а также отделений стационара, персонал должен через шлюз, а персонал через предусмотренную.

3777. В операционных предусматривают автоматизированную систему дверей (двери, фотозащиты, прочее). Все двери операционной должны оставаться закрытыми за исключением тех случаев, когда есть необходимость перемещения

обтупления, шерошавости или борозды. Щеточно-абразивное оборудование в операционной по возможности должно крепиться на колесах. Чисто шерошавый, которому разрешено ходить в операционную, особенно шнуровые тапочки, должно быть сведено к минимуму. По заданию на проектирование для обучения студентов должна быть предусмотрена тренировка операций и другие умения:

3778. Операционные должны быть простыми и функционально разделены с учетом необходимости оборудования и степени чистоты операционного помещения.

3779. В операционных блоках санитарные пропускники для персонала (мужской и женский) следует проектировать каждый с отдельным помещением. Персонал помещений, оборудованных душем, сауной и раздевалкой с раствором антисептика. В данном помещении входящий персонал снимает обувь, в которой работал в отделении, привешивает душ и проводит личную гигиену обработки рук. Во втором помещении персонал надевает чистые хирургические костюмы, расположенные в шкафах по размеру, специальную обувь, бахилы и выходит из санпропускника в операционный операционный блок, далее в операционную. После проведенной операции персонал возвращается в санпропускник через третье помещение, в котором устанавливают контейнеры для сбора использованной обуви (духаны, хирургических костюмов, бахил, тапочек, бахил). Далее персонал переходит в первое помещение, где, при необходимости, принимает душ, надевает специальную для работы в операционной и выходит из операционного блока.

3780. При подготовке стерильных столов необходимо соблюдать меры предосторожности. Целесообразно мыть и дезинфицировать столы, применяя растворы антисептика, рекомендуемых для дезинфекции поверхностей в операционных;

проектируя, использовать для планировки стерильных столов, веревки стерильной прошивки на целостность материалов. При наличии повреждений их следует заменить. Альтернативой является использование стерильного одноразового хирургического борта для стерильных операционных столов, бортах и столешниц.

3781. Перед применением проследить за тем, чтобы материалы и инструменты (до вскрытия стерилизационных коробов/упаковок):

аккуратно отпечатают печатью закрытия пришедшей стерилизационной коробки или упаковки стерилизационной упаковки для дальнейшего применения;

проверяют по соответствующим методам химическим индикатором, в том числе на стерилизационных упаковочных материалах;

проверяют дату стерилизации;

на бумажке бинсы, упаковочном пакете ставят штамп, приемы вскрытия в толщину вскрываемого.

3782. Паркет подоловой стерильных столов операционных камер обрабатывают руки санитаров стерильными кожными антисептиком при известном и обработан руке хирурга, надевают стерильные халат и перчатки.

3783. При подготовке большого инструментального стола для стерильных простынь, халатов, в которых имеются дыры, раскладывают на теплую и прохладную подстилки стола простыни штаба - в штаб. Простыни располагают вертикально, чтобы края были вровень с краем одной простыни, захватив на другую простыню в мешок веш на 10 см, а края простыней со всех сторон стыка должны быть не менее чем на 15 см. Поверх этих простыней выкладывают третью простыню в развернутом виде так, чтобы ее края стыка не были не менее чем на 15 см. Стол с разложенными на нем инструментами, сверху накрывают стерильной простыней, сложенной вдвое по длине простыни, покрывающей или другую простыню в развернутом виде.

3784. Большой инструментальный стол накрывают одной раз в день непосредственно перед первой операцией. Во время работы инструменты и материалы с большого инструментального стола разрешается брать в стерильных перчатках с помощью стерильной коряжки-палочки. После проведенной операции на большой инструментальный стол дополнительно, посылать на стерильной упаковке, выкладывают инструменты и материалы, необходимые для следующей операции.

3785. При подготовке большого инструментального рабочего стола стол накрывают стерильной простыней, сложенной вдвое, а затем стерильной пленкой в развернутом виде, края которой должны быть вровень со всех сторон стыка. Находящиеся стерильные инструменты и материалы, и сверху накрывают их стерильной пленкой, сложенной вдвое. Альтернативой является использование присланных или приобретенных простыней из нежелезного, воздухопроницаемого материала, удобными к фронтальному доступу.

3786. Малый инструментальный рабочий стол после каждой операции накрывают заново для следующей операции.

3787. Приоритетной задачей большого инструментального стола является обеспечение удобства на каждой операции, поэтому стандартный набор инструментов в операционной комнате, инструменты, используемые в каждой операции.

3788. В операционной комнате все инструменты обрабатывают в соответствии с требованиями к каждой операции, а удаляют после каждой операции. При большой

длительности операции достигается применением специальных инструментов в течение не более 6 часов (в зависимости от длительности операции). В этих случаях в целях предотвращения мышечной нагрузки, применяемые инструменты оформляют специальными держателями. После операции всевозможные инструменты поддают дезинфекции, predeterminedной очистки и стерилизации. Доставку инструментов по назначению инструментов в ЦС О производят в закрытых ватно-марлевых контейнерах.

3789. При подготовке к использованию наркозно-дыхательной аппаратуры с целью предотвращения перекрестной инфицирования пациентов через наркозно-дыхательную аппаратуру используют специальные одноразовые фильтры, предназначенные для очистки респираторной аппаратуры. Устройства в замену фильтров осуществляют в соответствии с инструкцией по применению конкретного фильтра. Для заполнения резервуаров увлажнителей следует использовать стерильную дистиллированную воду. Сменные детали аппарата дезинфицируют так же, как медицинские изделия из соответствующих материалов.

3790. Члены операционной бригады ходят на территорию операционного блока через санпропускник, где принимают душ и меняют одежду на операционную одежду и шапочки, надевают соответствующую обувь (белые).

3791. Члены операционной бригады перед входом в зону строгого режима выкашляют в ведро (специально для этого предназначен), закрывают нос, рот и область подбородка, и приходят в предоперационную, где производят обработку рук хирурга по технологии, указанной в главе 1 листинг с санпропускных дверей. После этого члены операционной бригады надевают стерильные шапочки и перчатки с длинными манжетными частями. Перчатки надевают после надевания стерильного халата. Ассистенты (врач, медсестра) должны работать в чистой рабочей одежде (стерильные костюмы, шапочки, соответствующая обувь или ботинки, белые в санпропускнике) в стерильных перчатках.

3792. Хирургические скальпы, используемые в операционном блоке, должны быть маркированными и укомплектованы принятым способом. Предпочтительны скальпы с двумя разводами лезвия.

3793. Перевязочные лотки, быть обеспечены необходимым количеством стерильных инструментов и расходных материалов. Выбор для проведения перевязки должны быть надлежащим.

3794. Стерильный перевязочный стол вымывается так же, как в операционной и не используется более 6 часов. На время перевязки накрывают халаты перевязочной

стол. При включении индивидуальных стерильных наборов стерильный стол можно не закрывать, при этом в составе набора предусматривается стерильная салфетка.

3795. Перевязочный стол для персонала (дуплетка) идентифицируют способом протирания в горизонтальной плоскости (поверхность), предпочтительно в обратном направлении, перед каждой новой перевязкой.

3796. Сметки лоскуты производят индивидуальную обработку марлевыми и чистыми (неиспользованными) салфетками, которые выносятся после каждого лоскута.

3797. Личный врач (персональный доктор) производит перевязку в стерильных перчатках, которые выносятся при каждой перевязке.

3798. Все предметы из стерильного перевязочного стола берут стерильным инструментом (пальцами). В целях предотвращения вторичной контаминации рабочей поверхности корригирующей (устанавливая часть бинта) и оперирующей и первоначальной разработки корригирующей на край стерильного стола рук, ладонь рабочей поверхности вставляется под стерильную пленку, а поверхность, которая соприкасается с руками персонала (кошачьи ручки корригирующей или оперирующей конечности пациента) выносятся из края стерильного стола. Либо корригирующая должна выполняться в стерильном лотке, покрытом стерильной пленкой, из-под которой выносятся кошачьи ручки корригирующей или оперирующей конечности. Если корригирующая или конечность входят в стерильный операционный набор в виде бинта с другим инструментом после окончания операции (перевязки) для обработки и стерилизации. Пленка или корригирующая нечеткая часть не используется. Данные инструменты подлежат незамедлительной обработке, если имеется возможность различия поверхностей биологической активности, либо приложить вакуумную стерильность.

3799. По окончании перевязки использованный материал, использованные перчатки, использованные салфетки, пленка выносятся в емкость для сбора отходов класса Б.

3800. В конце работы для проводят уборку поверхности с использованием раствора и различных поверхностей. Для проведения уборки может использоваться инвентарь и уборочный материал.

Требования к организации и проведению мер профилактики ИСМП в отделении (палатах) размещения и вытекания тарелки

3801. Состав и площадь помещений отделений размещения и вытекания тарелки (ОРИТ) определяется численностью и графиком коек структурного подразделения МО

3802. При строительстве янгов МО в по возможности при реконструкции действующая в целях профилактики ИСМП, связанных с пребыванием пациентов в размещенных в отделениях хирургического профиля, предусмотреть возмещение изотермического размещения пациентов.

3803. В составе ОРИТ должна предусматриваться изолятор (оборудованная палата).

3804. Необходимо выделить отдельные помещения и оборудование среднего медицинского персонала для ухода за пациентами, требующими длительного реанимационного пособия (реанимационный зал), и для ухода за пациентами, поступающими в отделение для выхода из комы и критического состояния и постоперационного периода (палаты).

3805. Должно быть обеспечено раздельное пребывание пациентов с острым коронарным синдромом и заболеваниями в отдельных палатах или отделениях.

3806. Персонал реанимационного отделения обеспечивается специальной одеждой (халаты из бязи и фартук, шапочка, тапочки, халат) с ежедневной сменой комплектов.

Сотрудники других отделений, осуществляющие лечебно-диагностические мероприятия у реанимационных больных, при входе в реанимационное отделение, надевают одноразовый халат, который после выхода из ОРИТ помещают в корзину для белья.

3807. При входе и выходе из реанимационной палаты персонал обрабатывает руки жидким антисептиком.

3808. После выписки больного из отделения проводить туалет, крышки обрабатывать дезинфицирующим раствором. Постельные принадлежности (матрас, подушка, одеяло) подвергать дезинфекции. При наличии на матрасах и подушках пятен их обрабатывают раствором дезинфицирующего средства.

3809. Перед поступлением больного крышки заправляют чистой комплектом постельных принадлежностей (матрас, простыня, подушка, одеяло, пеленка, подгузники). Стена постельного белья подлежит ежедневно, а также при его загрязнении.

3810. В целях профилактики пролежней необходимо ежедневно проводить обработку кожи пациента, применять противопролежневые матрасы, специальные прокладки, изменять положение тела. Полную обработку кожи пациента проводить не менее 2-х раз в день.

3811. В каждой МО разработаны и внедрены в работу протокол качества и ухода за внутрисосудистыми устройствами и периферическими и центральными венозными катетерами.

материальный паттерн (в виде СОП). Постановку возмущить катетер и уход за ним должен проводить персонал обученный соответствующей стандартной операционной процедуре.

3812. При установке центральных венозных и артериальных катетеров (ЦВК и ЦАК) медсестры должны выполнять максимальные барьерные меры предосторожности: обрабатывают руки (по методу обработки рук хирургов), надевают шапочку, маску, стерильный колпак и стерильные перчатки. Накрывают датчики шотландкой, от голеней до шеи, стерильной хирургической простыней с отверстием для интроспективного поля. Чрезвычайно важным центральным паттерном является в шотландии с десятидневным режимом.

3813. Место входа катетера обрабатывают доминирующей рукой до постановки катетера. После того как катетер будет установлен в вену, место постановки катетера не дезинфицируют.

3814. С целью обеспечения адекватного контроля состояния раны, венозной фиксации ЦВК, минимизации механических повреждений кожи при смене повязки и замены раны должны отвечать катетеры от компрессионной нити, предпочтительнее использовать прозрачную полупроницаемую повязку (эпидермис), изготовленную из прозрачного пластика. У пациентов с длительными сроками постановки ЦВК следует использовать прозрачную эластичную полупроницаемую повязку с вентиляцией. Специальные специальные непрозрачные повязки можно использовать в исключительных случаях (в том числе в случае острой инфекции венозного катетера и при неэффективности прозрачных повязок). Такая повязка должна быть эластичной при высокой влажности на прозрачную. Стерильные повязки должны не обладать барьерной функцией, и их не следует применять.

3815. В истории болезни указывают место, дату постановки катетера и дату его удаления. Ежедневно ведется учет катетеро-дней до удаления (для разных специализированных показателей действия факторов риска).

3816. Перед любой манипуляцией с катетером персонал обрабатывает руки стерилизующим жидким антисептиком в ладонях перчаток. Для введения раствора через катетер используют стерильные одноразовые шприцы.

3817. Необходимо ежедневно инспектировать место введения катетера через непрозрачную прозрачную повязку. Если повязка мешает осмотру в пальпации места введения катетера, ее удаляют и после осмотра накладывают новую. В случае шотландии привязать инфузионный катетер (гиперемия, болезненность при пальпации, покраснение, отекание вокруг катетера, лихорадка, высокая температура), необходимо

3832. Следует обеспечивать постоянное удаление секрета из надгортанничного пространства и контролировать глубину и давление - целевой уровень давления 25-30 см вод. ст.

3833. Для профилактики инфицирования системы следует проявлять необходимость тушения полости рта в зависимости от состояния больного, но не реже 2 раз в день.

3834. Замену трахеостомической трубки следует проводить в асептических условиях.

3835. При уходе за пациентом трахеобронхиального дерева следует избегать обширных перемещений.

3836. При использовании открытой системы для аспирации секретов дыхательных путей следует применять стерильные спинальные катетеры одноразового применения с использованием иглы катетера для лучшей аспирации. Повторное использование спинального катетера и закрытых систем (кроме дренажей) после пациента в течение срока их использования запрещается.

3837. У пациентов с трахеостомической полостью ИВЛ более 48 часов, с целью уменьшения количества предметов окружающей пациента и риска инфицирования путей дыхательных путей, необходимо отложить предложение накрытия системы для дыхания. Длительность использования закрытой системы для аспирации трахеи у одного пациента принимается в соответствии с инструкцией производителя.

3838. Для профилактики санации трахеобронхиального дерева у каждого пациента используется индивидуальная вакуум-система.

3839. С целью профилактики перекрестной инфицирования запрещается использовать одну и ту же вакуумную систему для аспирации трахеобронхиального дерева у нескольких больных. Вакuum-отсос необходимо отсоединить и дезинфицировать по мере использования, но не реже 1 раза в смену. Протоколы для выбора метода очистки для сбора секретов дыхательных путей описаны в приложении.

3840. Повторное использование систем для аспирации секретов дыхательных путей, в том числе у одного и того же пациента запрещается.

3841. Все новые материалы, контактирующие с дыхательными путями больного (интубационная трубка, трахеостомическая трубка, катетеры для аспирации секретов трахеобронхиального дерева) должны быть стерильными.

3842. Не следует без особых показаний (загрязнение, нарушение функционирования и иные) производить замену дыхательного контура исходя из

продуктивности его прижизненно, при использовании контура у того же самого пациента. Предполагается, следует избегать использования действительных контуров отягощенности прижизненно. Длительность применения контуров принимается в соответствии с инструкцией производителя. Следует своевременно удалять любой конденсат с контура.

3843. Съемные детали аппарата парково-дыхательной аппаратуры дезинфицируют так же, как медицинские изделия из соответствующих материалов. Обслуживающие персонал, выполняющие аппаратные проводы с учетом рекомендаций, изложенных в инструкции по эксплуатации аппарата, соответных моделей.

3844. С целью предотвращения перекрестного инфицирования пациентов через парково-дыхательную аппаратуру необходимо использовать барьерно-бактериальные дыхательные фильтры однократного применения, предназначенные для пациентов указанных аппаратов. Убедитесь при этом, что системы стерильной водой через закрытые каплевидные Нормы мешки по мере использования.

3845. С целью уменьшения риска, связанного с применением ИВЛ у взрослых, следует избегать применения теплообменниковых фильтров. Съемный фильтр привязывается в соответствии с рекомендациями производителя либо чаще в случае его загрязнения или обструкции. При выявлении у пациента бронхо-обструктивного синдрома, повышенной частоты дыхания, склонности к обструкции некушетвенных дыхательных путей возможно применение искусственного увлажняющего дыхательного смеси. Для предотвращения резервуара системы увлажнения использовать стерильную воду. Система вентиляции со стерильной водой – дыхательный контур всегда должна оставаться закрытой.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению мер профилактики ИСМВИ и протирочных дезинфекционных мероприятий в стационарах (отделениях) акушерского профиля, акушерских палат

3846. Во время строительства и реконструкции здания акушерских отделений, перинатальных центров и стационаров для лечения детей должны предусматриваться специальные помещения отдаленные от палат, буфетов и столовых, для размещения грудного молока, помещаемого для сбора в хранилище материнского грудного молока, а также помещения для предотвращения детских инфекций.

3847. Акушерский стационар (отделение) может иметь отдельные отделения с совмещенной и (или) раздельной пребыванием матери и ребенка. Соотношение тех и других палат определяется заказом на проектирование.

3848. Количество мест в палатах совместного пребывания должно быть не более 2 материнских и 2 детских. В дисперсионных палатах раздельного пребывания количество

кожх для родильниц должно быть не более 4 и сплывающей, кильчатым кожом и шпатель для новорожденных.

1849. В отделении для новорожденных акушерская стационарная палата должна группироваться в палаты не более чем на 20 кроваток с остекленными перегородками между палатами и акушерским отделением.

1850. В родильных палатах с совместным пребыванием матери и ребенка необходимо предусматривать широты психической терапии для матерей и детей, а также летнюю палату для здоровых новорожденных.

1851. В акушерских стационарах и отделениях, при наличии обсервационных вент, прием родовниц и родовниц на дифтерийные заболевания осуществляют через бумажный шланг с дезинфицирующим раствором с отсасывающим насосом.

1852. Во вентх строятся и реконструируются частные и общие приемные отделения необходимо предусматривать, наивысшим образом, при наличии вентх, обсервационное отделение в структуре учреждения может не выделяться. В этом случае следует предусмотреть возможность стационарной палаты частх палат для экстренного размещения обсервационного отделения.

1853. Отделение второго этажа выделенных предусматривают в составе родильных палат и детских стационаров, при наличии родовниц-матерей в общепринятой палате.

1854. Палатная отделений акушерского стационара (в том числе хирургический, гинекологический, педиатрический, неврологический, ботанический, психиатрический, стоматологический, психологический, психический).

опишется круглогодичное пребывание матери и ребенка (до 30% мест);

дневное пребывание матери и ребенка (до 30% мест).

1855. При использовании палаты родовниц для приема родовниц следует предусмотреть фанель при приеме в отделение и помещение для отдыха и приема пищи, санитарный узел.

1856. В перинатальном центре должны быть предусмотрены палаты (отделения) для проведения родовниц родовниц мероприятий и психической терапии новорожденных, родовниц и родовниц.

1857. Акушерский стационар (отделение) не менее одного раза в год должен закрываться для проведения психической дезинфекции, в том числе при необходимости - для текущего ремонта (но не менее чем на 14 календарных дней). Открытие стационара, закрывающегося по эпидемиологическим показаниям, допускается по согласованию с

проектируемые, утверждаемые федеральным государственным санитарно-эпидемиологическим надзором.

3858. При планировании перинатального центра, обеспечивающей обеспечить поставку в достаточном количестве технологических материалов, поступающих патентованное изобретение перинатального центра для плановой дезинфекции с использованием оборудования по содержанию в отделе. Удостоверены федеральным государственным санитарно-эпидемиологическим надзором.

3859. Запрещается прием и акушерский стационар женщин в постерпелых случаях.

3860. Прием выписки из акушерского стационара отменяется в состоянии здоровья матери и ребенка. В экстремальных случаях возможна выписка на 1 или 4 день после родов, в том числе до отпущения пуговицы у новорожденной.

3861. Прием выписки пациентов в освобождении лавы при условии ухода по типу экстренной дезинфекции, поступающие при необходимости изобретения экстренной дезинфекции для обработки растворов дезинфицирующих средств при наличии подопытных случаев.

3862. Акушерский стационар обязан информировать о наличии родильницы в родильном отделении кинематографа и детскому поликлинику по фактическому месту жительства или месту пребывания в родильном отделении.

3863. Прием выписки беременных и родильниц родильницким учреждением административной акушерского стационара (отделения).

3864. Прием выписки мужа (близкого родственника) при родах возможен при наличии выписки родильниц из родов с учетом состояния женщины. Родильницам присутствие при родах должно быть в полной мере и обуви. Порядок обследования таких лиц соответствует порядку обследования лиц, поступающих в стационар.

3865. Для персонала должны быть предусмотрены личные вещи (одежда, обувь, туалетные принадлежности и санитарная одежда, туалет). Санитарная одежда должна быть чистой.

3866. Во всех отделениях акушерского стационара ежедневно проводится уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3867. Протестированные препараты в отделениях (палатах) для ВИЧ-инфицированных пациентов и на выявленных случаях приема по типу режима оказания для больных вирусом гепатита В. При манипуляциях (операциях) у ВИЧ-инфицированных пациентов используют инструменты и другие медицинские изделия.

опторазового применения. При их использовании инструменты и материалы должны использоваться по назначению (по режиму), установленному для профилактики перекрестных инфекций, с соответствующей маркировкой.

3866. Медицинский персонал, принимающий роды и осуществляющий уход в послеродовый период, в том числе за ВИЧ-инфицированной родильницей и ее новорожденным, должен:

соблюдать меры личной безопасности (работать в перчатках при приведении всех манипуляций, правил обработки рук, при уходе родив - использовать чистые бинты для перевязки).

соблюдать меры предосторожности при работе с пациентами, страдающими инфекционными заболеваниями, СПИДом;

обращаться к медицинскому персоналу с заболеваниями бешены, поместить его в карантинные мешки или контейнеры, плазменное белье обработать в дезинфекционной машине или контейнере;

убедиться в целостности упаковки стерильной профилактики перекрестных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, экстренной помощи, санитарно-эпидемиологической помощи и патологической медицинской помощи при подготовке к приведению манипуляций беременной с ВИЧ-инфекцией;

выполнять манипуляции в присутствии второго специалиста, который может в случае разрыва перчаток или шпоро продолжить ее выполнение;

при аварийных ситуациях (кровоток и разрыв инструментов, контактировавших кровью и другими биологическими жидкостями, в том числе от ВИЧ-инфицированных пациентов, больных гепатитами В, С или синдромом, а также попадание крови в другие биологические жидкости на слизистые оболочки, носа и губ), принять экстренные профилактические меры.

3867. При поступлении беременной женщины в акушерский стационар (родильное) потребоваться наблюдение и физическое или лабораторное обследование «мать-дети» рождается на основании данных об эпидемиологии, истории и осмотрах поступающей в акушерский стационар женщины. Следует обеспечить изоляцию беременных и родивших, поступающих в родильные отделения и отделения. Для путей передачи инфекционных заболеваний необходимо иметь отдельные помещения.

3868. При поступлении родившей женщины медицинский персонал и санитарную обработку. Брать кожные пробы на токсоплазмоз и диагностику инфекционных заболеваний при необходимости. Дать направление всем пациентам, получить подтверждение

матери для контакта кожел-я-коже с изолирующим прикрыванием 3 группы. Ребенок по заверше у матери укрывается шерстяной (хлопчатобумажной) сухой теплой пеленкой и одеялом.

3880. Обработку кожных швовая покровов ребенка проводят только в случае загрязнения кожных покровов новорожденного мыльным или кремом, которые смывают теплой водопроводной водой.

3881. Профилактику инфекционных заболеваний кожи у новорожденного проводят с использованием трициклопентановой или тетрациклиновой мазей, 20% раствора сульфата натрия (альбуцил), 1% раствора нитрата серебра в ватно-марлевой упаковке.

3882. После пеленания и одевания новорожденного высушить в пеленальный стол препарат раствора дезинфицирующего средства. Нов оборудование, используемое при купании, мытье и уходе за новорожденным, обеззараживают дезинфицирующим раствором по рецепту, обеспечивающему гибель бактерий, вирусов и простейших. Кипятят для обеззараживания слюны у новорожденного используют стерильные бутылки и лоточки для хранения прикорма.

3883. Постеридовое физиологическое отделение с совместным и раздельным пребыванием матери и ребенка

3884. Постеридовое физиологическое отделение должно быть организовано преимущественно по принципу совместного пребывания матери и ребенка. Возможна приемлемая палата с совместным пребыванием матери и ребенка и в observationalном отделении.

3885. Для совместного пребывания матери и ребенка оборудуют одну или двухместные палаты. Заполнение палаты происходит в течение 24 часов.

3886. Палаты постеридового физиологического отделения с раздельным пребыванием матери и ребенка заполняют планшетами, синхронно с палатами детского отделения в течение не более 3 календарных дней.

3887. Постельное белье меняют каждые 3 календарных дня, рубашки и ползавшие - ежедневно, подкладные одеяла для замены - по необходимости. Допускается использование в палатах планшетах синтетических широкими и широкими быть у матерей и новорожденных широкими широкими планшетами у новорожденных.

Палаты новорожденных

3888. Палаты новорожденных с раздельным пребыванием матери и ребенка заполняют синхронно с палатами постеридового физиологического отделения в течение не более 3 календарных дней.

температура (но не выше 23°C в теплом месте не более 2 часов) для использования для спелых и сформированных ребенка, оставшихся при этом можно охлаждать и хранить по необходимости.

3906. Идентификационные маркированные емкости со сжатым охлажденным молоком, хранящиеся в холодильнике, под контролем маркированного работника допускается доводить до объема не более 150 мл при температуре не выше 20 ($4 \pm 2^{\circ}\text{C}$) молока маркированного сывороточного молока от пазух и той же материи (при наличии возможности сменить молоко несколько раз в день) от момента сжатия в закрытой емкости в течение не более чем 24 часов. Кратность добавления молока в банку в ту же емкость — не более 5 раз в 24 часа.

3907. Охлажденное сжатым грудное молоко в количестве не более 150 мл, хранящееся в маркированных маркированных емкостях в холодильнике не более 24 часов (в случае отсутствия маркировки — от момента сжатия первой порции), допускается размораживать при температуре не выше $18-40^{\circ}\text{C}$.

3908. Закрытые емкости (контейнеры) с замороженным грудным молоком могут храниться в специально предназначенном морозильнике при температуре не выше минус 18°C в течение не более 1 месяца.

3909. Для медленного размораживания сжатого грудного молока следует поместить емкость с замороженным молоком в теплую воду (при температуре $4\pm 2^{\circ}\text{C}$) до полного оттаивания с последующим доведением температуры молока до температуры кормления путем помешивания смеси с молоком в теплую проточную воду (при температуре не более $17-40^{\circ}\text{C}$) на 20 мин.

3910. Для быстрого размораживания сжатого грудного молока смесь с замороженным молоком можно сразу выливать в теплое проточное воду (при температуре не более $17-40^{\circ}\text{C}$).

3911. Размораживание и подогрев молока следует сразу использовать для кормления ребенка. Размораживание в теплом молоке запрещено хранить при комнатной температуре более 2-х часов. Не допускается повторное размораживание и охлаждение грудного молока допускается хранить в холодильнике при температуре $4\pm 2^{\circ}\text{C}$ не более 24 часов от момента размораживания. Непосредственно в течение 24 часов от момента размораживания для кормления ребенка размораживание можно повторно замораживать не подлежит и должно быть использовано.

3912. В случае возникновения отравления (более чем 24 часов с момента сжатия) кормящая женщина должна сменить грудным молоком замороженное грудное молоко его можно размораживать и использовать до температуры кормления.

ребенка. Допускается хранить не подвергнутому повторному размораживанию грудное молоко в холодильнике при температуре $(-4\pm 2)^{\circ}\text{C}$ не более 24 часов от момента размораживания, после чего размороженное молоко должно быть заморожено и не должно быть использовано.

3913. В случае необходимости отсроченного кормления замороженного сцеженным молоком (отдельная бутылочка и т.п.), сцеженное грудное молоко может быть использовано после заморозки.

3914. Молоко разливают в стерильные бутылочки по 30-50 мл (по 100 мл для переносимого центра) для последующего использования. Бутылочки под крышкой закрывают герметично и пастеризуют на водяной бане в течение 5 - 7 минут от начала закипания воды, уровень воды в которой должен быть не ниже уровня молока в бутылочках. Бутылочки с молоком после пастеризации охлаждают до комнатной температуры, помещая их в емкость с холодной водой и раздают для кормления детей для хранения в холодильнике до 24 часов.

3915. Пастеризованное молоко, молочные смеси используются для вскармливания при назначении прикорма при наличии показаний. Запрещается кормление малышей детей из одной бутылочки. Поды и растворы для питья должны быть в стерильной упаковке (стерильной разовой расфасовке).

3916. Сухие молочные смеси после вскрытия упаковки должны иметь маркировку с указанием даты и времени вскрытия. Разведенные смеси хранятся в стерильной посуде. Допускается использование готовых жидких смесей фабричного производства.

3917. В observational обследование поступают рожающие, родившие и вскармливаемые в соответствии с показаниями в случае отсутствия индивидуальных родильных планов или планов. Планирование к рождению беременных и рожающих является:

высокое состояние (температура тела $37,6^{\circ}\text{C}$ и выше без клинических признаков других симптомов);

инфекционная патология, в том числе:

острые воспалительные заболевания и дренируемые воспалительные заболевания в острой фазе (пневмония, пиелит, бронхит, менингит, скарлатина, скарлатина и другие);

острые респираторные заболевания (грипп, аденовирус и другие);

ВИЧ-инфекция, гепатит, вирусные гепатиты В, С, Д, гонорея, герпес, малярия, тиф;

туберкулез (любой локализации при отсутствии специализированного стационара).

Беременных и рожающих с острой формой туберкулеза госпитализируют в специализированный родильный дом (отделение), при отсутствии таковых - в ближайший

и некоторым обсервационным стационаря с последующим переводом также родиль и прототуберкулезной стационар.

приведение беречьности по медицинским и социальным показателям с 20 тысяч беречьности:

выступителю издать приказ, глупые животные рожать плохих детей, изобретение джорданаго ридоржестеица.

исполнение медицинским джоржестеица и даны об обследовании ридоржестеица:

родиль вне лечебной учреждения (после 24 часов после родов)

3918. Перенос в обсервационное отделение из других отделений акушерского стационара подлечив беречьность, роженицы и родильницы, изобретение:

появление температуры тела в родах и раннем послеродовом периоде до 38 °C и выше (при измерении измерять через каждый час):

температура воздуха выше (температура тела выше 37,6 °C), продолжительность более 24 часов.

приведения экспериментальных инфекционных заболеваний, не требующих перевода в специализированный стационар (острая респираторная инфекция, шимпан, герпес).

Лечение послеродовых осложнений и осложнений осуществляют в условиях прототуберкулезного стационара (и изобретение).

3919. Перенос и социальными в обсервационное отделение подлечив:

новорожденных; матеря которых переведены из физиологического послеродового отделения в обсервационное;

новорожденных с инфекцией респираторной и инфекцией респираторной ридоржестеица. Во всех случаях в срочном хирургическом лечении:

дети, рождающиеся вне родильного дома

3920. Новорожденных с ИСМП и ВУИ переводят в детский стационар или специализированный центр.

3921. В случае смерти новорожденного в обсервационное отделение вместе с ним переводят и родильницу.

3922. В обсервационном отделении пациентов необходимо разместить в палаты по изоляционным формам заболеваний беречьности - отдельно от родильниц

3923. При необходимости перевода в обсервационное отделение инфекционной инфекцией инфекцией, надлежит беречьность. Для этого у инфекций в отделении должны быть изоляционные камеры, системы с барьерами.

3924. Прием родов у ВИЧ-инфицированных беременных, а также у беременных с синдромом Д. С., сифитком возмещается в родильных домах специально организовано для общего пользования. При этом прием родов происходит в специально выделенной палате, преимущественно в боковой, где роженица с ребенком находится до выписки. При необходимости оперативного вмешательства используются стандартные наблюдения отдаленности.

3925. При ведении родов у ВИЧ - инфицированных беременных через естественные родовые пути проводится обработка влагалища 0,25% водным раствором хлоргексидина для предотвращения инфекции (при первом влагалищном исследовании), а при пачках водян - при каждом последующем влагалищном исследовании. При безводном периоде более 4 часов обработку влагалища хлоргексидином проводят каждые 2 часа.

3926. Во время ведения родов у женщины с ВИЧ-инфекцией при живом плоде ограничивают проведение процедур, повышающих риск инфицирования плода: фетотомии, родостомии, кесарева, амниотомии, амниоцентеза. Включая акушерских пинцетов, вакуум-аспиратора и др. Выписки после родов проводят только по медицинским показаниям.

3927. Отделная роженица и новорожденный помещаются в новорожденный (НРИТ) и изолированы новорожденных и недоношенных (ОПН) соответствующего центра для того, чтобы обеспечить выбор помещений, изолированных от родильнических и других отделений.

3928. В ОРИТ и ОПН допускается перевод новорожденных из других отделений перинатального центра или других акушерских стационаров. Перевод новорожденных из ОРИТ в ОПН и дисперсионные отделения перинатального центра или других акушерских стационаров не допускается.

В случае если перинатальный центр работает в ОПН и ОРИТ новорожденных из других акушерских стационаров при этом в отделение предусматривают наличие помещений приема.

Все диагностические и лечебные процедуры должны быть доступны врачам и медицинским сестрам осуществляющим непосредственно в палате. Процедуры в физиотерапевтической кабинете предназначены только для подготовки и лечения или диагностическими мероприятиями.

Перед осмотром каждого ребенка и проведенным манипуляцией персонал проводит обработку рук. После осмотра ребенка и ухода персонал проводит обработку рук.

заключаются перед закрытием кузовов. Преимущественно применяется недавнее упреждение кузовов.

Для осмотра повреждений в каждой полости предусматривают специальный свет, оборудованный зажимом в поперечном и продольном направлении.

Термометрия проводится электронным термометром. Для осмотра зра неощущают односторонней шпатель.

При отделении предусматривают помещения для фильтры (отража, осветитель и измеритель), измерительная и осветительная аппаратура (другие радиоприемники по усмотрению). Матери (другие радиоприемники), перед началом в отделении устанавливают частоту измеренной мощности. Допускается использование чистой ламповой лампы. В отделении запрещены проведение несовершенных детей.

Каждый случай профилактического обследования (включенного и исключенного), в том числе выявленного условия-патологическим инструментом, у ребенка, поступающего в ОРИТТ или ОИПН, подлежит учету и регистрации.

ОИПН должно быть организовано преимущественно по принципу совместного пребывания матери и ребенка. В ОРИТТ для нахождения без матерей, но допускается посещение ребенка родителями.

Матери, находящиеся в отделении совместно с ребенком, не должны иметь другие полеты одежды или другие отделенные предметы. В отделении ОРИТТ и ОИПН запрещается хранение продуктов питания, вещей, предметов одежды, пользование электрическими приборами, оборудованием, фотоаппаратами.

3929. В отделении стационаре систематически проводятся дезинфекционные мероприятия, при этом обработка кузовов проводится в специально оборудованном помещении.

3930. Дезинфекция кузовов осуществляется дезинфицирующими средствами, в соответствии с инструкцией, которая есть рекомендация по обеззараживанию кузовов.

3931. Для дезинфекции кузовов не допускается применение хлорсодержащих средств, а также средств, содержащих в своем составе эфирные масла, фенолы и его производные.

3932. Дезинфекцию наружных поверхностей кузовов: делая профилактику ИСМН осуществляют ежедневно одновременно с проведением ежедневных уборок по режиму, обеспечивающему гигиену пребывания больных и профилактику заболеваний.

3933. Обработку наружных поверхностей и приспособлений кузовов проводят по типу заключительной дезинфекции в отделении, хорошо оборудованном помещением, оснащенном ультрафиолетовыми облучателями для других устройств, обеззараживающих воздух, радиационными и химическими. Обеззараженные наружные поверхности и приспособления кузовов проводят перед поступлением ребенка.

3934. Обработку кузовов проводят после перепада температуры, но не реже 1 раз в 7 календарных дней. Обработку кузовов следует проводить с учетом документации по уходу за телом кузовов, прилагаемой к эксплуатационной модели.

3935. Перед обработкой кузова это необходимо включить, открывают люк, бачок увлажнителя. В случае, предусмотренных инструкцией по эксплуатации кузова, поместить фильтр отверстия кабины, через которое в кузов поступает воздух.

3936. Дезинфекция поверхностей кузовов проводят способом щотирования, разлитых приносимых - погружением в раствор дезинфицирующих средств по режимам (концентрация раствора, время дезинфекционной выдержки), рекомендованным для приносимых и брызгов с бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями. Выбирая из них наиболее жесткий для данного процесса (более высокая концентрация рабочих растворов и более длительное время обеззараживания) и последующим применением воды в соответствии с режимом, рекомендованным для каждой дезинфекционной обработки.

3937. После дезинфекции кузова остатки дезинфицирующего раствора следует удалить многократным протиранием (смыванием) стерильными салфетками или стерильной ветошью, обильно смоченными стерильной водой (100-150 мл). После мытья кузова необходимо поверхность вытереть сухой. По окончании обработки кузова следует проветривать в течение времени, рекомендованного для конкретного дезинфицирующего средства.

3938. По окончании обработки, кузов покрывают ветошью и помещают в укрытие. Перед тем, как поместить ребенка, увлажняющую систему кузова закрывают стерильной дезинфицирующей ветошью.

Самостоятельно-технические требования к организации и применению мер профилактики ИСЗП и приносимых мер профилактики в помещениях (отделении) инфекционного профиля

3939. Зоны стационара инфекционного профиля, расположенные на расстоянии не менее 100 метров от территории жилой застройки.

3940. Инфекционный корпус отделен от других корпусов палатной зоной, исключая

3941. При соответствующей планировкой здания и наличии соответствующих систем вентиляции исключается размещение инфекционных отделений в одном здании с другими отделениями.

3943. Инфекционные стационары (отделения) в составе многопрофильных больших должны иметь отдельные крылатые отделения.

3943. В жилых и общераспачных зданиях не допускается размещение ИИО, пыляющих медицинскую помощь. Обеденный инфекционными заболеваниями.

3944. На территории медицинских организаций, оказывающих помощь в стационарных условиях по профилю «Инфекционные болезни», «Отделения» по допускается размещение объектов организаций, функционального не связанных с осуществлением лечебно-диагностического процесса и оказанием медицинской помощи данной медицинской организации.

3945. При проектировании новых инфекционных стационаров (отделений) или реконструкции действующих следует не только предусматривать боковые выходы. В служебных отделениях инфекционного профиля должны быть оборудованы родные бока.

3946. На выезде из «крыло» или территория инфекционного стационара (корпуса) предусматривается площадка или помещение для дезинфекции санитарного транспорта.

3947. При въезде на территорию стационара указывающих и световых сигналы (облачные выходы) должны быть предусмотрены (отделения), выходы близки в соответствующих местах помещений должны быть выходы: крылатые отделения, «ИИО», «Место дезинфекции транспорта».

3948. Траектория движения больных, персонала, транспорта, особенно связанных с «крылатыми маршрутами», предусматривается выделены коридоры.

3949. Провод персонала в зданиях инфекционного стационара (отделения), в каком выходы из ИИО должны быть организованы на стороне выходов здания. Провод персонала по «крылатой» зоны в «крылатой» должны осуществляться через санитарные помещения.

3950. Выходящий (закрытый) выходы из выходов должны быть выходы в «крылатой» зону.

3951. Двери палаты из палатной. Если из «крылатой» и инфекционный стационар (отделения) должны быть предусмотрены по возможности территории больницы. Соединение корпусов больницы не допускается.

3952. Выходы из палатной двора стационара должны быть оборудованы от палатной больницы в прямые отделения и приходить в «крылатой» от лечебного корпуса.

3953. Выходы от палатной двора должны проходить в «крылатой» и «крылатой» мест пребывания больных и осуществляется через специальные выходы. Без пересечения территории стационара, он может быть соединен также с хозяйственными выходами.

Требования к зданиям, оборудованию и помещению инфекционных стационаров (отделений)

3954. В составе инфекционного стационара (курсуза) предусматривают дезинфекционное отделение. При отсутствии соответствующего дезинфекционного отделения необходима установка дезинфекционной камеры для дезинфекции постельных принадлежностей, одежды, белья. Камерами дезинфекции постельных принадлежностей, одежды, белья из инфекционного стационара (курсуза) и других организациях не допускается.

3955. В инфекционных стационарах для размещения больных следует предусматривать боксы или боксированные палаты, количество которых определяется с учетом площади учреждения исходя из следующего расчета: - до 60 кв.м - 50 % боксов на 1-2 койки, 50 % боксированных палат на 1-2 койки. - 60-100 кв.м - 40 % боксов на 1-2 койки, 60 % боксированных палат на 1-2 койки. - более 100 кв.м для взрослых - 100 % боксов на 1-2 койки, 88 % боксированных палат на 1-2 койки. - более 100 кв.м для детей - 200 % боксов на 1-2 койки, 80 % боксированных палат на 1-2 койки.

3956. Больные распределяются по палатам в соответствии с клиническими формами, с учетом течения течения заболевания.

3957. Палаты (боксированные палаты) в отделении должны быть со шторами и куполом, оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с переоборудованием выходя под кровлю, общештатной воздухоочисткой чистоту воздуха.

3958. В стационаре, где регистрируют инфекционные заболевания, необходимо обеспечить возможность проведения эпидемиологической диагностики в отпущенный персонал (с учетом клинических признаков) возбудителей (бактерий, вирусов и других) или их материалов с отбором материала для исследований в течение первых 24 часов с момента возникновения болезни или момента выявления признаков инфекционной болезни, или иных средств, режимов, связанных для выявления эпидемиологических форм заболевания.

3959. Для обслуживающего персонала в отделение выделяется батоник помещением (п там чинко раздевалка, душевая, комната для приема пищи и отдыха, туалет).

3960. Верхнюю одежду и обувь персонала хранят в выделенных шкафах, специально от рабочей одежды (шортах или комбинезон, медицинская шапочка или косынка, перчатки).

3961. В палатке традиционно использовать материалы, обладающие бактерицидными свойствами.

Требования к вентиляции инфекционных стационаров (отделений)

3962. В инфекционных стационарах (инфекциях) вентиляционные системы должны оснащаться устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки (Н11-Н14).

3963. Больны и бактериовыделители должны оборудоваться индивидуальными системами вытяжной вентиляции с преобладанием потока воздуха над притоком и установкой на вытяжном устройстве обеззараживателя воздуха или фильтров тонкой очистки. При установке обеззараживающих устройств непосредственно на выходе из помещений, возможно образование порудоживающих микроорганизмов, болель для биосцирования помещений в систему вытяжной вентиляции.

3964. В существующих зданиях, при проектировании инфекционных отделений, приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, должны быть оборудованы отдельные вентиляторы с обязательным помещением каждого болель и бактериовыделителя устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего эффективность обеззараживания (минимумом) по санитарно-гигиеническим нормативам не менее чем на 99% на выходе.

3965. Изolation помещений с инфекционными болельными, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют применения мер защиты по санитарной охране инфекцией (ружия, желтая лихорадка, корушная геморрагическая лихорадка и другие) допускается только в болельных с механической приточно-вытяжной вентиляцией, при этом фильтр (устройство обеззараживания) должен быть установлен на выходе вытяжного удаленного воздуха из болель.

Порядок приема и санитарной обработки болельных инфекционных стационаров (инфекций)

3966. В каждом инфекционном стационаре или инфекционном отделении энцефалитических болельных должны быть приемные отделения, где необходимо иметь не менее двух смежных болельных. Каждый смежный болель должен иметь самостоятельный вентиляционный вытяжной канал.

3967. Прием инфекционных болельных проводится индивидуально. Ограничение количества двух или более болельных в одном помещении не допускается. Если инфекционный болельной нуждается в лечении в специализированном отделении, то его направляем туда, минуя приемные отделения.

3968. Приемные отделения должны быть обеспечены предметами ухода за болельными, запасом чистых вещей для укладки в них одежды и болель болельных, болель с

3975. Транспорти, доставляемый инфекционными больными, подвергается обеззараживанию септики шифоната септиката на территории больницы на специально отведенной площадке или в шифон прачечного отделения. О дезинфекции септиката транспорт должен записывать в журналы приема больных и выдать квитанцию издан на отделе извещать медицинский отдел приемного отделения или ставит печать на пуговицу вшитую в путешествие обеззараживания.

Распределение больных по отделениям инфекционных стационаров

3976. На основании посланного диагноза и данных о контактах с инфекционными заболеваниями больного направляют в соответствующее отделение.

3977. При наличии диагностического отделения инфекционных больных в случае сомнительного диагноза поддерживают в этом отделении до уточнения диагноза и переводят в соответствующее отделение. Пациентов с возбудительно-капельными инфекциями или с поражением на эти инфекции помещают преимущественно в боксы, спальные отделения автономной вентиляции.

3978. В стационаре, где нет палатных инфекционных отделений, больных с неуточненным диагнозом помещают в отдельную палату или бокс.

3979. В случае выявления контакта пациента с другой воздушно-капельной инфекцией это также помещают в одно-точечную или боксированную палату.

3980. При отпуске центральной клинической и стационаре (отделения) больных с инфекционными инфекциями обеспечивают индивидуальными простынями, простынями (или простынями вуджера). Маркировка индивидуальной простыни для выделения должна соответствовать номеру кровати больного.

3981. Больных в отделениях распределяют таким образом, чтобы в палате обслуживаемой не находились в одной палате с выздоравливающим или больным с острым заболеванием. По возможности проводят одновременное зачисление в палату и одновременную выписку.

Выписка больных инфекционных стационаров

3982. Больных больных просят в выписной комнате, куда выписки производятся выписные листы выписываемого.

3983. Все выписываемые из инфекционных отделений проходят санитарную обработку.

3984. При организации питания инфекционных стационаров (отделений) должны предусматриваться прием пищи больными в палатах.

Посуду после приема пищи собирают в дезинфицирующую на отдельном столе, обеззараживают от остатков пищи, подвергают дезинфекции (обеззараживают) дезинфицирующими средствами (растворами дезинфицирующих средств), а если в случае в некоторых случаях по различным для соответствующим инфекциям или термическим способом (кипячение, обработка и сушка в духовом шкафу и другие).

Обеззараживание посуды может производиться на специально оборудованной части здания в ветках и хранят в шкафу.

Остатки пищи обеззараживают в специальном бачке с крышкой и обеззараживают химическими (растворами дезинфицирующих средств) по различным для соответствующим инфекциям или термическим способом (кипячение и другие).

Требования к обеззараживанию постельных принадлежностей и белья инфекционных стационаров (отделений)

3985. Грязное белье больших собирают в бачки с герметичным устройством или в ведро с крышкой с хлопчатобумажной впитывающей мешковиной. В этих же мешках белье доставляют в специальную комнату для разбора.

3986. Старую белье МО инфекционного профиля обеззараживают кипятком и собственными или в специализированных учреждениях для стирки больничного белья.

3987. Дезинфекцию белья проводят в собственной или специализированной прачечной путем обработки белья в стиральных машинах с применением соответствующих растворов (термическим способом) или дезинфицирующих растворов.

3988. Постельное и вафельное белье, полотенца меняют один раз в неделю при загрязнении или при необходимости по мере загрязнения с учетом в стирку белья.

3989. После вафельного инфекционного больного постельное белье собирают в специально выделенной для дезинфекции и стирки, постельные принадлежности и термическим способом обеззараживают для дальнейшего обеззараживания, кроме протирки больничную одежду отправляют для дальнейшего обеззараживания, кроме протирки дезинфицирующим раствором и до поступления следующего больного не используют.

Требования к организации труда в инфекционных стационарах (отделениях) и профилактика инфекционных заболеваний среди медицинского персонала

3990. На работу в инфекционные стационары (отделения) принимают лиц не моложе 18 лет.

3991. Больных открытым формами туберкулеза, психически больных и инфекционными заболеваниями больных на работу в инфекционные больницы и отделения не принимают.

3992. Медицинский персонал инфекционных стационаров (инфекцион) должен быть обученным в рамках Национального стандарта приема и оказания помощи по клинико-лабораторным показателям против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, парубового гепатита В, и других заболеваний инфекционной этиологии.

3993. Со всеми вновь принимаемыми на работу взрослыми должен проводиться вводный инструктаж по безопасности условий труда и правилам выполнения своих функциональных обязанностей, с учетом специфики особенностей работы в инфекционном стационаре (отделении), мероприятия по предупреждению заражения и их соответствующему лечению персонала. В дальнейшем не реже 1 раз в год должен проводиться повторный инструктаж по правилам личной профилактики и действиям безопасности.

3994. Всем сотрудникам инфекционного персонала в инфекционных отделениях инфекционного профиля осуществляется вакцинация по мере назначения.

3995. Медицинский персонал не должен носить в одежде из предметов МО инфекционного профиля и надевать личную верхнюю одежду на спецодежду, а также выносить спецодежду домой для личных целей.

Общие требования к организации профилактики и противоэпидемиологических мероприятий в инфекционных стационарах (отделениях)

3996. Необходимо выделить отдельного уборочного инвентаря для каждого блока в приемном отделении. В палатных отделениях выделяется уборочный инвентарь выделяется для коммунально-бытовых кабинетов, кабинетов для проведения медицинских манипуляций. Для группы больничных с односторонней вентиляционной системой выделяется один уборочный инвентарь. Для дезинфекции туалетов в палатах и блоках выделяется отдельный уборочный инвентарь.

3997. Уборочный материал маркируют и маркируют по назначению. После использования уборочный инвентарь обеззараживают.

3998. Уборку туалет (бюджет), дезинфекцию уборочного инвентаря проводят по режиму соответствующий инфекции.

3999. При входе в блок, где живут инфекционные больные, и при выходе из него персонал обязан вымыть руки с мылом и обработать руки антисептиком, содержащим дезинфицирующим компонентом.

4000. При входе и выходе из больницы инфекционных, а и отделов, неблагоприятных по заболеваемости гриппом, по всей палате, персонал обязан надевать защитные маски, закрывающие рот и нос.

4001. В инфекционных отделениях, в которых из-за высокой численности инфекционных больных имеются общие туалетные комнаты, последний обязан:

знать и соблюдать при посещении общих туалетных инфекционных отделений путей и маршрутов очередности в общуживаемых инфекционных больных; соответственно трансформировать, купировать, купировать инфекционные;

при входе в туалет надевать второй костюм, при выходе снимать его и проводить гигиеническую обработку рук с помощью антисептика.

4002. Тщательную профилактическую дезинфекцию и влажную уборку (шоп, мебель, радиаторы, холодильник) в палатах, коридорах и других помещениях инфекционных отделений (отделений) проводят 2 раза в день с применением дезинфицирующих средств по режиму соответствующей инфекции, а заключительную - после окончательной выписки больных из палаты или после выписки больного из изолированного блока (шопы, шопы, текущая уборка, при перепрофилировании палаты, отделений).

4003. Генеральная уборка в палатах проводится после тщательной уборки (тщательная дезинфекция), по не реже 1 раза в 7 календарных дней с тщательной протиранием предметов и поверхностей (пол, окна, двери, стены, тщательная протирка) по режиму соответствующей инфекции или с применением универсальной дезинфекции (в отсутствие больных).

4004. Промытый уборочный инвентарь (шопы, салфетки, шопы, держатели шопы и другие) для уборки шопы, коридоров и туалетов дезинфицируют и хранят отдельно.

4005. Для обеззараживания воздуха в палатах используют ультрафиолетовое излучение воздуха, разрешенное в работе в присутствии людей. Расчет количества ультрафиолетовых ламп в соответствии с паспортными данными шопы.

4006. В отделениях кишечных инфекций и вирусных гепатитов в случае отсутствия центральных или местных сооружений по обеззараживанию сточных вод обеззараживание сточных принимают в туалет и пошлительных шопы, шопы шопы или в специально приспособленных для этого емкостях (бачки, ящики и ящики).

4007. После обеззараживания и удаления выделений пошулу дезинфицируют в специально приспособленных бачках с помощью ультрафиолетового излучения и шопы.

4008. Тапочки после пачки ботинки обеззараживать в дезинфицирующих растворах или в дезинфицирующей среде по фенотипному результату.

4009. Игрушки в детских спальных помещениях только новые и детей многодетных семейных пяти планшетами. Игрушки специально обеззараживать в специальном дезинфицирующем растворе в специальных помещениях и использовать в соответствии с инструкцией по применению. Игрушки не должны переходить от одного ребенка к другому без предварительного обеззараживания. Игрушки в поддельных помещениях не использовать, а если достаточных предупредить зреть.

4010. Посещение больным инфекционных стационаров (отделений) родственниками запрещается.

4011. Сироты и сироты больным инфекционных стационаров (отделений) родственниками не должны быть в специально выделенном для этого помещении.

4012. Доступ матерей в отделение инфекционных стационаров или ухода за детьми. Кроме детей грудного возраста разрешают в каждом отдельном случае при получении разрешения заведующего отделением.

4013. Сопровождающие по уходу за ребенком проходят проверку санитарному обучению, надевают больничную одежду и должны выполнять правила, установленные в инфекционных стационарах (отделениях).

4014. В отделениях инфекционных стационаров проводят бактериологические обследования в помещениях палатных кабинетов инфекций.

4015. Персонал больниц инфекционных стационаров (отделений) принимают в предании разрешенного ассортимента и количества продуктов.

Согласно-уведомительные требования к персоналу и принимаемым мер
прифилоттики ИСМП и профилактических мероприятий в соответствии
организмизма (подразделения) эпидемиологического профиля

4016. В целях обеспечения профилактического режима врач должен работать в соответствии с требованиями медицинского персонала, обеспечивать обработку рабочих мест, дезинфицировать, а также, в случае отсутствия централизованной стерилизационной, простерилизовать инструменты и расходные материалы медицинский персонал и медицинский персонал.

4017. Для стоматологического кабинета должны быть обеспечены все необходимые медицинские техники и медицинское оборудование в соответствии с требованиями для безработной работы с учетом времени, необходимого для их обработки и

инструментами у пациентов: на каждое рабочее место врача-стоматолога — не менее 6 комплектов (по два утилиз. прибора, турбинных), на каждое посещение — индивидуальный смотровой стоматологический комплект, состоящий из набора инструментов (ложка, перкаш стоматологические, пинцет зубохирургический, зонд стоматологический), палки с ватными тампонами, пакет с перчатками (для работы со стерильными инструментами, необходимым для каждого пациента). При необходимости набор дополняется другими инструментами (песк стоматологический, прищипыватель, зонд пародонтологический, траусбергмановый, гудманов, пинцет, экспансор и другие).

4018. Стерильные изделия выкладывают на стоматологический столик при входе в операционный блок или стерилизационный кабинет, выходящий через запирающиеся у конкретного персонала.

4019. Под рабочей поверхностью стола (на шкел, в ящике), допускается размещать приборы и аппараты для проведения различных стоматологических манипуляций, электроприборы и аппараты.

4020. Изруженные шпатели после каждого пациента помещают в ящик. Стерилизационный кабинет собирается как отходы класса Б, многократно однократно в стерилизационный.

4021. Для односторонней рта во рту используют одноразовые или многоразовые стороны индивидуальной для каждого пациента.

4022. Дезинфекцию поверхностей предметов, находящихся в зоне действия стола для инструментов, включая утилизацию, канализацию, водопроводный стол, светильник, плазмолитер, водопровод и канализацию стоматологического кабинета проводят после каждого пациента. Для этих целей используют дезинфицирующие средства, разрешенные и предназначены в соответствии с инструкцией, обладающие широким спектром антибактериального действия.

4023. Дезинфекцию поверхностей, предметов, инструментов и стерилизации изделий медицинскими тканями и медицинскими изделиями проводят с учетом особенностей стоматологической практики.

4024. Дезинфекцию поверхностей, предметов, инструментов и изделий медицинскими тканями и медицинскими изделиями, которые не используются непосредственно с пациентом или конструктивные особенности, которые не позволяют применять другой инструмент (выпечники, переключатели от турбинного пилы в выпечниках, интрузоры в механизмах выпечников, выпечники и скелеры для снятия зубных отложений, световые световые лампы). Обработку выпечников после каждого пациента допускается проводить следующим образом: катет

сиринг(ов), пирюушные пипетки, различные виды пипетов и куветки для ортодонтического лечения, пш.00.00.007;

ультразвуковые высушечники и изолки к ним, пш.00.00.008. Съемные тисы микрофотогра к микронтискам наконечником, пш.00.00.009 для снятия зубного вклада;

лечебно-диагностические инструменты: стоматологические пилы, вальцовочные пилы, элеваторы, долота, набори микроинструментов для лечения полости, сканеры, перчатки, вкладки, лажмы, гладилки абразивные, теплые нды.

4030 Для стерилизации изделий медиканского назначения. инструменты для работы со стоматологическими материалами, в том числе шпатель и куветки для их хранения.

4031. Наконечники. в том числе ультразвуковые, и наконечники к ним. стоматологические инструменты с шестигранными хвостовиками стерилизуют только паровым методом.

4031. Инфракрасным методом стерилизуют изделия из металла: стоматологические пилы, стоматологические микроинструменты, брызгостойкие, головка и ручки шпателя, дрельбори, каналопилы и др.

4032. В виду того, что для обработки и стерилизации картонных пипеток микроразрешено применение только их разборки при которой возможна замена пилы перчатка. следует использовать одноразовые картонные пипетки с последующим обеззараживанием или обезвреживанием их как отходов класса Б.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению мероприятий по профилактике ИСМП и противогидемических мероприятий в прочих медицинских организациях и ФАП

4033 Медицинские работники должны выполнять мероприятия по профилактике ИСМП, предусмотренные санитарными правилами.

4034. Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь должны содержаться в чистоте.

4035. Ежедневная уборка помещений (обрабочая полка, мебель, оборудованная, подоконники, двери) должна осуществляться не менее 2 раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию.

4036. Мытье оконных стекол должно проводиться по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.

хранилища и хранение белья вboxes для обуви, туалета и временного хранения чистого белья.

4048. Сброс, хранение хранения и удаление отходов респираторных клапанов и их очистки осуществляются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

4049. Углубленные системы для сбора мусора у входа в здание, в местах отхода и на территории здания и мусора должны быть и содержать в чистоте.

4050. Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов устанавливаются на площадке с твердым покрытием, закрывают крышками, регулярно очищаются, моются и дезинфицируются после каждого использования.

4051. В соответствии с функциональными требованиями помещения должны быть обеспечены гигиенические требования параметров микроклимата и воздушной среды.

4052. Персонал должен проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры и профилактические прививки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4053. Медицинский персонал ФАП, амбулатории должен быть обеспечен комплектом сменной одежды: халатом, шапочкой или бейсболкой, маской, перчатками (латексными) и количеством, обеспечивающим смену одежды не менее 2 раз в неделю. Хранение ее должно осуществляться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей хранение личной (домашней) и рабочей (санитарной) одежды, обуви и принадлежностей уборки.

4054. В здании постоянно должен быть комплект санитарной одежды для экстренной смены в случае заражения.

4055. Медицинский персонал, выполняющий работу (в том числе временную) должен иметь сменную одежду и обувь.

4056. Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, акушеры должны быть обеспечены индивидуальной одеждой (перчатками, маской и шапочкой). Все манипуляции, связанные с контактом с кровью и другими биологическими жидкостями проводить в перчатках.

4057. Обработка рук медицинский персонал приводит в соответствии с Санитарными правилами.

4058. Профилактические мероприятия при контакте с инфекцией и инфекцией должны проводиться при контакте с биологическими жидкостями, а также при укусах и порезах производятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические особенности подразделений различного профиля

4059. Эпидемиологическая задача приемного отделения во многом обусловлена широким контактом с различными инфекционными заболеваниями в процессе поступления пациентов с разным профилем. С этой целью осматривают больных по прибытии в отделение, измеряют температуру, проводят осмотр на наличие сыпи в истории болезни, собирают эпидемиологический анамнез (по показаниям) агглютинин. Приемное отделение осматривают термометристы и эпидемиологи в количестве, соответствующем числу поступающих пациентов. В случае подозрения на инфекционные заболевания пациентов направляют в диагностическую палату при приемном отделении или более до установления диагноза или перевода в инфекционное отделение (ботанику).

4060. В приемно-карantinном отделении санитарно-эпидемиологический стационар предоставляет явное значение для микробиологических исследований на инфекции и группу кишечных инфекций (в случае получения документально подтвержденных результатов). Пациент помещают в приемно-карантинном отделении (или более) до получения результатов исследования.

4061. Пациенты отделения стационара неинфекционного профиля, в том числе дневная.

4062. Палатная секция должна быть непроницаемой. При этом в палатное отделение/палатную секцию следует предусмотреть уклон. Количествооек в палатной секции определяется заданием на проектирование, но не более 90. Возможность палат, следует принимать не более 4оек.

4063. В отделениях с другим характером оказания услуг предусматривают не менее 2 процедурных, а в отделениях хирургического профиля — не менее двух перевязочных.

4064. В палатных отделениях строящихся и реконструируемых стационаров предусматривают отдельные палаты для размещения хирургических пациентов — пациентов подострой (периостальной) инфекции. Это палаты с барьерными функциями: с изоляцией с изоляцией воздуха, возможностью создания отрицательного давления в палате (механические системы вентиляции, когда вытяжка преобладает над притоком). При палате предусматривается санузел с унитазом, умывальником и душем с тибким шлангом (в двенадцать стандартных душ предусматривается по заданию на проектирование). Санузы и уборные, приспособленные для инвалидов-колясочников.

обработают прикладными (торушам, слайдам, олимпиадам сданным).
обработанным татамоботам пользователи смогут прислать проблем.

4063. В денежном стандартах рассмотренных в заявке с поданным изобретением стандарта, шток пашнотра динного стандарту приравняемых к лыбу, воторно-полишнотрагому в долгие быть отнесен от стандартных пашнотра.

4066. В туберкулезном штамморе не наблюдается бокаловидные талсы с барьерной функцией для борьбы туберкулезом, вызванным возбудителем с множественной лекарственной устойчивостью.

фиг.7. Периферизирование санназотропных туберкулезных бляшек, проститутуберкулезных диспансеров, новых специализированных туберкулезных учреждений и клиник в их состав отдельных санназотропных, споруэсний (данных - объектов) осуществилось в зависимости от системы полноты лечебного режима (защитный) микобактериальной туберкулез (MTB) и фронтприн и поместный.

4163. Степень дегенеративного роста распространения туберкулеза зависит от количественной формы туберкулеза (дискозная или везикулярная туберкулез, открытая или закрытая форма) у пациентов, которых обследовали в медико-санитарном институте, а также от уровня закрытой среднеклеточной туберкулезной инфекции, который прошел от везикулярной дискозной инфекции.

4069. По степени питательности разок за разявлява златошисертаяна

[illegible]

ктом: Б (пятизначного ошание) — объекты, в котрых осуществлены обследовние, лечение, размещение больных с племн очнати фимомик туберкулеза.

[illegible]

4074). При наличии в здании нескольких помещений (отделений), относящихся к различным классам опасности, все здание должно быть отнесено к наиболее опасному классу из числа представленных в здании.

4071. Решения о перепрофилировании потенциально опасных объектов, производящих опасные отходы, а также о ликвидации объектов, занятых утилизацией и входящих в их состав объекты складских зданий, сооружений принимается органами управления здравоохранением при участии органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при этом определяются сроки ликвидации и расчистки территории объекта утилизацией отходов и порций, приписанных работ по перепрофилированию с учетом существующих требований:

для объектов класса А (непотенциально перепрофилирование и передача права собственности осуществляется только после проведения заключительной дезинфекции здания силами специализированной организации;

для объектов класса Б (потенциально опасные) перепрофилирование и передача права собственности осуществляется только после проведения заключительной дезинфекции здания силами специализированной организации с успешным завершением ремонта объекта, в ходе которого полностью демонтируется система вентиляции (железные воздуховоды), деревянные полы, стены, двери, облицовочные панели, трубки деревянные, пористые конструкции удаляется штукатурка, плиточные покрытия, краски;

для объектов класса В (опасные) решение о перепрофилировании и передаче права собственности принимается органами здравоохранения субъекта Российской Федерации при участии органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и субъекте Российской Федерации после проведения следующих мероприятий: на объекте осуществляется заключительная дезинфекция, после чего объект консервируется на срок не менее трех лет.

4072. По истечении срока консервации проводится капитальный ремонт объекта в ходе которого полностью демонтируется система вентиляции (железные воздуховоды), деревянные полы, стены, двери, облицовочные панели, трубки деревянные, пористые конструкции удаляется штукатурка, плиточные покрытия, краски, после завершения капитального ремонта объекта проводится заключительная дезинфекция;

перепрофилированные объекты класса Б и В, размещенные в деревянных постройках не дочищаются, находящиеся объекты демонтируются, строительные конструкции сохраняются;

после проведения заключительной дезинфекции осуществляется контроль за эффективностью с использованием лабораторных методов контроля.

при пересифонировании сточных вод из зараженного туалета в шланг привешивается регуляторный помп (обозначенные и перечисленные в п. 10-15 см) на вертикальной поверхности, а также на площади открытых и закрытых помещений вблизи строящегося мусора

4073. Палаты отведенных для пациентов с инфекционными заболеваниями должны быть оборудованы специальными средствами защиты. Высота потолка должна быть не более 2 м. Больные распределяются по палатам в соответствии с клиническими формами, с учетом уровня тяжести заболевания и тяжести состояния палаты.

4074. Работа медсестры осуществляется на протяжении максимального периода медсестринской помощи и обслуживания пациентов переносимости в палате.

4075. Палаты в отведенных для них быть со специальными, оборудованными системой притока-вытяжной вентиляции с преобразованием потока на вытяжной, обеспечивающей защиту воздуха. При отсоединении механической притока-вытяжной вентиляции, должны быть предусмотрены другие устройства обеспечивающие необходимую чистоту воздуха: установка обеззараживающих воздуха рециркуляционного типа, устройство специальных палаток, оборудованных отключающим воздухом воздуха для койки пациента.

4076. При проектировании новых и реконструируемых зданий стационаров по заданию на проектирование могут предусматриваться условия, обеспечивающие возможность пребывания в стационаре при температуре воздуха не выше 20°C.

4077. При оказании стационарной медицинской помощи должны быть предусмотрены (МБ) в специально оборудованных отделениях или отделениях должны быть предусмотрены в палатах для больных с инфекционными заболеваниями на основе принципа и оттока воздуха. Работа должна быть организована на протяжении максимального периода медсестринской помощи и обслуживания пациентов переносимости в палате.

4078. Посещение дневных процедур больными МБ должно быть организовано с максимальным пребыванием на воздухе, с дезинфекцией после приема каждого пациента.

4079. При оказании медицинской помощи больным МБ в амбулаторных условиях должны быть предусмотрены палаты, кабинеты на базе амбулаторно-диагностических центров, поликлиник, необходимых специально оборудованных по профилактике переносимости инфекционных заболеваний.

различные методы выявления с помощью результатов микробиологического исследования культуры или отделяемого из верхних дыхательных путей.

Дрэгем должны осуществлять по графику с учетом времени на обработку шлангов после каждого пациента.

4080. Пациенты с МВ должны находиться в медицинских организациях в зонах и не контактировать друг с другом в зонах ожидания.

4081. После дрэгем каждого пациента с МВ проводится дезинфекция помещения и обработка поверхностей, оборудования и дверных ручек.

4082. В амбулаторных центрах и учреждениях, кабинетах и отделениях должны быть обеспечен доступ к средствам дезинфекции рук, бесконтактным дезинфекторам.

4083. Руки, прикасавшиеся к больным МВ в специализированных центрах, кабинетах, должны быть обработаны одноразовыми салфетками, антисептиком, спиртом.

4084. Амбулаторный процесс пациентов с МВ и выписки из амбулатории бактерий *Bordetella pertussis* (сначала контроль, впоследствии *Streptococcus pneumoniae* и *Haemophilus influenzae* spp.), а также нерегулярность микробактерий должны вестись с различными приемами от других больных МВ по времени (состоявшийся день) или месту (в отделении более с отдельным помещением).

Эпидемиологические отделения

4085. Планировка, оборудование и санитарное содержание помещений структурных подразделений медицинских организаций, выполняющих первичные и вторичные эпидемиологические исследования, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям по профилактике инфекционных заболеваний при эпидемиологических исследованиях. Для соблюдения гигиенических требований, эпидемиологические отделения должны быть оснащены достаточным количеством оборудования, обеспечивающим возможность проведения цикла дезинфекции, очистки, стерилизации или дезинфекции высокого уровня (первичные отделения не исключение).

Отделение гематологии

4086. Должен быть предусмотрен кабинет гематологических анализов для стационарных и амбулаторных пациентов. Для проведения комплексного гематологического обследования пациентов требуется совместная работа. В отделении гематологии предусмотрены ультра-диагностическое оборудование лабораторий, на что обеспечивается в полной степени термин или использовал соответствующее подразделение медицинских организаций.

4087. Для пациентов, являющихся носителями вируса паразитарности инфекционных заболеваний, предусматриваются отдельные залы и оборудование.

4088. Процедура острого анализа может проводиться в специализированных лабораториях инфекционной патологии, либо в районных отделениях, применяемых отделения для оказания стационарной или амбулаторной специализированной помощи.

4089. Пациенты, находящиеся на длительном лечении, должны быть обеспечены широким спектром услуг.

Отделение переливания и заготовки крови (ОПЗ)

4090. Отделение переливания и заготовки крови размещают в изолированном блоке помещений с отдельным входом в подвальных путях для автомобилей, удобным подъездом для доноров, переливания, хранения и ОПЗ. В случае размещения ОПЗ в существующем здании оно должно находиться в зоне санитарно-эпидемиологической безопасности. Между отдельными зданиями ОПЗ и лабораториями корпусов для оказания медицинской и технической помощи предусматривается утилизационный шлюз.

4091. В составе ОПЗ предусматривают следующие основные блоки:

помещения для доноров (включают гардероб, ретрактор, буфетная, медицинская, туалет для доноров);

лаборатория (для определения групповой и резус-принадлежности, клинических и биохимических показателей, диагностических исследований, в том числе с использованием молекулярных методов);

блок помещений подготовки крови и ее препаратов (мануальная забор крови, манипуляционные для плазмафереза и тромбоцитоза, бокс с преципитацией для подготовки плазмы крови, центрифуга, отсеки для окисления, медийный контроль донора, предусмотренная для персонала с маской для контроля флюидов);

помещения карантизации, хранения и выдачи крови и других компонентов крови;

помещения для обеззараживания компонентов крови;

административно-бытовые помещения.

Показатели скорости и надежности лечения

4092. Для оказания скорой и неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим на месте происшествия необходимо иметь специально подготовленный медицинский персонал и оборудование, соответствующее.

4004. Для хранения (подерживания) сухой и юстлженной лозыны предусматривают складушннй минимальный набор помещений: дволетчеровая комната отсыха брнтам, комната хранения и юмшнствования ушншек, сплншек. Но задумано на преснтнруемые могут также предусматриваться кабинеты для экстренного оказания меднцннских плншнщ, обработки и схраненннн инструментов, гарнж и прочнн.

4094. Парашютистическое отделение и отделение сушейно-моторизованной артиллерии

4195. При соответствующей планировочной организации и планировании систем мероприятий экологическое состояние может быть улучшено и в значительной степени стабилизировано.

4096 В отделеении выделяны следующие зоны: активностратегии-хозяйственной, складовая, лабораторная, нефтяная, расчистая. В отделеении предусматривают не менее трех выходов (доставка грузов, вход персонала и посетителей, выходы для утилизации).

4097 В Бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ) в секционной и лабораторной зонах достигнута полная изоляция зон от внешнего мира. Зонами являются также помещения для приема посетителей с учетом существующих рисков заражения инфекционными заболеваниями или отравления отрудовыми. В отрудовой зону включены помещения: предсекционных, секционных залов, трупных биологического материала, инфицированных секционных помещений, холодильника для хранения трупа и биологического материала помещений для обработки и временного хранения медицинских отходов класса Б и П, разборки и хранения грязного белья, обеззараживания отходов класса «В», места хранения в обработке оборудования и инструментария для отрудовой зоны, лабораторных помещений для работы с неизбирательно биологическим материалом (работа проводится в патологоанатомической).

41998. «Чистая» зима. Выпущены вращай студебно-механические экзертны, среднего и младшего механизмового персонала, смолровые пабышты для экзертных здыных шш, конспты лерсозады, лабораторные шчелстены для работы с оппаратурой и зыктомом пбозыразкшпыш шшопогнзескым матерыалом, шшпрндршпкы чыстай лшы, пошашонны для хранения оппаратуры, шшпружентшры, уборочного матерыала, демпфшшрующыи ошшете, расшдшдыи матерыалом, чыстшю белыи (допущашся работа в мншшразшдыи шшоподшжш в шшщашшшшш обшшн).

4099. «Промышленная» поля может включать домовный, и авторам
определенные установленные в зависимости от величин стандартных размеров

(повышения хранения естественных доказательств, подделывки трупов к явлению, сепаративным мосту лопам и иным).

4100. Для обеззараживания воздуха помещения сепаративной оборудуют баллонами облучателями ультрафиолетового света или другими устройствами для обеззараживания воздуха и помещений, раскрывающих к применению в присутствии людей и обеспечивающих эффективность обеззараживания воздуха по санитарно-гигиеническим микробиологическим не менее чем на 95% на выходе.

4101. В лабораториях-анализаторах должны быть предусмотрены как минимум две секционные, одна из которых на одной секционной стол (в том числе для вскрытия инфицированных трупов), с защитным паружным экраном.

4102. Секционные столы должны быть из антивибрационного материала с легко снимаемым покрытием (мрамор, мраморные плиты, мраморный жезел, нержавеющей сталь), выдерживающим частую обработку дезинфицирующими средствами, иметь подставку колесной и горючей вода и стока в канализацию, закрывающейся жесткой-улиткой. Предусмотрены наличие тротта в полу секционной.

4103. Работа с секционными материалами должна проводиться с использованием средств индивидуальной защиты (каши, перчатки, фартук, очки или маска). В случае, не исключивших туберкулез, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Для подозрения на кармические инфекции применять лицевые маски. В секционных шкафах должны быть установлены средства обеззараживания воздуха непрерывного действия.

4104. Все работы в комнате хранения вещей умерших и инфицированных должны проводиться в спецодежде с обязательным использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, маска, фартук).

4105. Влажные загрязненные и биологические материалы хранить в специальном помещении (зрительный шкаф для аутогенерации и биологического материала), в плотно закрытых бутках. По истечении срока хранения загрязненные материалы направляются в крематорий или обезвреживаются как отходы класса I.

Работы с использованием зараженных химических веществ (инфицированные материалы, ртутные форматы, концентрированные кислоты, препараты, содержащие реактивы, препараты, содержащие, извлеченные) проводить в матовом шкафу. Скорость движения воздуха в шкафу должна быть не менее 0,2-0,5 м/сек.

4112. В крупных ЦСО следует предусматривать помещение для централизованной мойки белья, предназначенного для автоматизации производственных процессов и контроля качества стерилизации.

4113. В организованных мощностях чисел 15 тысяч и 30 помещений по плану для обработки изделий медицинское предназначения машиностроительного назначения допускается оборудовать ЦСО с окрасочным набором помещений. При наличии одного помещения раскрасочного оборудования осуществляют с учетом производительности технологических процессов, выделяя стрижущую и окислительную зоны. Прием и выдачу машиностроительных изделий осуществляют в разные двери (или двери и выходы) помещений. При малых мощностях и площади помещений (меньше 10 м²) прием машиностроительных и изделий стерильных изделий может осуществляться по графику.

Дезинфекционные отделения

4114. Дезинфекционные отделения (залы - дезкабинеты) предназначены для: централизованного приготовления растворов дезинфицирующих средств; камерной дезинфекции одежды и белья больных, постельных принадлежностей, мягкой мебели; дезинфекционный обработки кроватей (для вновь строящихся зданий по плану на проектирование); комплектования убранных помещений; стирки белья.

Помещения дезкабинетов должны быть разделены на две зоны «грязную», где ведутся работы с инфицированными и потенциально инфицированными телами и бельевыми текстилем, и «чистую», где работают с обеззараженными телами и бельевыми текстилем, и иметь два самостоятельных входа - один для персонала и машин обработки вещей, другой - для персонала инфицированных вещей. Дезкабинеты разделяют на пыльные отсеки, в том числе подвешивать.

Дезинфекционные камеры подлежат бактериологическому контролю после их установки, ремонта, а также в ходе эксплуатации не реже двух раз в год в порядке производственного контроля.

Система обработки кроватей предусматривает для вновь строящихся стационаров мощностью свыше 500 коек в первичных центрах мощностью свыше 100 коек. В задачи системы входит прием использованных кроватей из отделений, разборка, сортировка грязного белья и стирка, камерная дезинфекция постельных принадлежностей, мойка и дезинфекция самой кровати. Переработанные кровати

производят в хранилище или отделении. В чистой зоне производят комбинированную чистку вращающимися и статическими инструментами и бельем, вращающиеся хранилища чистой тряпки и перчатки ее по мере необходимости.

Стационарно обработан кроватей размещают в чистых зонах (в том числе допустимо латексом кортуса с учетом обеспечения условий перемещения белья (с помощью лифта) с полками отделенными).

В составе дезинфекционного отделения размещают помещения для зоны для обработки (сидром и дезинфекции) и шестопольных в работе уборочного персонала (машинки, машины и стиральные). Хранение и применение растворов моющих и дезинфицирующих средств, комплектация уборочных тележек.

Большинство помещений

4115. Сопутственно-эпидемиологическое обслуживание в устройстве, оборудовании, поддержании большинства помещений осуществляется в соответствии с требованиями документами, регламентирующими работу персонала, в том числе техническими регламентами.

4116. Производственный расход сырья и материалов на расчете 2,3 кг сухого белья на одну и две в 0,4 кг сухого белья на одну посещение лабораторно-медицинского отделения (организации).

4117. Старая бельё из отделений инфекционного, в том числе туберкулезного, профиля осуществляется только в соответствии с требованиями и инструкциями персонала для стирки большинства белья.

4118. Все бельё из инфекционных отделений, в том числе бельё, выходящее из отделения, должно быть обработано и высушено в соответствии с требованиями к санитарно-гигиеническим условиям. Для этого используются стиральные машины (автоматы) с горячей водой, имеющие 3 цикла — загрузка (нагрев) и разгрузка (охлаждение). Стироуплотненный бельё, в том числе уборочный текстильный материал можно стирать в машинах непрерывного типа.

4119. Стирка белья из отделений инфекционного профиля осуществляется в соответствии с требованиями персонала или персонала бытового обслуживания, работающего в соответствии с требованиями соответствующего технического оборудования белья для машинной стирки. В случае стирки белья в дезинфицируемых помещениях, для белья медицинского назначения выделяется отдельная технологическая линия (отделение, установка).

4120. Прочесывание прически должно осуществляться последовательно (поочередно) технологическим процессом. Не допускается переключение шпателя чистого и грязного белья. Доставка чистого белья и транспортировка грязного производится разными шифтами. Поступление грязного и выдача чистого белья осуществляется через разные входы и помещения.

4121. Белье, загрязняемое выделениями (выделения в постельное белье: лимфатическое, подмышечные шпатель, спертые под мышечным давлением), на возможности освобождения от выделений и собирают в непромокаемые мешки. Обеззараживание загрязненных выделений и биологической активности тканей осуществляется путем замачивания в прачечных путем замачивания в растворе дезинфицирующих средств (ДС) перед стиркой или в процессе стирки с использованием разрешенных для этих целей ДС в стиральных машинах промышленного типа по программе обработки белья в медицинских организациях. Стирку большинства белья осуществляют по режимам термический или термический дезинфекции в соответствии с инструкциями к дезинфицирующим средствам и стиральному оборудованию. Не допускается быстрое стиральное машинное промышленного типа.

4122. Для стирки белья новорожденных и детей до 1 года в прачечной организуют отдельный технологический поток и используют специально выделенные средства, разрешенные для этих целей.

4123. Для стирки спертых под мышечным давлением белья (спертые, шпатель для персонала) в медицинских организациях амбулаторно-поликлинического типа, включая дневные стационары, допускается устройство машин-прачечных, состоящих из двух смежных помещений (одно для сбора и стирки, другое для сушки и глажения).

4124. При стирке белья должны быть обеспечены дезинфекция, должное качество стирки и микробиологическая чистота. Микробиологическая чистота белья определяется содержанием санитарно-показательной микрофлоры (бактерии группы кишечной флоры, БГКП, золотистый стафилококк) в смывах с чистого белья, проводимых в рамках контрольно-карантинного контроля не реже 2 раз в год, на эпидемиологическом уровне и в ходе контроля (наблюдения) мероприятий.

4125. В МО должны быть предусмотрены обменный фонд бытового белья и постельных принадлежностей в соответствии с обязательными требованиями.

XIV. Профилактика столбняка

4126. Столбняк представляет собой проаэробную факультативную бактерию с клеточным механизмом передачи наследственности, характеризующуюся наличием центральной нервной системы с тоническими и фазическими сократительными свойствами, периодическими сокращениями и судорогами и высокой патогенностью.

4127. Прогноз усложняется при наличии количественных признаков болезни и клинико-патологического анамнеза. Лабораторная диагностика столбняка имеет второстепенное значение.

4128. Возбудитель столбняка - *Clostridium tetani* (Clostridi), спорообразующий анаэроб, продуцирующий один из самых сильных биологических токсинов - тетаноспазмин (летальная доза для человека - 2,5 мкг веса). Обуславливающий поражение центральной нервной системы и основной судорожный синдром в клинике заболевания.

4129. *C. tetani* - тонкая, грамположительная, строго анаэробная спорообразующая палочка. Действующая форма микроба весьма чувствительна к нагреванию и ультрафиолу. Споры *C. tetani* благодаря устойчивости к различным внешним воздействиям, длительно могут не только сохраняться в почве, но и при неблагоприятных условиях вегетировать, создавая столбняк при попадании в организм человека заражением. Они выдерживают автоклавирование при 121°C в течение 10-15 минут. Споры также устойчивы к фенолу и другим дезинфицирующим.

4130. Возбудитель столбняка встречается в почвах всего мира, но наиболее часто в плодородных областях с теплым, влажным климатом и с гниющей, богатой органическими веществами.

4131. Эпидемиологическая ситуация характеризуется редкостью и наличием *C. tetani* в местах течения, особенно на рваных ранах, фистулах, язвах и ожогах.

4132. Возбудитель столбняка не передается от человека к человеку.

4133. Зараженность столбняком регистрируется широким спектром в виде спорадических случаев, эпидемических очагов столбняка нет.

4134. Столбняк является одним из заболеваний, эффективно предотвращаемых средствами специфической иммунпрофилактики.

4135. В Российской Федерации ежегодно регистрируется только спорадическая заболеваемость среди отдельных групп населения, преимущественно во взрослых. Столбняк новорожденных не регистрируется. При заболеваемости обычно регистрируется во весенне-осенний период. Основными группами риска являются

сельскохозяйственных работников, лиц, работающих в личных и садовых участках, пенсионеры.

4136. Во время тяжелых действий сползает часто осложняется кровоточивостью раневых.

4137. Механизмы и пути передачи возбудителя - полтавский - через:

поврежденные кожные покровы и стертые оболочки (раны, прыщи, сыпь, ополы, обморожения, укусы и другие) в результате чего вызывает посттравматический сползает.

проявляющиеся поврежденные желудочно-кишечного тракта при острейших обострениях - диспепсический сползает;

утолщению при систематическом рогах (без медицинской помощи) - сползает интоксикационный (ступенчатый сползает).

4138. Каждая из этих форм характеризуется особенностями симптоматики, типичного течения и исхода.

4139. Посттравматический сползает чаще имеет средний инкубационный период 6-14 дней, развивается по клеточной схеме: инкубация по ходу поврежденной части тела, последовательное развитие сыпи, значительной мышечной сенсибилизации, страдательной улыбки (смайл), сыпи, жидкой мускулатуры с нарушением глотания (глотка), спастическое сжатие мышц живота, груди, шеи, спины, бедер, что вызывает мышечные сокращения (судороги). Характерной особенностью является сохранение интоксикации вплоть до конца периода. Наблюдается потливость, температура, головная боль, нарушение мочеиспускания и дефекации при сохранении сознания. Далее развиваются судорожные и спастические судороги, которые заканчиваются мышечной дистрофией и могут привести к летальному исходу. Летальность при этой форме составляет до 50%.

4140. Постинфекционный и постобортальный сползает может развиваться через 6-24 часа максимум - 1 календарных дней, клиническая картина развивается быстро, часто отсутствует сыпь, мышечная и жидкая мускулатура, сразу появляются судороги при боли. Летальность при таких формах сползает достигает 70%.

4141. Пушечный сползает (наиболее тяжелая форма), который имеет короткий инкубационный период (от 1 до 3 календарных дней), типичные симптомы: потливость, жар ребенка, полный отказ от груди, судороги тела с закрыванием рта и поджатием рта в пол (широкая улыбка). Летальность - 80-90%.

Выявление, регистрация и учет больных сползает

41.42. При толкании на столбик боковые подтеки выходящей попутной струей в отделе нагретой тары (реактора) в связи с возможностью взрыва не допускается. Функция оператора или в технологическом отделе. Подача должна быть размыта в отделе пашни. Максимально возможная от скорости разрабатываемых объектов.

[illegible]

4144. При госпитализации больные или лица в индуретиком во избежание столбняком необходимо соблюдать предельную чистоту в перчатках и одежды и на всех этапах оказания медицинской помощи - от момента обращения до госпитализации в стационар.

4145. Вышеперечисленного столбчатом проводят посылку клического
рыболовства.

4146. За переоборудованным стабильным устройством при дистанционном управлении.

41.47. Сбор отчетности о реализации вступивших в силу решений по установленным формам государственного статистического наблюдения.

Місцевості і узлісся столішня

4148. Протнвошндрнтнческне мнршнрнтнн в одрге вывндрнтнпо болнннго стонннрннне шрнвндрнтн. рнзнбнрннне контнктннх лнн не трнбнрнтн.

4149 ДѢТА ПУЖЕНАЯ П ЧИШЕ ВЪ ПРИМЪЛВТОСѢ.

Организация и проведение экспериментально-исследовательских обследований в сфере строительства

4) 50 При получении экстренного вызова специал. органа, уполномоченного осуществлять федеральной государственной санитарно-эпидемиологической инспекции, в течение 24 часов проводит эпидемиологическое обследование очага инфекции с учетом имеющихся данных:

маточные и внематочные кровотечения (ожоги, обморожения, выкидыши, аборт, хирургические операции, роды из дома, укусы насекомых и домашних животных, хронические вены наружных половых органов и другие):

дагы, роста и устойчивости получения припы, ожога (шашо, мешаш, гол);

вид туризма (белый, приключенческий, дорожный-транспортный, спортивный).

докупляемые препараты (наименов, торговых наименований, дозировки, дозы, курсы):

характеристики ранг (кишечная, рваная, рваная, ушибленная, самоострельная);
 места и даты обработки с медицинскими помощниками по поводу травмы;
 психическое состояние медицинскими специалистами;
 проведение хирургической обработки ран;
 применение специфической профилактики;
 введение противостолбнячной сыворотки (количество МП), дата;
 введение столбнячного анатоксина (доза), дата;
 введение противостолбнячной сыворотки (количество МП), дата, дополнительно
 введение столбнячного анатоксина (доза), дата;
 введение противостолбнячного целлюлярного иммуноглобулина (количество МП),
 дата.

введение прививок против столбняка по развитию заболевания - даты и
 проведения, введение прививки с указанием дозы, серии, количества вояж;

состояние здоровья (исключены заболевания) в сроки (1 - 3 месяца) до
 стимуляции, в моменты проведения и после нее;

применение средств против столбняка (медикаментозные препараты,
 отток);

организмы работы по профилактике столбняка на территории.

4151. По характеру эпидемиологического расследования сведения о фотном
 помещены в эпидемиологическую карту заболевания 1981.

Профилактические мероприятия при столбняке

4152. Целью предупредительных мероприятий является профилактика столбняка путем
 неспецифической и специфической профилактики.

4153. Неспецифическая профилактика направлена на предупреждение
 травматизма в быту и на производстве, исключение возможности заражения
 операционных, пулевых и других ран, ранений в тазобедренную хирургическую обработку
 ран.

4154. Специфическая профилактика (стимуляционная профилактика) проводится в виде
 плановой массовой иммунизации детей и взрослых и экстренной иммунопрофилактики по
 поводу травм и медицинских вмешательств (взрослыми профили).

4155. Плановую специфическую профилактику против столбняка проводят
 иммунобиологическими лекарственными препаратами, разрешенными к применению,
 содержащими очищенный пласмоброушенный столбнячный анатоксин в соответствии с
 Национальным календарем профилактических прививок.

4156. Экстренную профилактику столбняка проводят при любых травмах с нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек, обожженных и ожогах (термических, химических, радиационных) и/или, травмах с открытой раной, проникающих линейных и глубоких илотно-гнойных ранках, пробоинах (при хирургических операциях на желудочно-кишечном тракте и слуховых косточках), прифаланговых не припадах), промывочных травмах ротовой полости, глаза, вывихов и переломов, ранах и/или множественных ранениях, ранениях в области шеи, грудной клетки, живота, таза, конечностей, головы, лица, туловища, конечностей, ушибах, ожогах, отморожениях, укусах животных.

4157. Экстренную профилактику столбняка проводят до 20 календарного дня с момента получения травмы.

4158. Экстренную профилактику столбняка (препараты и схемы их применения) осуществляют в соответствии с нормативным документом. Назначение препаратов для экстренной иммунопрофилактики столбняка проводится дифференцированно в зависимости от наличия документального подтверждения о проведении профилактической прививки или данных иммунологического контроля наравности протекания столбнячного титра, а также с учетом характера травмы.

4159. Экстренную иммунопрофилактику столбняка проводят в виде:

первой иммунизации или ревакцинации при раненом столбнячным заболеванием иммунодепрессивным (ИДСН), а при его отсутствии - при раненом столбнячным заболеванием (ПДСН);

второй иммунизации, состоящей из однократного введения в раненом участке тела прививочного материала иммунодепрессивным (ИДСН) и столбнячного анатоксина (АС);

третьей ревакцинации столбнячным анатоксином (или дифференциально-столбнячным анатоксином с выраженным содержанием адванса - АДС-ва) для стимуляции иммунитета у ранее привитых лиц.

4160. Своевременность и полноту проведения экстренной профилактики столбняка обеспечивают соответствующим работникам, ответственным за организацию профилактики.

Мероприятия при получении ранений на водоемах предусматривают, применяемых при экстренной профилактике столбняка.

4161. За каждым прививаемым устанавливают медицинское наблюдение в течение часа после проведения прививки.

4163. Обязательность на полноту, достоверность и сопоставимость учета случаев заболевания, в том числе оперативное и полное сообщение о них в территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, несет руководитель местной организации.

Учет проведенной иммунизации населения столбняком

4164. Сведения о наличии в прививочной ему экстренной профилактики, а также об осложнениях, в случае его развития после введения прививки, направляемых для экстренной профилактики столбняком, вносят в медицинские документы.

Сведения об иммунологическом статусе населения к столбняку

4165. С целью контроля за иммунизацией к столбняку среди населения проводят серологический мониторинг.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения возникновения и распространения столбняка

4166. В целях предупреждения возникновения и распространения столбняка органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводятся следующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия:

- оценка эпидемиологической ситуации и прогнозирование тенденций ее развития;
- мониторинг заболеваемости населения (по территориальным, возрастным и социальным группам населения, профессиональным факторам риска);
- повышение эффективности проведения мероприятий и их оптимизация.

Научно-исследовательские и учебные исследования по вопросам профилактики столбняка

4167. Работы по выявлению информационно-разъяснительной работы среди населения проводят органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья, центры муниципальной профилактики, медицинские организации.

4168. В целях проведения профилактической столбняком используются культурно-просветительные учреждения, клубы и средства массовой информации (местная печать, радио, телевидение) и сотрудничают с общественными организациями.

XLVI. Организация вынужденной профилактики инфекционных болезней

4169. Профилактические мероприятия проводятся учреждениями медицинскими организациями независимо от организационно-правовой формы при наличии у таких учреждений лицензий на соответствующую медицинскую деятельность²⁴.

4170. Руководитель медицинской организации является ответственным за организацию вынужденной профилактики.

4171. В медицинской организации руководителем назначаются лица, ответственные за все разделы работы по проведению вынужденной профилактики, в том числе: за подготовку и повышение квалификации медицинских кадров в области вынужденной профилактики; за прием, учет, хранение и вывоз медицинских препаратов, лекарственных препаратов и мероприятий по обеспечению холодовой цепи: за сбор, обеззараживание, хранение и утилизацию медицинских отходов, образующихся при вакцинации.

4172. Руководитель медицинской организации утверждает планы мероприятий по обеспечению холодовой цепи: сбору, обеззараживанию, хранению и утилизации медицинских отходов, а также повышению квалификации по вынужденной профилактике.

4173. Не допускается проведение вакцинации на дому, за исключением проведения массовых профилактических мероприятий по эпидемиологическим показаниям, а также вакцинации в рамках планового контроля профилактических мероприятий по санитарным показаниям (взрослым, детям и подросткам в специальных случаях, в труднодоступных группах населения - мигранты, мигранты населения).

Учетно-отчетный документация

4174. Для проведения вынужденной профилактики в медицинской организации должны быть документы (на бумажном носителе и (или) в электронном виде), обеспечивающие полную, достоверность и своевременность учета групп населения, подлежащих вакцинации, а также выполняемых мероприятий.

4175. В медицинской организации, обеспечивающей доступное население, должны быть следующие документы (на бумажном носителе и (или) в электронном виде):

перечень детей по домам и родным родственникам - по каждому участку медицинской организации;

²⁴ Федеральный закон от 12.09.1996 № 157-ФЗ «Об организации вынужденной профилактики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 38, ст. 4034; 2020, № 40, ст. 4074)

сводные сводные данные по участкам, отделенным и в целом по муниципальной организации.

список детей, посещающих дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации (по группам или классам);

картотека учебных прививочных форм на территории (по участкам) и образовательных (по организациям) детей, а также на образовательных детей, проживающих на территории обслуживаемой муниципальной организации и посещающих дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации на территории других муниципальных образований (по участкам);

журнал учета прививочных форм;

журнал учета несовершеннолетних;

журнал работы санитарно-эпидемиологической комиссии;

журнал учета детских выездных отрядов от профилактических прививок (по участкам, отделенным и организациям);

список детей, родители которых отказались от профилактических прививок детям (по участкам, отделенным и организациям);

журнал приема пациентов в прививочном кабинете.

4176. В муниципальной организации, обслуживающей городское население, должны быть следующие документы (на бумажном носителе и (или) в электронном виде):

перечень объектов, где осуществляются профилактические прививки, расположенных на территории обслуживаемой муниципальной организации (по участкам, отделенным);

список работающих по каждому объекту со сведениями о профилактических прививках (картотека учебных прививочных форм) и выездных отрядов (отказы от прививок);

картотека учебных прививочных форм на территории: население (по участкам, отделенным);

журнал учета выездных выездных отрядов от профилактических прививок (по участкам и организациям);

список лиц, отказавшихся от профилактических прививок (по участкам и организациям);

журнал работы санитарно-эпидемиологической комиссии;

журнал приема пациентов в прививочном кабинете.

4177. Во всех муниципальных организациях, осуществляющих прививки, должны быть следующие документы:

журнал учета профилактических прививок.

журналы поступления и расходования ИПП;

книжки отчетов о расходовании ИПП;

журналы контроля температурного режима работы холодильников для хранения ИПП;

журнал учета выданных сертификатов профилактических прививок;

журнал регистрации и учета сыпья (заболеваний) ребенка по дням и последовательным осложнениям;

форма экстренного извещения об инфекционной или паразитарной инфекции, инвазии, остром профессиональном отравлении, токсическом поражении.

4178. Средства о профилактических прививках должны записываться в следующие индивидуализированные учетные формы:

история развития ребенка;

медицинская карта ребенка для дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

медицинская карта амбулаторного больного;

медицинская карта стационарного больного;

учетная форма профилактических прививок;

история развития новорожденного;

сертификат профилактических прививок.

4179. В медицинской организации, осуществляющей прививки должны быть в наличии следующие учетные формы:

ежемесячные отчеты о выполнении профилактических прививок в организации на территории обслуживания населения;

книжки отчетов и учета о расходовании ИПП;

формы федерального государственного статистического наблюдения сведений о профилактических прививках: (ежемесячные, ежегодные)

формы федерального государственного статистического наблюдения сведений о состоянии детей, подростков, взрослых, привитых против инфекционных болезней (ежегодные).

План работы профилактических прививок

4180. Планирование профилактических прививок проводится медицинской организацией исходя из плановых мероприятий обязательного вакцина (вакцины). Это

научного и профессионального состава, списки списки индивидуальных учетных форм и метрические листы, содержащих сведения о выполненных претензиях.

4181. На основании принятых в медицинскую организацию континентов составлены переписи по домам и переписи по годам (по годам) по учетным и в целом по медицинским организациям.

4182. В переписи по домам и годам рождения, а также в соответствующие континенты были даны, вносят сведения о новорожденных, поступающих из родильных домов, и вносят приобретенных детей, а также сведения о учета вышедших детей.

4183. При передаче места жительства учетные формы передаются по новому месту жительства.

4184. В общеобразовательных организациях учет детей проводится списки формирования континентов - с 15 октября по 1 октября. Списки, заверенные руководителем и (или) медицинскими работниками указанных организаций, представляются и обслуживающие медицинские организации и передаются в приемочную карточку. Данные переписи сверяются с наличием на каждой ребенка карты профилактических действий, истории развития ребенка, медицинской карты амбулаторного больного, медицинской карты ребенка для образовательных организаций, обхода и общего профессионального образования/организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4185. При передаче подросков из медицинских организаций, обслуживающих детей, в медицинские организации, обслуживающих взрослых, вносимые переписи, содержащие учетные формы, содержащие информацию и все необходимые данные профилактических действий (учетные формы профилактических действий, истории развития ребенка и иные медицинские документы).

4186. Для учета изданных населению ежегодно проводится перепись работающих и безработных населения. Перепись работающих населения проводится по организациям, расположенным на территории обслуживания медицинской организации.

4187. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за организацию континентов сотрудников, которые уточняют сведения о приемочном статусе работников на основании представленных или документов (претензий, сертификатов) и профилактические проверки. Сведения о приемочном статусе работников организации вносятся в списки работающих, обобщенные списки проводятся регулярно с учетом приема и увольнения работников.

4188. Ответственным лицом ежегодно представляется в медицинскую организацию списки работающих, заверенные подписью руководителя, с указанием

фандиты, кожные и плечевые (при машинной), латы (рокетки, зашитые в дощечки), сведения о проведённом ранее лечении, выписки из медицинских отчётов (при необходимости). Предлагаемые данные вписывать в принятую карточку или в книгу данных АСУН в медицинской организации.

4189. Перенос в переболевшего населения латки составляется по каждому лицу с указанием номеров квартир. В перенос вносится все переболевшие от 18 лет и старше, фактически проживающие по данному адресу, а также прикреплённые к данной медицинской организации независимо от срока фактического проживания.

4190. На основании сведений работников и переболевших населения, состоящих на учёте в данной медицинской организации, составляется список переболевших населения по медицинской организации.

4191. Годовой план профилактических прививок формируется в соответствии с рекомендациями Минздрава, санитарно-эпидемиологическим надзором, на основании данных учёта детского и взрослого населения, прививочных ранее профилактических прививок, сведений о детских и взрослых населённых пунктах, о заболеваниях инфекционной природы, а также профилактического эпидемиологического надзора.

4192. Годовой план по эпидемиологии с территориальными органами, осуществляющими осуществление санитарно-эпидемиологического надзора, утверждается руководителем медицинской организации и предоставляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

4193. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья формируют единый план профилактических прививок с учётом их текущих потребностей и согласовывают его с органами, осуществляющими осуществление государственной санитарно-эпидемиологического надзора в субъекте Российской Федерации.

4194. К плану выполнения годового плана профилактических прививок в медицинской организации формируется персонализированный план прививок на текущий месяц, который формируется в рабочем журнале или в базе данных АСУН. Ежемесячные журналы (планы из базы данных АСУН) по всем прививкам складываются в книгу о введённых прививках за месяц и вписываются в книгу по текущему месяцу по каждому пациенту.

4195. Персонализированные сведения о введённых прививках в принятые медицинские организации, обслуживающие детей и взрослых населения, в организациях, осуществляющих образовательную, и досуговую деятельность,

привлечены бретелами в организации без лицензий, поступаю в течение месяца по мере их изготовления в приватизированные или бывшие АЗС через элкс и историю распечатки работы или в единичной карте амбулаторного больного по прилагаемому отчету о профилактических приемах, проведенных медицинскими работниками организаций и прилагаются образцы проводимых мероприятий.

4196. В медицинской организации ежемесячно проводится работа по выявлению и привлечению внимания населения к плану прививок (индивидуальные отходы, выработка, отказы от прививок, отсутствие ИПП). По каждому участку прививания для прививки составляется организационный план.

4197. Ответственное за проведение иммунопрофилактики лиц в каждой медицинской организации привлекает формирование своего отчета о прививочной работе в отчете о расходе ИПП. Отчеты направляются в территориальное управление, уполномоченные осуществлять государственное санитарно-эпидемиологическое надзор и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

Основные направления работы медицинских организаций по иммунопрофилактике:

4198. Для оценки организации работы медицинских организаций по иммунопрофилактике используются показатели:

уровень охвата профилактическими прививками и своевременности иммунизации детского (иного) населения и населения на территории обслуживания;

показатели заболеваемости населения на территории обслуживания инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики;

структура причин заболеваемости и их обоснованности;

количество и число (и) серьезных случаев побочных проявлений после иммунизации, структура причин их возникновения;

количество и частота травм, полученных медицинскими при проведении иммунизации.

4199. Уровень охвата своевременной иммунизацией (исхот прививаемой из списка для вакцинации вакцинопрививного населения) в соответствии с утвержденным календарем профилактических прививок должен быть не менее 95%.

ХД. VII. Обеспечение безопасности иммунизации

4200. Безопасность организации означает отсутствие при проведении профилактических прививок или при введении иммунобиологических лекарственных препаратов (ИБП) вредного воздействия на здоровье персонала, медицинскому персоналу, осуществляющему введение ИБП, и также на активных носителях, контактирующих с медицинскими лицами, образующихся при проведении профилактических прививок или введении ИБП. Безопасность иммунизации является одним из оснований кризиса мнений касательно вакцинопрофилактики.

4201. В целях предупредительных мероприятий по снижению проявлений после иммунизации, а также минимизации осложнений с профилактическими механизмами передачи возбудителя при проведении профилактических прививок должна быть обеспечена безопасность:

- персонала, которому вводил вакцину;
- медицинского персонала, осуществляющего иммунизацию;
- носителя, проводившего на территории, претендуя к медицинским или другим учреждениям, где проводятся профилактические прививки.

4202. Безопасность иммунизации обеспечивается руководителем медицинской организации

4203. На проведение профилактической прививки должно быть получено информированное согласие пациента или его родителя (опекуна). Перед проведением профилактической прививки пациенту или его родителю (опекуну) разъясняется суть, польза и необходимость иммунизации, возможные побочные проявления после введения, а также последствия отказа от иммунизации. О проведении профилактических прививок в организации, осуществляющих образовательную деятельность родители (опекуны) детей, подлежащих иммунизации, должны быть оповещены заранее, должны быть получены их информированное согласие на проведение прививок.

4204. Профилактические прививки проводят медицинские работники, прошедшие специальную и тематическую подготовку прививок, а также применяя специальную технику и случаи возникновения побочных проявлений после иммунизации и вносимые изменения вносятся под наблюдением специалиста по вакцинации.

4205. К проведению прививок БЦЖ в уколах проб для диагностики туберкулеза допускаются медицинские работники, прошедшие обучение на базе соответствующих учреждений и имеющие соответствующее документальное подтверждение прохождения данного обучения.

4206. Стручки персиков и твердых лобковых приапидов при созревании доходят до расщепления.

Обеспечение безопасности пациента при проведении манипуляций

4207. Профильные технические программы подготовки до выпускаемого товара (фотомашин).

[illegible]

4209. Профилизация и контроль за качеством продукции, предусмотренные классификацией продукции по функциональным показателям и назначению по проекту ПУИ

[illegible]

4211. Результаты осмотра в больнице и медицинские документы.

[illegible]

4.21.3. Профсоюзные комитеты приносятся в приложенные табельные медицинские организации, не допускаются первичные приемы в процедурный кабинет за исключением случаев медицинских организаций (фельдшерско-акушерских пунктов), в которых устанавливается график проведения процедур и манипуляций, исключаются однократные их проведение, и предусматриваются обязательство влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха после проведения процедур для предотвращения инфицирования.

1214. В дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, учреждениях среднего профессионального образования с круглосуточным пребыванием (пояса ребенка, детские дома, интернаты) профилактические прививки вводятся в соответствии с требованиями и на медицинском кабинетах данных организаций.

4215. В целях приведения манипуляций общепольного назначения средств пелюшечной и противопаразитарной терапии, а также экстренной профилактики паразитарных инфекций

4216. Манипуляции в домашних условиях по месту работы/проживания должны выполняться при наличии необходимых условий, обеспечиваемых администрацией для оказания помощи пациентам, нуждающимся в экстренной профилактике паразитарных инфекций, разработаны интервалы и тарифы для сбора медицинских отходов.

4217. Хранение и транспортирование ИПП должно осуществляться при соблюдении инструкций по их применению и требований санитарности законодательства. При использовании ИПП следует придерживаться правил: вымыть, сразу герметично закрыть, не использовать повторно, не использовать в первую очередь. Следует использовать только запасы ИПП до наступления максимального доступного срока хранения.

4218. В каждой организации, осуществляющей деятельность по транспортированию, хранению и использованию ИПП, должен быть разработан и утвержден руководителем организации план мероприятий по обеспечению соблюдения правил и требований к применению.

4219. Работники, ответственные за соблюдение температурного режима хранения и транспортирования ИПП, должны иметь специальные вышестоящие полномочия на осуществление мероприятий по обеспечению соблюдения правил.

4220. Доставка ИПП к месту назначения осуществляется в соответствии с инструкцией по применению препарата.

4221. Перед использованием ИПП выполнить или предоставить к такому элементу следующие задачи: этикетки на флаконе или ампуле:

- инструкция для пациента (взрослый или детский);
- инструкция по применению раствора для инъекций;
- использовать ли растворитель (ИПТ) раствора;
- нет ли признаков порчи препарата (флакона или ампулы).

или при наличии признаков порчи флакона или ампулы (наличие повреждений на этикетке, повреждение упаковки, изменение цвета, запаха, вкуса). Ответственность за качество ИПП несет организация, предоставляющая ИПП.

для приготовления раствора ИПП и других лекарственных средств или для приготовления - все при наличии признаков того, что препарат (растворитель) не пригоден для применения.

4223. Если по какому-либо из перечисленных признаков качество вакцины или растворителя вызывает сомнения - данный препарат использовать нельзя.

4224. Вакцина из многодозных флаконов может использоваться в течение рабочего дня в соответствии с инструкцией по ее применению при соблюдении следующих условий:

после каждой дозы вакцины из флакона осуществляется с соблюдением правил асептики;

вакцина хранится при соответствующей температуре ($+2^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$);

восстановленные дозы не используются повторно и хранению не подлежат.

4225. Открытые флаконы с вакциной в конце рабочего дня уничтожаются и утилизируются с обязательным требованием.

4226. Не допускается смешивать вакцины в растворителях и смешивать открытые флаконы.

4227. Для восстановления вакцины в открытые флаконы используется одноразовый стерильный шприц со стерильной иглой. Повторное применение шприца и иглы, уже использованных для смешивания растворителя и вакцины, не допускается.

4228. Не разрешается использовать для хранения вакцины в шприцах и последующее хранение вакцин в шприцах.

4229. Профилактическая прививка против туберкулеза и туберкулезно-холерного шовбата в отдельный кабинет проводится добровольно, а при ее отсутствии - по специально разработанной схеме в определенные дни и часы. Не разрешается проводить шовбат против туберкулеза и туберкулезно-холерного шовбата одновременно с другими прививками.

4230. Все профилактические прививки при параллельном введении препаратов производят стерильным шприцом и иглой одноразового применения.

4231. В случае однократного введения одному человеку нескольких профилактических прививок, календару вводят отдельные шприцы и иглы в разные участки тела в соответствии с инструкцией по применению препарата. Не допускается введение комбинированных вакцин БЦЖ и вакцин против жертой туберкулеза одновременно в разные участки.

4232. Вскрытие ампул, восстановление лиофилизированных вакцин, введение препаратов осуществляется в соответствии с инструкцией по их применению при соблюдении правил асептики. Для восстановления лиофилизированных вакцин применяют растворители, произведенные в соответствии с фармакопейной статьей или в аптеках на длительный медицинский лабораторно-фармацевтический препарат.

4242. Перед набором сформированного препарата в шприц необходимо тщательно встряхнуть шприц (флакон) для лучшего перемешивания.

4243. Для набора каждой дозы вакцины из упаковки сыворотки флакон используется стерильный шприц со стерильной иглой. Стерильная игла и крышка флакона для каждой последующей дозы вакцины вытирается. Для набора вакцины из флакона используется тот же шприц, который будет использоваться для инъекции.

4244. Вакцину вводят в кожу, соответствующей инструкции по применению препарата.

4245. Обработка инъекционного поля осуществляется в направлении от центра к периферии сафиткой или тампоном, смоченным антисептиком. Предварительное замачивание и хранение вакцин тампоном в растворе антисептика запрещается. Допускается использование сафиткой однократного применения с антистатиком, прошедшего ультразвуковую обработку, дезинфекцию и стерилизацию в разрешенных и применяемых для обработки инъекционного поля.

4246. Инъекцию следует проводить после выжатия воздуха.

4247. Для вакцин вакцин используется метод, который указан в инструкции или ее приложениях. Внутримышечные инъекции детям летнего возраста проводят только в верхненаружную поверхность средней части бедра. Лицам в возрасте старше 3-х лет инъекции вакцин проводят по границе верхней и средней трети плеча.

4248. В течение 30 минут после введения вакцины на пациентом осуществляется наблюдение с целью своевременного выявления аллергических реакций и оказания экстренной медицинской помощи.

4249. Сроки и длительность медицинского наблюдения определяются сроком пикового вероятного развития поставленных реакций и осложнений, установленный в инструкции по применению препарата.

4250. Сведения о выполненной профилактической прививке (дата введения препарата, название препарата, проведшая врач, серия, доз, дата истечения срока годности, место и место введения препарата, а по результатам наблюдения - характер реакции) заносятся в медицинские документы. Медицинский работник, проводящий вакцинацию, обеспечивает правильность и достоверность ее регистрации.

Обеспечение безопасности медицинского работника при проведении вакцинации.

4251. Медицинский работник при применении вакцины должен соблюдать следующие правила: использовать инструмент, вакцины и образующиеся медицинские отходы

обязан соблюдать требования, направленные на профилактику инфекций с профилактичными мероприятиями передачи возбудителя.

4242. Медицинские работники, осуществляющие вынужденную:

приходят дополнительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

должны быть приняты в соответствии с установленными требованиями к профессиональным приемкам и экзаменам профессиональных приемкам по медицинскому персоналу с учетом эпидемиологической ситуации.

4243. Медицинский персонал должен осуществлять мытье рук в специальной мыльной воде (холоде и горячей и востерильный эпидемиологический контроль). Проводить мытье после каждого мытья. Гигиеническая обработка рук медицинского персонала проводится в соответствии с требованиями Санитарных правил.

4244. Медицинские работники должны избегать близкой телесной близости, приходя, не прикасаясь к лицам, которые могут быть источником инфекции, в том числе избегать рукопожатий с заболевшими лицами.

4245. В случае выявления заболевания травмы с нарушением целостности кожных покровов и (или) слизистых, необходимо принять меры для профилактики.

4246. Ответственным лицом факт получения травмы медицинским работником вносится в журнал учета аварийных случаев, составляется акт о несчастном случае на производстве с указанием даты, времени, места, характера травмы, применяемых средств индивидуальной защиты, соблюдении правил техники безопасности, указанием лиц, находившихся на месте происшествия, а также применяемый метод оказания первой помощи. Акт составляется в 2 экземплярах и хранится 3 года.

4247. Медицинский учет и расследование случаев инфицирования персонала при получении инфекционных заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью, проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4248. Сбор, временное хранение, транспортирование, утилизация (утилизация) медицинских отходов, образующихся при выполнении, осуществляется в соответствии с установленными санитарными законодательствами Российской Федерации требованиями.

Обеспечение безопасности персонала, проживающего на территории:

предлагающей в отпусках, где проживают члены семьи.

4249. По окончании отпуска с отпуском, проживающим при выезде, на территории, проживающего на территории предлагающей с медицинскими организациями или другими учреждениями, для проведения профилактических мероприятий.

4250. Сбор, временные хранения в больно стационар подлежат выплате в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, которая утверждается в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства и утверждается руководством организации.

4251. Транспортирование отходов с территории организации, осуществляющей медицинскую деятельность, производимой транспортом специализированных организаций к месту дальнейшего обезвреживания, размещенных медицинских отходов в учетом единой централизованной системы санитарной очистки данных административной территории.

42.5. Устойчивое транспортирование и хранение медицинских отходов при их перемещении

4252. Санитарно-эпидемиологические правила устанавливают общие требования к устойчивому транспортированию и хранению всех групп ИО, порядок транспортирования и хранения ИО от момента их извлечения до использования в медицинских организациях, а также требования к оборудованию, обеспечивающему сохранность отходов, качества и безопасности ИО и порядок использования этих оборудования.

4253. Для обеспечения качества и безопасности ИО проводится с общественным контролем поэтапный (приложение 3 к Санитарным правилам):

1) первый уровень - доставка ИО от организации-источника до принимающей оптовой торговли лекарственными средствами, включая этап таможенного оформления;

2) второй уровень - хранение ИО организационным оптовой торговли лекарственными средствами и доставка ИО до других организаций оптовой торговли лекарственными средствами, городских и районных (районных) аптечных организаций, медицинских организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую или медицинскую деятельность;

3) третий уровень - хранение ИО городскими и районными (районными) аптечными организациями, медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую или медицинскую деятельность и доставки ИО до медицинских организаций или их отдельных подразделений (в том числе участковых больниц, амбулаторий, поликлиник, родильных домов) или иных организаций (в том числе медицинских учреждений организаций,

осуществляющих образовательную деятельность в других организациях), использующих ИПП, в целях развития персонала ИПП;

4) четвертый уровень - хранение ИПП в медицинских организациях или их обособленных подразделениях (в том числе участковых больницах, амбулаториях, поликлиниках, родильных домах), являющихся организациями (муниципальных предприятиях, организациях), осуществляющих образовательную деятельность в других организациях, где производятся выданные ИПП препараты.

4254. При транспортировании и хранении ИПП на всех уровнях холодильной цепи, а также при применении ИПП руководителем организации (индивидуальный предприниматель) организует и обеспечивает выполнение установленных Санитарных правил требований к условиям транспортирования и хранения ИПП, гарантируя сохранность качества ИПП.

4255. В организациях, осуществляющих хранение и транспортирование ИПП на всех уровнях холодильной цепи, должны работать специалисты, прошедшие инструктаж по вопросам обеспечения сохранности вакцин, препаратов и защита их от воздействия вредных факторов окружающей среды. Инструктаж специалистов проводится ежегодно с учетом изменений в санитарном законодательстве.

Требования к температурному режиму транспортирования и хранения ИПП

4256. При транспортировании и хранении ИПП должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность качества препарата и защиту его от воздействия вредных факторов окружающей среды от окружающей природной, бытовой и бытовой упаковки ИПП.

4257. Не допускается замораживание адсорбированных препаратов, содержащих адьюванты (вакцино-дифтерия-коклюшечной вакцины, дифтерия-коклюшечной вакцины, полиция против гепатита В и А, субъединичных препаратов полиция-наемников-вакцины против полиомиелита), а также растворов для вакцин при их транспортировании и хранении.

4258. На четвертом уровне холодильной цепи для ИПП, в том числе растворов для вакцин, должны храниться в холодильниках при температуре в пределах от -2°C до $+8^{\circ}\text{C}$ включительно.

4259. При определении режима транспортирования и хранения ИПП необходимо руководствоваться инструкцией по его применению.

Требования к оборудованию для холодильной цепи:

4260. В системе «холодовой цепи» применяются следующие виды оборудования:
- оборудование для транспортирования ИЛП;
 - оборудование для хранения ИЛП;
 - оборудование для контроля температурного режима хранения и транспортирования ИЛП.
4261. Покрытие внутренних и внешних поверхностей оборудования, используемого в системе «холодовой цепи», должно быть устойчиво к действию моющих и дезинфицирующих средств.
4262. Для безаварийной работы холодильного оборудования и электросетей прибор для контроля температурного режима холодильного обеспечения должен обеспечивать стабильность напряжения и электросетях, осуществляющих энергоснабжение холоднооборудования, а также возможность электроснабжения по резервным схемам при автоматическом подключении системы автономного электроснабжения (электрогенераторов или инверторов).
4263. Запрещается использовать оборудование «холодовой цепи» для одновременного с ИЛП хранения и транспортирования продуктов, которая может попасть на участок ИЛП и (или) повредить их упаковку.
4264. Необходимо обеспечивать соблюдение сроков эксплуатации и периодичности планового обслуживания оборудования, определенных его производителем.
4265. Оборудование, предназначенное для транспортирования и хранения ИЛП, должно обеспечивать:
- постоянный температурный режим или заданный интервал температур в течение всего времени транспортирования и хранения при любой допустимой степени загрузки с учетом сезонных колебаний температуры в конкретной климатической зоне;
 - минимальное тепловыделение из ИЛП, который может поступить на данный участок «холодовой цепи» (при одновременной поставке ИЛП для предотвращения выгрузки холодильного оборудования должна обеспечиваться циркуляция воздуха и поддержание необходимого температурного режима);
 - уплотнение и хранение и маркирование состояния достаточного количества таровых элементов, используемых в комплексе с термодобактериями или в качестве аварийных источников холода в стационарном холодильном оборудовании.

Требования к оборудованию для транспортирования ИЛП

4266. В системе хладоновой цепи для транспортирования ИЛП используемое оборудование:

- термоконтейнеры, в том числе сумки-холодильники,
- холодильные агрегаты,
- холодильные камеры.

4267. Для транспортирования объектов (всех рефрижераторов) транспортом ИЛП упаковываются в специально предназначенные тары, обеспечивающие соблюдение требуемого режима температур и тем самым обеспечивающие транспортирование с учетом внешней колебательной температуры и конкретной климатической зоны.

4268. В зависимости от способа сохранения требуемого интервала температур применяются термоконтейнеры:

- активные, рефрижераторного типа с встроенной холодильной установкой;
- пассивные, изотермические, в которых в качестве диатермического вещества используются хладагенты.

4269. В зависимости от используемого термоустройства и технологии производства пассивные термоконтейнеры подразделяются на термоконтейнеры однократного и многократного применения. Не допускается использование в изотермической упаковке тары однократности применения.

4270. Термоконтейнеры многократного применения должны, сопроводивляемым документом производителя, содержать информацию об их технических характеристиках, включая термокарту и инструкцию по применению.

4271. На время и время упаковки объектов цепью в случае запланированного сокращения пассивных термоконтейнеров для экстренных мероприятий в чрезвычайных ситуациях необходимо обеспечить резервный запас хладоустройств. На третьем и четвертом уровнях готовности цепей термоконтейнеры многократности применения должны быть упакованы в двойном объеме хладоустройств, один из которых используется для загрузки термоконтейнера, другой - для размещения в него объектов.

Термоконтейнеры емкостью до 30 дм³ включительно (сумки-холодильники) должны обеспечиваться средствами для ручного транспортирования. Термоконтейнеры емкостью более 30 дм³ до 50 дм³ включительно (средние термоконтейнеры) должны обеспечиваться средствами, обеспечивающими их ручное транспортирование. Загруженные большие (свыше 50 дм³ до 100 дм³) и сверхбольшие (свыше 100 дм³) термоконтейнеры

термоконтейнера с помощью механических транспортных средств.

4273. Запрещается наполнять термоконтейнеры с механическими шиферными стенками (лпн) приезда как внутри, так и снаружи.

4273. Очистительная обработка термоконтейнера осуществляется при въезде производится перед загрузкой и после выгрузки с применением химических средств. В случае необходимости с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по применению термоконтейнера.

4274. Загрузка ИЛП производится в термоконтейнер, предварительно охлажденный до температуры -2°C до -8°C (согласно инструкции к термоконтейнеру не предусматривая другой режим подготовки).

4275. Для создания необходимой температуры внутри помещения термоконтейнера используются холодильники. В холодильнике могут находиться жидкое и твердое состояние папируса.

4276. Холодильники, используемые в качестве папируса, должны иметь маркировку «Холодильник».

4277. Холодильники, содержащие другие материалы, должны иметь маркировку «Холодильник» указывать в инструкции к холодильнику. Запрещается использование сухого льда в помещениях термоконтейнера при транспортировании и хранении ИЛП.

4278. Холодильники используются в соответствии с инструкцией их эксплуатации и требованиями, предъявляемыми к прилагаемым паспорту и (или) инструкции к термоконтейнеру для холодильника.

4279. При транспортировании в одном помещении термоконтейнера ИЛП различных видов, в том числе по различным режимам заморозки, и растворителей и веществам, для предотвращения замораживания ИЛП используются папирусы (частично размораживание) аналогичные с использованием папируса либо другие с рабочей температурой в пределах от -2°C до -8°C , если иное не предусмотрено инструкцией к термоконтейнеру.

4280. При транспортировании ИЛП в термоконтейнер устанавливается оборудование для контроля температурного режима, которое позволяет установить, была ли нарушена температурный режим в течение всего пути транспортирования.

4281. Оборудование для контроля температурного режима устанавливается в каждом термоконтейнере и должно соответствовать требованиям, согласно требованиям, предъявляемым к ИЛП. Контроль температуры осуществляется после окончания цикла транспортирования по время выгрузки папируса.

4282. В ледовых камерах-холодильниках применяются термомашинеры или терморегистраторы. Активные термотермометры оборудуются датчиками или автономными терморегистраторами.

4283. Для транспортирования ИПП в упаковке производители без выполнения востребованных средств защиты должны использовать авторефрижератор с комбинированной системой оборудования: дополнительная-оборудованная установка с автоматической системой поддержания заданной температуры внутри упаковки, инвентаризация средств защиты и контроль температуры, а также температурной записи в термометре.

4284. Кухня авторефрижератора для транспортирования ИПП оборудуется термометром и терморегистратором. Для обеспечения возможности контроля температуры в кухне рефрижератора в процессе транспортирования ИПП в упаковке должны быть средства визуального отображения информации о температурном режиме.

4285. Авторефрижераторы допускаются использовать в качестве холодильных или морозильных камер для временного хранения ИПП в экстренных ситуациях, а также для подготовки термостойких ИПП и материалов к использованию.

4286. В качестве дополнительного средства контроля температуры в авторефрижераторе допускается использование термомашинеры, которые устанавливаются в упаковке ИПП в соответствии с требованиями.

4287. Контроль температур термомашинеры и терморегистраторов осуществляется после получения каждого этапа транспортирования во время загрузки продукта.

4288. (Способ размещения контейнера в холодильнике рефрижератора должен обеспечивать циркуляцию воздуха и сохранность ИПП. В случае рефрижератора большого объема необходимо размещать ИПП на полках (поддонах)).

4289. Погрузка ИПП производится в предварительно охлажденный (замороженный) до температуры от -2°C до -8°C кухня рефрижератора. Разгрузка ИПП должна производиться в соответствии с требованиями.

4290. Транспортное средство должно обеспечиваться дезинфицирующими средствами и инструкцией по его применению на случай аварийных ситуаций с возможным нарушением целостности упаковки вакцин (вакцин, флажков).

4291. Санитарная обработка кухни рефрижераторов проводится перед и после каждого рейса с применением моющих средств, а также по мере необходимости с

непопытки плаванием дезинфицирующих средств.

4292. Водители транспорта, используемого для транспортирования ИПП, а также экспедиторы должны пройти обучение мерам и способам обращения ИПП при транспортировании в группе вынужден, а также в случае пожара или аварии в пути, и принятию экстренных мер.

Требования к оборудованию для хранения ИПП

4293. Для хранения ИПП используется следующее оборудование:

холодильные камеры и контейнеры;

морозильные камеры;

холодильники, в том числе холодильники-трюки;

морозильники, в том числе морозильники-приставки;

холодильники со встроенной морозильной камерой;

термоконтейнеры, в том числе сумки-холодильники;

холодильные ящики.

4294. Способность температурных параметров и регулирующих характеристик оборудования для хранения ИПП должна позволять осуществлять контроль, позволяющий производить для каждой новой единицы холодильного оборудования ИПП отчеты о температурном режиме хранения в процессе эксплуатации. Данные термодатчиков должны учитываться при размещении ИПП внутри холодильного оборудования.

4295. Данные термодатчиков должны учитываться при размещении ИПП внутри холодильного оборудования.

4296. Холодильное оборудование необходимо размещать в помещениях, для предотвращения замерзания текучей среды при отрицательных температурах воздуха окружающей среды. В помещении также предусматривается полочка воды с постоянной заменой. Площадь помещения определяется в соответствии с требованиями производителя оборудования.

4297. При размещении холодильного оборудования в помещениях и полуоткрытых помещениях должны предусматриваться пути возможной эвакуации ИПП в экстренной ситуации и защита оборудования от возможных повреждений под воздействием воды или остатков воды.

4298. Холодильное оборудование должно размещаться таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к нему и возможность загрузки и выгрузки ИПП с использованием, при необходимости, средств механизации.

4299. На первом, втором и третьем уровнях холодильной цепи для расфасовки, хранения, упаковки и подготовки для дальнейшей транспортировки ИПП используются холодильные камеры (комнаты).

4300. Холодильные камеры (комнаты) должны оснащаться сложными оборудованными, а также приборами измерения и контроля температуры.

4301. Мерзильные камеры выполняются на первом и втором уровнях холодильной цепи для ИПП, которые полностью настроены по их применению должны храниться в замороженном состоянии.

4302. Холодильная (морозильная) камера (комната), по желанию иметь закрытые приемы, дверной проем оборудуется искробезопасной дверью (автоматический коротыги шириной не менее 70 см). Дверь холодильной (морозильной) камеры (комнаты) должна открываться наружу по ходу пути аварийной эвакуации ИПП и оборудована запирающим устройством, которое должно открываться как снаружи, так и изнутри. Холодильная (морозильная) камера (комната) оборудуется температурной сигнализацией.

4303. При наличии новых холодильных (морозильных) камер (комнат) следует устанавливать двойной холодильный агрегат с системой автоматической корректировки для постоянного поддержания объема агрегатов и сетей обеспечения топливом сжигания ИПП в случае поломки одного из устройств. Каждый агрегат должен поддерживать заданную температуру при любых возможных для местного климата окружающих температурных условиях.

4304. Холодильные (морозильные) камеры (комнаты) оборудуются стеллажами, маркированными для каждого ящика ИПП (при наличии электрической системы учета). Низшая полка для размещения пожаротушающих средств в холодильной камере (комнате) должна выдвигаться на высоту не менее 200 мм от уровня пола с целью предотвращения средств от переувлажнения и от повреждения при наледи пола. При наличии хранения не допускается размещение высокогорных маркированных ИПП на полках поддона (пашете). Полки холодильной камеры (комнаты) должны быть выделены место для хранения ИПП и пространство для складывания термометров. Размещение охлаждающих термометров на полу запрещено.

4305. Зеркала холодильных (морозильных) камер (комнат) должны обеспечивать свободный доступ и должно иметь камеры (комнаты) и шкафы для работы персонала внутри камер (комнат), а также свободную циркуляцию воздуха по всему объему в целях обеспечения равномерного распределения температур.

4306. Холодильные камеры (комнаты) оборудуются терморегулятором, встраиваемым в автоматизированную термометрию, и также термомониторингом.

4307. Датчики встроенного термометра и встроенного терморезистора (либо автономные терморезисторы) размещаются по периметру холодильной камеры (комнаты) на уровне средних полок стеллажей не менее чем в двух контрольных точках, определенных производителем холодильной камеры (комнаты) или в соответствии с термикартой.

4308. Автономные термометры и терморезисторы размещаются не менее чем в трех контрольных точках: на верхней полке, наиболее удаленной от двери, на средней полке в центре камеры (комнаты) и вблизи двери. Автономные термометры и терморезисторы размещаются непосредственно на коробках с ИПП рядом друг с другом. Точка размещения автономных средств контроля определяется в соответствии с термикартой.

4309. При загрузке холодильных камер (комнат) не разрешается размещение препаратов, эмпрессируемых вострых видовуступ, термоядкихпрое и автономных термометров на участках расширения потока холодного воздуха с температурой ниже $+2^{\circ}\text{C}$.

4310. Текущая уборка в холодильных камерах (комнатах) осуществляется по мере необходимости; генеральная уборка проводится не реже одного раза в месяц.

4311. Морозильные камеры оборудуются терморезисторами, термометрами, встроенными в автономные термометры. Все средние температурные датчики должны иметь возможность фиксировать значение (до -25°C и ниже) отрицательные температуры.

4312. Датчики встроенного терморезистора либо автономные терморезисторы размещаются по периметру морозильной камеры на уровне средних полок стеллажей не менее чем в двух контрольных точках, определенных производителем холодильной камеры или термикартой.

4313. Терморезисторы и автономные термометры размещаются в контрольных точках, определенных производителем морозильной камеры или термикартой: наиболее теплой, изоляционной воступную температуру (возле двери), и наиболее холодной.

4314. Текущая уборка в морозильных камерах осуществляется по мере необходимости; генеральная уборка проводится не реже одного раза в месяц. Не допускается размещение пленки на стенах морозильной камеры.

4315. Морозильные камеры оборудуются терморезисторами, термометрами, встроенными и автономными термометрами. Все средние температурные датчики должны иметь возможность фиксировать значение (до -25°C и ниже) отрицательные температуры.

4.11.6. Датчики пассивного терморезистора либо эквивалентные терморезисторы размещаются на периметру морозильной камеры на уровне верхних полок стеллажей не менее чем в двух контрольных точках, определенных производителем морозильной камеры или термобарой.

4.11.7. Термодатчики и автономные термометры размещаются в контрольных точках указанных производителем морозильной камеры или термобарой: на полках «оттевои», поддерживающей вертикальную структуру (опалевые двери), в палатках «оттевои».

Требования к оборудованию для контроля температурного режима в системе «холодовой цепи»

4.11.8. Для контроля температурного режима в системе «холодовой цепи» используются средства измерения температуры и средства выявления (индикация) нарушения температурного режима.

4.11.9. В качестве средств измерения температуры используются термометры и тем числе электронные датчики температуры; термографы; терморезисторы. Допускается использовать термометры, не являющиеся средствами измерения, по общедоступным валидированным точностным характеристикам.

4.11.10. Для выявления нарушения температурного режима (показ за пределы заданных температурно-временных условий) используются средства контроля - сертифицированные для «холодовой цепи».

4.11.11. Средства измерения температуры (термометры, термографы, терморезисторы) и средства выявления нарушения температурного режима (терминальные) должны обеспечивать сквозной непрерывный контроль температурного режима от момента заезда ИЦП в упаковочную тару до их выгрузки по назначению на всех этапах транспортирования и в течение пути и периода хранения.

4.11.12. Оборудование для контроля температурного режима в системе «холодовой цепи», регистрирующее и отображающее измеренное значение температуры в конкретный момент времени (термометры, датчики температуры, термографы, терморезисторы), должно проходить периодический контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации². Периодичность контроля и калибровки определяется при регистрации измеренного устройства.

4.11.13. Постановки (перевозки) ИЦП по требованию получателя ИЦП обязан предоставить документальное подтверждение соответствия показателей, указанных

² Федеральный закон от 28.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, № 26, ст. 3021; 2020, № 50, ст. 8074).

приборов. При хранении ИСП документы, подтверждающие своевременное проведение поверки средств измерения, используемых для контроля температурного режима, должны храниться у должностного лица, ответственного за соблюдение цели».

4.324. Погрешность измерения температуры оборудования для контроля температурного режима на рабочих температурах должна быть не более $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Величина погрешности подтверждается в документах производителя до фактического датского обслуживания.

4.325. Все документы производителя средств измерения и контроля температуры, содержащие информацию о технических характеристиках, и инструкции по эксплуатации должны быть на русском языке. У термометризаторов, в том числе подключаемых к внешним компьютерам, графики и расчеты должны содержать информацию о температурном режиме и его нарушении, а также данные, необходимые для идентификации устройств и периодов эксплуатации.

4.326. В системе «Холодовой цепи» для измерения и отображения температуры (в пределах потребности) используются электронные термометры (датчик - термометр). Термометры устанавливаются во всех сетях холодильного оборудования для хранения ИСП и идентифицируются для транспортирования ИСП.

4.327. Термометры, применяемые в холодильной технике, имеют несколько температурных датчиков, расположенных в контрольных точках, обозначенных производителем на термодите данной единицы оборудования. Автономные термометры не требуют использования дополнительного оборудования при эксплуатации. Автономные термометры должны иметь средства визуального отображения информации (дисплей). Термометры должны фиксировать значения температуры с интервалом времени между соседними измерениями не более 1 минуты (не менее 60 измерений в час). Длительность интервала между соседними измерениями температуры должна быть указана производителем (поставщиком) в инструкции для пользователя к эксплуатации термометру.

4.328. Автономные термометры размещаются согласно термодите в наиболее «холодной» и наиболее «теплой» точках холодильного оборудования.

4.329. Контроль показаний каждого термометра осуществляется два раза в день (в начале и в конце рабочего дня). Показания термометров регистрируются в специальном журнале мониторинга температур, который вывешивается отдельно на каждую ступень холодильного оборудования (приложение 3) к Справочнику давления. В случае, если контроль температур в холодильном оборудовании осуществляется с помощью внешнего мониторинга температурного режима, учет показаний приборов осуществляется

температурного режима осуществляется по электрическому входу с архивизацией.

4330. Терморегистратор (далее - терморегистратор) предназначен для измерения логотипический эмисии, хранения и воспроизведения на электрическом и (или) бумажном носителе значений температуры (в пределах погрешности) с привязкой к заданным промежуткам времени.

4331. В системе холодильной цепи может использоваться терморегистратор, фиксирующий значения температуры с интервалами времени между соседними измерениями не более 1 часа (не менее 60 измерений в час). Длительность интервала между соседними измерениями температуры должна быть указана производителем (поставщиком) и измеряться от момента его подключения к терморегистратору.

4332. Терморегистраторы могут быть как встроенными в холодильное оборудование, так и автономными.

4333. Терморегистраторы должны иметь возможность функционировать как с компьютером для выведения информации на дисплей и звуковой электроный носитель.

4334. В системе «холодовой цепи» терморегистраторы используются в следующих случаях.

4335. При транспортировании ИПП в холодильниках как правило средство контроля температурного режима. В этом случае терморегистраторы могут быть как автономными, так и встроенными. При этом последние обязаны обеспечивать такие терморегистраторы, которые позволяют оперативно обеспечивать получателя ИПП полной информацией о температурных условиях транспортирования от момента начала транспортирования до момента его окончания.

4336. При транспортировании ИПП в холодильниках большого объема с первого на второй и со второго на третий уровень холодильной цепи как дополнительное (при использовании терморегистраторов) средство контроля температурного режима.

4337. В стационарных холодильниках терморегистратор является неотъемлемой составной частью холодильника. При этом последние обязаны обеспечивать также терморегистраторы, которые позволяют оперативно обеспечивать получателя ИПП полной информацией о температурных условиях транспортирования от момента начала транспортирования до момента его окончания. Связанные информации с терморегистраторов осуществляются после каждого цикла (этапа) транспортирования.

4338. При хранении ИПП в холодильных камерах и холодильных камерах как правило средство контроля температурного режима. В этом случае терморегистраторы могут быть как автономными, так и встроенными составными узлами холодильных

контраты или контрольной камере. Считывание информации с терморегаляторов осуществляется периодически, при этом время отбора пробы и анализа по мере необходимости и при возникновении аварийной ситуации.

4339. Как защитное средство контроля температурного режима для защиты работоспособности холодильного оборудования.

4340. Конструкция терморегаляторов должна включать возможность фальсификации данных измерений температуры. В процессе его эксплуатации для отпугивания измерений не допускается вмешательство показаний и не допускается возможность любой преднамеренной потери данных измерений.

4341. Оперативная информация о температуре и возникших нарушениях может отображаться на экране дисплея терморегулятора, а информация о динамике температуры сохраняться на электронном или бумажном носителе. Сведения электронной копии и расшифровку данных на бумажном носителе следует делать не реже одного раза в неделю при хранении ИПП либо после окончания этапа транспортирования или при возникновении аварийной ситуации. Целостная информация хранится на каждом уровне и не менее пяти лет.

4342. Используемые в настоящее время механические конструкции в связи с высокой пожароопасностью из-за риска при плановой замене оборудования следует заменить на электронные терморегуляторы.

4343. Для однократного установления и отображения факта нарушения конкретного температурного интервала в течение определенного времени или факта отсутствия такого нарушения в системе охладительных цепях применяются активные электронные термодатчики, предназначенные для контроля охладительных цепей (датчик - термоэлектрический).

4344. Допускается применение флуоресцентных термодатчиков (датчик - ФТИ) в случае, если они включены на выходе ИПП транзитора при выходе продукта. Наличие ФТИ на достигаемых этапах хранения и транспортирования ИПП не допускается.

4345. В системе охладительных цепей следует использовать термодатчики, фиксирующие значения температур с частотой опроса не более 1 минуты (то есть 60 измерений в час). Частота опроса температур увеличивается при возникновении (индикация) в конструкции или руководстве по эксплуатации и термодатчику.

4346. Для контроля перетекания и замораживания ИПП и для осуществления анализа характера и причин нарушений в системе охладительных цепей следует использовать термодатчики с резкими скачками температурно-временных пороговых значений.

соответствующим температурным характеристикам различных ИСП, определяемой их происхождением.

4347. Каждый термоминидатор должен иметь собственный идентифицированный номер в целях предотвращения возможности фальсификации его показаний. Термоминидатор должен иметь возможность вывешивания наглядных указаний о нарушении температурного режима.

4348. Конструкция термоминидатора должна исключать возможность фальсификации его показаний. В случае эксплуатации термоминидатора не допускается применение и сбор информации с его шкалы. Допускается возможность временного прерывания работы термоминидатора при условии автоматического сигнала и электронной защиты всех предыдущих нарушений в течение всего срока службы термоминидатора.

4349. Контроль показаний термоминидатора должен быть визуальным, простым, однозначным и не требующим дополнительных манипуляций с прибором.

4350. В системе «холодовой цепи» термоминидаторы выполняются в следующем случае:

4351. При транспортировании ИСП в термоконтейнерах любого объема любым видом транспорта (в том числе и ручную) на всех этапах хранения охладитель цепи: блок основного средства контроля температурного режима при условии, что время транспортирования препарата превышает один час (при транспортировании ИСП в термоконтейнерах любого объема с первого по второй и со второго на третий уровень охладитель цепи: дополнительное использование криорециркуляторов и в качестве средства контроля температурного режима).

4352. При транспортировании ИСП в аморефрижираторах как дополнительного средства контроля температурного режима при наличии основного средства контроля - терморегистратуры.

4353. При хранении ИСП в холодильных камерах и морозильных камерах как дополнительное средство контроля температурного режима.

4354. При хранении ИСП в холодильниках и морозильниках блок основного средства контроля температурного режима.

4355. При транспортировании ИСП контроль охладитель термоминидатора производится при загрузке (погрузке) и выгрузке (погрузке) препарата. Показания каждого термоминидатора с указанием его идентификационного номера регистрируются в журнале учета движения ИСП (приложение 4) и Свидетельстве годности для каждого контейнера.

4356. Контроль показаний датчика термометризатора в оборудовании для хранения ИПП осуществляется два раза в день. Показания датчика термометризатора и датчика терморегистратора с указанием его идентифицированного номера регистрируются в журнале мониторинга температуры, который заполняется ежедневно на каждую единицу холодильного оборудования (приложение 39 к Санитарным правилам) или в электронном виде.

4357. При одновременном использовании в одном объеме дополнительного оборудования для хранения или транспортирования ИПП результаты данных оборудования востуком температурного режима для получения оптимального результата контроля необходимо использовать сопоставление между собой в соответствии со следующими критериями оборудования.

**Общие требования к организации транспортирования
и хранения ИПП на всех уровнях холодильной цепи**

4358. На всех уровнях «холодовой цепи» в туринге (приложение 40 к Санитарным правилам) проводятся регулярные поступления и отправления ИПП в соответствии с указанием наименования производителя, адреса производства, количества продукта (для вагона и растворимых в сухом - в лотках), даты, даты воступающей срота годности, даты поступления (отправления), организационно-подписи, показаний термометризатора и их идентифицированных номеров, фамилия, инициал, отчество (при наличии) ответственного работника, осуществляющего регистрацию.

4359. Если в оборудовании для транспортирования ИПП имеется терморегистратор, его показания за все время транспортирования регистрируются на бумажном носителе или в электронном виде и прилагаются к принимаемым документам на ИПП. Для выявления термометризатора на флэш-карте (данные) с ИПП, контроль температурного режима хранения ИПП осуществляется по показаниям датчика термометризатора на флэш-карте (ФТН).

4360. У типа термометризатора или датчика термометризатора, расположенных при транспортировании ИПП, оставшихся после отправки ИПП изымается (в том числе по факсу или электронной почте) информация о группе, даты и подписи от него подтверждения (условия или показания) изымается с учетом показаний датчика оборудования контроля температуры при приеме ИПП.

4361. Сотрудник, осуществляющий регистрацию поступления и отправления ИПП, должен пройти инструктаж (в рабочем месте по вопросам соблюдения правил

холодильника и транспортный ИПП, работе с холодильным оборудованием и работе с приборами, регистрирующими изменения температурного режима (термометры, термомониторы, терморегистраторы), и как должна быть сделана соответствующая запись в журнале инструктаж.

4362. На первом, втором и третьем уровнях холодильной цепи ежедневно два раза в день, а на четвертом уровне - в рабочие дни в журнале (приложение 34 к Санитарным правилам) или в электронном виде отмечаются показания термометров и термомониторов (микропленных) камер (комнат), холодильных (морозильных), в которых хранятся ИПП. В том же журнале регистрируются факты планирования аварийного отключения холодильного оборудования от энергоснабжения, поставки и факты нарушения температурного режима с указанием даты и времени отключения.

4363. На первом, втором и третьем уровнях холодильной цепи ежедневно два раза в день, а на четвертом уровне - в рабочие дни в журнале (приложение 35 к Санитарным правилам) или в электронном виде отмечаются показания термомониторов, размещенных в холодильных (морозильных) камерах (комнатах) и холодильных (морозильных), в которых хранятся ИПП, с указанием их идентификационного номера.

4364. В помещениях каждого из уровней холодильной цепи определяется порядок обеспечения температурного режима хранения и транспортирования ИПП и обязанности должностных лиц, ответственных за обеспечение холодильной цепи на данном уровне, утверждаемые расширенным документом организации (приказом).

4365. Транспортирование ИПП всеми видами транспорта, кроме железнодорожного, осуществляется в термоконтейнерах. Каждый термоконтейнер обеспечивается термомонитором, если время транспортирования превышает один час.

4366. При обнаружении нарушения температурного режима при транспортировании на всех уровнях холодильной цепи ответственный работник, осуществляющий прием ИПП и регистрирующий соблюдение температурного режима, обязан доложить об этом руководителю и составить соответствующий акт. Решение об отказе в поступлении ИПП принимается руководителем организации. Порядок действий персонала при отказе из приема ИПП определяется условиями договора между поставщиком и потребителем ИПП.

4367. Отпуск ИПП при разничной реализации разрешается осуществлять при условии доставки до места реализации в термоконтейнере или термосе с соблюдением требований к холодовой цепи. Каждая реализованная партия доп ИПП сопровождается инструкцией по применению препарата на русском языке. В

контроля указаны условия его хранения и транспортирования.

4.3.6.8. Рабочими документами, обеспечивающими реализацию продукции ИПП, являются инструкция покупателя и раскладываемая опломбированная охлаждаемая цепочка при транспортировании ИПП, о чем делается отметка во реперной, заверенная подписями покупателя и продавца, проставляется дата и время отгрузки ИПП.

Общие требования к организации экстренных мероприятий по обеспечению охлаждаемой цепи в чрезвычайных ситуациях.

4.3.6.9. В каждой организации, осуществляющей деятельность по транспортированию, хранению и использованию ИПП, должны быть разработаны и утверждены руководителем организации план мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях, который должен предусматривать следующие мероприятия при возникновении пожара и стихийных бедствий, при поломке или повреждении транспортных средств, возникновении поломки холодильного оборудования, аварийной:

схеме размещения холодильных (морозильных) камер и холодильного оборудования на территории предприятия (учреждения), задействованных для размещения иммунобиологических лекарственных препаратов в холодном режиме;

схему размещения резервных холодильных (морозильных) камер, холодильного оборудования и термомониторингов, используемых только в чрезвычайных ситуациях с расчетом на аварийную потребность;

схему перемещения холодильного оборудования на резервное и аварийные источники питания;

расчет потребности холодильного (морозильного) оборудования и термомониторингов для обеспечения сохранности иммунобиологических лекарственных препаратов;

список аварийно-восстановительных групп (ответственные лица);

дополнительные обязанности лиц по ликвидации работоспособности холодильного оборудования и энергоснабжения;

дополнительные обязанности лиц по обеспечению сохранности иммунобиологических лекарственных препаратов в чрезвычайных ситуациях;

поиск и обеспечение компенсации материальных потерь лекарственных препаратов во время их транспортирования по прямому и косвенному маршрутам;

4.3.7. С учетом специфики производства (организации) и транспортирования лекарственных препаратов (организаций) по прямому (холодильному)

индивидуально-логическим лекарственным препаратам, содержащим яд может быть исключено.

4371. В плане экстренных мероприятий учитываться все возможные в данной организации, районе, районе, в котором могут возникнуть ситуации.

4372. В плане экстренных мероприятий должны быть четко указаны:

порядок и средства оповещения ответственных лиц на случай чрезвычайной ситуации;

порядок действий по обеспечению условий хранения и транспортирования ИЛП и должностные лица, ответственные за эти действия.

места размещения и порядок использования резервного оборудования для хранения ИЛП, в том числе оборудованных для контроля температурного режима и автономных источников обогрева;

порядок встречения и использования системы потопленного электричества;

транспорт для перевозки ИЛП с указанием конкретных телефонов ответственных лиц.

4373. Для выполнения плана экстренных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на первом, втором и четвертом уровнях сложности четко должен быть запас аварийнодействующих, термостатических (терморегуляторов) и аварийных холодильных систем.

4374. Для временно размещения ИЛП в чрезвычайных ситуациях может использоваться холодильное оборудование других организаций по согласованию с руководителем этих организаций.

4375. При подготовке к замораживанию упаковки, содержащей в качестве активного ингредиента плазмину, необходимо провести тест на прочность (кши-тест), для проведения которого необходимо:

выбрать контрольный образец, представляющий собой флакон с плазминой того же типа и того же объема, серия того же производителя и из той же партии, что и основная, которую планируется приклеивать, и нанести на него отметку «заморожено» (далее - контрольный флакон);

оставить контрольный флакон из воды при температуре минус 20 °C или до образования льда, после чего необходимо дать содержимому флакона оттаять, достигая его принудительное разложение;

выбрать флакон из партии упаковки в отстойнике которой находится гидролизная замораживаемая (далее - тестируемый флакон);

взять контрольный и тестируемый флаконы по одну руку и с силой встряхнуть в

время 10 - 15 секунд;

разложить контрольный и тестируемый флажки для наклеивания на обратную сторону флажка на столе или другой плоской поверхности, обеспечивая оптимальное прохождение света через оба флажка для проверки уровня цвета допустимостей перепорочивание флажков вокруг ламп и окрасившиеся наполнены на уровне темной флажки.

4376. Вакансия на тестируемой партии не порождающая и пригодна в использовании, если осадок рыжий, или изосадиной эссенции лаванды, осадок в тестируемых флажках образуется медленнее, чем в контрольном флажке.

4377. Вакансия на тестируемой партии изосадиной и не пригодна в использовании, если осадок рыжий и изосадиной. Если осадок образуется одинаково образом и с одинаковой скоростью в тестируемых и контрольных флажках или осадок в тестируемых флажках образуется быстрее, чем в контрольном флажке.

4378. Необходимо периодически (не реже одного раза в год) проводить учения по выполнению плана экстренных мероприятий по обеспечению «жизненной цепи» в чрезвычайных ситуациях с задействованием всех подразделений и с привлечением работников всего оборудования. По результатам учений составить план мероприятий по устранению недостатков.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕРВИСА

III группа

1. <i>Agrobacterium pasteurii</i>	- холера
2. <i>Borrelia recurrentis</i>	- возвратного тифа
3. <i>Campylobacter jejuni</i>	- абсцессов, оспятыхный
4. <i>Campylobacter jejuni</i>	- эпилепсия, холерическая, оспятыхный
5. <i>Clostridium botulinum</i>	- ботулизм
6. <i>Clostridium tetani</i>	- столбняк
7. <i>Corynebacterium diphtheriae</i>	- дифтерия
9. <i>Enterobacteriaceae choleracholerae</i>	- эриксиноз
10. <i>Helicobacter pylori</i>	- гастрит, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
11. <i>Legionella pneumophila</i>	- легионеллез
12. <i>Legionella pneumophila</i>	- легионеллез
13. <i>Listeria monocytogenes</i>	- листериоз
14. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	- туберкулез
15. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	- туберкулез
16. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	- туберкулез
17. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	- туберкулез
18. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	- туберкулез
19. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	- туберкулез
20. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	- туберкулез
21. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	- туберкулез
22. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	- туберкулез
23. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	- туберкулез
24. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	- туберкулез
25. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	- туберкулез
26. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	- туберкулез
27. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	- туберкулез
28. <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	- туберкулез

IV. प्रश्नसूची

1. <i>Aerobacter aerogenes</i>	- септицемия
2. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- пищевой токсикоинфекции
3. <i>Bacteroides fragilis</i>	- острого, гнойного инфицир. колита и пелл, гнойник инфицир. ЦНС, стоматитифекция, гнойник; диспантитов, гнилыва. инфекции матки и тазовой, параректальныя абсцессы, дифтерийные язв. язва слуха, остеомиелиты, анаэробная гангрена инфекции
4. <i>Bacillus spp</i>	- клещевого спиноцефта
5. <i>Pseudotellia bronchiseptica</i>	- бронхопневмония
<i>Pseudotella carnositatis</i>	- параксандроз
6. <i>Burkholderia cepacia</i>	- воспалительных заболеваний легких и верхних дыхательных путей, хронических бронхитов, уросиротом, эндокандритов, менингитов
7. <i>Burkholderia caryophylli</i>	- местных воспалительных процессов в сенях
8. <i>Burkholderia thailandensis</i>	- местных воспалительных процессов
9. <i>Corynebacterium spp</i>	- газротеррита, псевдотуберкулеза
10. <i>Citrobacter spp</i>	- местных воспалительных процессах, инфаркт токсикоинфекции
11. <i>Clostridium perfringens</i>	
<i>Clostridium botuli</i>	
<i>Clostridium septicum</i>	- газовой гангрены
<i>Clostridium histolyticum</i>	
<i>Clostridium bifermentans</i>	
12. <i>Enterococcus faecalis</i>	- эндогенный острый абсцесс, абсцесс тазика
13. <i>Escherichia coli</i>	- энтерога
14. <i>Enterococcus faecium</i>	- остеомиелит позвоночника

[illegible]

8. <i>Rickettsia japonica</i>	- японский пятнистый лихорадки
9. <i>Rickettsia africae</i>	- африканской клещевой лихорадки
10. <i>Rickettsia huai</i>	- пятнистой лихорадки острова Фиджи
11. <i>Rickettsia aeschlimannii</i>	- риккетсиоза, вызванного <i>Rickettsia aeschlimannii</i>
12. <i>Rickettsia felis</i>	- риккетсиоза, вызванного <i>Rickettsia felis</i>
13. <i>Rickettsia heilongjiangensis</i>	- риккетсиоза, вызванного <i>Rickettsia heilongjiangensis</i>
14. <i>Rickettsia bellii</i>	- риккетсиоза, вызванного <i>Rickettsia bellii</i>
15. <i>Rickettsia massillae</i>	- риккетсиоза, вызванного <i>Rickettsia massillae</i>
16. <i>Rickettsia parkeri</i>	- риккетсиоза, вызванного <i>Rickettsia parkeri</i>
17. <i>Rickettsia monni</i>	- риккетсиоза, вызванного <i>Rickettsia monni</i>
18. <i>Rickettsia slovaca</i>	- риккетсиоза, вызванного <i>Rickettsia slovaca</i>
19. <i>Rickettsia typhi</i>	- риккетсиоза, вызванного <i>Rickettsia typhi</i>

Диалязмы

(семейство Амарилляциевые, порядок Rickettsiales)

III группа

1. <i>Ampelisca phagocytophilum</i>	- гриппоподобного амелизиса человека
2. <i>Ehrlichia ewingii</i>	- эрлихиозной прилипания человека
3. <i>Neorickettsia sibirica</i>	- лихорадка сыпчатая

Вirusы

Из-за отсутствия стандартных лабораторий для вирусов достаточно данных в русской литературе)

I группа

1. *Picorniviridae*:

Морбильвирусы, и Бундмбурлит инфламмурус. - геморрагическая лихорадка

Защ. Эболавирусы, Сунден Эболавирусы, Тоб

Фарест эболавирусы

2. *Arnaviridae*:

вирусы Мекон, Хинт, Мокунга, Селнга - геморрагическая лихорадка

Пухадина

3. *Reoviridae*:

Род (Энтеровирусы)

вирусы натуральной оспы (*Variola*) - натуральной оспы, чешечка

вирусы оспы обезьян (*Monkeypox*) - оспы обезьян

4. *Herpesviridae*:

обезьяньи вирусы В - хронического энцефалита и энцефаломиелита

II группа

1. *Toroviridae*:

вирусы лошадиных энцефалитов - лошадиных энцефалитов,

(Восточно-азиатский ВЭЭП, Восточный ВЭЭП, энцефалиты и энцефаломыелиты

Западный ВЭЭП)

вирусы лихорадки Сент-Луи, Виллери - дистрофических заболеваний

Эвергленд, Чикунгунья, ОН-Сонг-Ньонг,

Карельский, Синдуба, река Росс, Мидири,

Мундуба, Сапуна

2. *Adenoviridae*:

вирусы эпидемического кишечного энцефалита - энцефалитов, энцефаломиелитов

(ВЭЭ), Адам-Арсия, Аппа, Лавинг, Негинья,

Потавалл, Шотландского энцефаломыелита

швед

Белетия леса (Кансавур, Окалп) - геморрагических лихорадок

геморрагической лихорадки (ГЛЛ)

вирусы комплекса японского энцефалита - энцефалитов, энцефаломиелитов

(ЯЭ), Западного Нила, Итхел, Роски, Селт-

Лунга (эпифаэтиты). Усугу, (эпифаэтит),
молиты Муррен, Карши, Куован, Селен,
Воссельборн

Экст. Рибраве, Делан, Сохрух

Желтой лихорадки

Нерус гепатита С

- лихорадочных заболеваний
- геморрагической лихорадки
- парентерального гепатита,
гепатита, цирроза, карциномы печени

3. *Коронавирусы*

Род *Coronaviridae*:

Болезни Кальфорния, эпифаэтиты,
Па Крис, Дрейкостан, каны, зайко-
башков, Нехо, Гипти

комплекс С-вирусы Ашер, Мадрид,

Орбана, Соса, Роста и другие

Род *Rhinoviridae*:

вирусы экзентных пикоридов Синаман,

Наттала, Рифт-вирус, Тоскана и другие

Род *Adenoviridae*:

вирус Крюкской гемоглобиновой

пикоридов-Кини:

болезни овец Нейрофа, Гаджам;

Дутбе

Род *Herpesviridae*:

вирусы Хантани, Скуд, Пууниа, Чаш,

Андо и другие

Син-Номбо

- энцефалитов, эпифаэтитов,
мезентериальных и лихорадочных
заболеваний с артритом
- лихорадочных заболеваний с менингитом и
артериитом

- энцефалиты и дискорационных заболеваний
с артритом и менингитом

- геморрагической лихорадки

- лихорадка с экзантематозным синдромом

- энцефалита

- геморрагических лихорадок с почечным
синдромом (ГПНС) и с лихорадкой
с энцефалитом

хантавирусного кардиопульмонального
синдрома

4. *Резовирусы*

Род *Orthomyxoviridae*:

вирусы Кокорона, катаральной степной
лихорадки, Синего лихорадки, Чашаишан,

Орус и другие

- лихорадка с менингеальным синдромом и
артритом

5. *Rhabdoviridae*:

Род *Rhabdoviridae*:

лиосвирус бетапепты	- бетавирус, гидрофильный лиосвирусного энцефалита
Туркменский лиосвирус летучих мышей 1 типа	- лиосвирусного энцефалита
лиосвирус Ирак 1	- лиосвирусного энцефалита
Эшадно-кавказский лиосвирус летучих мышей	- лиосвирусного энцефалита
Европейский лиосвирус летучих мышей 2 типа	- лиосвирусного энцефалита
Мокили лиосвирус	- лиосвирусного энцефалита
Аравийский лиосвирус	- лиосвирусного энцефалита
Хутанский лиосвирус в группе	- лиосвирусного энцефалита
6. <i>Picornaviridae</i> :	
Род <i>Poliovirus</i> :	
вирус полио	- полио
7. <i>Arteriviridae</i> :	
вирусы лимфотропного хронического гепатита	- лимфотропных хронических гепатитов
Токсин, Пичанго	
8. <i>Herpesviridae</i> :	
вирус гепатита D	- парентеральный гепатит D
9. <i>Retroviridae</i> :	
вирусы иммунодефицита человека (ВИЧ-1, ВИЧ-2)	- СПИДа
вирус Т-клеточного лейкоза человека (HTLV)	- Т-клеточного лейкоза человека
10. <i>Adenoviridae</i> :	
вирусы гепатита D (гепатит) и E	- инфекционных гепатитов
11. <i>Coronaviridae</i> :	
вирус SARS	- COVID
коронавирус MERS	- ближневосточного респираторного синдрома
вирус SARS-CoV-2	COVID-19
12. <i>Orthomyxoviridae</i> :	
лиосвирусные вирусы гриппа	- грипп

13. *Functional disorders*

Возбудители медленных пограничных и -
подострых субальных энцефалитов (Pion
Disease) Куру

Агент С.ПД-возбудитель болезни

Крейнфельд-Якоб

Возбудитель транссмиссионной губчатой
энцефалопатии человека

Возбудитель спонгиозной церебешарной
атрофии человека

Возбудитель фатальной семейной
бессонницы (FTL)

Скрепы

Возбудитель энцефалитов ягрок
Хроническая интратканевая болезнь
копытных

Возбудитель губчатой энцефалопатии
крупного рогатого скота

14. *Parvoviridae*

Хандря хантинавирус, Инава хантинавирус

- подострый энцефалит

- болезнь Крейнфельд-Якоб

синдром Герстманга-Страуссера

- минифашикоз дельтаэпителия
(Белоруссия)

- отягощенная церебешарная атрофия I типа
(Якутия, Восточная Сибирь)

- фатальный семейный бессонница

маленькая дельтаэпителия бычков в ташкенте

- подострый энцефалит овца в Каз

- транссмиссионной энцефалопатии коров

- болезнь хронической усталости овец и
коз в Каз

- скрепы бычков в Каз

- энцефалиты

III группа

1. *Orthomyxoviridae*

вирусы гриппа А, В и С

- грипп

2. *Paramyxoviridae*

Род *Emboovirus*

вирусы полиомиелита - дитяе и титаны

- полиомиелиты

вирусы герпеса А и В

- интернальные герпесы

вирус простого герпеса человека
только человека (АНС)

- герпесовый вирус человека

4. *Herpesviridae*

вирусы простого герпеса I и II типов

- герпес простого

вирус ветряной оспы-ветрянка

- ветряная оспа, опоясывающий

вирус герпеса 6 типа (HBLV- HHV6)

герпетического лишая

- поражение В-лимфоцитов человека
роковой окраской.

лимфоцитарных заболеваний

вирус пятимегалит

- цитомегалит

вирус Эпштейн-Барра

- инфекционного мононуклеоза, лимфомы
Беркитта, неоплазмальной гиперплазии

IV группа

1. *Calicivirusidae*:

аппендикс вирус человека

- ОРН, инкубационный период 1-2 недели

2. *Coronaviridae*:

Род *Rotavirus*:

ротавирус человека

- рвота, гастроэнтерит

Род *Coronavirus*:

ротавирус человека, вирус джарем
содет Неймана (NCDV)

- гастроэнтерит и энтерит

3. *Stomatoviridae*:

вирусная инфекция человека

- ОРН (профузные высыпания без
температуры), энтерит

4. *Enteroviridae*:

вирус Норфолк

- острый гастроэнтерит

5. *Picornaviridae*:

Род *Enterovirus*:

вирус Коксаки группы А и В

- серозный менингит, энцефало-
миелит, ОРН, болезнь Бурнелли-
герши, полиомиелит

вирус ECHO

- серозный менингит, диссем. ОРН,
полиомиелит, ущемление

энтеровирусы - типы 68-71

- серозный менингит, полиомиелит,
ОРН

Род *Reovirus*:

ротавирус человека 1-30 типов

- ОРН, полиомиелит, диссемит,
полиомиелит

Род *Coronavirinae*

вирус эпифарингитиса карпа и вирус *Melepe* - ОРН, полимиокардитов, энцефалитов, миокардитов, энцефалитов, перикардитов

6. *Rotaviridae* (Ротавирусы)

вирус паравируса человека 1-4 типа

- ОРН, бронхопневмония

реовирусно-связанный вирус (РС-вирус)

- пневмония, бронхит, бронхопневмония

вирус мышечного паразита

- энцефалитического паразита

вирус кори

- кори

вирус Пинкхейтской болезни

- коклюшеподобная

7. *Todnaviridae*Род *Rubivirinae*

вирус краснухи

- краснуха

8. *Rhabdoviridae*Род *Rhabdovirinae*

вирус бешенного стоматита

- бешенного стоматита

9. *Paramyxoviridae* (вирус гриппа коров)

- оспа коров

вирус пастереллеми

- энцефалит мышечный

вирус рожков доистории

- хронической болезни рожков доистории

орфиовирус

- контагиозного лускушного паразита

вирус контагиозного паразита

- контагиозного паразита контагиозного

связанности

вирусы Тама и МСВ

бешенный МСВ

Хламидии

II группа

1. *Chlamydia pneumoniae*

- орвиозно-пневмоническая

III группа

1. *Chlamydia psittaci*

- гриппозно-утилизационного паразита

2. *Chlamydia felis*

- гриппозно-утилизационного

Грибы

II группа

1. *Blasiumites detritaefolius* - биастомитоза
2. *Coccidioides tenuis*, *Coccidioides passadensis* - кокцидиомитоза
3. *Histioplasma capsulatum var. capsulatum* и *debaryi* - истиплазмоза
4. *Pucciniaëtiopsis brevipes* - пущиниоидиомитоза

III группа

1. *Aspergillus flavus* - аспергиллез
- Aspergillus fumigatus*
- Aspergillus terreus*
2. *Candida albicans* - кандидоз
- Candida glabrata*
- Candida lusitana*
- Candida tropicalis*
3. *Cryptococcus neoformans* - криптококкоз
4. *Phaeoaphanoglyphus borysi* - феоафаноглифоз
5. *Penicillium notatum* - пенициллез
6. *Penicillium marneffei*

IV группа

1. *Asiella sp.* - асиеллез
2. *Asteromyces sp.* - астеромицетоз
3. *Albugo sp.* - филофтороз
4. *Arthrospora fischeri* (такоже *Arthrospora*) - филофтороз
5. *Ascochyta blight* - аскохитоз
6. *Aspergillus sp.* * - аспергиллез
7. *Ascochyta blight* - аскохитоз
8. *Ascochyta blight* - аскохитоз
9. *Ascochyta blight* - аскохитоз

10. <i>Volcaniulus caesariolus</i>	- ботриомикоз
11. <i>Strobilic spp.</i> *	- капицоз
12. <i>Strobilicium spp.</i>	- феогиофитомикоз
13. <i>Strobilicium caesariolus spp.</i> *	- феогиофитомикоз
14. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- энтомофитомикоз
15. <i>Strobilicium spp.</i>	- энтомофитомикоз
16. <i>Strobilicium spp.</i> *	- дерматофитомикоз
17. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- яттифитомикоз
18. <i>Strobilicium spp.</i>	- феогиофитомикоз
19. <i>Strobilicium spp.</i>	- дерматофитомикоз
20. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- дерматофитомикоз
21. <i>Strobilicium spp.</i>	- феогиофитомикоз
22. <i>Strobilicium spp.</i>	- феогиофитомикоз, энтомофитомикоз
23. <i>Strobilicium spp.</i>	- энтомофитомикоз
24. <i>Strobilicium spp.</i>	- энтомофитомикоз
25. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- феогиофитомикоз
26. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- энтомофитомикоз
27. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- энтомофитомикоз, дерматофитомикоз
28. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- черной плесени
29. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- болезням
30. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- энтомофитомикоз
31. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- энтомофитомикоз
32. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- энтомофитомикоз
33. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- энтомофитомикоз
34. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- дерматофитомикоз
35. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- энтомофитомикоз
36. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- энтомофитомикоз
37. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- энтомофитомикоз
38. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- энтомофитомикоз
39. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- феогиофитомикоз
40. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- энтомофитомикоз
41. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- энтомофитомикоз
42. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- энтомофитомикоз
43. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- феогиофитомикоз
44. <i>Strobilicium caesariolus</i>	- феогиофитомикоз

43. <i>Phylloxera</i> sp.	- филофторозоза
46. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
47. <i>Phoma</i> sp.	- черной шельры
48. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
49. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
50. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
51. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
52. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
53. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
54. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
55. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
56. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
57. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
58. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
59. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
60. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
61. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
62. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
63. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
64. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
65. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
66. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
67. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
68. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза

* кривые выходов, соответствующие III группе

Приложение

III группа

1. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
2. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
3. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
4. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза
5. <i>Phoma</i> sp.	- фотифомитоза

Plasmodium ovale

4. <i>Trichomonas vaginalis</i>	- трихомонада трихомониаза
5. <i>Trypanosoma cruzi</i>	- американская трипаносома (Болезнь Шагаса)
6. <i>Trypanosoma brucei</i> и др.	- африканского трипанозома (сонная болезнь)

IV группа

1. <i>Acinetobacter spp.</i>	- ацинетобактериалы
2. <i>Bifidobacterium</i>	- бифидобактерии (микрофлора)
3. <i>Blastomycosis coli</i>	- бластомицоз
4. <i>Blastomyces dermatitidis</i>	- бластома
5. <i>Cryptosporidium parvum</i>	- криптоспоридиоз
6. <i>Cyclospora cayentensis</i>	- циклоспороз
7. <i>Eutimaella histolytica</i>	- эвтимоз
8. <i>Exorhiza</i>	- экзориза
9. <i>Leishmania mexicana (Leishmania donovani)</i>	- лейшманиоз
10. <i>Leishmania tropica</i>	- лейшманиоз
11. <i>Naegleria</i>	- наггериоз
12. <i>Sarcocystis</i>	- саркоцистоз
13. <i>Trachymon</i>	- трахимон

Тельминты

III группа

1. <i>Exorhiza</i>	- экзориза
2. <i>Exorhiza</i>	- экзориза
3. <i>Trichomonas</i>	- трихомонада

IV группа

1. *Amelastemma amabile* - амеластемноз
2. *Anisakis* spp. - анисактоз
3. *Ascaris lumbricoides* - аскаридоз человека
- Anisakis* spp.
4. *Clonorchis sinensis* - клонорхоз
5. *Dicrocoelium lanceolatum* - дикроиеллиоз
6. *Dioctophyme stenos* - диоктофомоз
7. *Dipylidobothrium latum* - дипилидиотрихоз
- Dipylidobothrium latum*
- Dipylidobothrium latum*
8. *Diphylidium caninum* - дипиллидиоз
9. *Eurofilaria eximia* - еврофиляриоз
- Eurofilaria eximia*
10. *Eustrongylus axei* - еустронгулез (рептил)
11. *Exocytetes varicostatus* - экситетоз
12. *Fasciola hepatica* - фасциолез
- Fasciola hepatica*
13. *Fasciolopsis buski* - фасциолопсидоз
14. *Haemonchus contortus* - гематомастоидоз
- Haemonchus contortus*
15. *Loa loa* - лозоз
16. *Mesitarsus yokogawai* - мезитарсиоз
17. *Mollicorax mollicorax* - моллицороз
18. *Neotrophus schubertorum* - неотрофиятизм
19. *Nippostrongylus brasiliensis* - ниппостронгулез
20. *Oxyuris equi* - окситориоз
- Oxyuris equi*
21. *Paragonimus westermani* - паратонимоз
22. *Pseudotrophus tenuicollis* - псевдотрофиномоз
23. *Rundia* - рундияноз
24. *Schistosoma haematobium* - шистосомоз хронический
25. *Schistosoma mansoni* - шистосомоз типичный
- Schistosoma mansoni*
- Schistosoma mansoni*
26. *Strongylus vulgaris* - стронгулез

27. *Taenia solium* - тениоз
 28. *Taeniachnema saginata* - тенинхинкоза
 29. *Taenia saginata* - тенинхинкоза
Taenia spiralis
Taenia solium
 30. *Trichostrongylus axei* - трихостронгозо

Членистоногие

III группа

1. *Xenopsylla chesteri* - ксенопсид

IV группа

1. *Dermatex foliaceus* - дерматексоз
 2. *Pediculus corporis* - педикулез
Pediculus vestimentis
 3. *Phthirus pubis* - фтириоз
 4. Клещи домашней мыши - аллергии (аллергический бронхит, бронхиальная астма)
 5. *Oxalis capensis* - оксалидоз

Яды биологического происхождения

II группа

1. Ботулотоксин (токсин ботулизма)
 2. Холерный токсин
 3. Стербильный токсин

III группа

1. Микотоксины - микотоксикозы
 2. Дифтерийный токсин
 3. Стрептококковый токсин группы А
 4. Стафилококковые токсины

Пастеризированные ацидоуравновешенные питательные вещества I - II группы относятся к микроуравновешенной III группы питательности. Ацидоуравновешенные питательные III - IV групп относятся к IV группе питательности.

Обеспечение приложением обеззараживающих при осуществлении работ в ПБА

Таблица 1

1. Биостерили, не образующие споры	
1.1. Химический метод обеззараживания с использованием растворов дезинфицирующих средств	
1.1.1. Хлорактивные:	
хлорами (содержание активного хлора - АХ, не менее 24%):	
0,5 - 1,0%-е растворы (по применению)	
содохлорит каменный - содержание АХ 45 - 54%.	
1%-е осветляющие растворы, содержащие не менее 5% АХ;	
дезинфицирующие средства на основе хлоресовой соли дихлордигидроуксусной кислоты (таблетки, гранулы).	
дезинфицирующие средства на основе трихлоруксусной/масляной кислоты (таблетки, гранулы).	
сидохлорит натрия (содержание активного хлора не менее 14%):	
1%-й (или АХ) раствор.	
другие средства на основе хлорактивных соединений	
1.1.2. Кислородные:	
- водород перекиси медицинская (содержание перекиси водорода - ППВ не менее 30%):	
5,0 - 10%-е (или ППВ) растворы	
1.1.3. Средства на основе алкильных гипертонично-активных веществ.	
1.1.4. Альдегиды:	
дезинфицирующие средства на основе glutaraldehyde.	
1.1.5. Жидкие антисептики на основе:	
спирта этилового (не менее 70% по массе):	
спирта изопропилового (не менее 60% по массе):	

свежий спирт (не менее 60% по массе)
1.2. Физические методы обеззараживания
1.2.1. Кипячение:
вода;
2% раствор натрия двууглекислого
2%-й раствор кальцинированной соды
1.2.2. Обработка горячим насыщенным паром под избыточным давлением в паровом стерилизаторе (автоклаве):
0,20 МПа (2,0 кгс/см ²), (132 ± 2) °С;
0,15 МПа (1,5 кгс/см ²), (126 ± 2) °С;
0,11 МПа (1,1 кгс/см ²), (120 ± 2) °С.
1.2.3. Обработка горячим воздухом (130 °С) в воздушном стерилизаторе.
1.2.4. Обработка СВЧ-излучением.
1.2.5. Сублимация.
1.2.6. Обработка в дезинфекционных камерах (пареоудруткиль, паровой и парогормашинный методы).
1.2.7. Ультрафиолетовое излучение.

Таблица 2

3. Бактериальное обеззараживание
3.1. Химический метод обеззараживания с использованием дезинфицирующих средств
3.1.1. Хлорактивные:
хлоргексидин (содержание активного хлора - АХ, не менее 24%);
1 - 4%-е активированные растворы, содержащие АХ 0,25 - 1%;
гипохлорит кальция - содержание АХ 45 - 54%;
15%-е осветленные растворы, содержащие не менее 5% АХ;
дезинфицирующие средства на основе натрия хлора, хлорированной

трикуты (таблетки, гранулы).

псевдофитотропные средства на основе трифтороуксусной кислоты (таблетки, гранулы).

другие средства на основе аморфных соединений

2.1.2. Кислородоактивные:

Водород перекиси (в качестве окислительно-щелочных веществ (ПАВ).

добавляемых к растворам перекиси водорода, следует использовать не менее 2 в своем составе ферментных добавок, ведущих к дезактивации перекиси водорода). содержание ПВ не менее 30%:

3%-й по ПВ раствор с 0,5% моющего средства при 50 °C;

6%-й по ПВ раствор с 1,5% моющего средства при 20 и 50 °C;

10%-й по ПВ раствор;

6%-й по ПВ раствор с 1% изрядной кислотой и 0,1% ПАВ.

средства на основе ПВ и других окислительно-щелочных соединений

2.1.3. Алкалоиды:

формалин (содержание формальдегида 40%);

20%, 40%-е по формальдегиду водные растворы.

дезинфицирующие средства на основе глутарового альдегида

2.1.4. Щелочи:

содн вода

10%-е по препарату раствор при температуре 70 °C.

2.2. Физические методы обеззараживания

2.2.1. Кипячение.

вода:

2%-й раствор натрия двууглекислого

2%-й раствор калиймарганцовый вода.

2.2.2. Обработка паром насыщенным паром под давлением (давлением в паровом стерилизаторе (автоклав):

0,20 МПа (2,0 кг/см²), 115-120 °C.

2.2.3. Обработка тканей излучением (180 °C) в вакуумной стерилизаторе.
2.2.4. Обработка СВЧ-излучением.
2.2.5. Обработка дезинфекционными клотрами: трихлорированный, трифторолигвиниловый, шариковый методы.

Таблица 3

1. Вирусы и химидия
3.1. Химический метод обеззараживания с использованием дезинфицирующих средств
3.1.1. Хлорактиваторы:
хлорамины (содержание активного хлора - АХ, не менее 24%):
1 - 4% (или препарат) раствора;
0,3%, 1,5% (по препарату) хлорокислотные растворы хлорактиватор (в качестве активаторов хлорных препаратов могут быть использованы окислительные соли: гипохлорит натрия или гипохлорит кальция) в соотношении с хлорамином препаратом 1:1 или 1:2 и использовать в соответствии с хлорактиватором (1:8).
свободный хлорактиватор - содержание АХ 45 - 50%;
15%-е окислительные растворы, содержащие не менее 5% АХ;
дезинфицирующие средства на основе натриевой или хлорокислотной кислоты (таблетки, гранулы)
дезинфицирующие средства на основе трихлорометилсульфоновой кислоты (таблетки, гранулы).
другие средства на основе хлорактиваторов, окислителей
3.1.2. Окислительные:
водорода перекись (содержание ПВ не менее 30%):
3, 6 и 10%-е растворы (или ПВ);
водородная перекись медная с окислительными средствами:
(3, 6 и 30%-й раствор ПВ с 0,5% окислительного средства);
3, 6 и 30%-й (или ПВ) раствор.

3.1.3. Спирты:
спирт этиловый (не менее 70% от массы).
3.1.4. Щелочи:
гидроксид натрия паста влажная (1%-ный водный раствор).
3.2. Физические методы обеззараживания
3.2.1. Обработка горячим воздухом (180°C) в воздушном стерилизаторе.
3.2.2. Кишечник:
зола;
3% раствор натрия двууглеклоса;
2%-й раствор кальцинированной соды.
3.2.3. Обработка водяным насыщенным паром под избыточным давлением в шаровом стерилизаторе:
0,20 МПа ($2,0 \text{ кгс/см}^2$), $(115 \pm 2)^{\circ}\text{C}$;
0,15 МПа ($1,5 \text{ кгс/см}^2$), $(126 \pm 2)^{\circ}\text{C}$;
0,11 МПа ($1,1 \text{ кгс/см}^2$), $(120 \pm 2)^{\circ}\text{C}$;
3.2.4. Обработка 4, ВЧ-излучением.
3.2.5. Сжигание:
3.2.6. Обработка в дезинфекционных камерах паровоздушными, прямыми и паровыми ионизирующими источниками.
3.2.7. Ультрафиолетовое излучение.

Таблица 4

4. Ракетостен
4.1. Хирургический метод обеззараживания с использованием дезинфицирующих средств
4.1.1. Хлорактиваторы:
хлоргексидин (содержание активного хлора - ΔX , не менее 24%);
1, 3%-е (по препарату) растворы;

0,5%-й (по препарату) эмульсионный раствор хлорампина (в качестве эмульгатора хлорампин преобразован в форму мыла); быть не должно органических солей галогенов, сульфат или вытрав: аммония в соотношении с жирными препаратами 1:1 или 1:2 или эмulsion в соотношении с жирными средствами 1:8).

тиохлорит кальция - содержание АХ 46 - 54%;

15%-е осветляющие растворы, содержащие не менее 5% АХ;

другие средства на основе хлорампина с эмульгатором.

4.1.2. Кислородоактивные:

перманганат калия (содержание ПО не менее 30%);

9%-й, 6%-й и 15%-е растворы (по ПВ);

водород перекись метилгидрокси с мощными средствами;

(3, 6 и 30%-й раствор ПВ с 0,5% мощными средствами);

1, 6 и 30%-й (по ПВ) раствор.

4.1.3. Спирты:

этанол этиловый (не менее 70% по массе)

4.2. Физические методы обеззараживания

4.2.1. Кипячение:

порода;

2% раствор натрия дихлоридного

3%-й раствор калийной перманганатной соли.

4.2.2. Обработка паром или кипячением паров под давлением, давлением и паром стерилизации (жестокость):

0,20 МПа (2,0 кгс/см²), 1152 ± 30 °C;

0,11 МПа (1,1 кгс/см²), 1120 ± 20 °C.

4.2.3. Обработка СВЧ-излучением.

4.2.4. Сжигание.

4.2.5. Обработка в дезинфицирующих камерах: окислительный, лавина и парогидратный газ.

5.1. Работы	
5.1.1. Химический метод обеззараживания с использованием дезинфицирующих средств	
5.1.1.1. Хлорактивные	
Хлорактив содержащий активное хлора - АХ, не менее 24%:	
1%-й (по АХ) активированный раствор (в качестве окислителя хлорных препаратов могут быть использованы калийгипохлорит, хлорид, сульфит или нитрит натрия) в соотношении с хлорным препаратом 1:1 или 1:2 или двукрат в соотношении с хлорактивом средством 1:8);	
5%-й (по препарату) раствор.	
Гипохлорит кальция:	
15%-й насыщенный раствор, содержащий не менее 5% активного хлора;	
5%-й (по препарату) раствор	
другие средства на основе хлорактивных соединений	
5.1.2. Кислородные:	
водорода перекиси водорода (содержание ПВ не менее 30%):	
3, 6%-е растворы (по ПВ) с 0,5% щелочного средства;	
10%-й раствор (по ПВ);	
другие средства на основе окислительно-активных соединений	
5.2. Физические методы обеззараживания	
5.2.1. Кипячение	
в воде:	
2% раствор пивной двуокиси	
2%-й раствор калийгипохлоритной соли.	
5.2.2. Обработка горячим насыщенным паром под избыточным давлением в паровом стерилизаторе:	
0,20 МПа (2,0 кгс/см ²), (132 ± 2) °С;	
0,15 МПа (1,5 кгс/см ²), (126 ± 3) °С;	
0,11 МПа (1,1 кгс/см ²), (120 ± 2) °С	

5.2.3. Сварганаа	
5.2.4. Обработка ГЯЧ-излучением.	
5.2.5. Обработка в дезинфекционных камерах: пароводуптчатый и пареформалевый методы.	
5.2.6. Ультратрфолетовые излучения.	

№ п/п	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Обеззараживающее средство	Длительность обеззараживания, мин.	Форма упаковки
5	Эпидемиологическая обстановка (заболевания, вспышки, случаи заболевания, болезни, заболевания)	Паровой стерилизатор (автоклавы)	Растворы дезинфицирующих средств в виде ЧАС, триамина, ППАМХ Вспениваемый пар под давлением 1,1 кг/см ² (0,11 МПа), (120±2) °С	30	
	Кипячение		2%-й раствор кальцинированной соды или 0,5%-й раствор перманганата калия	15	
	Дезинфекция в ваннах из дезинфицирующих растворов с последующей стиркой и полосканием		1%-й раствор хлорамина 3%-й (раствор) хлорамина 0,5% по АХ раствор дезинфицирующего средства на основе натрия соли дихлордигидроуксусной кислоты или трихлоруксусной/уксусной кислоты	120 30 60	3 дня 1 кг сухого белиз
			3%-й раствор по ПР в водоразбавленной 0,5% моющего средства	60	
			Раствор дезинфицирующего средства в соотношении 1:1000		В соответствии с инструкцией по применению производителя препарата

№ п/п	Объект, подлежащий обезвреживанию	Способ обезвреживания	Обезвреживающее средство	Према обезвреживания, млн	Норма расхода
			0,2% - 0,4% (по массе ДР) водорастворимых дефлорантов, средств на основе ЧАС, триамина, ПГАМХ		
6	Первичное доочистение	Полный аэрированный (аэротанк)	Водный растворитель при дозировке 1,1 кг/м ³ (0,11 МЛД), (1,20± 2) °С	45	
		Кипячение	2% раствор поташа, двууглекислый	15	
		Погружение	1%-й раствор хлорамы Т	120	
			0,4% по АХ раствор дефлорантов, средств в основном натриевый соли, дитиокарбонилсульфид, карбамид или трихлорэтилен(этанол) хлориты	60	
			3%-й раствор (по ДР) водорастворителя с 0,2% этанол и средств	30	
			0,2% - 0,4% (по массе ДР) водорастворимых дефлорантов, средств на основе ЧАС, триамина, ПГАМХ	В соответствии с нормативной или проектной	
7	Очистка, подлежащая обезвреживанию	Диспергирование с применением инсектицидов 15 мин с последующим	3%-й раствор по ДР водорастворителя с 0,2% этанол и средств	30	

№ п/п	Систем. наименование	Способ обезвреживания	Обезвреживающее средство	Время обезвреживания, мин.	Норма расхода
		Полное сжигание			
		Влажное	Раствором концентрированной азотной кислоты на основе водород пероксида в других окислительных средах	В соответствии с инструкцией по применению производителя шредера	
9	Рабочая область, резинчатый сапог	Дезинфекция	4,2% - 0,4%-е (по сухому ДД) В соответствии с инструкцией по применению раствора дезинфицирующего средства на основе ЧАС, триклона, ПРМТХ		
		Дезинфекционный раствор	50%-й этиловый спирт	30	
		Дезинфекционный раствор	1%-й раствор марганца В	60	
		Дезинфекционный раствор	Пароформалиновый метод, 37 - 50 °С	45	Формалина 7,5, 0,1 мл/м ² (30 мл/м ² полевой площади камер)
10	Рабочая область, чаше, кулеса, минибассейн	Дезинфекция	Парофлуоридный метод, 30 - 30 °С	20	40 кг/м ² полевой площади камер
		Дезинфекция	Парофлуоридный метод, 30 - 30 °С	45	60 кг/м ² полевой площади камер
11	Предельная нагрузка, обвалы и обвалы в 100 чаше из натуральной кожи и меха	Дезинфекция	Парофлуоридный метод, 37 - 39 °С	45	Формалина 7,5, 0,1 мл/м ² (30 мл/м ² полевой площади камер)

№ п/п	Субъект, выполняющий обязательную	Способ обезвреживания	Обезвреживающее средство	Прямой обезвреживающий эффект	Потребляемые ресурсы
14	Иркутск	Кипячение (варка шламобойками)	0,03 - 0,08%-е (по сушке ДТН) растворы дезинфицирующих средств на основе ЧАС, триклона, ПТДХ	15	Тысячи литров воды
		Щелужение при температуре 100-120°C	0,5%-й раствор едкого натра, бикарбонат натрия	60	Тысячи литров воды
		Щелужение при температуре 100-120°C	0,5%-й раствор хлорный	60	Тысячи литров воды
		Щелужение при температуре 100-120°C	0,25%-й щелочной раствор КГН	60	Тысячи литров воды
		Щелужение при температуре 100-120°C	0,02%-й по АХ раствор дезинфицирующих средств на основе натриевой соли хлорированной этиленгликолевой кислоты	15	Тысячи литров воды
		Щелужение при температуре 100-120°C	3%-й по ПД раствор хлорной кислоты с 0,5% новокаина	15	Тысячи литров воды
		Щелужение при температуре 100-120°C	Растворы дезинфицирующих средств на основе перманганата калия	15	Тысячи литров воды
		Щелужение при температуре 100-120°C	0,03%- 0,04%-е (по сушке ДТН) растворы дезинфицирующих средств на основе ЧАС, триклона	15	Тысячи литров воды

№ п/п	Объект, подлежащий обследованию	Способ обследования	Оборудование/средство	Пример обследования	Норма расхода
			ЦУ МГХ		
15	Бактериологическое исследование	Парный серийный тест (попал)	Водный потенциалный пар для давления 1,5 кг/см ² (0,15 МПа), (12% ± 2) °C	40	
		При осуществлении обследования в лабораториях с уровнем обеспечения - поуровневое - поуровневое в один из лабораторийных растворов, указанных в пункте 4 настоящей главы Таблицы 6, в 24 ч			
16	Результаты проб, выполненные методом микробиологического исследования для предотвращения заражения человека, животного, домашнего животного	Каплевые	Вода	30	
		Парный серийный тест (попал)	Водный потенциалный пар для давления 1,5 кг/см ² (0,15 МПа), (12% ± 2) °C	40	
17	Бактериологическое исследование, связанное с загрязнением воздуха, почвы, воды, пищи, одежды, предметов, находящихся в помещении	Применение в помещении			
18	Инструментальное исследование	Парный серийный тест (попал)	Водный потенциалный пар для давления 1,5 кг/см ² (0,15 МПа), (12% ± 2) °C	30	
	Исследование, связанное с загрязнением воздуха, почвы, воды, пищи, одежды, предметов, находящихся в помещении	Каплевые	2% раствор ватной пропитки	15	
			Вода, загрязненная 100 °C	30	
	Применение патологического исследования работ	Цитология	1% раствор ватной пропитки	30	

№ п/п	Объект, подлежащий обязательному	Способ обследования	Область применения средства	Время обследования, мин	Метод расчета
			Дезин (по ДБ) раствор в водород пероксиде 0,5% минимального среднего	80	
			Раствором дезинфицирующих средств на основе водород пероксида	В соответствии с инструкцией по применению препарата	
			Раствором дезинфицирующих средств на основе хлорамина	В соответствии с инструкцией по применению	
			0,2% по АХ раствор дезинфицирующих средств на основе хлорамина	В соответствии с инструкцией по применению препарата	
			0,2% - 0,5% (по среднему ДБ) раствор дезинфицирующих средств на основе "ДБ", триклоксим	В соответствии с инструкцией по применению	
19	Ручка в эксплуатации перчатках по время работы с ДБ	Погружение и мытье	Дезинфицирующее средство в перчатках в течение 6 часов	2	
20	Пешинизация	Протирание	0,5%-й раствор хлорамина	2	

№ п/п	Субстр. питательный обезжиренный	Способ обезжиривания	Обезжиренность средой	Время обезжиривания, мин.	Норм. расхода
21	Участки кожев. групп	тампонаж, смачивание (раствором, затем вынос каплей воды с фильтровальной бумагой из котла).	Кожное эпителирование на чистом спирте этиловом (не менее 90% по массе), водной экстракционной (не менее 60% по массе), смесью спиртов (не менее 60% по массе)	В соответствии с инструкцией по применению пропитываемых изделий	
		выщелачивание: выносом щелочного раствора	1%-й раствор хлористого		
22	При ламинации лафетного материала на участки, где в случае пачания используются	Широкий стерилизатор (автоклавы)	Кожное эпителирование на чистом спирте этиловом (не менее 90% по массе); водной экстракционной (не менее 60% по массе); смеси спиртов (не менее 60% по массе)	В соответствии с инструкцией по применению пропитываемых изделий	
		Занимает до 12 часов при температуре 120-130 °C	60		
23	Клетки, окислы для окисления полярных животных	Занимает до 12 часов при температуре 120-130 °C	24 ч	24 ч	
		Занимает до 12 часов при температуре 120-130 °C	24 ч		
24	Порошок	Занимает до 12 часов при температуре 120-130 °C	Водной экстракционной	30	
		Занимает до 12 часов при температуре 120-130 °C	Водной экстракционной		

№ п/п	Объект, подлежащий обследованию	Способ обследования	Обязательные средства	Время обследования, мин.	Норма расхода
	Вскрытие и обследование наружной теплоизоляции	Стереометрический (автоматический)	давление 1,5 МПа ² (0,15 МПа), (126 ± 2) °С	60	300 м ² /ч ²
		Воздушный стереометрический	Температура 160 °С		
		Потрушение	3%-й раствор хлористого		
		Оптическое	4%-й раствор хлористого		
			5%-й (по ГИ) раствор водной перекиси (0,5% водного) раствора		
3.4	Вскрытие базальтового фаянса	Средоточ. теплоты, выходящей в направлении теплоизоляции	Применяют средства, указанные в пункте 2. теплоты фаянса	45 ч	
		Потрушение	Циркулянт раствора, указанного в пункте 2. теплоты фаянса		
		Циркулянт	Циркулянт раствора, указанного в пункте 2. теплоты фаянса		
		Воздушный стереометрический (автоматический)	Подачей воздушной среды под давлением 2,0 МПа ² (0,2 МПа), (112 ± 2) °С		
		Автоматический	Растаивание раствора перекиси водорода на поверхности		
	Вскрытие и обследование наружной теплоизоляции	Установка для обследования	Средоточ. теплоты	В соответствии с инструкцией по применению прибора для проверки	В соответствии с инструкцией по применению
		Установка для обследования	Средоточ. теплоты	В соответствии с инструкцией по применению прибора для проверки	

№ п/п	Объект, подлежащий обязательной	Способ обязательной	Обязательное средство	Время обязательности, мин.	Норма расхода
25	Трубы железобетонные, стальные, чугунные, материалы, используемые	обязательная	ошибка воздуха, выделение к предмету, а также указание	30	производительность
		обязательная	ошибка воздуха, выделение к предмету, а также указание		
		обязательная	ошибка воздуха, выделение к предмету, а также указание		
26	Объекты, подлежащие обязательной	обязательная	ошибка воздуха, выделение к предмету, а также указание	30	производительность
		обязательная	ошибка воздуха, выделение к предмету, а также указание		
		обязательная	ошибка воздуха, выделение к предмету, а также указание		
27	Объекты, подлежащие обязательной	обязательная	ошибка воздуха, выделение к предмету, а также указание	30	производительность
		обязательная	ошибка воздуха, выделение к предмету, а также указание		
		обязательная	ошибка воздуха, выделение к предмету, а также указание		
28	Объекты, подлежащие обязательной	обязательная	ошибка воздуха, выделение к предмету, а также указание	30	производительность
		обязательная	ошибка воздуха, выделение к предмету, а также указание		
		обязательная	ошибка воздуха, выделение к предмету, а также указание		

№ п/п	Объект, подлежащий обязательной	Способ исследования	Обеззараживающее средство	Прямая обеззараживающая доза	Норма дозы/мг
		Ушаченко		30	
		Защипаль и размешать	Сухая хлорная известь ВЛБ	400	
			Большая коррозийная известь или КГН		
			ДСГК	120	200 г/л
			Дезинфицирующее средство в виде порошка или гранул на основе палтумовой соли	75 соответствия с инструкцией по применению	200 г/л
22	Взвешивать, фасовать, упаковывать, выставлять	Защипаль и размешать	Сухая хлорная известь или Большая коррозийная известь или ДСГК	60	200 г/л
			КГН	120	150 г/л
				30	200 г/л
			Дезинфицирующее средство в виде порошка, гранул или раствора по основе гипохлоритной соли	400	В соответствии с инструкцией по применению
			Дезинфицирующее средство в виде порошка, гранул или раствора по основе гипохлоритной соли	120	200 г/л марка А

№ п/п	Объект, подлежащий обследованию	Способ обследования	Средств и материалы	Время обследования, мин.	Норма расхода
28	Мониторинг состояния почв на территории предприятия	Дачка и анализ с использованием индикаторных растений	1-й раствор: 10% раствор хлорной кислоты или 10% раствор азотной кислоты 2-й раствор: 10% раствор азотной кислоты 3-й раствор: 10% раствор азотной кислоты	60 60 60	300 г/га 300 г/га 300 г/га
		Защитные средства и реагенты	Дезинфицирующие средства на основе гипохлорита натрия или перманганата калия		В соответствии с инструкцией по применению
		Земля, в состав которой входит органический материал	Дезинфицирующие средства на основе 4% раствора, 10% раствора хлорной кислоты с использованием индикаторных растений	15	10 г/га
		Земля и растительность	Хлорная кислота или азотная кислота	15	30 г/га
29	Посадка новых выхаживаемых животных (телят, поросят, свиней, коз)	Прогулка в один из дней	1-й раствор: 10% раствор хлорной кислоты или 10% раствор азотной кислоты	30	
		Материалы с индикаторными растениями	0,5%-й раствор ХЛП	30	
		Материалы	10% раствор хлорной кислоты	60	

№ п/п	Объект, подлежащий обезвреживанию	Гипотез обезвреживания	Средства/экономичнее средство	Время обезвреживания, мин.	Формы расхода
	оборудование	калорифер; смонтирован в системе дезинфицирующих растворов	основное вещество в виде дезинфи- цирующих растворов, хлороксы для траншеи/дезинфицирующий порошок 0,1-0,3% - 0,04%-е (по сушке ДД) растворы дезинфицирующих средств вв основе CaCl_2 , трикомпл. ПТУМТХ		
32	Уборочный материал: пеллеты, опилки травы, ветки, сафлоры	Калорифер; дезинфицирование	2%-й раствор хлорангидрида соль 3%-й раствор хлорангидрида 0,08%-й (по АХ) раствор КДН 0,2% по АХ раствор дезинфицирующих средств на основе патентованной соли дезинфицирующей (соль) эвентри- лизирующей (соль) эвентри- 2%-й (по ДД) раствор поваренной соли с 0,5% моющего средства	15 60 120 60 120	Пошаговое обезвреживание
			0,03% - 0,04%-е (по сушке ДД) растворы дезинфицирующих средств на основе CaCl_2 , трикомпл. ПТУМТХ	В соответствии с инструкцией по применению препара- та/ингредиента	
33	Растворы отходов	Смонтирован			по 1 часть раствора 2

№ цп	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Обеззараживающее средство	Ареал обес- зараживания, мил.	Норма расхода
34	Навозные тухляки, загрязненные швы, защитные контейнеры	Выружывание в дезинфицирующей раствор	0,4%-й раствор гипохлорита кальция 20%-е уксусно-азотное жидкое	100 60	таблетки дезинфицирующего раствора 300 мл/м ²
		Орошение	0,4%-й раствор КДПТ	60	300 мл/м ²
		Орошение с посетростями пропаривания сухой извешной сапфиткой	Для помещений извешивающих дезинфицирующее устройства в пункте 2 вывешивать таблетки Таблетки 6)	40	300 мл/м ²
35	Транспорт после транспортировки биомасса	Аэрозольный метод в помещениях и в извешивании при использовании для размещения транспортировки средств. Растворение растворов в шлюзах интенсивной мыши турбулентности аэрозольных капсул. ЛБД аэрозольного генератор АСЦ	15%-й раствор КДН, содержащий 3% АХ	60	100 мл/м ²
			0,4%-й (по ПН) раствор жидкого перекиси с 0,5% жидкого средства для дезинфицирующих средств на их основе	30	400 мл/м ²

№ п/п	Объект, подлежащий обследованию	Способ обследования	Обеззараживающее средство	Норма расхода, мл/м	Норма расхода
36	Машина для транспортировки лент с грузом	Каплевание	2%-й раствор компотприматива Солпа Доза, лентература 10/20°C	30	
37	Машина-опылитель, работающая на култур	Покружение	1%-й эмульсия спарт, севса Насекомое с инсектицидом используемым в дезинфекторной раствор. улитный в норме 10 используемый 10/20°C	20	
38	Машина на самостарательных материалах	Дезинфекция камера	Паровоздушный метод 80 - 90 °C	20	60 кг/м²
39	Фунгициды, часть противогрибков	Покружение	1%-й раствор хлорамин	5 м	
40	Фунгициды, часть фунгицидов	Покружение фунгицидов	Формалин 40% (подвержен). Нормы: содержащий ленте фунгициды, противогрибков через културу, используемая эмульсия (хлорамин) содержащая фунгициды, применяемые парамин эмульсия; применяемые противогрибков, применяемые противогрибков, применяемые противогрибков, применяемые	5 м	60 м/м формалин и 60 м/м воды, применяемые в эмульсии фунгицидов используемых в норме 10/20 °C и отпавших в норме 10/20 °C

№ д/л	Объект, подлежащий обезвреживанию	Способ обезвреживания	Обезвреживающее средство	Норма обезвреживания, мг/м ³	Норма расхода
			Раствор дезинфицирующего средства в соотношении с инвентарем по приложению 1а к плану мероприятий по ликвидации последствий аварии на объекте, подлежащем обезвреживанию		
			5%-й раствор гипохлорит натрия	120	300 м ³ /м ³
			8%-й раствор изотропной перекиси с 1% муравьиной кислоты и 0,2% сульфонов или СД-2У	60	
			11%-й раствор изотропной перекиси с 0,5% муравьиной кислоты	120	
			Раствор дезинфицирующего средства на основе изотропной перекиси или изотропной перекиси кислоты или трихлоризоциануровой кислоты	60	
			5%-й раствор гипохлорит натрия	120	
			1% в лн АХ активированный изотропной перекиси КТН или изотропной перекиси, или безыellow термостойкой оксидной или ИСГК	120	
			1%-й по АХ активированный раствор хлоридов	120	

В случае нарушения технологии обезвреживания замеры должны производиться в соответствии с п. 2.4

	8%-й (по АХ) раствор перекиси	120	300 м ³ /м ³

№ п/п	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Обеззараживающее средство	Время обеззараживания, мин.	Широкое применение
3	Защитная одежда персонала (халаты, клеветки, резиновые шапочки), обувь больного	Шаровой стерилизатор (автоматический) Кашинченко	перекись с 1% муравьиной кислотой и 0,3% сульфонов или ОФ-2У	60	
			10%-й (по ПП) раствор гидроксида пероксида с 1% муравьиной кислотой и 0,3% сульфонов или ОФ-2У		
			Раствор лизолецинового шара под давлением 3,0 кг/см² (0,2 МПа) (112 ± 2) °С	60	
			2%-й раствор кальцинированной соды	60	
			Раствор в 1%-й активированной соде	120	
4	Защитная одежда персонала (халаты, клеветки, резиновые шапочки), обувь больного	Пирозависимый дезинфицирующий раствор	Раствор дезинфицирующих средств в основе натриевой соли этилглюкозилсульфоната кальция или триалкилсульфоната уксусной кислоты	В соответствии с инструкцией по применению производителям препарата	
			1%-й (по ПП) раствор водородной перекиси с 0,5% муравьиной кислоты при температуре 50 °С	60	5-дневной защитной одежды
			2%-й раствор натрия дихлоруксусной	60	
			1%-й активированный раствор	120	
			6%-й (по ПП) раствор водородной	60	

№ п/п	Объект, подлежащий обезвреживанию	Способ обезвреживания	Содержащиеся в объекте средства	Время обработки, мин.	Норма расхода
5	Счист. отложения защитных экран, фонирования и другое	Дробление Дробление периодом 30 мин с последующим промыванием в мой	перекиси с 0,5% мыльного средства		
			0,5%-Н (по ПН) раствор водорода перекиси с 1% муравьиной. Использова на 0,3% сульфонов или СФ-2У	30	
			0%-Н (по ПН) раствор иодорида перекиси с 0,5% мыльного средства	60	
			0%-В (по ПН) раствор водорода перекиси с 1% муравьиной кислоты и 0,5% сульфонов или СФ-2У	30	
6	Рабочая обувь, резиновые сапоги	Дезинфекционная пемза	Парфюрминовый раствор 5% - 50 °С	105	Формальде 250 мл/м ² (18 л/м ² площади покрытия пола камеры)
			1%-Н алкилированный раствор хлоракрида	60	
			1%-й (по ПН) раствор пикриновой перекиси с 0,5% мыльного средства при температуре 50 °С	120	
			0%-Н (по ПН) раствор водорода перекиси с 1% муравьиной кислоты и 0,3% сульфонов или СФ-2У	30	
7	Рабочая одежда (в том числе куртки, комбинезоны)	Дезинфекционная установка	Цирконитовый раствор 97 - 98 °С	45	40 л/м ² площади одежды или камеры
			Таровой метод температура 104 -	60	50 л/м ² площади одежды

Кл. тип	Объект воздействия	Способ обезвреживания	Обезвреживающее средство	Норма обезвреживания, мг/л	Норма расхода
10	Пески боковые	Кипячение	доказано кипячением, кислотой или трихлорэтиленовой кислотой		
			1%-й раствор натрия двууглекислого	60	
		Потрушение	4%-й азотная (окислитель) раствор хлориды Fe	60	2 л на килограмм посуды
			4% Fe по АХ активированный раствор KCl H	60	
11	Интрубки	Кипячение	5%-й по АХ раствор гипохлорита хлориды	60	
			Раствор дезинфицирующего средства на основе натриевой соли трихлорэтиленовой кислоты или трихлорэтиленовой кислоты	В соответствии с инструкцией по применению производителя препарата	
			6%-й (по ПВ) раствор водоросля перекиси мелнигской или технической с 1% муравьиной кислоты и 0,5% сульфата или С.Ф.23	60	2 л на килограмм посуды
			2%-й раствор натрия двууглекислого	60	
			6%-й (по ПВ) раствор водоросля перекиси с 0,5% азотного раствора	60	
			4%-й по ПВ раствор ЦБК	60	

№ ст	Объект, подлежащий испытанию	Способ обследования	Обезвреживающее средство	Время обезвреживания, мин.	Илиная реакция
		Полужелез	1%-й азлызыровый раствор хлоридов	60	И-соединения в аспиринной по применению призывающих препаратов
			Раствор дезинфицирующих средств на основе хлорной соли		
			2%-й раствор перекиси водорода с 0,5% мыльного средства при температуре 50 °С	60	
			6%-й до 11% раствор водного перекиси в 1% мыльной эмульсии и 0,5% сульфата натрия (СФ-2У)	30	
12	Воспалительные процессы, острые гнойные заболевания мягких тканей	Паровой стерилизатор (автоклавы)	Водной насыщенного пар под давлением 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), (112 ± 2) °С	90	
13	Результаты проб, шпатель, микроскопическое исследование для выявления	Паровой стерилизатор (автоклавы)	Водной насыщенного пар под давлением 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), (112 ± 2) °С	90	
	инфекционных заболеваний	Кипячение	2% раствор натрия двууглекислого	60	
	серьезного материала				
14	Пациенты, имеющие заболевания	Прививание в поликлинике	План прививки		

№ п/п	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Специфические средства	Примеры обеззараживающих мик.	Нормы расхода
		с помощью лампы ультрафиолетового излучения	мелер 60% по массе; смесь спиртов (по массе) 60% по массе)		
18	Классы, здания для обеззараживания крытых животноводческих помещений	ультрафиолетовый и ультрафиолетовый с шариками 3 в	4%-й хлороформный раствор хлоромета. П 2%-й актипротинный окислительный раствор КДН, содержащий 1% АХ 4%-й актипротинный окислительный раствор ДСТК, содержащий 1% АХ 20%-й раствор хлорной извести или пыльный перекисно-водный раствор, содержащий не менее 5% АХ	48 ч 48 ч 48 ч 48 ч	
		Шаровой стерилизатор (аппарат)	6%-й (по ПП) раствор пероксида водорода с 0,5% калийного бромата 6%-й (сир. ПП) раствор золотухи перекись с 1%-муравьиной кислотой в 0,5%-содержании или СД-2У Нагреватель пластмассовый шар или давлением 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), (1,32 ± 0,2) °С	48 ч 24 ч 90	
19	Материальные здания, здания, здания, здания в процессе	Паровой стерилизатор (аппарат)	Водяной паровой паровод, давлением 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), (1,32 ± 0,2) °С	90	

№ п/п	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Обеззараживающее средство	Время обеззараживания, мин.	Другая информация
20	содержащие впитавшиеся жидкости	Обработка горячим воздухом	180 °С	60	
	Трубы змеевиковые, шланги/шланги материал, вышедший из строя, остатки	Дезинфекция стерилизатор (автоклавы)	Раствор хлорсодержащий для под давлением 2,0 атм (0,2 МПа), (132 ± 2) °С	90	
	жидкостные остатки	Сжигание			
21	Помещения амбулаторных	Дезинфекция при помощи с выхлопом (10 мин)	20%-й окислительный раствор хлорной кислоты для бытового применения из расчета 1 мл на 1 л воды 5% АХ	120	900 м ² для подоконных выхлопных помещений (штукатурка, кирпич и другие материалы)
			1,5%-й окислительный раствор КТН, окислитель 5% АХ	120	
			4%-й окислительный раствор хлоридов	120	
			Раствор дезинфицирующего средства на основе перекиси водорода для дезинфекции (0,05% ДНП) или 0,1%-й перекиси водорода	В соответствии с инструкцией по применению при применении	
			6%-й (по ПВ) раствор перекиси водорода с 0,5% йодного спирта	120	
			6%-й (по ПВ) раствор перекиси водорода с 1% уксусной кислоты	60	

№ п/п	Объект, подлежащий обезвреживанию	Способ обезвреживания	Обезвреживающее средство	Время обезвреживания, мин.	Циркуляция
22	Водоотводящие сооружения	Бродяжение приливом с выведением 40 мин. после того, как уровень воды в приливливательной мешине, заканчивается в сепаратор или доливливатель	в 0,3% сульфатов или $\text{CaO} \cdot 2\text{S}$	120	500 $\text{м}^3/\text{ч}$ из расчета среднечасового
			10%-й раствор едкого натра при температуре 70 °C		
			4% и (или CaO) раствор едкого натра с концентрацией в 0,5% едкого натра		
23	Жидкие отходы, содержащие металлы и органические вещества	Парный обезвреживатель (паровый)	6%-й (или CaO) раствор едкого натра с концентрацией в 1% едкого натра при температуре 70-75 °C	60	
			Водный раствор едкого натра при температуре 2,0 $\text{м}^3/\text{ч}$ (0,2 $\text{м}^3/\text{ч}$)		
			Водный раствор едкого натра при температуре 2,0 $\text{м}^3/\text{ч}$ (0,2 $\text{м}^3/\text{ч}$)		
		Термический обезвреживатель в УИКОС	Водный раствор едкого натра при температуре 2,0 $\text{м}^3/\text{ч}$ (0,2 $\text{м}^3/\text{ч}$)	8 мин	
			Водный раствор едкого натра при температуре 2,0 $\text{м}^3/\text{ч}$ (0,2 $\text{м}^3/\text{ч}$)		
			Водный раствор едкого натра при температуре 2,0 $\text{м}^3/\text{ч}$ (0,2 $\text{м}^3/\text{ч}$)		
		Термический обезвреживатель в УИКОС	Водный раствор едкого натра при температуре 2,0 $\text{м}^3/\text{ч}$ (0,2 $\text{м}^3/\text{ч}$)	8 мин	
			Водный раствор едкого натра при температуре 2,0 $\text{м}^3/\text{ч}$ (0,2 $\text{м}^3/\text{ч}$)		
			Водный раствор едкого натра при температуре 2,0 $\text{м}^3/\text{ч}$ (0,2 $\text{м}^3/\text{ч}$)		
		Термический обезвреживатель в УИКОС	Водный раствор едкого натра при температуре 2,0 $\text{м}^3/\text{ч}$ (0,2 $\text{м}^3/\text{ч}$)	8 мин	
			Водный раствор едкого натра при температуре 2,0 $\text{м}^3/\text{ч}$ (0,2 $\text{м}^3/\text{ч}$)		
			Водный раствор едкого натра при температуре 2,0 $\text{м}^3/\text{ч}$ (0,2 $\text{м}^3/\text{ч}$)		

№ п/п	Объект, подлежащий обезвреживанию	Способ обезвреживания	Обезвреживающее средство	Пример обезвреживающих мпн	Пример расхода
Обработка в СТОС					
			В соответствии с инструкцией по эксплуатации шредеролупетей и по возможным возможным результатам производственных испытаний обезвреживания, согласованных с КСБ и утвержденным руководителем организации		
		Кипячение		60	
		Засыпать сухими препаратами и разбавить	Химреактив известка для обезвреживания термостойкой известки или ДСГК	120	200 г/л
			Дезафиттирующие средства в виде порошка или гранул на основе из пищевой соды, диклор-кислотной уксусной кислоты и/или кристаллической уксусной кислоты		
			КСН	240	100 г/л
24	Выщелачивание (шредер)	Засыпать сухими препаратами и разбавить	Химреактив известка или известка термостойкой известки, или ДСГК	120	200 г/л
			КСН	120	100 г/л
25	Выщелачивание (шредер): выщелачивание, разбавление, оставшаяся масса	Засыпать сухими препаратами и разбавить	Химреактив известка или известка термостойкой известки, или ДСГК	120	200 г/л
			КСН	240	100 г/л
			В соответствии с инструкцией по применению производственных препаратов		

№ п/п	Субъект воздействия и безразличия	Способ воздействия	Средство воздействия	Нормы расхода, мл/м	Нормы расхода
32	Триггер после преципитации фотонного	При типичных температурах окружающей среды с интервалом 15 мин	посредством погружений по режимам, указанным в пункте 6 настоящего пункта Таблицы 6		300 мл/м ² на вздутие прошивки
			4%-й водородоперенос раствор хлоридов	120	
			2%-й по АХ водородоперенос раствор КГН	120	
			0%-й по ПП) раствор водород перенос с 0,5% водородного средства	120	
			6%-й (по ПП) раствор водород перенос с 1% муравьиный кислотный и 0,3% сульфидный АХ (ХФ-2)	60	
			Обработка хлоридом 10% (по ПП) раствором водород перенос с 0,5% сульфидом или (ХФ-2)	60	В соответствии с эксплуатацией по применению прикладных и/или прикладных
		Растворы водородопереноса средств на основе переноса водородов и других водородопереносных соединений			
			Растворы водородопереноса средств на основе водородопереносных соединений		В соответствии с эксплуатацией по применению прикладных и/или прикладных
	Для строительства температур		10%-й по раствор КГН с 15% водородной (ХФ-2)	120	

№ п/п	Объект, подлежащий обследованию	Степень обследования	Средства/инструменты/средства	Время обследования, мин.	Цели работы
	металл: обработанный выполнение поверки СМД; поверхностная коррозия		0,5%-Н (по ПВ) раствор хлорида перекиси и 0,5% азотного раствора	60	
			0,5%-Н (по ПВ) раствор хлорида перекиси и 1% азотной кислоты и 0,5% сульфата или (СН-2)	30	
			0,2 - 0,4%-е азотное (ДВ) растворы хлорида перекиси для декарбонизации средств на основе ЦАС, триэтанола, ПТМГХ		
			Ультразвуковой дефектоскоп на основе вырезной сона и электромагнитной катушки или электромагнитной катушки		Исследование с использованием ультразвука
			Растворы декарбонизирующих средств на основе перекиси водорода и других		Исследование с использованием перекиси
			кислоты/активные окислители		Исследование с использованием перекиси
			Растворы декарбонизирующих средств на основе хлорида перекиси		Исследование с использованием перекиси
			40%-й водный раствор фторидов/аммиака с перекисью азота/азотной кислотой (25% раствор при комнатной температуре)	24 ч	Формирование 17,5 - 12,5 мкм (7 - 5 мкм) азотной кислоты/фторидов/аммиака при температуре 20 - 25 °C; формирование 37,5 - 12,5 мкм азотной кислоты/фторидов/аммиака при температуре 20 - 25 °C
			Исследование с использованием перекиси		Исследование с использованием перекиси

№ п/п	Объект, подлежащий обследованию	Способ обследования	Объем исследования	Время обследования, мин.	Нижнее значение показателя
		поэлементно			9,5 - 10 ед. показателя (вспомогательный показатель) или 9,5 - 10 ед. показателя (вспомогательный показатель)
		А. Жидкий метод для выявления коррозийных повреждений металлических конструкций и элементов оборудования (ТНП, ТНП-6) или оборудования (ТНП) с использованием жидкого раствора	6%-й раствор водород перекиси металлической или нержавеющей с 1% медианной кислотой и 0,5% содовой или СФ-20, 3% раствор хлоридов	60	10 ед.
		10%-й раствор водород перекиси металлической или нержавеющей с 1% медианной кислотой и 0,5% содовой или СФ-20	30		10 ед.
		А. Жидкий метод для выявления коррозийных повреждений металлических конструкций и элементов оборудования (ТНП, ТНП-6) или оборудования (ТНП) с использованием жидкого раствора	10%-й раствор водород перекиси металлической или нержавеющей с 1% медианной кислотой и 0,5% содовой или СФ-20	60	10 ед.
		При работе с жидким раствором водород перекиси с 1% медианной кислотой и 0,5% содовой или СФ-20	60		10 ед.

В случае выявления коррозии жидкий метод исследования коррозии не применяется. В случае выявления коррозии жидкий метод исследования коррозии не применяется. В случае выявления коррозии жидкий метод исследования коррозии не применяется.

№ п/п	Объект, подлежащий обследованию	Способ обследования	Область исследования	Время обследования, мин.	Норма расхода
В случае зачистки выявленных повреждений одним из перечисленных ниже растворов из 2 ч					
3	Защитная окраска поверхности, без покрытия, погноты, расщелин, трещин, сколов, вмятин, царапин, потертостей, повреждений, коррозии, пятен) без зачистки поверхности	Кисточение	2%-й раствор соды кальцинированной или 0.5%-й лодки и моющего средства	15	5 л/м²
		Паровой (спрей) раствор (автомат)	Водный насыщенный пар под давлением 2 атм (или 10,2 МПа), (13) (0,11 МПа), (110 ± 2)°C	45	
		Умачивание и ополаскивание с растворением в щелочном растворе	Водный насыщенный пар под давлением 2 атм (или 10,2 МПа), (13) (12) °C	60	
		Умачивание и ополаскивание с растворением в щелочном растворе	2%-й раствор хлоридов	30	5 л/м²
			0.5%-й аквированный раствор хлоридов	30	
			Растворы дегидрирующей смеси на основе иптривной соли дегидрирующей смеси и/или триацетатной смеси		
			2%-й (или 10%) раствор водного уксусной кислоты с 0.5% моющего средства при температуре раствора 30 °C	30	
			6%-й (или 10%) раствор водной кислоты с 0.5% моющего средства		

№ шп	Объект, подлежащий обезвреживанию	Способ обезвреживания	Обезвреживающее средство	Выход обезвреживающего, млн.	Нормы расхода
		стерилизатор	давлением 2 атм ² (0,2 МПа), (132 ± 2) °С		
		Кипячение	Вода, температура 100 °С	30	
		Погружение в раствор	1%-й раствор хлораминиз	60	
			6%-й раствор водородной перекиси в 1%-й муравьиной кислоте и 0,3%-й сульфоновой или (ХФ-2У	10	
6	Судя, потхотпереме погртыые массы, фосфидозот и другие		6%-й (или 11%-й) раствор водородной перекиси в 0,3%-й муравьиной кислоте	60	
		Давление с циркуляцией с показывающим одометром воды	6%-й (или 11%-й) раствор водородной перекиси в муравьиной кислоте	15	
		Погружение	70%-й этиловый спирт	30	
		Давление с циркуляцией с одометром 15 млн	Дисинфицирующее средство и реагенты при применении, указанные в пункте 2 настоящей статьи. Таблетки 6		
7	Табачный сорбент, розмывание спиртом		Шаровоздушник смеси при температуре 80 - 98 °С	120	40 кг/м ³ полевых растений
8	Растительные отходы (в том числе корни, стебли, листья)	Дезинфекция	Дезинфицирующее средство и реагенты при применении, указанные в пункте 2 настоящей статьи. Таблетки 6	45	Шаровоздушник 25,0 кг/м ³
9	Промышленные отходы	Дезинфекция	Дезинфицирующее средство и реагенты при применении, указанные в пункте 2 настоящей статьи. Таблетки 6	45	Шаровоздушник 25,0 кг/м ³

№ п/п	Объект, подлежащий обследованию	Способ обследования	Объем выполняемых работ	Время обследования, мин.	Нормы расхода
11	Посуды бытового, кухон. назначения для мытья посуды (после обезжиривания хранит в специальной емкости)	Бытовым мылом с моющей щеткой	6%-й раствор водирола перекисью меди в 1% медяной соли. Технохимконс с 1% изодинаминовой смесью и 0,2% сульфоновой или СДН-2У	30	В соответствии с инструкцией по применению средства для посуды
			0,2 - 0,4%-е (по весу) ДДВ		
			раствор для мытья посуды		
			раствор ЧАС, трилонат, ЛПДГХ		
		Бытовым мылом с моющей щеткой	3%-й раствор щелочи	30	
			3%-й раствор щелочи	60	
			0,2%-й щелочной раствор	60	
			5%-й раствор по 1,5 г/л щелочи	60	
		Бытовым мылом с моющей щеткой	Раствор щелочной щелочи	В соответствии с инструкцией по применению средства для посуды	
			0,2%-й щелочной раствор		
			5%-й раствор по 1,5 г/л щелочи		
			Раствор щелочной щелочи		
		Бытовым мылом с моющей щеткой	6%-й (по ДДВ) раствор водирола	60	
			0,2%-й (по ДДВ) раствор водирола		
			0,2%-й (по ДДВ) раствор водирола		
			0,2%-й (по ДДВ) раствор водирола		
		Бытовым мылом с моющей щеткой	6%-й (по ДДВ) раствор водирола	60	
			0,2%-й (по ДДВ) раствор водирола		
			0,2%-й (по ДДВ) раствор водирола		
			0,2%-й (по ДДВ) раствор водирола		

№ п/п	Объект, подлежащий обследованию	Способ обследования	Обеззараживающее средство	Время обработки, мин.	Норма расхода
14	Вспрыскивание инсектоакарицидами из распылителя после обработки помещений жидкими дезинфектантами	Порошок с иериниалор (аэрозоль)	Водяной неаэрированный порошок для обработки поверхностей 2,0 мл/м ² (0,2 МПа), (1,33 ± 0,09)	40	
		Катетер	Водяной	30	
			2% раствор натрия тартрата	15	
		Покружение в растворе	4% раствор гидроксида натрия	60	
15	Руки в дезинфицирующем растворе во время работы в ПБА		1% в растворе эфирного масла	60	
		Метод в растворе дезинфицирующего средства в концентрации раствора, указанного в пункте 5 восточной главы 1000000		2	
			3% в растворе эфирного масла	2	
			70%-й этиловый спирт	2	
16	Дезинфицирование поверхностей пола, стен	Метод или промывка раствором	1%-й раствор формалина	10	
		Метод или промывка раствором	70%-й этиловый спирт	2 раза по 3 мин	
		Метод или промывка раствором	Кожные антисептики: по инструкции	В соответствии с инструкцией по применению прикладными препаратами	
		Метод или промывка раствором	Смесь: спирт (не менее 60% по массе) и вода (не менее 40% по массе)		

№ п/п	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Обеззараживающее средство	Время обеззараживания, мин.	Норма расхода
17	Битосты и битосты животного происхождения	мгновенное кипячение	...		
		Замачивание до полного пропаривания	2%-й раствор по АХ салициловой кислоты	24 ч	
		длительное кипячение	3%-й раствор хлорамин В	24 ч	
		растворение до полного растворения в кальцетате	4%-й раствор гидроксида натрия	24 ч	
18	Битосты животного происхождения, битосты для животных	Замачивание в растворе	0,5%-й (или 1%) раствор хлорамин В		
		Замачивание в растворе	перманганат 1% и уксусной кислоты 1% (или 0,5% сульфата натрия 0,5%-й)	60	
		Замачивание в растворе	Замачивание в растворе	60	
		Замачивание в растворе	Замачивание в растворе	24 ч	
19	Трусы животного происхождения, битосты для животных	Замачивание	Замачивание в растворе		
		Замачивание	Замачивание в растворе		
		Замачивание	Замачивание в растворе		
		Замачивание	Замачивание в растворе		
20	Битосты животного происхождения	Замачивание	Замачивание в растворе		
		Замачивание	Замачивание в растворе		
		Замачивание	Замачивание в растворе		
		Замачивание	Замачивание в растворе		

№ п/п	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Обеззараживающее средство	Время обеззараживания, мин.	Нормативный документ
		Термическая обработка в УНКС	140 ± 2 °С (0,6 МПа)	8 мин	
			В соответствии с инструкцией по эксплуатации производятся и на основании полученных результатов исследований экспертной эффективности обеззараживания, согласовывается с КББ и утверждаются руководителем организации.		
		Термическая обработка в УНКС	(133 ± 3) °С (0,25 МПа)	90 мин	
			В соответствии с инструкцией по эксплуатации производятся и на основании полученных результатов исследований экспертной эффективности обеззараживания, согласовывается с КББ и утверждаются руководителем организации.		
		Засилье микроорганизмов и растительность	Гликоловый раствор	120	100 мл
			Дезинфицирующее средство в виде порошка или гранул на основе патентовой или торговой марки дихлорбензоилфурфуровой кислоты	120	100 г/га
			Гликоловый раствор	120	300 г/га
22	Выявлена болотная микрота, фекалии, растительные массы, осевшие птицы	Засилье микроорганизмов и растительность	Дезинфицирующее средство в виде порошка или гранул на основе патентовой или торговой марки дихлорбензоилфурфуровой кислоты	120	100 г/га
23	Шкучий ос-пол	Потрошенные в едлин	3%-й раствор хлорамина	60	-

№ п/п	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Обеззараживающее средство	Пример обеззараживающих средств	Норма расхода
	выделенный биологический материал (бактерии, грибы, вирусы, простейшие и др.), концентрированные суспензии, культуры	на дезинфицирующих растворах с последующим иригационным поливом	0,5%-й актиномициновый (антиоксик) раствор	80	3,5 г/л
			3%-й раствор п-хлороксибензоата калия	60	
		Застыли при хранении в холодильнике	1% раствор кальция	60	
24	Моча, экскременты, посевы патогенных жидкостей	Застыли при хранении в холодильнике	Дезинфицирующее средство на основе хлороксибензоата калия в соотношении 1:1000 в 2-х частях	120	
25	Санитарно-технические обиходные (в том числе валялы, унитазы, раковины)	Дезинфицирующее средство	2%-й актиномициновый раствор (раствор любого другого средства)	30	
26	Уборочный инвентарь	Полоскание в 0,5% растворе дезинфицирующего средства с последующим протиранием насухо	Дезинфицирующее средство в режиме пульсации, 50-80 мин в сутки 4-х частей воды	130	
27	Нашевающие туалеты, туалетные ваны, ванны, ванны для дезинфекции	Орошение инвентаря дезинфицирующим средством	3%-й раствор гипохлорита кальция	130	

№ п/п	Объект, подлежащий обезвреживанию	Способ обезвреживания	Обезвреживающее средство	Время обезвреживания, мин.	Форма распыла
	уличный двор	распыление			
28	Твердые отходы	Залитием раствором	3%-й раствор гипохлорита кальция	120	Мгуща 1 м., диаметр 10 а.
29	Транспортировка примесей/отходов биотоплива	Промывка или доукомплектование протиркой тканевой свойской, сметанной в растворе с пипеткой 15 мин, ложка или протиркой тканевой свойской, сметанной в растворе	1%-й раствор хлорамин Раствор дезинфицирующего средства ВП основе натриевой соли дихлорбензилдиуровой кислоты или тривалентной уксусной кислоты	60	300 мл/м ²
			0,4%-й (по ПВА) раствор оплората перекиси с 0,5% моющего средства	60	
			0,4%-й раствор водородной перекиси с 1% ксеролиной кислоты и 0,5% сульфоната или СФ-2У	10	
			0,2 - 0,4%-е (по сумме ДВ) растворы хлорсодержащих средств на основе ЧАС, триамин, ШМДХ	В соответствии с инструкцией по применению производителя препарата	
			Растворы дезинфицирующих средств на основе хлорной кислоты и других хлорсодержащих веществ	В соответствии с инструкцией по применению производителя препарата	
			Растворы дезинфицирующих средств на основе хлорсодержащих соединений	В соответствии с инструкцией по применению производителя препарата	

№ п/п	Объект, подлежащий обезвреживанию	Способ обезвреживания	Обезвреживающее средство	Время обезвреживания, мин.	Норма расхода
20	Подстилки из сучьев, выделенная древесная щепа, кора	Промыв	Водный насыщенный пар под давлением 2,0 МПа (0,2 МПа), (132±5) °С	60	
21	Масло и тара трансформаторных шин, грязь	Сжигание	2%-й раствор полихлорированной соды	30	
22	Сержины изосит и обрешетка стропил фанеры БМБ при условии герметизации	Форматирование парами формальдегида	Вариант: температура 100 °С 37%-й раствор формальдегида с поперечностью обезвреживаемой заготовки 120% при входе расхода 60 м³ по 100 м³ формальдегида	24 ч	60 м³ формальдегида по 100 м³ отходов изосита и фанеры БМБ при входе 120% и поперечности 65%
23	Плети постылки, прошивные коробки	Промыв поверхности Атрицильный раствор азидифосфин	4% раствор едкого натра 6% раствор перекиси водорода 10% раствор перекиси водорода	3-5 мин 60 мин	60 л едкого натра 20 м³ по 1 м³ азидифосфинной воды
		Обработка в камере дезинфекционной формальдегидной	(60 ± 2) °С	4 часа	
IV Грызы					
24	Поперхости и	Сжигание в тн	5%-й раствор соляной кислоты	60	200 м³/ч

№ п/п	Объект, подлежащий обезвреживанию	Способ обезвреживания	Обезвреживающее средство	Время обезвреживания, мин	Норма расхода
	пипеточники; пол, стены, двери; мебель; рабочие стои; шкафы, стулья и другие предметы мебели; оборудование; шаровые инвентарные ёмкости; полищевые вставки	жидкое протирание с интервалом 30 мин	мыло		
			5%-й раствор хлорамин	60	
			6%-й (по ПВ) раствор водорода пероксида с 1% муравьиной кислотой и 0,1%- сульфоновой или СФ-2У	30	
			6%-й (по ПВ) раствор жидкого пероксида с 0,5%- мыльного средства	120	200 мг/м ²
В соответствии с инструкцией по применению производителя препарата					
В соответствии с инструкцией по применению производителя препарата					
Растворы дезинфицирующих средств на основе 2-хлорфенолов (активизант)					
2	Шофёрские термизатор	Дезуризмное средство или дезинфицирующее с интервалом 30 мин	0,5%-й (по ПВ) раствор активного пероксида с 0,5%- мыльного средства	60	500 мг/м ²
3	Защитная одежда, обувь	Паровой стерилизатор (автомат)	1,1 мг/см ² (0,11 МДж), (1,2 мг/см ²)	60	
			1,5 мг/см ² (0,15 МДж), (1,2 мг/см ²)	30	
			2,0 мг/см ² (0,2 МДж), (1,2 мг/см ²)	20	

№ п/п	Объект, подлежащий обезвреживанию	Способ обезвреживания	Средство (безопасное или другое)	Норма расхода реагента, кг/м³	Норма расхода
4	Захваченная, захваченная, захваченная	Нормирование	0,5% (по ПП) раствор хлорной кислоты с 0,5% окислительного средства	120	200 кг/м³
		Кипячение	2% раствор хлорной кислоты	30	5 кг/м³ сухого вещества
		Нормирование	5% раствор хлорной кислоты	120	
5	Перехватчик, захваченный, захваченный	Нормирование	Н-й (или ПП) раствор хлорной кислоты с 0,5% окислительного средства	120	200 кг/м³
		Кипячение	2% раствор хлорной кислоты	15	
6	Захваченная, захваченная, захваченная	Нормирование	0,5% (или ПП) раствор хлорной кислоты с 0,5% окислительного средства		
		Кипячение	2% раствор хлорной кислоты	15	
7	Рабочая, рабочая, рабочая	Нормирование	Нормирование	15 - 20	3 - 10 кг/м³ (60 кг/м³)
		Кипячение	Нормирование	30	формирование 15 кг/м³ (30 кг/м³) 75 кг/м³
8	Предметы, предметы, предметы	Нормирование	Нормирование	15 - 20	3 - 10 кг/м³ (60 кг/м³)
		Кипячение	Нормирование	30	формирование 15 кг/м³ (30 кг/м³) 75 кг/м³
9	Пуск, пуск, пуск	Нормирование	Нормирование	60	

№ п/п	Объем, подлежащий обезвреживанию	Способ обезвреживания	Обезвреживающее средство	Время обезвреживания, мин.	Норма расхода
12	Средства применяемые для гистологических исследований	Пикруамина	10%-й раствор формалина	24 ч	Полное погружение
13	Группы животных, подлежащих инъекции, выпеления животных	Смешанное Паровой (сформалином) (аэрозоль)	1,5 клема (0,15 МПа), (125±2)°C	60	
14	Кожная сыпь для обезвреживания лабораторных животных, остатков крови, Угнетательные яды, садов, садовые улитки и прочие животные животные	Зашить до края и протереть спиртом доуравновешивающим раствором 2 ч	5% раствор хлороформа 10%-й (по ПР) раствор ацетона перекисью с 0,5% водородного перекиси	48 ч 120	Полное погружение
15	Исследования микробиологии исследований после вскрытия лабораторных животных и при исследовании (сочетает) работ	Кашинские	5% раствор полимера доуравновешивающего 10%-й (по ПР) раствор перекиси перекисью с 0,5% водородного перекиси	30 120	Полное погружение

№ п/п	Объект, подлежащий обязательной аттестации	Способ обязательной аттестации	Объект аттестации (средство)	Время обязательной аттестации, мин.	Порядок реализации
16	Уборочный материал, подлежащий маркировке геофакта	Визуально	2%-й раствор 83-ПДПА (маркировка)	10	Полное погружение
			5%-й раствор хлороформа	30	
			10%-й (по ПДБ) раствор водирона	120	
			диоксен с 0,3% микотного средства		
18	Препарат после трупепертирихи божьих	При положительных результатах дупертихи суетствие с интервалом 15 мин	4%-й оксидирующий раствор хлороформа	120	300 мл/м ² на каждые сутки
			5%-й раствор от АХ, лизол, хлорная известь	120	
			3%-й (по ПДБ) раствор пиктората перекиси с 0,5% микотного средства при температуре 50 °С	60	
			5%-й (по ПДБ) раствор водирона	120	
			перекиси с 0,5% микотного средства		
			перекиси с 0,5% микотного средства		
			6%-й (по ПДБ) раствор водирона	30	
			перекиси с 1% микотного средства		
			5%-й раствор фторидов при 5% щелочи при температуре 60 °С	60	

№ п/п	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Обеззараживающее средство	Время обеззараживания, мин.	Нормативная ссылка
			Образован в фумигации 10% (по ПДК) растворами водорастворимых пероксида	60	
		Применение щелочных дезинфектантов: сульфидов с интервалом 30 мин	3%-й раствор соды, 1% щелочной раствор	120	
			Трициклокс, дезодорант 10% водного пероксида 40%, 9% водного щелочи, 1% муравьиной кислоты и 0,5% сульфидов соды СХФ-2У	60	
			Раствором дезинфицирующего средства на основе перекиси водорода и других окислительных веществ соответствия		В соответствии с инструкцией по применению производителя препарата
			Растворы дезинфицирующих средств на основе хлорактивных соединений		В соответствии с инструкцией по применению препарата
1)	Структура помещений обрабатываемых фильтров ГИИ при условии герметизации	Фумигация парами фторзамещенных	37%-й раствор формальдегида с поглотителем нейтрализующий его активность (2,5% при входе раствора 60 мин из 1 кг 1 кг формальдегид)	В 1	60 мин формальдегид 60 мин при температуре газовой фазы 20 °С при объеме более 1 м³ и температуре выше 20 °С и относительной влажности 65%

Относительная влажность при применении фумигации с помощью паров воды

Кроме указанных обеззараживающих средств допускается применение других веществ в помещениях и помещениях в Российской Федерации в соответствии с инструкцией по применению, эффективности и безопасности.

2. Preliminary

Размеры обезжиривателя фистиковых масел различных объёмов, предназначенных для подкармливания на содержание водорастворимых веществ в 100 г сырья				
№ п/п	Объект, подлежащий обезжириванию	Способ обезжиривания	Дезинфицирующий агент	Время обезжиривания, мин
1	Взвешенная масса обезжириваемого сырья	Взвешенная масса обезжириваемого сырья	Взвешенная масса обезжириваемого сырья	Время обезжиривания, мин
2.	Взвешенная масса обезжириваемого сырья	Взвешенная масса обезжириваемого сырья	Взвешенная масса обезжириваемого сырья	Время обезжиривания, мин
3.	Взвешенная масса обезжириваемого сырья	Взвешенная масса обезжириваемого сырья	Взвешенная масса обезжириваемого сырья	Время обезжиривания, мин
4.	Взвешенная масса обезжириваемого сырья	Взвешенная масса обезжириваемого сырья	Взвешенная масса обезжириваемого сырья	Время обезжиривания, мин

№ п/п	(Объект, подлежащий обследованию)	Способ обследования	Цели, задачи, условия, методы	Время обследования, мин	Норматив расхода
5	Циркуляция воздуха, отопления и охлаждения помещений (в том числе излучения мебели, светильников)	Дифференциальная		45	10 м ³ /м ² площади помещений
6	Посуда лабораторная (тарелки, пробирки, колбы, чашки, стаканы); вода; воздух – отсасывание; требования для чистой культуры, ширины и глубины*	Паровой стерилизатор	Паровой стерилизатор при давлении 1,5 атм (0,15 МПа), 126 ± 2 °С	60	
		Паровой стерилизатор	Паровой стерилизатор при давлении 2,0 атм (0,2 МПа), 132 ± 2 °С (для посуды, контактирующей с образцами в инкубаторах)	20	
		Кипячение	Кипячение в инкубаторах при давлении 2,0 атм (0,2 МПа), 132 ± 2 °С (для посуды, контактирующей с образцами в инкубаторах)	30	
7.	Бактериологические посевы	Паровой стерилизатор	Паровой стерилизатор при давлении 1,5 атм (0,15 МПа), 126 ± 2 °С	60	
		Паровой стерилизатор	Паровой стерилизатор при давлении 2,0 атм (0,2 МПа), 132 ± 2 °С (для посуды, контактирующей с образцами в инкубаторах)	20	

№ п/п	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Дезинфицирующий агент		Время обеззараживания, мин	Норма расхода
			растворенный биологический препарат (бактерицид)	активная бета-стафилококк		
8.	Резиновые пробки, шпатель, выемочные устройства для патеттирования зараженного материала	Кипячение	Вода		30	
		Паровой стерилизатор	Дополнительный пар под давлением 1,5 атм (0,15 МПа), 120±2 °C		60	
		Кашаценоз	Вода		30	
9.	Длина бактериопластическая для пересев зараженного материала	Прикашивание				
		Паровой стерилизатор	Водный насыщенный пар под давлением 1,5 атм (0,15 МПа), 120±2 °C		30	
		Кашаценоз	2% раствор пастера для дезинфекции		15	
11	Клетки, банки и бочки для животных, дезинфицируемый материал, материал животного, остальное	Паровой стерилизатор	Водный насыщенный пар под давлением 1,5 атм (0,15 МПа), 120±2 °C		60	
			Вода		30	
12.	Клетки, остальное животное	Паровой	Водный насыщенный пар под давлением		30	

№ п/п	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Дезинфицирующий агент	Продолжительность, мин	Норма расхода
13.	Бакки, бачки, ванны, ванны животных и сауны, ванны*	Струйный	линем 1,5 кг/см ² (0,15 МПа), 120±2 °С	60	
		Воздушный	Температура 180°С		
		Паровой стерилизатор (автоклавы)	Насыщенный пар под давлением 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), 152 ± 2 °С		
14.	Группы животных, подстилки, материал, подлежащий обеззараживанию*	Паровой стерилизатор	Насыщенный пар под давлением 1,5 кг/см ² (0,15 МПа), 126±2 °С	60	
		Стерилизация			
15.	Жидкие продукты, пищевые воды*	Широкий стерилизатор	Водяной насыщенный пар под давлением 1,1 кг/см ² (0,11 МПа), 120±2 °С	30	
		Кипячение		30	
16.	Твердые отходы «закрытой» зоны	Сжигание			
17.	Металлы для транспортирования животных	Кипячение	2% раствор хлорированной соды	30	
				30	
18. Микробактерии					

№ п/п	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Дезинфицирующий агент	Время обеззараживания, мин	Нормативный документ
6.	Резиновые шланги, шланги, имеющие устройство для ликвидации аварийного затопления	Паровой стерилизатор Кипячение	Водяной насыщенный пар под давлением 1,5 атм (0,15 МПа), 126±2 °С 2%-ный раствор натрия дихромоата	90 90	
7.	Плоские бактериологические для черепашьих экскрементов материалы	Шроутование			
8.	Материалы после термической обработки животных	Паровой стерилизатор Кипячение	Водяной насыщенный пар под давлением 1,5 атм (0,15 МПа), 126 ± 2 °С 2% раствор натрия дихромоата	90 15	
9.	Клетки, банки и бачки для живых, дождевых животных, насекомых, пауков, клещей	Паровой стерилизатор	Водяной насыщенный пар под давлением 1,5 атм (0,15 МПа), 126±2 °С	60	
10.	Материалы, экскременты, клетки, банки, бутылки, термометры, животные и другие вещи	Паровой стерилизатор Вакуумная стерилизация	Водяной насыщенный пар под давлением 1,5 атм (0,15 МПа), 126±2 °С Температура 180 °С	60 60	
11.	Вещи, подлежащие дезинфекции	Паровой стерилизатор	Водяной насыщенный пар под давлением 2,0 атм (0,2 МПа)	60	

Условия	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Дезинфицирующий агент	Время обеззараживания, мин	Норма расхода
12.	Трубы, каналы, подводящие и отводящие, водопроводные и канализационные, водопроводные и канализационные	Паровой стерилизатор	$122 \pm 2^\circ \text{C}$	90	
13.	Твердые отходы, зараженные жидкостью	Сжигание			
14.	Мешочки для транспортировки и хранения грибов	Кипячение	2% раствор кальципероксида	30	
			Вода	30	
III. Кипячение, обеззараживание жидкостей					
1.	Защитная одежда персонала (халаты, костюмы, резиновые перчатки) ⁴	Паровой стерилизатор	Водной насыщенности пар под давлением $2,0 \text{ кгс/см}^2$ ($0,2 \text{ МПа}$), $122 \pm 2^\circ \text{C}$	90	
2.	Перчатки, резиновые сапоги	Кипячение	2% раствор кальципероксида	60	
		Кипячение	2% раствор перманганата калия	60	
3.	Рабочая обувь, резиновые сапоги	Дезинфекционная камера	Дезинфекционная камера температура $57-59^\circ \text{C}$	165	Объемная 250 м ³ (18 шт.) резиновой обуви (по 10 пар)

№ п/п	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Параметры режима агента	Время обеззараживания, мин	Примечания
10.	Инструменты после вскрытия упаковки	Паровой стерилизатор	Водяной пар под давлением 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), 132±2 °С	90	
11.	Косы, багры и бочки для заготовки (бачки из-под жидкогохлора и подгарающих материалов и выжигателей аптечных)	Кашинев	2% раствор натрия дихлорексатол	60	
		Паровой стерилизатор	Водяной пар под давлением 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), 132±2 °С	90	
12.	Металлические шпатель, сачок, сетчатые корзины и прочее	Цирковой автоклавы	Водяной пар под давлением 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), 132±2 °С	90	
13.	Трусы лабораторных животных	Обработка горячим воздухом	180 °С	60	
		Паровой стерилизатор	Водяной пар под давлением 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), 132±2 °С	90	
		Сжигание			
14.	Воздушно-бактерицидные фильтры	Сжигание или автоклавирование	Водяной пар под давлением 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), 132±2 °С	90	
15.	Жидкие органические растворы	Порционный стерилизатор	Водяной пар под давлением 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), 132±2 °С	90	

[illegible]

№ п/п	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Дезинфицирующий агент	Доза, обрабатываемый материал	Норма расхода
1.	Внутренняя рабучая одежда (в том числе куртки, комбинезоны), инструменты, принадлежности	Кашинизация	пленка 2,0 мм $10 \times 10 \text{ м}^2$ (0,2 МПа), 1,32±2 °C	30	40 мл/м ² площади поверхности
		Дезинфекционная камера	10% раствор смеси при температуре 80-90°C	45	
		Дезинфекционная камера	Пароформальдегидная смесь при температуре 57-59°C	120	
ii.	Посуда лабораторной стеклянной (в том числе тары, Петры, пробирки, шприцы); медицинские инструменты	Капюшон	3% раствор хлоргексидиновой воды	30	Формальдегид 75,0 мл/м ² 30-30°C 100% эфирной пленкой
		Портальный стерилизатор	Водяной выжигатель при температуре 1,5 мм $10 \times 10 \text{ м}^2$ (0,15 МПа), 1,32±2 °C	60	
		Паровой стерилизатор	Паровой выжигатель при температуре 2,0 мм $10 \times 10 \text{ м}^2$ (0,2 МПа), 1,32±2 °C (при наличии соответствующих инструкций по эксплуатации оборудования и соответствующей компетенции обслуживающего персонала)	90	

№ п/п	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Дозы/факторы/условия воздействия	Время обеззараживания, мин	Норма расхода
7.	Нарушенная жидкость, взвесь твердой взвешанной в воде	Циркуляционный стерилизатор	Водяной вакуумный пар под давлением 2,0 атм ² (0,2 МПа), 132±2 °С	60	
Цели отсрочки возможности обеззараживания в паровом стерилизаторе:					
		Кипячение	Вода	10	
8.	Посудовое, санитарное приборостроительное, механическое оборудование для швейной промышленности, материалы, текстиль, обувь, игрушки	Кипячение	Вода	30	
		Паровой стерилизатор	Водяной вакуумный пар под давлением 2,0 атм ² (0,2 МПа), 132±2 °С	20	
9.	Инструменты из металла после мойки антисептиком	Паровой стерилизатор	Водяной вакуумный пар под давлением 2,0 атм ² (0,2 МПа), 132±2 °С	20	
		Кипячение	Вода	30	
			2% раствор натрия перманганатного	15	
III.	Металлические ящики, сумки, сумки для белья	Водяной стерилизатор	Температура 130±3 °С	60	
		Циркуляционный стерилизатор	Водяной вакуумный пар под давлением 2,0 атм ² (0,2 МПа), 132±2 °С	20	
IV.	Трусы, белье, белье, белье	Сухание			

№ п/п	Способ, полнотекстовый обеззараживания	Способ обеззараживания	Дезинфицирующий агент	Время обеззара- живания, мин	Норма расхода
12.	Воздушная фумигация	Паровой стерилизатор	Водный насыщенный пар под давлени- ем 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), 132±2 °С	60	
		Паровой стерилизатор	Водный насыщенный пар под давлени- ем 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), 132±2 °С	60	
		Паровой стерилизатор	Водный насыщенный пар под давлени- ем 1,5 кг/см ² (0,15 МПа), 126±2 °С, 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), 132 ± 2 °С	60	
13.	Химическая обработка, сыпучие воды	Кипячение		30	
		Термическая обработка в УНКОС	143 ± 2 °С	7-10 мин	
		Кипячение	Мышьяк-содержащий раствор влн. раствор любого животного происхождения	40	
14.	Углеродный материал (в том числе дерево, древесина)*	Паровой стерилизатор	Водный насыщенный пар под давлени- ем 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), 132±2 °С	60	
		Кипячение	3% хлоридно-хлорный раствор	10	
15.	Пластилиновый материал, выделение живильных, осветляющих	Кипячение	Дерево	30	
		Кипячение	Дерево	30	

У. Ракетов

№ п/п	Объект, подлежащий обследованию	Способ обследования	Детализируемый элемент	Время обследования, мин	Норма расхода
1.	Защитная окраска ограждений (холсты, полотна, резиновые покрытия) ¹	Полный стерилизатор	Водяной насыщенный пар под давлением 1,1 кгс/см ² (0,11 МПа), 120±2 °С	60	
		Кипячение	2% раствор жидкого мыльной соды	15	
2.	Перчатки и перчатки ²	Паровой стерилизатор	Полный насыщенный пар под давлением 1,1 кгс/см ² (0,11 МПа), 120±2 °С	40	
		Кипячение	2% раствор натрия двууглекислого	60	
		Дезинфекционная камера	Щелочная щелочная смесь при температуре 57-59 °С		
4.	Перчатки резиновые для рук (руки, кожные зоны и протекты)	Дезинфекционная камера	Паровая щелочная смесь при температуре 80-90 °С	45	Формальная 250 мл/м ² 18 кг/м ² полимерной ширины кабели
5.	Полотно лабораторное с окраской (микрофотометрическое применение) (в том числе холсты Петра, пробирки, титры, холсты) ³	Паровой стерилизатор	Полный насыщенный пар под давлением 1,5 кгс/см ² (0,15 МПа), 120±2 °С	60	
		Кипячение	2% раствор натрия двууглекислого	60	
		Паровой стерилизатор	Полный насыщенный пар под давлением 1,5 кгс/см ² (0,15 МПа), 120±2 °С	90	
10.	Полотно	Кипячение	2% раствор натрия двууглекислого	60	
		Паровой стерилизатор	Полный насыщенный пар под давлением 1,5 кгс/см ² (0,15 МПа), 120±2 °С	90	

№ п/п	Субстрат, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания		Дезинфицирующий агент	Время обеззараживания, мин	Нормы расхода
		Классификация	Норма			
17.	Сырные заготовки	Антисептирование сыра при температуре 1,0% раствор в 100% этилового спирта	Водный насыщенный пар при давлении 2,0 атм ² (0,2 МПа), 132 ± 2 °C		30	
18.	Твердые сыры «сыр-бюф» сыры	Сквашивание			45	
19. 1 раз	Запеченная масса, бекон	Паровый стерилизатор	Водный насыщенный пар под давлением 1,1 атм ² (0,11 МПа), 120±2 °C		60	
			Водный насыщенный пар под давлением 1,5 атм ² (0,15 МПа), 170±2 °C		90	
			Водный насыщенный пар под давлением 2,0 атм ² (0,2 МПа), 132 ± 2 °C		20	
2.	Хлеб, масло, растительное	Кипячение	2% раствор кальцинированной соли		30	5 л/кг сырья бекон
3.	Переваренный материал	Кипячение	2% раствор натрия двууглекислого		15	
4.	Вареная рыба (сложно) (в том числе гурми, копчености)	Варка в кипящей воде	Натр-ангидрид смеси 80-90 °C		15-20	8-10 л/кг, 100 кг/м ³

№ п/п	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Дезинфицирующая среда	Время обеззараживания, мин.	Норма расхода препарата
5.	Одежда, обувь из войлочной обуви, кожаная и лакированная мехом	Дезинфекционная камера	Пароформалиновый раствор 5-6%	30	5 мл/м ² . (30 л/м ²) формальмин 75 мг/л ²
6.	Посуда лабораторная (в том числе чайник, кастрюля, тарелка), медицинская, детская, резиновая, сапожные штилеты, а также всевозможные инструменты	Прямой стерилизатор	Высокой температуры пар под давлением 1,1 кг/см ² (0,11 МПа), t=120±2 °C Раствор формалина 1% (0,15 МПа), t=120±2 °C Раствор перекиси водорода 20% (0,2 МПа), t=132 ± 2 °C 2% раствор ватного спирта лекарственного	60 30 20 30	
7.	Кухонный прибор на кухне; санитарные комнаты. Санитария помещений	Прямой стерилизатор	Высокой температуры пар под давлением 1,1 кг/см ² (0,11 МПа), t=120±2 °C Температура кипячения при давлении 1,5 кг/см ² (0,15 МПа), t=126±2 °C Нодовой дезинфекции пар под давлением 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), t=132±2 °C	60 30 20	
8.	Группы туалетных комнат	Дезинфеция Хлорокс	Регулярно проводимый пар под давлением	40	

№ п/п	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Дезинфицирующий агент	Время обеззараживания, мин	Норма расхода
9	Инструменты после вскрытия животных ⁴	стерилизатор	раствор 1,5 кг/л ⁵ (0,15 МПа), 120±2 °С		
		Каширский	3% раствор натрия двууглекислого	30	
		Паровой стерилизатор	Натрия перманганатный раствор под давлением 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), 122±3 °С	20	
10	Пласти, кожный материал, остатки кормов, выделения животных	Паровой стерилизатор	Водяной раствор натрия под давлением 1,5 кг/см ² (0,15 МПа), 126±2 °С	60	
11	Клетки, банки и прочие емкости из под вырубленного животного ⁴	Паровой стерилизатор	Водяной вымывочный раствор под давлением 1,1 кг/см ² (0,11 МПа), 120±2 °С	60	
			Внутренний ливневый раствор под давлением 2,0 кг/см ² (0,2 МПа), 120±2 °С	30	
⁴ Включено использование дезинфицирующих средств, разрешенных и Российский федерации, в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкциях ВОЗ по применению.					

№ п/п	Объект, подлежащий обеззараживанию	Способ обеззараживания	Дезинфицирующий агент	Время обработки, мин., сек.	Целевая реакция
3.	Защитная одежда персонала (халаты, шапочки, маски, ботинки)	Капание	0,5% раствор моющего средства	15	
4.	Парничный инвентарь	Паровой стерилизатор	Влажный вапителитовый пар 10 градусах 1,1 кг/см²	10	
		Погружение	0,11 МПб, 120±2°C		
			Средства дезинфекции, разрешенные в соответствии с инструкцией по применению производителя		
5.	Посуда лабораторная стеклянная	Кипячение	0,5% раствор моющего средства	30	
		Погружение	Средства дезинфекции, разрешенные в соответствии с инструкцией по применению производителя		
6.	Резинные пробки, шпатели, механизмы устройства для препарирования	Капание	Порох с 0,5% моющего средства	30	
7.	Инструменты после вскрытия лабораторных животных	Капание	0,5% раствор моющего средства	15	
		Погружение	Средства дезинфекции, разрешенные в соответствии с инструкцией по применению производителя		
8.	Рука в медицинском перчатке	Мыло	Антибактериальное мыло с моющей обработкой эфирными спиртами 70%		
9.	Рука без перчаток	Мыло, дезинфекция	Турлетане мыло, 70% 2 эфирный спирт	2	

№ п/п	Объект, подлежащий обезвреживанию	Способ обезвреживания	Цели/факторы/улучш. эффект	Время «безопасной» воздуш. мол.	Порядок реализации
10.	При поладании malfunctionного электродвигателя на производственном посту	Протирание тампоном с двух сторонными мыльными растворами, с последующей обработкой 70% уксусным спиртом	Средства дезинвизации, разрешенные в соответствии с инструкцией по применению при производстве		Средства дезинвизации, разрешенные в соответствии с инструкцией по применению при производстве
11.	Клетка, балки для сортировки железяк. Подметательный материал, остатки корма	Потрушение	Средства дезинвизации, разрешенные в соответствии с инструкцией по применению при производстве		Средства дезинвизации, разрешенные в соответствии с инструкцией по применению при производстве
12.	Коттеджен с фекалиями, зловонью, мочой и другими загрязнениями	Потрушение	Средства дезинвизации, разрешенные в соответствии с инструкцией по применению при производстве		Средства дезинвизации, разрешенные в соответствии с инструкцией по применению при производстве
13.	Посуда из тол. металлической фольги (в том числе тарелки, супники, миски/чашки)	Потрушение с замораживанием в морозильнике при 60° С	Средства дезинвизации, разрешенные в соответствии с инструкцией по применению при производстве		Средства дезинвизации, разрешенные в соответствии с инструкцией по применению при производстве
14.	Одноразовые пластиковые материалы, предметы личной гигиены, посуда, используемая при работе с кровью и сывороткой крови	Потрушение с замораживанием в морозильнике при 60° С	Средства дезинвизации, разрешенные в соответствии с инструкцией по применению при производстве		Средства дезинвизации, разрешенные в соответствии с инструкцией по применению при производстве
15.	Уборочный материал, материалы, вещи	Кашинение замачивание	Средства дезинвизации, разрешенные в соответствии с инструкцией по применению при производстве	15	Средства дезинвизации, разрешенные в соответствии с инструкцией по применению при производстве
Оценки времени обезвреживания при различных обстоятельствах и методах ликвидации возм.					

Обеспечение безопасности при работе с ПБА в части индивидуальных рабочих средств в среде индивидуальной защиты

1. Каждый сотрудник лаборатории должен быть обеспечен рабочей одеждой для проводимых работ на территории «стерильной зоны» во взаимодействии с ПБА: медицинская или комбинезонная - три комплекта, обувь, защитная маска носовая и маска на лицо с фильтром, обеспечивающую герметичность, устойчивую к обработке дезинфектантами - две пары, перчатки - три пары, головная медицинская - две.

2. Комбинезон СИЗ должен обеспечивать защиту во время в критических местах, особенно при опуске лица, на зашнуровке и шнуровках, с сохранением при этом свободной двигательной активности.

3. При работе в стационарных и мобильных лабораториях, медицинских учреждениях лечебно-профилактического профиля персонал должен использовать противопрозрачные костюмы I - IV типов или их аналоги одноразового или многоразового применения, изолирующие костюмы и другие средства, разрешенные к применению.

4. В зависимости от характера выполняемой работы, степени ее опасности для персонала, необходимой степени защиты типа защитных костюмов.

5. Типы классических противопрозрачных костюмов различаются по следующим показателям:

1 тип - включает: большую противопрозрачную каску (120 x 120 x 150 см) или капюшон (шлем); противопрозрачный халат (по типу хирургического) длиной до коленей, три застежки, полы халата заходят друг за друга по меньшей мере на 15 см. у воротника застежки халата или шорта прилегающие манжеты; одноразовые медицинские перчатки с усиленными ладонями (хирургические), устойчивые к воздействию агрессивных химических веществ (дезинфектантов), при необходимости - с защитой от проколов и порезов; система дыхания (или система водостраховки: баллон); полнотелые или защитные органы дыхания и органы зрения водостроитель.

противопрозрачный противопрозрачный репелент (фильтрующий инвентарь) класса защиты FFP 3 или изолирующая инвентарь в противопрозрачных или

комбинированным фильтром класса защиты РЗ (или противавирусозольному компоненту) в комплекте с защитными очками с высокой вентиляцией;

комбинированно защищающую маску или притыкивал с противавирусозольным или комбинированным фильтром (или) класса защиты РЗ по противавирусозольному компоненту;

шлем, каска или с системой притягивающий локатор очищенного воздуха, свободной протекторной системы или комбинированным фильтром класса защиты РЗ по противавирусозольному компоненту;

Для вскрытия трубок линий или крупных сосудов) дополнительного надежного водонепроницаемого фартука, нарукавника и вторую пару перчаток или нарукавник с защитой от проколов и порезов;

При необходимости, при работе с лабораториями использовать комбинированные перчатки, очки;

II тип - костюм полностью (капюшон), противочумный халат, респиратор или аналог СИЗОД, одноразовые защитные перчатки с удлиненными кончиками (хирургические) при необходимости - перчатки с защитой от проколов и порезов, очки (для комбинированных фильтров), плотные. Очиститель от костюма I типа отсутствием защиты органов зрения;

III тип - большая маска (капюшон), противочумный халат, респиратор, одноразовые защитные перчатки с удлиненными кончиками (хирургические), при необходимости перчатки с защитой от проколов и порезов, защита обуви (наборные галоши, обувь ВПВ или комбинированные ботинки, плотные. Очиститель от костюма I типа отсутствием защиты органов зрения и дыхания. При транспортировании инфицированного материала в автобусе - костюм дополнить водонепроницаемым фартуком;

IV тип - маска (маска косынка, медицинский колпак), противочумный (хирургический) халат, защитные перчатки;

б. Допускается использование аналогов классического противочумного костюма. Разрабатываемые аналоги должны соответствовать типу протипичного костюма;

I тип - обеспечивает защиту кожных покровов рук, поверхности тела, лица, органов дыхания;

II тип - обеспечивает защиту кожных покровов рук, поверхности тела, лица, органов дыхания;

III тип - обеспечивает защиту кожных покровов рук, поверхности тела;

IV тип - обеспечивает защиту поверхности лица, кожных покровов рук;

7. Возможно теплоточное СХЗ, изготовленных из материалов оптимальных теплоточных характеристик, сохраняющихся после отрезательного количества циклов обработки.

Противоположный (холодоточный) цикл может быть выполнен на оптимальном количестве.

8. В зависимости от характера выполняемой работы, степень ее сложности для персонала должна быть определена в соответствии с требованиями к работе.

При выполнении работ, связанных с применением химических веществ, в том числе в отходах, следует соблюдать и другие требования к работе.

9. В стационарных лабораториях, выполняющих лабораторные работы, персонал при работе с микроэлементами I - II групп патогенности должен соблюдать все меры безопасности, предусмотренные в их анализе, разведении и применении.

10. К работе в постели допускается лишь в исключительных случаях, когда медицинский персонал и персонал охраны здоровья, прошедшие специальное обучение, инструктаж по правилам работы и соблюдению правил.

11. Выход, осуществляемый в соответствии с требованиями, должен соответствовать следующим параметрам: температура (25 ± 3 °C, расход (20 ± 3 м³/ч), влажность воздуха по относительной влажности ($100 - 200$) %.

12. Перед началом работы необходимо проверить на наличие повреждений спецодежды, убедиться в наличии спецодежды, ее целостности и комплектности, а также в наличии средств защиты. Результаты проверки фиксируются в специальном журнале. Проверка спецодежды и средств защиты производится под наблюдением лица, ответственного за работу. Проверка производится перед началом работы и после окончания работы. Проверка производится в соответствии с требованиями к работе.

13. Правила работы, порядок выполнения и другие требования к работе должны быть регламентированы в рабочих инструкциях. По окончании работы спецодежда и средства защиты должны быть вывешены в специально отведенном месте и далее обработаны в соответствии с требованиями к работе.

14. Для проведения работы с данными, полученными в результате работы, должны быть обеспечены соответствующие условия работы.

В течение всего года - тематическая работа (включая и другие) и другие работы, связанные с работой, должны быть выполнены в соответствии с требованиями к работе.

белоглазая каштанная при работе в полевых биптопах и летним головным убором (на одного работника по два комплекта постельных и три пары хлопчатобумажных носочков);

в холодное время года - меховым пальто, утепленной курткой с непромокаемыми вставками, утепленной бородкой, берущая лямочки или пальто с меховыми, толстыми рукавицами, меховым головным убором;

15. Для работ по транспортировке груза все рабочие должны быть обеспечены защитной одеждой: комбинезон, косырек, обувь (берцы или сапоги) и хлопчатобумажные перчатки.

[illegible]

[illegible]

(из списка выделяемых в ф. дифференци- ровки) (3 п.)	IV тип утверждаемый (400000)	(для утвержда- емого)	(для утвержда- емого)	I тип (для утверждае- мого)	II тип (для утверждае- мого)	III тип (для утверждае- мого)	IV тип (для утверждае- мого)	V тип (для утверждае- мого)	VI тип (для утверждае- мого)
Утвержда- емый (400000)	Итого	I тип (для утверждае- мого)	II тип (для утверждае- мого)	III тип (для утверждае- мого)	IV тип (для утверждае- мого)	V тип (для утверждае- мого)	VI тип (для утверждае- мого)	VI тип (для утверждае- мого)	VI тип (для утверждае- мого)
Итого	Итого	I тип (для утверждае- мого)	II тип (для утверждае- мого)	III тип (для утверждае- мого)	IV тип (для утверждае- мого)	V тип (для утверждае- мого)	VI тип (для утверждае- мого)	VI тип (для утверждае- мого)	VI тип (для утверждае- мого)

IV тип (для утверждаемого) - не утверждаемый

IV тип (для утверждаемого) - утверждаемый

Общая сумма: Итого

выделенных для

содержания

бюджет,

трансформации

не ЕПБ. В

дифференциаль-
но-оптимальном,

загрузка

(разреша-
ет)

материалы и

выделенные

Работа, связанная с IV типом ЕПБ. В работе для дифференциальной утверждения, в бюджетировании, в бюджетировании - I тип (для

с возмозможностями обращения	IV тип утверждаемый (обязателен)	I или II тип утверждаемый в БМБ II или III типа (или утверждаемый законом)
хорошо выполнены (в том числе централизованно и путем информации, полученной из распространен высших персона различия)		
Широко известны внутри бюджетного процесса и контрактных участников. Хорошо известны и шаровые работы	III тип	IV тип (или утверждаемый законом) + БМБ
Проведение интервью с работниками линии информации (в том числе показатели, показатели культуры, т.д.)	III или IV тип (или утверждаемый законом)	IV тип (или утверждаемый законом) + разрешение IV тип (или утверждаемый законом) разрешается

серийный номер исследования			
Исследования с применением ПЦР			
Содержательные исследования с ПЦР	ИЗ ПРОВЕДЕНЫ	13 лет (или соответствующий срок)	13 лет (или соответствующий срок)
Уборка, вынос, обработка, утилизация отходов (или: ликвидация)	ИЗ ПРОВЕДЕНЫ	13 лет (или соответствующий срок) – пистолет + МП	
При ликвидации аварий			
Планы, образцы, идентификация, маркировка	ИЗ ПРОВЕДЕНЫ	13 лет (или соответствующий срок)	

* Изображение средств индивидуальной защиты (маски, костюмы для их защиты).

** При применении любого метода дезинфекции использовались защитный костюм и перчатки (или соответствующий эквивалент).

Состояние	I тип	I тип	II тип	IV тип + респиратор	I тип + 2-я пара МП + ФК + НК	I тип + 2-я пара МП + ФК + НК	II тип
Син	III тип + респиратор	I тип	II тип предусмотрен	IV тип	I тип + 2-я пара МП + ФК + НК	I тип + 2-я пара МП + ФК + НК	II тип
	III тип	II тип	II тип предусмотрен	IV тип	II тип + 2-я пара МП + ФК + НК	II тип + 2-я пара МП + ФК + НК	II тип
	III тип	II тип	II тип предусмотрен	IV тип	II тип + 2-я пара МП + ФК + НК	II тип + 2-я пара МП + ФК + НК	II тип
Синдром хвост	III тип	II тип	II тип предусмотрен	IV тип	II тип + 2-я пара МП + ФК + НК	II тип + 2-я пара МП + ФК + НК	II тип
	IV тип	IV тип	IV тип предусмотрен	IV тип	IV тип + 2-я пара МП + ФК + НК	IV тип + 2-я пара МП + ФК + НК	IV тип
	IV тип	IV тип	IV тип предусмотрен	IV тип	IV тип + 2-я пара МП + ФК + НК	IV тип + 2-я пара МП + ФК + НК	IV тип
Холера	IV тип МП	IV тип + респиратор	IV тип предусмотрен	IV тип	IV тип + 2-я пара МП + ФК + НК	IV тип + 2-я пара МП + ФК + НК	IV тип
	IV тип	IV тип + респиратор	IV тип предусмотрен	IV тип	IV тип + 2-я пара МП + ФК + НК	IV тип + 2-я пара МП + ФК + НК	IV тип
	IV тип	IV тип + респиратор	IV тип предусмотрен	IV тип	IV тип + 2-я пара МП + ФК + НК	IV тип + 2-я пара МП + ФК + НК	IV тип
Дифтерия Кл	IV тип	IV тип + респиратор	IV тип предусмотрен	IV тип	IV тип + 2-я пара МП + ФК + НК	IV тип + 2-я пара МП + ФК + НК	IV тип
	IV тип	IV тип + респиратор	IV тип предусмотрен	IV тип	IV тип + 2-я пара МП + ФК + НК	IV тип + 2-я пара МП + ФК + НК	IV тип
	IV тип	IV тип + респиратор	IV тип предусмотрен	IV тип	IV тип + 2-я пара МП + ФК + НК	IV тип + 2-я пара МП + ФК + НК	IV тип

* Водяные прожилки по слизистой оболочке рта и глотки. Глазные конъюнктивы и слизистые оболочки рта и глотки. В СМД 1 типа.

** Водяные прожилки по слизистой оболочке рта и глотки. Глазные конъюнктивы и слизистые оболочки рта и глотки. В СМД 1 типа.

МП – мезентериальная перитония; ФК – фиброз; НК – некроз.

**Обеспечение безопасности при работе с ПБА в части эксплуатации
инженерно-технических систем**

1. Инженерно-технические системы биологической безопасности должны обеспечивать защиту персонала, воздуха рабочей зоны и окружающей среды при работах с использованием ПБА, а также предотвращать распространение ПБА за пределы помещения, включая помещения для хранения различных классов биологической опасности внутри одного помещения.

2. Устройства, режим работы, правила эксплуатации инженерно-технических систем должны соответствовать требованиям и оптимальности, как санитарно-гигиеническим (принадлежность) мероприятиям, направленным на обеспечение личной и общественной безопасности, защиту окружающей среды при работе с ПБА.

3. Оборудование и оснащение инженерно-технических систем биологической безопасности должны соответствовать действующим техническим документам, а также нормам и правилам пожарной безопасности.

Космические инженерные системы обеспечения биологической безопасности включают:

- отряды стропильных конструкций;
- системы вентиляции и климатизации воздуха;
- системы специализированной обработки сточных вод;
- системы передаточных устройств;
- систему водоснабжения и водопроводящих сетей индивидуальной системы;
- системы приготовления и хранения дезинфицирующих растворов;
- санитарные проходы;
- инженерно-технические и санитарно-технические системы;
- биологическую безопасность.

4. Инженерно-строительные конструкции, составляющие внутреннюю и внешнюю ограждающую группу помещений «защитной» зоны окружающей от помещений «защитной» зоны и окружающей среды, (далее – ограждающие строительные конструкции) должны обеспечивать безопасность при работе с ПБА.

5. Для предотвращения захвата ПТЧ на рабочих помещениях «загрязной» зоны и смежных помещений чистой зоны и во внешнюю окружающую среду принимаются строительные конструкции должны быть герметичными.

6. Отражающие строительные конструкции группы помещений «чистой» зоны составляют наружный контур герметизации.

7. Внутренний контур герметизации составляется стропильные стропилами отдельных помещений внутри «загрязной» зоны.

8. Контур отражающих стропильных конструкций составляют пол, потолок, стены, окна и двери.

9. Система отражающих строительных конструкций помещений «загрязной» зоны определяется в зависимости от характера проводимых работ и уровня биологической безопасности.

10. Пятипримочные решения помещений «чистой» зоны и отражающие строительные конструкции должны обеспечивать:

соблюдение требований технической документации, в том числе норм и правил пожарной безопасности;

наилучшую группировку помещений с одной и той же степенью приближенности к чистоте;

исключение пересечения порожков и примыканий к дверям материальных элементов;

наличие самозакрывающихся приточных клапанов и наличие естественной вытяжной вентиляции;

герметичность окон и дверей;

герметичность углов установки перегородочного оборудования и проходов коммуникаций через разделяющие конструкции на границе «загрязной» и чистой зон;

возможность сбора и обработки использованной рабочей одежды в соответствии с режимом работы и хранения чистой рабочей одежды;

размещение помещений с более высоким уровнем биологической чистоты внутри помещений более низкого уровня;

размещение помещений для содержания животных и работы с ними изолированно от других лабораторных и рабочих помещений;

устройство тамбур-шлюзов для персонала оборудования (при необходимости) и материалов на границах «загрязной» и чистой зон;

отсутствие выступающих элементов на внутренней поверхности отражающих строительных конструкций, нарушенных стыков вертикальных и горизонтальных

поверхностей отражающих конвекторов;

применение и отделка прохладостенных и санитарно-бытовых помещений износостойкими, нетоксичными материалами, легко моющимися, устойчивыми к воздействию растворов дезинфицирующих средств, герметизируемых настилов с лифтовыми окрешивателями химически стойкими эмалью;

использование полимерных, высокопрочных конструктивных материалов;

применение термостойких материалов при сильном и отраженном конструктивных элементах.

Для обеспечения надежной герметизации стыков всех конструктивных элементов должны применяться упругие прокладки и сальниковые термитапы, обеспечивающие уплотнение изоляции стыков элементов конструкции и обеспечивающие требованиям пожарной безопасности. Место ввода инженерных коммуникаций герметизируется и закрывается полз остальное покрытие пола. Полы для пола:

гидроизоляцию пола с настилом на вертикальную поверхность на высоту не менее 150 мм;

использование возможности приподнятыми и химическими. В помещениях бани для работы с лифтовыми шахтами предусматривают выходы (30 см) пороги, лифтовые для прохода шахты.

11. Для предотвращения развития пожарной опасности зоны и ограждающие строительные конструкции для лифтовой шахты 2 в виде должны быть обшиваться

железобетонными или другими требуемой прочности материалами в рабочих помещениях;

вместимость устройства предупредительной сигнализации, запрещающей одновременное открытие дверей лифтов.

12. Для предотвращения развития пожарной опасности зоны и ограждающие строительные конструкции для лифтовой шахты 2 в виде должны быть обшиваться предусматривать устройство на лифтовой шахте для санитарных помещений, состоящих из лифтовых шахт с лифтовыми шахтами (отделены для входа и выхода сотрудников) и санитарно-бытовых помещений, в которых применяются полные использование персонала члены рабочей и специальной одежды, средств индивидуальной защиты, их обеззараживание, приведение в исходное состояние и хранение. Для персонала, находящихся для купания в бане (лифтовой шахте является душевой).

13. Визуальный, приборный и инструментальный контроль на возможности

необходимо документировать утечек воздуха через ограждающие строительные конструкции в процессе эксплуатации необходимо проводить не менее 1 раза в 6 месяцев для максимальной изоляции лабораторий. При обнаружении документных утечек воздуха через ограждающие строительные конструкции необходимо принять меры по их ликвидации.

14. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха помещений "чрезвычайно" должны обеспечивать безопасность при работе с ПБА.

15. Системы вентиляции помещений "чрезвычайно" должны включать составленную часть системы биологической безопасности по предотвращению выброса ПБА во внешнюю среду и распространения ПБА между помещениями, фильтрация помещений и поглощения различных степеней биологической опасности внутри другого оборудования.

16. Системы приточно-вытяжной вентиляции зоны для биологической безопасности лабораторий должны включать в себя группу взаимосвязанных приточных и вытяжных вентиляционных установок, обеспечивающих непрерывный процесс принудительной вентиляции, а также обеспечение подержания требуемой вентиляции давлением и циркуляции воздуха рабочей зоны и обслуживаемой зоны или биологической безопасности.

17. Установки приточной или вытяжной вентиляции (сборки) должны включать в себя устройства и оборудование, включающие в себя фильтры, сертифицированные сертифицированные устройства, обеспечивающие фильтрацию и незначительное загрязнение, защиту от вредных веществ (при необходимости), выхлопных газов, жидкостей, плазмы и иных вредных веществ (элементов).

18. Фильтры очистки воздуха (фильтрующие элементы) устанавливаются в качестве защитных, в корпусе из стали, в корпусе или в корпусе на высокоэффективных фильтрах.

19. Для биологической функционирования систем вентиляции помещений "чрезвычайно" зона должна быть обеспечена:

составлены требования технической документации, при этом правила пожарной безопасности;

созданы необходимые санитарно-гигиенические и микроклиматические условия;

показатели вредных веществ в воздухе и внутри помещений должны быть в пределах;

обеспечение условий работы помещений и от биологических устройств воздуха путем обеспечения систем вытяжной вентиляции фильтрами и фильтрами в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню биологической безопасности лабораторий;

приточность воздуха должна в рабочих помещениях не менее установленной

нормативной документацией;

направление воздушного потока в сторону более «чистой» зоны;

бесперебойная работа систем приточно-вытяжной вентиляции;

исключая шумаемого в рабочие помещения воздуха в соответствии с требованиями.

предъявляемым в отношении безопасности лабораторий:

размещение фильтров очистки воздуха в помещении «чистой» зоны;

создание и поддержание избытка отрицательного давления (разрежения) относительно окружающей среды в рабочих лабораториях помещений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню безопасности лабораторий.

20. Контролируемые параметры работы систем вентиляции (величина разрежения в помещениях «чистой» зоны, скорость движения воздуха между помещениями лабораторий различного уровня безопасности, средняя скорость воздушного потока в открытых широких проемах, средняя скорость движения воздуха в рабочих притоках воздуха (интеркоммунитарной безопасности) должны соответствовать требованиям, предъявляемым в отношении безопасности лабораторий.

21. Системы вентиляции помещений «чистой» зоны должны непрерывно обеспечивать создание и поддержание требуемой величины разрежения, а в рабочих зонах и рабочих помещениях (интеркоммунитарных и микрокоммунитарных условиях). Допустимым переход на режим «первичного» давления с поддержанием оптимальной величины разрежения и сохранением напряженности воздушного потока в рабочее время.

22. Работа систем вентиляции биологического помещения «чистой» зоны для работ с микроорганизмами должна быть непрерывной, без переключений на обслуживание времени.

23. Автономные системы вентиляции следует предусматривать для помещений блока при работе с инфицированными животными.

24. Кондиционирование воздуха помещений «чистой» зоны предусматривается секциями кондиционирования (охлаждения, осушения), присутствующими в составе приточных воздушных систем до фильтров очистки воздуха не менее класса H11 - H13 (в случае их наличия). В лабораториях, осуществляющих работы с ПАВ III-IV группой патогенности, кондиционирование воздуха в помещениях «чистой» зоны должно также отдельно предусматриваться с обеззараживанием фильтрами 1 раз в 3 месяца.

25. Работа фильтров очистки воздуха подлежит инструментальному контролю эффективности. В лабораториях, выполняющих исследования объектов окружающей

средств и качества продукции на наличие санитарно-полезительных микроорганизмов, выражающихся в виде плесени и грибоподобных организмов, допускается помещать вентрикулярные кувалды заварочной фидерной (по режиму 1 раз в год).

26. Эксплуатация систем аэрично-вентиляционной системы (аэрично-вентиляционной системы) осуществляется в соответствии с инструкцией (руководством), утвержденной локальным актом организации.

27. Фильтры следует выбирать из стали с покрытием, устойчивым к обработке дезинфицирующими средствами. В системах фидерной системы преимущественно применяются (при необходимости) герметичные клапаны с электроприводом, устанавливаемые на воздуховоды непосредственно перед и после фидерной, для защиты от обработки фидерной.

28. Вентиляционные системы должны быть герметичными, устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами, устанавливаться на каждой части с аэрично-вентиляционной системой с клапанами, обеспечивающими охлаждение.

29. Устройства фидерной системы по условиям герметичности воздуховодов, проходящих через помещения других групп и клапаны, не допускаются.

30. Для лабораторий необходимо обеспечить уровень 4 необходимо также обеспечить:

оплавление и автоматическое поддержание внешнего отрицательного давления (разряжения) относительно окружающей среды в рабочих лабораториях помещений в соответствии с требованиями к уровню безопасности лабораторий:

оборудование помещений приточных и вытяжных устройств;

приточные и вытяжные системы вентиляции должны быть устойчивы к воздействию коррозии и воздействию агрессивных веществ (жидкостей);

автоматическое включение резервных вентиляторов при выходе из строя рабочих;

оборудование помещений вентиляции с электромеханическим приводом устройств в соответствии с требованиями к установке, установленной ФАИ:

контроль и управление работой всех приточных и вытяжных систем следует предусматривать дистанционным и автоматическим или ручным с центрального поста управления, размещенного в чистой зоне.

Информация о работе вентиляционных установок, включая перепад давления между помещениями разных групп, показания термометров и других элементов конструкции вентиляционных установок должна отображаться на дисплее.

Фильтры следует выбирать из коррозионно-устойчивой стали.

для стали с покрытием, устойчивой к обработке дезинфицирующими составами. В области фланцев (фланцев) применяются коррозионностойкие материалы с электропроводящим, устанавливаемыми на воздуховодах непосредственно перед и после фланцев, для защиты и обработки фланцев.

Герметичные воздуховоды должны выполняться из коррозионно-устойчивой стали или сварки с минимальным количеством фланцевых соединений. Фланцы и воздуховоды должны привариваться сплошным швом. Устройства фланцевых соединений на участках герметичных воздуховодов, проходящих через помещения других групп и классов, не допускается.

31. Комплекс инженерно-строительных решений и организационных мероприятий, обеспечивающих биологическую безопасность при входе в группы помещений «загрязненной» зоны и выходе из них (далее - санитарные пропускники) является составной частью системы биологической безопасности или предусмотрена введомой ПБА во внешней среде и распространения ПБА между помещениями зон различной степени биологической опасности внутри здания сооружения.

32. Устройство санитарных пропускников помещений «загрязненной» зоны осуществляется в соответствии с требованиями ПБА и характером производимых работ в соответствии с требованиями к уровню биобезопасности лаборатории.

33. Устройства санитарных пропускников должны обеспечивать:

- возможность одеться на комплект рабочей одежды при входе в «загрязненную» зону;
- индивидуальную мойку и смену рабочей одежды на выходе при выходе;
- возможность сбора и обезвреживания использованной рабочей одежды в соответствии с режимом работы и хранения чистой рабочей одежды;
- предупредительную сигнализацию, запрещающую одномоментное открытие всех дверей тамбура или тамбур-шлюза (при необходимости);
- направление воздушных потоков в сторону более «чистой» зоны;
- скорость воздушного потока в дверном проеме на границе чистоты и «загрязненной» зоны.

34. Санитарные пропускники должны быть автоматизированы для групп помещений различной степени опасности. При численности персонала, работающего в «загрязненной» зоне, до 6 человек допускается устройство санитарных пропускников, во всех остальных случаях - развешивание.

35. Устройство туалетов в санитарных пропускниках допускается только со стороны чистой зоны.

36. Контролируемым диаметром и санитарным пропускником является средняя скорость воздушного потока в открытых дверных проемах на границах зон, которая в санитарных пропускниках лабораторий максимального уровня изоляции должна быть не менее 0,4 м/с (первоначальная проверка 1 раз в 6 месяцев однократно с проверкой системы вентиляции).

37. Сырцованы, проходя из «чистой» зоны в «загрязненную» через санитарный пропускник, должны оставить личную одежду в индивидуальном шкафу, предназначенном для хранения, иметь свою обувь во входе для душа, проходить в помещении для подготовки рабочей одежды и обуви.

38. В санитарном пропускнике имеются отдельные комнаты для личной и рабочей одежды с индивидуальными шкафами, а также душевые, расположенные между двумя душами помывочными. Разница ялт происходит по направлению душевой со стороны чистой зоны.

39. Через санитарный пропускник из «чистой» зоны в «загрязненную» зону допускается только предметы, не загрязняющие помещения и не создающие воздушных депрессионного режима санпропускника. Из «загрязненной» и «чистой» зону разрешается проносить только книги, печати и листовки с персональной информацией, индивидуальное дезинфекционной обработки.

40. Сырцову обработан сточный вод состоит комплекс оборудования, обеспечивающий сбор, обезвреживание, обеззараживание при термическом обезвреживании и сброс сточных вод в водопользователя. По направлению работы сточные теплотой обработки сточных вод подразделяются на циклическую и непрерывную обработки.

Личные системы канализации помещений «загрязненной» зоны, транспортирующие загрязненные стоки к оборудованию системы обработки сточных вод (далее — сточных канализация) системы обработки сточных вод должны обеспечивать:

обеспечение требований нормативно-технической документации, а также мер и правил пожарной безопасности;

термическую (испарительную или циклическую) или химическую обработку сточных вод на «чистой» «загрязненной» зоны;

безопасный сброс обработанных сточных вод в канализацию с температурой не выше 40 °C;

биологическую безопасность при транспортировании загрязненных сред из помещений «чистой» зоны в помещения «загрязненной» зоны.

41. Помещения «загрязненной» зоны оборудуются специальными зонтами, которые должны

обеспечивать прием и транспортирование сточных вод, поступающих из этих помещений в сборные самотечные аппараты на тепловую или химическую обработку перед сбросом их в наружные сети канализации.

43. У каждого предприятия сточных вод, присоединяемого к сети канализации, предусматривается гидрозатвор. Конструкция гидрозатвора не должна препятствовать отсоединению при аварийном давлении для разгрузки в канализационной сети.

44. Сточные воды на технологическое оборудование и помещения санитарно-экономического назначения по санитарно-гигиенической сети трубопроводов в зависимости от их давления (сильнонапорные и вакуумные) и уровня канализации.

45. Сброс напорных стоков на технологическое оборудование и помещения производится в отдельные сборные самотечные аппараты, сброс их в аппараты для санитарных стоков не допускается.

46. Высокотемпературные технологические стоки перед поступлением в сборные самотечные аппараты должны охлаждаться до температуры не выше 80 °C и вводиться в аппараты под зеркало жидкости.

47. Устройства для сантехнических стоков должны обеспечивать заборные системы и обеспечивать возможность летнего прохода стоков.

48. Прочистку сети самотечной канализации осуществляют через решетки или гидрозатворы при помощи сточков. При выполнении этих и других ремонтных работ персонал должен находиться в защитной одежде, вид которой определяется в соответствии с требованиями биологической безопасности. Внутренняя пневматическая сеть в случае ремонта изолируется соответствующей дегазированной обработкой. Значительная дезинфекция сети самотечной канализации производится путем заливки ее дезинфицирующим раствором (3-4% поваренной соды или 1% хлорной извести) также с удалением пуха и осевшего наглухо у вала приемыма стоков.

49. Сети специализации должны быть термостатичны, замкнуты, сообщаются с воздухом помещений сформированной или другой, стальной или стальной фильтры очистки воздуха, обеспечивающие эффективность при повышенной влажности или загрязненности помещений (концентрация в воздухе). Периодичность проветривания этих фильтров - перед каждой сменой работы и не реже 1 раз в 6 месяцев. Обслуживание фильтров очистки воздуха, установленных на поступающих линиях аппаратов и на воздушный канал сети специализации, производится химическим или термическим методом.

50. Термическая обработка сточных вод осуществляется в системах, работающих

по пятилучевому или непрерывному принципу соответственно в емкостях - СТОС или в установках непрерывной обработки слювок - УНДС.).

51. Сбор сточных вод при пятилучевой обработке производится в отдельные специально предназначенные для этих целей емкостные аппараты. Соединение в одной емкости приема сточных вод и процесса термической обработки однозначно не допускается.

52. Обрубки емкости для приема стоков, нагреватели и выдерживающие для термической обработки, а также пилы для перекрестки стоков должны располагаться в охранной зоне.

53. Сети канализации (трубопроводы и факельные части) должны проектироваться открытыми, учетом требований прочности и коррозионной стойкости к дезинфицирующим растворам.

54. Сбор сточных вод при непрерывном способе осуществляется в емкостях с последующей термической обработкой на установках непрерывной стерилизации.

55. Системы контроля параметров и управления качеством процесса обработки сточных вод должны обеспечивать:

доставление информации о работе оборудования;

световую и звуковую индикацию, релезащиту и автоматическое поддержание на заданном уровне основных технологических параметров процесса (давление пара, подаваемого в установку обработки слювок, расход слювок перед нагреванием, температуру сгорания топлива и давление после нагревателя при непрерывном способе обработки, температуру и расход топлива - при пятилучевом способе, уровень сточных вод в емкостях для сбора слювок).

56. Системы контроля и управления технологическим процессом обработки сточных вод должны предусматривать наличие плавной автоматической блокировки, исключительной выходы из обработанных сточных вод при аварийном режиме стерилизации и повторную обработку.

57. Информация об изменении технологических параметров, работе оборудования и нарушении технологического режима обработки сточных вод должна отображаться на дисплеях.

58. Устройства технологических и санитарно-технических систем, обслуживающих домостроения «архивных» зон (далее - внутриквартирные системы) должны обеспечивать биологическую защиту домашних животных, растений систем и систем канализации дома и обеспечивать подачу воды в условиях работы.

59. Возмозательным технологическими и санитарно-техническими системами обеспечения безопасности являются системы:

холодного и горячего водоснабжения, отопления, холодоснабжения, теплоснабжения и обратного водоснабжения;

сжатого воздуха, технологически воздуха;

обор и обслуживающих/обслуживаемых твердых отходов, электроснабжения.

60. Системы холодного и горячего водоснабжения должны обеспечивать:

соблюдение требований нормативно-технической документации, а также норм и правил пожарной безопасности;

биологическую безопасность при транспортировании и расходе загрязненной воды из «грязной» зоны и повышенных «загрязненной» зоны.

качество холодной и горячей воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;

плотность и целостность системы водоснабжения в том числе не менее чем двумя водопроводами.

потребность в технологических и санитарно-технических расходах воды.

61. Во время работы с ПБА соблюдение помещений «загрязненной» зоны холодной и горячей водой должно осуществляться на «загрязненной» системе, повышенными устройствами, предотвращающими обратному току жидкости.

62. Полное прекращение работы для разрыва струи с холодной и горячей водой в процессе жидкостной не допускается. Если могут возникнуть полностью только после прекращения работы с ПБА и проведения полной заключительной дезинфекции в обслуживаемых помещениях «загрязненной» зоны. В случае аварийного отключения работы в (или) трубопроводах работа в обслуживаемых помещениях «загрязненной» зоны должна быть прекращена, трубопроводы обслуживаемого холодного и горячего водоснабжения отключены и в помещениях проведена заключительная дезинфекция.

63. Во время работы с ПБА запрещается опорожнение от воды системы охлаждения и минеральных «загрязненной» зоны. Опорожнение системы разрешается только после прекращения работы с ПБА и проведения заключительной дезинфекции во всех помещениях «загрязненной» зоны, обслуживаемых системой. Опорожнение внутренних систем должно производиться в сеть принудительной канализации.

64. Внутренние системы охлажденной воды, охлаждающей воды и теплоснабжения обслуживаются в жаркую систему через теплообменники,

устанавливаемые в помещениях «чистых» зон. Среди изолирующих систем выделяется в трубопроводы теплообменники, вырабатывающие тепло-холод, поступающие в окружающее пространство. Температуры среды в межтрубном пространстве теплообменников должны быть выше, чем в трубках.

65. Системы сжатого воздуха и технологического вакуума должны обеспечивать: соблюдение требований нормативно-технической документации, а также норм и правил пожарной безопасности;

требуемую герметичность системы сжатого воздуха;

требуемую чистоту вакуума и системы технологического вакуума;

обеспечение безопасности при транспортировании и разгрузе перемещаемой среды во «чистой» зоне и помещения «чистой» зоны.

66. Побудитель воздушного потока (компрессор, вакуум-насос) должен быть установлен в помещении «чистой» зоны.

67. Трубопроводы в арматуре сжатого воздуха и технологического вакуума должны быть герметичны, и покрытие их герметичности со стороны «чистой» зоны должно выдерживать обработку дезинфицирующим раствором.

68. Фильтры очистки воздуха, установленные на сети сжатого воздуха на границах помещений «чистой» зоны (со стороны помещений), подлежат проверке на эффективность фильтрации, целостность и герметичность: контролируемые не реже 1 раза в 6 месяцев для лабораторий максимального уровня чистоты; для остальных лабораторий - не реже 1 раза в год.

69. Контроль работы фильтров тонкой очистки на входе в технологических системах во «чистой» окружающей среде должен производиться по нормативной документации и на эффективность фильтрации для каждой ступени раздельно. Контроль гидравлического сопротивления фильтров должен проводиться и регистрироваться автоматически. Контроль эффективности фильтрации проводится в сроки, определенные в инструкции по эксплуатации, но не реже 1 раза в 6 месяцев для максимально оборудованных лабораторий и лабораторий, работающих с ТБС 1 - II групп, или остальных лабораторий - не реже 1 раза в год.

70. Дезинфекция фильтров тонкой очистки на входе в технологических системах производится химическим или термическим методом перед каждой проверкой или заменой фильтра.

71. Системы сбора и утилизации твердых отходов должны обеспечивать:

соблюдение требований нормативно-технической документации, а также норм и

OPREDELJENJE VARNOSTI INERCIJNE MASE:

внепрямой обход всех данных осколков, обусловится в результате работы с каталогами, лабораторными тикетными и соответствующим оборудованием и т.п. и т.п. в соответствии с требованиями;

высвобождающие требования регулярно автоматизируются с помощью ПО, позволяющего в
 различном журнале:

использованы методы, без деформаций контейнеров для сбора и транспортировки твердых отходов.

72. Системы электроснабжения должны обеспечивать:

сообщения: требования технической документации, в том числе нормы и правила пожарной безопасности;

собщениях: принят четкий тон электромагнитной;

моделировать функционирование всех систем сооружения путем адаптации бесшовных от разделительных мембранного, вальцовых и точечных бестеребильного питания для лаборатория материалов и их системы изобретения.

ЗАПЕЧАТЫТЬ печатью государственной или муниципальной власти первого
подписавшего;

применение электростатических зарядов во атомно-энергетической промышленности и промышленности строительных материалов.

73. Проверка работоспособности элементов системы осуществляется в соответствии с технической документацией по профилю, определенному программой.

74. Работа инженерных систем безопасности, санитарно-технических, вспомогательных технических систем, устройств и устройств должна соответствовать требованиям нормативных документов, устанавливающих требования к работе, качеству работы, качеству обслуживания. В этих случаях соответствующих систем. Даны и указаны все инженерные системы безопасности должны иметь не менее 1 года

75. Обслуживание, ремонт и ремонт контрольно-измерительных приборов и других механизмов и почасовых «зарядных» лиц должны выполняться только специально обученным персоналом с уровнем КТЭП/А, прошедшим соответствующий инструктаж

Рекомендуемый образец

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
учета инструкций по биологической безопасности

Национальная организация

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
учета инструкций по биологической безопасности

1. Отдел (лаборатория, подразделение) _____
2. Фамилия, имя, отчество (полностью при подписке) _____
3. Дата поступления в отдел (лабораторию) _____
4. Инструктаж по ББ (инструкция № _____) в рабочем месте прошел
руководитель группы _____
(фамилия, подпись, дата, должность, имя, отчество (полностью при подписке))
5. Инструктаж прошел _____
(подпись, подпись, дата)
6. Инструктаж по ББ пройден, разрешено допустить к самостоятельной работе
в качестве _____
- Начальник подразделения _____
(подпись, дата, фамилия имя, отчество (полностью при подписке))

7. Инструктаж на рабочем месте проходит:

Дата	Подпись выполняющего	По какой инструкции проведен инструктаж (виз, номер)	Подпись лица, проводившего инструктаж	Подпись лица, получившего инструктаж	Подпись заведующего отделом (лабораторией)
1	2	3	4	5	6

4. Эффективность: достижение поставленных целей, удовлетворение потребностей, развитие персонала, улучшение качества продукции.

[illegible]

Ваш предприятие (наименование) характеризуются средствами	Крытый эффектности
Средства для обработки лесов деревьев в природе	таблицы выдают при 6-24-часовом экспозиции в лабораторном помещении при условии через 1-3 суток. % - не менее 90
Средства, позволяющие способом выражения на растительности	Острые действия: таблицы полярны при условии через 2 часа - 100
Наименование средства контактной обработки	
Средства в форме дустов, жидкостей, мелкодисперсных и в виде фумигации для борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений	Острые действия: таблицы выдают при 6-24-часовом экспозиции в лабораторном помещении, красных клеток через 24 часа. % - 100
Средства в форме концентрированных растворов, суспензий, воднодисперсных, эмульсионных, аэрозольных, гранул и таблеток для борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений в виде фумигации для борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений	Острые действия: таблицы выдают при 6-24-часовом экспозиции в лабораторном помещении, красных клеток через 24 часа. % - 100 таблицы выдают при 6-24-часовом экспозиции в лабораторном помещении, красных клеток через 24 часа. % - не менее 90
Средства для борьбы с вредителями растений и помещений	Острые действия: таблицы выдают при 6-24-часовом экспозиции в лабораторном помещении, красных клеток через 24 часа. % - 100
Средства для борьбы с вредителями растений и помещений	Острые действия: таблицы выдают при 6-24-часовом экспозиции в лабораторном помещении, красных клеток через 24 часа. % - 100
Средства для борьбы с вредителями растений и помещений	Острые действия: таблицы выдают при 6-24-часовом экспозиции в лабораторном помещении, красных клеток через 24 часа. % - 100
а) препараты для борьбы с вредителями растений и помещений	Острые действия: таблицы выдают при 6-24-часовом экспозиции в лабораторном помещении, красных клеток через 24 часа. % - 100
б) препараты для борьбы с вредителями растений и помещений	Острые действия: таблицы выдают при 6-24-часовом экспозиции в лабораторном помещении, красных клеток через 24 часа. % - 100
Подобные препараты средства	
Для всех препаратов формы подкормки	таблицы выдают при 6-24-часовом экспозиции в лабораторном помещении, красных клеток через 24 часа. % - 100
Средства для борьбы с вредителями растений и помещений	таблицы выдают при 6-24-часовом экспозиции в лабораторном помещении, красных клеток через 24 часа. % - 100

Вид (подвидовая форма) до эфемерного среза	Кристаллическая структура
Средства борьбы с вредителями и болезнями	Время приготовления эмальевой композиции 100% массы и эмалированной посуды с наполнителем (песком, мелом) - не более 180
Препараты для обработки комбинированного действия	Острые действия на комбинированную смесь (1% и 2% - не более 15) Однородность смеси - не более 10 Таблетки (таблетки) 30 доз (таблетки) через 24 часа - 100
Средства для обработки комбинированного действия	Острые действия: Гибель тусклости комбинированной смеси через 72 часа, % - 100
Средства для обработки комбинированного действия	Острые действия: Гибель комбинированной смеси при 100 и 200% 40-50%, % - 100
Средства для обработки комбинированного действия	Время обработки 95% комбинированной смеси в объеме 10 л. смеси - не более 60
Средства для обработки комбинированного действия	Гибель комбинированной смеси через 24 часа, % - не менее 80
Средства для обработки комбинированного действия	КСД для комбинированной смеси, % - не менее 75
Средства для обработки комбинированного действия	Острые действия на комбинированную смесь: Однородность смеси - не более 15 Однородность смеси - не более 1000 КСД смеси - не более 10
Средства для обработки комбинированного действия	Гибель комбинированной смеси при обработке на комбинированную поверхность при 24 часа, % - не менее 80
Средства для обработки комбинированного действия	Гибель комбинированной смеси через 24 часа, % - не менее 80
Средства для обработки комбинированного действия	Устойчивость смеси 3 суток, смесь, % - не менее 80
Средства для обработки комбинированного действия	Вывод смеси в комбинированную смесь, смесь, % - не менее 80
Средства для обработки комбинированного действия	Вывод смеси в комбинированную смесь (КСД)
Средства для обработки комбинированного действия	Вывод комбинированной смеси в комбинированную смесь при 100% и 200% - не более 10
Средства для обработки комбинированного действия	Вывод комбинированной смеси в комбинированную смесь при 100% и 200% - не более 10
Средства для обработки комбинированного действия	Суммарное количество смеси с комбинированной смесью при 100% и 200% - не более 10

Вид активности (подтверждение) дезинфицирующего средства	Кристаллическая эффективность
Дезодоризаторы в АДСД (на основе) для тараканов	выше 50 факторизация: много разлетел тараканов без наличия морфологических изменений при учете через 14 суток, % - не более 50
Инсекто-рецидивные средства	Повысь биохимическую активность при кормлении на 3 суток при учете через 24 часа, % - не более 80
Приманки инсекто-рецидивные для тараканов	Повысить эффективность тараканов, % - не менее 80
Репеллентные средства в инсекте для тараканов (уменьшение активности тараканов на 30%)	Повысить эффективность тараканов, % - не менее 80
Дезинфицирующие средства (для тараканов)	Повысить эффективность тараканов, % - не менее 80
Дезинфицирующие средства (для тараканов)	Повысить эффективность тараканов, % - не менее 80
Дезинфицирующие средства (для тараканов)	Повысить эффективность тараканов, % - не менее 80
Дезинфицирующие средства (для тараканов)	Повысить эффективность тараканов, % - не менее 80
Дезинфицирующие средства (для тараканов)	Повысить эффективность тараканов, % - не менее 80
Дезинфицирующие средства (для тараканов)	Повысить эффективность тараканов, % - не менее 80
Дезинфицирующие средства (для тараканов)	Повысить эффективность тараканов, % - не менее 80

Вид активности (выявление), идентификация средства	Критерий эффективности
Идентификация, одобрение результатов (уточнение признаков, выделение) для защиты людей от воздействия популяции	КСД для выработки: % - не менее 20
Результаты исследования эффективности применения	Уменьшение числа и увеличения выработки клеток - в 2 раза и более
Выводы на основании результатов (уточнение признаков, выделение) для защиты людей от воздействия популяции	Уменьшение числа и увеличения выработки клеток - в 2 раза и более
Анализ результатов (уточнение признаков, выделение) для защиты людей от воздействия популяции	Уменьшение числа и увеличения выработки клеток - в 2 раза и более
Анализ результатов (уточнение признаков, выделение) для защиты людей от воздействия популяции	Уменьшение числа и увеличения выработки клеток - в 2 раза и более
Анализ результатов (уточнение признаков, выделение) для защиты людей от воздействия популяции	Уменьшение числа и увеличения выработки клеток - в 2 раза и более
Анализ результатов (уточнение признаков, выделение) для защиты людей от воздействия популяции	Уменьшение числа и увеличения выработки клеток - в 2 раза и более
Анализ результатов (уточнение признаков, выделение) для защиты людей от воздействия популяции	Уменьшение числа и увеличения выработки клеток - в 2 раза и более
Анализ результатов (уточнение признаков, выделение) для защиты людей от воздействия популяции	Уменьшение числа и увеличения выработки клеток - в 2 раза и более
Анализ результатов (уточнение признаков, выделение) для защиты людей от воздействия популяции	Уменьшение числа и увеличения выработки клеток - в 2 раза и более
Анализ результатов (уточнение признаков, выделение) для защиты людей от воздействия популяции	Уменьшение числа и увеличения выработки клеток - в 2 раза и более

Вид экстремости (получаемый) дезадаптивного средства	Критерий эффективности
Однократная закладка водной отпугивающей смеси	1. количество - 10 и более раз 20 2. категория - 3 и более раз 10 3. категория - 3 и более раз 5
Для защиты людей от нападения насекомых	Для насекомых клещей: КСД, % - не менее 95 Для людей: КСД, % - не менее 90 Дш, % - не менее 98 КСД, % - не менее 98
Адаптивные (инсектоакарицидные) средства для борьбы с насекомыми клещами	
Для борьбы с насекомыми клещами в пригородных биотопах	Острая реакция: Эффективность от 1 сутки, % - не менее 95 Длительность действия (при сохранении эффективности не менее 95%) сутки - не менее 30
Результативное средство	
Средства быстрого действия	1. время действия в пределах 10 минут от момента нанесения - не менее 95% Время действия - не более 3 суток Посредством готовой формы растворимой или порошкообразной смеси в воде (или в другой жидкости) в течение 10 минут от момента нанесения время действия - не менее 10% от общего действия
Средства длительного действия на основе эфирных масел	Время действия - не менее 14 суток Посредством готовой формы растворимой или порошкообразной смеси в воде (или в другой жидкости) в течение 10 минут от момента нанесения время действия - не менее 10% от общего действия
Средства быстрого действия	Посредством готовой формы растворимой или порошкообразной смеси в воде (или в другой жидкости) в течение 10 минут от момента нанесения время действия - не менее 10% от общего действия

Приложение 7

к СП 3.1686-21

Рекомендуемые образцы

Таблица 1

Журнал регистрации полученных документов, образцов (проб, образцов), материалов для исследований*

Полное наименование учреждения	Полное наименование подразделения	Длительность 3 сыв.	
	Диаг.		
	Исслед.		
Наименование отдела, отделения, лаборатория, производственного подразделения	Оформлена		
			(день, месяц, год)

№ или поступивший образец	Наименование ПБА или образца (проб, образцов); поступающих на исследование	Условно поступающий образец	Срок поступления	Цель исследования	Результат исследования (проба)	Дата выдачи	Подпись	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* В лабораторию, производящую исследования, журнал регистрации документов, образцов, материалов (проб, образцов), поступающих на исследование, заполняется по индивидуальным карточкам.

** В журнале указывается ссылка в ПБА или образцы (пробы, образцы, образцы):

увяточные (для копирования в журнал);

переводы в копировальную и другие подразделения; в других учреждениях (указаны в журнале);

подписаны во хранение (указаны в журнале).

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Исполнительное учреждение _____		Наименование предприятия _____		Хронолог. 3 года _____	
До: _____		Почет: _____		Оценка: _____	
Наименование отдела, отдела, лаборатории, предприятия _____		Наименование предприятия _____		(день, месяц, год) _____	
Формирование _____		_____		_____	

[illegible]

A TWINNED COPY OF THIS DOCUMENT IS AVAILABLE FOR THE NATIONAL ARCHIVES AT COLLEGE PARK, MARYLAND.

УДК 62-50

Выводы из журналов учета и отчетности по состоянию на 18.01.1977

Полное наименование предприятия		Характеристика 3 года			
Наименование учреждения		Тип:			
		Вид:			
Наименование подразделения (отдела, отделения, лаборатории, производственного формирования)		Оформляет:			
		(день, месяц, год)			

№	Наименование	Наименование	Объем	Полное наименование	История	Место	Возраст	Дата поступления	Судьба	Примечание			
											полное наименование	полное наименование	полное наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

в Бетон штатом, поступил на другой материал, в графе 11 указать, поменявшие коллекцию (организация), откуда поступил штатом, и наименование номера штатом, производственный и кой другой коллекции.

Журнал выдачи патентованных биологических материалов

Полное наименование организации		Хронология 3 года					
Полное наименование организации		Дир.					
Полное наименование организации		Начет:					
Наименование отдела, лаборатории, на базе которого (хитория)							
Функциональный кодировка организации							
№	Дата поступления	Описание поступления, сведения о разрабатываемом объекте	Наименование и инвентарный номер	Условно обозначение объектов с ПБА (указать вид поставки, упаковки)	Дата отгрузки	Фамилия, имя и отчество (последнее) при выписке, наименование учреждения, номер и дата документа, подтверждающего передачу выданного	Выписан в (фамилия, имя, отчество) (подпись) (при наличии) (подпись)
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
							10

«Уполномоченный» (разрешенный) руководителем организации на выдачу патентованного ПБА (имя, дата).

Журнал учета ПБА I-IV групп, находящихся в рубочной или заготовочной стадии

Полное наименование		Хранить 3 года	
Наименование учреждения		Исх. № _____	
Полное наименование		Цель: _____	
Полное наименование		Описание: _____	
Полное наименование		Дата, месяц, год: _____	

№ п/п	Полное наименование ПБА (для микроорганизмов) — род, вид и таксономическая группа	Наименование выделенного штамма	Путь поступления	Откуда получены штаммы, число, месяц, год получения	Отметка об употреблении передано другому сотруднику или передано в специализированный лабораторный кабинет	Отметка о применении (фамилия, имя, отчество (подписать при выделении), подпись, дата, месяц, год)
1				3	6	7

* Рубочная стадия — обработка древесины до получения древесины, находящейся в рубочной стадии.

Журнал учета качества строительных материалов и изделий

Наименование предприятия		Хранить 3 года					
Наименование учреждения		Дл.					
Наименование изделий (деталей, элементов, приборов и др.)		Наименование					
Краткое описание (применение)		Описание:					
		(день, месяц, год)					
№	Дата	Лаборатория (подписавший)	Наименование материала, ПБА	Число образцов, порезанных из каждой ПБА	Порядок сдачи материала, ПБА	Порядок принятого материала, ПБА	Исходный материал
1	2	3	4	5	6	7	8

вход	Режимы хранения			Контроль стерилизации			Другие виды испытаний (указаны в режиме эксплуатации)	Получить	
	квант	длительность (ч)	температура (°C)	экспозиция (архим-1)	Контроль стерилизации			послеавария (дезинфектор)	оценка качества
					анализы	тесты			
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6									

|| DUAHJUT ||

Received 12 July 2006; accepted 12 July 2006
Published online 12 July 2006 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/anie.200601422

Направление развития

HEAT-SENSITIVE PHOSPHOLIPASES

[illegible][illegible]

17

Журнал регистрации учета товаров ПБА и/у групп. (культура, искусство материальными в культуре)

Наименование учреждения

Наименование учреждения

Наименование учреждения, применяемого для формирования

№ п/п	Дата уничтожения ПБА	Фамилия, имя, отчество (полное при наличии) и должность уполномоченного ПБА	Фамилия, имя, отчество (полное при наличии) и должность ПБА	Полное наименование организации	Уничтоженный ПБА, объект (группа, объект), составляющий ПБА	Место уничтожения ПБА				Фамилия, имя, отчество (полное при наличии) ответственного лица
						являющийся объектом (разновидность объекта) уничтожения	путем уничтожения (способ уничтожения)	путем уничтожения (способ уничтожения)	путем уничтожения (способ уничтожения)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Наименование ПБА (для уничтожения) – год, вид, инвентарный номер и количество уничтоженного, количество уничтоженного (анну.)

Паспорт штампа

Наименование заведения	
Полное название учреждения	
Наименование подразделения (отдела, отделения, лаборатория)	
1. Регистрационный номер штампа в коллекции	
2. Наименование штамма (род, вид и патогенной трихариции)	
3. Подвид, тип, субтип, вариант, серотип	
4. Описание особенностей штамма, присвоенного коллекции	
5. Вегетативный, микотический, членистый	
6. Формы выделения	
7. Место выделения	
8. Способ выделения	
9. Кожный выделен	
10. Характеристика штамма:	
10.1. Морфология клеток при выделении	
10.2. Культуральные свойства	
10.3. Биохимические свойства	
10.4. Молекулярно-генетические характеристики	
10.5. Другие особенности штамма	
10.6. Данные о характерной структуре генома и (или) отдельных генов (ссылки на базы данных или другие источники, где хранятся данные о штамме)	

Ушиковой, маркировка, документация для транскрипирования ПБА I-IV групп патологичности (опасности), классифицируемых как грузы 6-й класс опасности

1. Наименование патологий соответствует Разделению по перечню опасных грузов.

2. Если наименование или физическое состояние вещества являющихся таковыми, что по результатам испытаний вещество не отвечает классификационным критериям, то это вещество не попадает под действующие нормы упаковки и маркировки.

3. Преобладающие и упорядоченные токсичные вещества (групп) биологической происхождения, классифицируемые как токсичные вещества подклассов 6.1, № ООН 3172 или № ООН 3402, являются отличительной группой упаковки, количества и физического состояния перевозимого материала (в жидком или твердом виде).

4. В подпунктах 6-9 Таблицы 1 приведены размеры инструкций и специальных этикеток по упаковке в соответствии с таковыми Рекомендациями по упаковке опасных грузов, которые следует применять в отношении от позначенной группы упаковки, количества и физического состояния перевозимых токсичных веществ № ООН 3172 и № ООН 3402.

5. В подпунктах 4 и 5 Таблицы 1 указаны количества токсичных, отравляющих или отравляющих веществ для как «свободных» количеств, а в отношении которых применяются требования к упаковке в соответствии с главами 9.4 и 3.5 Рекомендаций по перевозке опасных грузов.

Таблица I

№ ООН, задающая структуру наименование	Класс подразд.	Группа упаковки (ХМН)	Ограничения и оборудование ^{1,2}		Техн. КСД ^{3,4}		Перевозные шпалеры и контейнеры для опасных грузов	
			Странство- выд. количество	Оборудование количество	Идентификация по упаковке ^{5,6,7}	Специальные предостережения ^{8,9,10}	Идентификация ^{11,12}	Специальные попытки ^{13,14}
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.12*	2.0*	2.0, 1.1*	3.4*	3.2*	4.1.3*	4.1.4*	4.2.5(4.3.2)*	4.2.6*
3.12, «Товары, используемые не для целей организации».	6.1	1	11	1 шт/100 шт	1001			
3.12, «Товары, используемые не для целей организации».	6.1	0	100 шт	1 шт/200 шт	1001 1002			
3.12, «Товары, используемые не для целей организации».	6.1	III	5.4	20 шт/1000 шт	1001 1002 1003			
3.12, «Товары, используемые не для целей организации».	6.1	I	4	1 шт/200 г	1003 1007	101	106	1033
3.12, «Товары, используемые не для целей организации».	6.1	0	300 г	1 шт/1 г	1002 1003	103, 104	103	1033

6. Вопросы упаковки, маркировки, подготовки документов для транспортировки грузов, относящихся ко взрывчатой взрывчатке биологического происхождения в количествах, превосходящих приведенные в таблице 5 Таблицы 1 как освобожденные количества, в настоящее время относятся к Санитарным вопросам не рассматриваются.

7. Упаковка, маркировка грузов с токсичными биологическими продуктами № ООН 3172 и № ООН 3462 в освобожденных количествах осуществляется в соответствии с главой 5.5 «Опасные грузы, упакованные в освобожденные количествах» Рекомендаций по перевозке опасных грузов.

Каждая упаковка должна иметь:

надписанный и разборчивый маркировочный знак «Освобожденное количество», относящую маркировку в виде надписи: «Опасные грузы в освобожденных количествах».

В транспортном документе на опасный груз, перевозимый в освобожденном количестве (например, авиатрубопроводный бакетет) должны быть сделаны записи «Опасный груз в освобожденных количествах» и должны быть указаны количество упаковок.

Разрешается использовать транспортные пакеты, в которые могут помещаться упаковки с опасными грузами, не упакованными в освобожденные количества. В этом случае для маркировки транспортного пакета применяется правило пункта 5.1.2.1 Рекомендаций по перевозке опасных грузов.

В отношении грузов, упакованных в освобожденных количествах, применяются дополнительные требования и ограничения, связанные со спецификой конкретного вида транспорта, приведенные в международных соглашениях по перевозке опасных грузов по видам транспорта, ратифицированных Российской Федерацией¹.

Воздушными судами гражданской авиации² в освобожденных количествах могут перевозиться только те опасные грузы, которые разрешается перевозить на пассажирских воздушных судах и только те вещества подпадают 6.1, которые не входят в перечень с ингибирующей активностью веществ стеснен опасности (I группа упаковок).

Не разрешается перевозка опасных грузов в освобожденных количествах воздушным транспортом гражданской авиации в качестве зарегистрированного багажа, или в почте.

¹ Приказ МВ МВД РФ от 17.04.94; Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (информативный сайт Европейской таможенной комиссии (Европейский Союз) и Европейской комиссии (ЕС) и Европейской Федерации от 28.04.1994) в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.02.1994 № 76 «О продолжении Российской Федерации к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 7, ст. 508); Международное соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (Восточная Европа) от 27. 1976.

² Приказ МВ МВД РФ от 17.04.94.

От грузополучателя требуется заявление с указанием, в соответствии с каким документом производится подготовка груза к транспортировке.

Упаковка IBA I-EV группа опасности, классифицируемых как опасный груз подклассом 6.2 «Инфекционные вещества».

8. В отношении упаковки опасных грузов, содержащих инфекционные материалы подклассом 6.2, действует принцип тройной упаковки. Он подразумевает наличие трех слоев защиты:

первичная емкость. Первичная непроницаемая и герметичная емкость, содержащая образец. Эта емкость размещается в достаточном количестве абсорбирующего материала, чтобы в случае повреждения или протечки абсорбировать всю жидкость;

вторичная тара. Вторичная непроницаемая, герметичная тара для содержания и защиты первичных емкостей. В одну вторичную тару можно помещать несколько обернутых первичных емкостей; при этом следует использовать дополнительный абсорбирующий материал, чтобы исключить всю жидкость в случае повреждения или протечки. Первичная емкость и вторичная тара образуют внутреннюю тару;

наружная тара. Внутреннюю тару помещают в наружную тару для транспортировки с достаточным количеством амортизирующего материала. Наружная тара во время транспортировки защищает содержимое от неблагоприятных внешних воздействий — например, от механического повреждения. Минимальные размеры наружной тары должны быть не менее чем 10 x 10 см.

Каждый окончательно упакованный груз должен быть маркирован, иметь сопроводительную документацию, соответствующую в упаковке, и транспортировочную документацию, содержащую, в том числе, сведения об опасном грузе. Договор перевозки заключается при перевозке воздушным транспортом или эквивалентные документы при перевозке другими видами транспорта).

9. Из-за различий в отношении вторично упакованных инфекционных материалов Категории А и Категории В при транспортировке, правила упаковки, маркировки и сопроводительной документации для этих двух категорий различаются.

10. Упаковка опасных грузов, содержащих инфекционный материал подклассом 6.2 (материалы животного происхождения, а также медицинские отходы, содержащие патогены) для транспортировки в контейнерах для опасных грузов, в настоящее время применяется. Стандартные правила не рассматриваются.

Упаковка, маркировка, документация при транспортировке груза, содержащего инфекционные вещества Категория А, № ООН 2814

11. Установленные правила упаковки, маркировки, документации при транспортировке инфекционных веществ категории А, № ООН 2814, соответствуют установленным Регламентом по перевозке опасных грузов.

12. Тара, предназначенная для упаковки инфекционных веществ Категории А, № ООН 2814, должна соответствовать требованиям к изготовлению и материалам, определенным плавой 6.1 Рекомендаций по перевозке опасных грузов, и сертифицироваться компетентными органами.

На наружную тару должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями стандарта ООН, указывающая, что упаковка прошла испытания, удовлетворяющие всем требованиям и сертифицированы компетентными органами. Пример маркировки тары в соответствии со спецификацией ООН для инфекционных веществ Категории А (ООН 2814) I, K 4C/Cla:8 b 2470 (GB-2470) (Эта маркировка включает:

упаковочный штамп ООН;

сведения о типе упаковки (в данном случае – картонная коробка (4C));

информацию о том, что упаковка прошла необходимые испытания на соответствие требованиям к упаковке для инфекционных материалов Категории А (подкова 6.2);

последние две цифры года выпуска (в данном случае – 2010 год);

компетентный государственный орган, который разрешил использование данной маркировки (в данном случае: GB – Великобритания);

код идентификации упаковки, определенный компетентным органом (в данном случае 2470);

13. Грузотранспортные информационные материалы должны обеспечивать такие сведения упаковки, чтобы она находилась в полной готовности в надлежащем состоянии и не представляла опасности для людей или животных во время транспортировки.

14. Для наземного транспорта максимальное количество на упаковку не установлено. Для воздушного транспорта в соответствии с Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху¹ установлен следующий предел:

50 кг или 50 л в пассажирском самолете;

4 кг или 4 л в грузовом самолете.

15. При условии соблюдения требований Сопутствующих правил, а также пашоженных, изложенных в Инструкции РГМ по упаковке, представлений в разделах 4.1.4 и 4.1.9

¹ ТНН 9284 АЗ, 905 ИКАО.

Распадающийся по перечисленным группам, касающийся специфичных заболеваний шоупахом инфекционных веществ, предлагается осуществлять упаковку инфекционных веществ Категория А, МС ООН 2814, в тару, состоящую из:

- а) внутренней тары, пачки/коробки;
- термостойкую первичную емкость (емкость);
- герметичную вторичную тару;

кроме случая твердых инфекционных веществ — абсорбируемый материал в мешочках, лежащий для поглощения выделенного содержимого, помещенный между вторичной емкостью (емкостями) и вторичной тарой; или в одну единичную вторичную тару помещено несколько герметичных емкостей, они должны быть либо закручены на целостность, либо разделены во избежание взаимодействия;

- б) жесткой паружной тары:

барaban (стальных, алюминиевых, из прочих металлов, пластмассовых, из фанеры, из фибрового картона);

ящики (стальных, алюминиевых, из прочих металлов, из естественной древесины, из фанеры, из древесного материала, из фибрового картона, из пластмассы, из пенопласта, из твердой шпательности);

- вкладыш (стальной, глинозёмный).

Минимальный внутренний размер упаковки должен составлять не менее 100 мм.

16. Внутренняя тара содержит инфекционные вещества, не должна объединяться с внутренней тарой, содержащей другие грузы. Готовые упаковки могут объединяться в общие упаковки (транспортные пакеты). Такие пакеты могут содержать сухой тел.

17. Кроме таких исключительных случаев, как целые органы, для которых требуется специальная упаковка, к грузам применяются следующие дополнительные требования:

и материалы, находящиеся при температуре окружающей среды или при более высокой температуре. Первичные емкости должны быть стеклянными, металлическими или пластмассовыми. Для обеспечения герметичности должны использоваться также эффективные средства, как термостойкие, ополаскивающие пробки или запечатываемые обжимные пилы. В случае использования взвешивающихся пробок, также крышки должны быть закреплены эффективными средствами, в том числе клейкой лентой, герметизирующей лентой на основе парафина или вторичным устройством, соответствующим с этой целью.

б) материалы, находящиеся в охлажденном или замороженном состоянии. Возврат вторичной тары или, как альтернативный вариант, в пакет с сухой или влажной

готовимых упаковками. Лидеры поместятся под сухой лед или другой охлаждающий агент. Вторичная тара для упаковки должна быть вышита с помощью фасторик так, чтобы она не оказывала своего воздействия после того, как лед растает или сухой лед испарится. Если используется лед, внутренняя тара не должна быть герметичной. При использовании сухого льда наружная тара или пакет должны пропускать газообразный диоксид углерода. Первичная емкость и вторичная тара должны сохранять свою целостность при экстремальном снижении температуры охлаждения пещеры;

п) материалы, перевозимые в жидком виде. Должны использоваться пластмассовые первичные емкости, способные выдерживать очень высокие температуры. Внутренняя тара также должна выдерживать очень высокие температуры, и в большинстве случаев она применяется для упаковки каждой первичной емкости. Должны также соблюдаться требования, касающиеся перевозки жидкого кислорода. Первичная емкость и вторичная тара должны сохранять свою целостность при температуре жидкого кислорода;

т) криофидирующие материалы могут также перевозиться в первичных емкостях, которые представляют собой статические замкнутые системы для стекловых флаконов с резиновой пробкой, снабженных меташтифтами кильбертом.

18. Независимо от предполагаемой температуры перевозки, первичная емкость и вторичная тара должны выдерживать не только утечки, внутреннее давление, превышающее 30 мПа или менее чем на 95 мПа внешнее давление, и температуры в диапазоне от -40°C до $+55^{\circ}\text{C}$.

19. Другие опасные грузы не должны перевозиться в одну и ту же тару с инфекционными веществами класса 6.2, в исключительном случае, когда они необходимы для поддержания жизнеспособности, стабилизации или предотвращения инфицирования веществ или для нейтрализации ядовитых веществ, опасных для инфекционных животных. В каждую первичную емкость, содержащую инфекционные вещества, может помещаться 30 мл или менее опасных грузов, включенных в классы 2 (инфекционные вещества), 3 (коррозивные вещества) или 9 (другие опасные вещества и изделия, включая изделия, отнесенные для отбраковки).

Любая первичная емкость объемом более 50 мл должна быть расположена в партикулярной таре таким образом, чтобы крышки находились сверху. Из двух противоположных поверхностей наружной тары в этом случае должны быть вырезаны прямоугольные накладки с двумя отверстиями, направленными вверх, для указания направления расположения крышек первичных емкостей.

20. Для предотвращения порывов течи трубопроводов ВПВ до ее устранения и других место она должна быть продезинфицирована или сжигаться для исключения любой опасности. В любом случае на нее должны быть нанесены маркировка, свидетельствующая о том, что в ней находятся инфекционные материалы, должны быть удалены или скрыты.

21. Маркировка ушаков, содержащих инфекционные материалы Категории А, соответствуют требованиям главы 5.2. и в разделе 4.1.8⁴ Маркировка содержит:

наименования и адреса производящих и транспортирующих пункты назначения в отношении груза:

пункт опасности (стикеры I для инфекционного вещества);

№ ООН 2814 и соответствующее четырехзначное наименование «Инфекционное вещество, опасное для людей»;

требование по хранению при определенных температурных режимах (если требуется);

маркировку, указывающую, что тара прошла испытания в соответствии с требованиями пункта 12 настоящего приложения к Санитарным правилам и сертификатом компетентного органа;

все грузы вето и брело;

выступающие знаки, указывающие на способ обращения с грузом (в том числе ориентировочные наклейки для указания правильного положения крышек первичных емкостей с двумя стрелками, направленными вверх);

- при использовании одного для или заднего дна в качестве хвостового;

знак опасности (стикеры), для одного лица для каждого типа и соответствующее соответствующее наименование с добавлением слов «В пакете/в контейнере»;

- надпись «транспортируемые грузы/экспресс»;

- фирманы, дата, отсылки (последнее для вето), номер телефона ответственного лица, располагающего информацией о грузе (в соответствии с национальными и международными правилами перевозки опасных грузов по воздуху, автомобильным и морским транспортом);

- надпись «Не открывать. Опасно».

22. Документация для идентификации инфекционных веществ ушаков А, № ООН 2814. Каждый предназначенный для транспортировки груз, содержащий инфекционное вещество Категории А, должен иметь соответствующую документацию.

⁴ Рекомендации по маркировке опасных грузов.

эксплуатацию и утилизацию (использовательские письма и акт утилизации) и транспортировки документов.

23. Сопровождающую документацию (использовательские письма и акт утилизации) оформляют в двух экземплярах. Первый экземпляр помещают в упаковку вместе с тарой и наружной тарой, второй экземпляр остается у грузоотправителя.

В сопроводительном письме на бланке организации-грузоотправителя указывают название организации-грузоотправителя в грузополучателя, их адреса, телефоны, факсы, адрес электронной почты, факсимля, имя человека (последнее при наличии), телефон ответственного лица, располагавшего информацией о грузе, номер Организации Объединенных Наций и выданный им документ, подтверждающий статус груза, указывают наименование информации, ставя в соответствие с международный кодификацией в латинский транслитерации и на русском языке, количество первичных экземпляров с секретным индексирующим номером и количество экземпляров с секретом.

Если индексируемые данные являются секретными, то есть относятся к категории А по КСНН 2814, то в сопроводительном письме указывают, что индексируемые данные относятся к категории А.

Сопроводительное письмо подписывает руководитель организации.

В акте упаковки указывают дату упаковки, общее количество первичных экземпляров, количество тир и акт первичных экземпляров (в том числе латинский алфавит, в том числе латинский алфавит) и в том числе тары, способ их термизации (в том числе термостатирование, пиритерм, пиритерм, вакуумирование, крышки с латеральными устройствами), указывают также, в соответствии с какими национальными и международными правилами или инструкциями упакован груз, в факсимля, имя человека (последнее при наличии) лица, производившего упаковку. Акт упаковки подписывают лицом, производившем упаковку.

Организация, осуществляющая упаковку с индексируемым веществом категории А, должна вставить акт упаковки упаковки в вместе с письмом, подтверждающим получение, отправить его в организацию, отправившую ППА.

24. Транспортный документ по опасным грузам Категории А по КСНН 2814 должен содержать информацию с перечисленными в пункте 3.4.3.3 обязательными элементами. Форму транспортного документа определяет перевозчик в соответствии с правилами и положениями данного вида транспорта: при перевозке воздушным транспортом предусматривается информация декларацию грузоотправителя опасных грузов и

вызывающую, для перевозки другим видом транспорта оформляется самостоятельным сопроводительным документом.

25. Информация об опасном грузе включает следующие обязательные элементы:

название и адрес грузоотправителя и грузополучателя опасного груза;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона ответственного лица, предоставляющего информацию о грузе;

наименование опасного груза, состоящее из № ООН 2814, подлежащего отгрузке, и наименования «Инфекционные вещества, опасные для людей» с указанием в скобках наименования инфекционного агента и показателя с международный идентификацией и латинской транскрипцией на русском языке (если инфекционные вещества неизвестны, то есть известные только, что они соответствуют критериям для отнесения их к Категория А в номеру ООН № ООН 2814), то указывается, что инфекционные вещества предположительно относятся к (Категории А); указывая также, является ли вещество:

общее вещество каждого другого опасного груза, имеющего отдельный номер ООН, подлежащий отгрузке и выполнение для каждого из этого груза, в том числе для сухого льда или жидкого азота, если используется;

полностью в отягощен указывать:

номера классов опасности;

декларацию, подписанную грузоотправителем с указанием даты составления, состоящую из следующей фразы: «Настоящим заявляю, что содержание данной партии груза полностью и точно описано выше (или ниже) указанным отгрузочным наименованием и что содержащее классифицировано, упаковано, маркировано, снабжено этикетками и во всех отношениях соответствует в полном соответствии для перевозки в соответствии с применимыми международными и национальными государственными правилами»;

указания и действия, которые должны предпринять перевозчик в отношении повреждений, указав, отгруженный в отношении вида транспорта или маршрута (если таковые есть). А также, по требованию перевозчика, маркировка на случай аварии или инцидента связанного с нарушением целостности упаковки, включая для перевозки содержимого.

Упаковка, маркировка, оформление документов для транспортировки

инфекционных веществ Категория В № ООН 3373

26. Действует прилагаемый образец упаковки, являющийся в настоящее время приложением к Дополнительным правилам.

28. Необходимость в сертификации тары для упаковки инфицированных веществ Категории В № ООН 3373 возмещается органом В в маршировке тары в соответствии с требованиями спецификации ООН, указывающей, что указанная тарная конструкция в соответствии с главой 6.3 Рекомендаций по перевозке опасных грузов. ВСТ.

Можно воспользоваться доступными источниками упаковочных материалов при условии, что как производитель тары, так и грузоотправитель могут полностью выполнить требования в отношении тары и упаковки, изложенные в настоящих приложениях к Стандартным правилам.

29. Правила упаковки инфицированных материалов Категории В № ООН 3373 действуют при перевозке тарой из любого типа транспорта в соответствии с Инструкцией по упаковке Р650 для инфицированных веществ Категории В № ООН 3373, приведенной в разделе 4.1.4 Рекомендаций по перевозке опасных грузов.

Для перевозок инфицированных материалов Категория В № ООН 3373 действуют также правила транспорта действующее дополнительное требование по упаковке, приведенные международными соглашениями или соответствующим видом транспорта. В отношении упаковки опасных грузов для авиатранспорта действуют требования технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по вводу Международной организации гражданской авиации (далее – ИКАО 9284 AN 005 ICAO).

30. При упаковке инфицированных веществ Категории В № ООН 3373 тару должны быть должностным образом и достаточно прочной, чтобы выдерживать удары и вибрации, обычно происходящие в ходе перевозки, а также при выгрузке между транспортными единицами и между грузом и транспортными единицами и складами, а также при любом перемещении с полки или палеты из тары с целью последующей ручной или механической обработки. Тара должна быть сконструирована и закрыта таким образом, чтобы не допускалось какой-либо потерей содержимого, которая может произойти в обычных условиях перевозки в результате вращения, изменения температуры, воздействия или давления.

Тара должна состоять, как минимум, из трех компонентов:

- а) первичной упаковки;
- б) вторичной тары;
- в) наружной тары.

При этом либо вторичная, либо наружная тара должна быть жесткой.

31. Вторичная упаковка должна указываться во вторичную тару таким образом, чтобы при обычных условиях перевозки исключать возможность их разрушения, при этом или пропеченая или содерываемого по вторичную тару. Вторичная тары должна указываться в

нарушению тару с использованием производного прокладочного материала. Любая протечка конденсата во время существенно ухудшает защитные свойства прокладочного материала или паружной тары.

32. По крайней мере одна из поверхностей излучатель тары должна иметь минимальный размер $100 \text{ мм} \times 100 \text{ мм}$.

33. Пенопласт должен быть в состоянии выдержать воздействие из шлангов, описанных в пунктах 6.3.5.1 и 6.3.5.2 Рекомендаций по перевозке опасных грузов, с высоты 1,2 метра.

34. Для теплых материалов:

а) первичная емкость (емкости) должна быть герметичной;

б) вторичная тара должна быть непроницаемой;

в) если в силу действия вторичной тары существует опасность разрушения первичных емкостей, они должны быть обернуты по отдельности или разделены во избежание взаимного соприкосновения;

г) между первичной(ыми) емкостью(ями) и вторичной тарой должен быть помещен абсорбирующий материал. Абсорбирующий материал должен состоять из количества, достаточного для поглощения всего содержащего шланговой(ых) емкости(ей), так чтобы любая утечка жидкости не ухудшила существенно защитные свойства прокладочного материала или паружной тары;

д) первичная емкость или вторичная тара должны быть в состоянии выдержать без протечек внутреннее давление 95 кПа (0,95 бар).

35. Для твердых материалов:

а) первичная емкость (емкости) должна быть непроницаемой для сыпучих веществ;

б) вторичная тара должна быть непроницаемой или герметичной;

в) если в силу действия вторичной тары существует опасность разрушения первичных емкостей, они должны быть обернуты по отдельности или разделены во избежание взаимного соприкосновения;

г) если есть сомнения по поводу того, что в первичной емкости во время движения между присутствовать остаточная влажность, то в этом случае должны использоваться тара, подходящая для жидкостей, с абсорбирующими материалами.

36. Охлажденные или замороженные образцы (лед, сухой лед, жидкий азот):

а) если в качестве охлаждающих веществ лед или жидкий азот, применяются требования раздела 5.5.3 Рекомендаций по перевозке опасных грузов. Когда используется лед, его необходимо поместить на известном вторичной таре или в транспортный пакет. Вторичная тара должна быть защищена с помощью распорок так

либы она не изменила своего первоначального назначения. Если используется тал, наружная тара или транспортный ящик должны быть маркированы так:

61. Наружная этикетка и внутренняя тара должны содержать свою целостность при температуре используемого хладагента, а также при температурах и давлениях, которые могли бы возникнуть в случае утечки хладагента.

37. Если упаковочная поликарбонатная транспортная тару маркированную таким же образом должны быть легко читаемы, либо маркированы на выгравированной поверхности поликарбонатного пакета.

38. Прочие опасные грузы не должны находиться в одной и той же таре с инфицированными веществами класса 6.2, за исключением случаев, когда они необходимы для поддержания жизнеспособности, стабилизации или предотвращения распространения инфицированных веществ или для нейтрализации ядовитых веществ, соответствующих инфицированным веществам.

39. В целях маркировки упаковки, содержащих инфицированные вещества Категория В № ООН 3271, на упаковке, подшитой к сопроводительным документам

транспортной маркировки, включаются сведения о грузополучателе, т.е. кроме наименования грузополучателя в пункте назначения, указывается его адрес и номер телефона:

наличие и маркировка упаковки должны соответствовать «Биологический препарат, категория В» маркированный знак (рис. 10) и форма поликарбоната по 15 артикулу квадрата (ромба) с длиной стороны не менее 50 мм, ширина этикетки должна составлять не менее 2 мм, а высота букв и цифр — не менее 6 мм.

Если требуется, указывается температурный режим хранения;

при использовании этого знака для упаковки (пакета) в качестве хладагента (пакета) знака (этикетки), код ООН и соответствующие отрублившиеся поликарбонаты с добавлением слова «В качестве хладагента», с указанием netto количества этого льда в килограммах.

40. Упаковочный и предназначенный для транспортировки груз, содержащий инфицированные вещества Категория В № ООН 3271, должен иметь сопроводительные документы, включенные в упаковку, а также транспортную документацию (авиаакт/титул при перевозке традиционным наземным транспортом или заглаженный документ при перевозке другим видом транспорта).

41. Сопроводительные документы оформляются в двух экземплярах. Первые экземпляры помещаются в упаковку между вторичной и наружной тарой, вторые экземпляры остаются у грузополучателя.

В сопроводительном письме на бланке организации-грузоотправителя указывается организационный грузоотправитель и грузополучатель, их адреса, телефоны, факсы, адреса электронной почты, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), телефон ответственного лица, расшлюбающего информацию о грузе. Организации Общественный Наблюдатель и владеющее отгрузочное наименование отправляемого груза, а также указывается наименование инфекционного агента в соответствии с международной классификацией в латинской транскрипции и на русском языке, количество переносимых инфекций с конкретными инфекционными агентами и количество содержания в емкостях.

Сопроводительное письмо подписывает руководитель организации-грузоотправителя.

Организация, получившая разрешение с инфекционными материалами Категория В, должна составить акт вскрытия упаковки и тиснуть с письмом, подтверждающим получение инфекционного материала, направить его в организацию, отправившую инфекционный материал.

42. Грузоотправитель заполняет транзитный документ - инвентаризацию при перевозке транзитом воздушным транспортом для живых животных докумен при перевозке другим видом транспорта. При этом транзитные документы на опасный груз в форме декларации грузоотправителя на опасный груз не требуется.

43. Для перевозки инфицированных материалов Категория А № ООН 2814 и Категория В № ООН 3373 разлитыми в емкости транспортом (транзитом воздушным транспортом, автомобильным, морским) применяются положения, соответствующие международным правилам ИПОД в указанной области.

Классификация и идентификация ПБА I-IV групп патогенности (опасности) для людей транзитирования¹

1. Система классификации и идентификации в соответствии с Типовыми правилами ООН.

2. ПБА I-IV групп патогенности (опасности) относят к классу 6 опасных грузов. Toxicity hazard and infectious hazard.

Класс 6 подразделяется на два подраздела:

Подкласс 6.1 Toxicity hazard.

Вещества способны вызывать смерть или серьезную травму, или причинять вред здоровью человека при проглатывании, вдыхании или контакте с кожей или глазами.

Подкласс 6.2 Infectious hazard.

Вещества, о которых известно или имеются основания полагать, что они содержат патогенные организмы. Патогенные организмы – это микроорганизмы (включая бактерии, вирусы, грибки, простейшие, гельминты и другие инфекционные агенты, такие как споры), способные вызвать заболевание людей или животных.

3. Опасные грузы включают идентифицированные номера ООН, присвоенные Консультативным экспертам ООН как наиболее часты транзитируемые опасные грузы или их группам и описание в Перечень опасных грузов, приведенный в части 3 Рекомендаций по перевозке опасных грузов, датируемый ООН.

4. Вещества подкласса 6.1 относят к следующим группам упаковки в соответствии со степенью их токсической опасности при перевозке:

- группа упаковки I – вещества и препараты с чрезвычайно высокой степенью риска поражения;
- группа упаковки II – вещества и препараты с высокой степенью риска поражения;
- группа упаковки III – вещества и препараты с относительно низкой степенью риска поражения.

При отнесении веществ к одной из групп должны учитываться имеющиеся сведения об отравлении людей при известных случаях, а также данные о токсическом действии веществ на особую группу особей, проявляющихся в особом биологическом действии.

5. При отсутствии данных о воздействии на людей отнесение к той или иной группе должно основываться на результатах экспериментов на животных. Должны быть

¹ Части 2 и 3 Рекомендаций по перевозке опасных грузов.

изучены следующие показатели токсичности при трех возможных путях воздействия: а именно, при пероральном, ингаляционном, а также, выделяя в окружающую среду (пыль, токсичная жидкая), в соответствии с подразделами 2.6.2.1 и 2.6.2.2 Типовых правил ООН¹.

Таблица 1

Показатели и критерии определения степени опасности веществ по пероральной, ингаляционной, ингаляционно-ингаляционной (аэрозоль) токсичности в отношении веществ к группам упаковки

Показатель	Критерий степени опасности веществ группа упаковки		
	Чрезвычайно высокая степень риска отравления, группа упаковки I	Высокая степень риска отравления, группа упаковки II	Относительно низкая степень риска отравления, группа упаковки III
Пероральная токсичность, средняя смертельная (летальная) доза LD ₅₀ , мг/кг	≤ 5	> 5; ≤ 50	≥ 50; ≤ 300
Чрезвычайная токсичность, средняя смертельная (летальная) доза LD ₅₀ , мг/кг	≤ 50	> 50 - ≤ 200	≥ 200; ≤ 1000
Токсичность при вдыхании аэрозоля, средняя смертельная (летальная) концентрация LC ₅₀ , мг/л	≤ 0,2	> 0,2; ≤ 1	> 1; ≤ 4

6. Токсичные биологического (растительного, животного или бактериального) происхождения, которые не содержат пагубно-инфекционных веществ, или содержатся в веществах, не являющихся инфекционными, должны рассматриваться из пределов их упаковки в подкласс 6.1 и обозначаться № ООН 3172 или № ООН 3462.

7. Подлежащим погружному обозначению для № ООН 3171 является «Токсичная, выходящая из живых организмов, жидкая», Н.У.К.х. для № ООН 3462 «Токсичная, выходящая из живых организмов, твердая» Н.У.К.х. (Н.У.К. - не указанные конкретно).

В грузовых документах и при маркировке упаковки подлежащее погружному обозначению должно быть выделено текстовым обозначением (жирное прописание или ссылка к упаковке с токсичным биологическим происхождением в освобожденных количествах).

¹ Рекомендован по паражам опасных грузов.

Воздействие инфекционного вещества происходит в случае его утраты из защитной упаковки, в результате которой оно вступает в физический контакт с людьми или животными.

Инфекционные вещества, которые отвечают всем критериям и вызывают заболевания людей или животных и животных, присваивается № ООН 2814. Инфекционным веществом, вызывающим заболевания только животных, присваивается № ООН 2000 (в Санитарных правилах не рассматриваются).

Характерные примеры инфекционных веществ № ООН 2814, отвечающих этим критериям, приводятся в таблице 2.

Таблица 2

Примеры инфекционных веществ, включаемых в категорию А в любом виде.

Номер ООН и вызываемое отравление человека/животного	вещь не уязвимо или	
	Микроорганизмы	
ООН 2814 Инфекционные вещества, опасные для людей	<i>Bacillus anthracis</i> (только культуры) <i>Breuerella abortus</i> (только культуры) <i>Breuerella melioides</i> (только культуры) <i>Brucella suis</i> (только культуры) <i>Burkholderia mallei</i> – <i>Pseudomonas mallei</i> – <i>Campylobacter</i> (только культуры) <i>Burkholderia pseudomallei</i> – <i>Pseudomonas pseudomallei</i> (только культуры) <i>Chlamydia psittaci</i> – птичий тиф (только культуры) <i>Clostridium botulinum</i> (только культуры) <i>Coccidioides immitis</i> (только культуры) <i>Cryptosporidium parvum</i> (только культуры) Вирус Крюгелштейна-Конго гоморепликационный микоразлит Вирус гепатита (только культуры) Вирус оспы человека (только культуры) <i>Escherichia coli</i> , серотипы (только культуры) <i>Haemophilus influenzae</i> Завр. С. ульн. Бундербелло Вирус Сэвиса Вирус Феттера <i>Enterococcus faecalis</i> (только культуры) Вирус Гумарито Хангвиртуса, вызывающего геморрагическую лихорадку с почечным синдромом Вирус Хендри Вирус гепатита В (только культуры) Вирус гепатита В (только культуры) Вирус ньюкастельского гриппа (только культуры) Высокопатогенный вирус птичьего гриппа (только культуры) Вирус японского энцефалита (только культуры) Вирус Желтой	

Вирус болезни Кассавурского леса
Вирус Ласса
Вирус Мэнуло
Вирус Марбург
Вирус оспы обыкновенной
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> (только культуры) *
Вирус Ниппа
Вирус оспы гвинея-конголезской лихорадки (только культуры)
Вирус оспы мавританской (только культуры)
Вирус бешенства (только культуры)
<i>Rickettsia prowazekii</i> (только культуры)
<i>Rickettsia rickettsii</i> (только культуры)
Вирус Райт-Балла (только культуры)
<i>Shigella dysenteriae</i> тип 1 (только культуры) *
Вирус клещевого энцефалита (только культуры)
Вирус энцефалитной оспы
Вирус неспецифического энцефалита людей (только культуры)
Вирус Занзибарского Ниппа (только культуры)
Вирус жёлтой лихорадки (только культуры)
<i>Yersinia pestis</i> (только культуры)

*Одними для возгонной трансформации, если культуры предназначены для исследования или выращивания людей, они могут быть классифицированы в качестве инфекционных материалов Категории В.

Инфекционные вещества, включая кровь или компоненты тубуляризованных инфекционных болезней, которые не включены в таблицу 2, но отвечают специфическим критериям, отнесен к Категории А. Если же представляется возможным установить, что для них или иных материалов примененным критериям, или другим веществам его следует включить в Категорию А.

К категории В относятся инфекционные вещества, не отвечающие критериям отнесенным к Категории А. Такие инфекционные вещества относят к № ООН 1333.

1) Биотическим и абиотическим материалам, пробам, образцам, в которых известно или есть основания считать, что они содержат инфекционные вещества Категории А присваивают № ООН 2814 или № 2900, Категории В № ООН 3371.

2) Медицинскими или ветеринарными отходами, а именно, отходами лечения людей или животных или отходами биологическими, содержащими инфекционные вещества Категории А, опасные для людей и животных, присваивают № ООН 2814. Отходами лечения животных или отходами биологическими, содержащими инфекционные вещества Категории А, опасные только для животных, присваивают № ООН 2900.

Медицинскими или биотическими отходами, а именно отходами лечения людей или животных или отходами биологическими, содержащими инфекционные вещества Категории В, присваивается № ООН 3291.

Медицинским и др. источниками слюды, в отпавлении которых требуется оказание помощи, что она с малой долей вероятности содержит инфекционные вещества, присваивается № ООН 3291.

1.3. Надлежащими структурными наименованиями для опасных грузов являются 6.2. материалы

- для № ООН 2814 - «Инфекционные вещества, опасные для людей»;
- для № ООН 3000 - «Инфекционные вещества, опасные только для животных»;
- для № ООН 3073 - «Бактериальный препарат, возбудитель Б.с»;
- для № ООН 3291 - «Клинические отходы, острые, Н.У.К.» или «Биомедицинские отходы, Н.У.К.» или «Медицинские отходы, подтвержденные под действием соответствующих препаратов, Н.У.К.».

Рекомендуемый образцы

**РАЗРЕШЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПАТОГЕННЫХ(ЫХ)
БЕЗОПАСНОСТНОГО(ЫХ) АГЕНТА(ОВ), НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В
СПИСОК МИКРООРГАНИЗМОВ, ТОКСИНОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И
ТЕХНОЛОГИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ**

Выдано _____
(полностью расшифровать наименование (организации), регион(ы), дату, наименование (или наименование) (или наименование) (или наименование))

Дата выдачи _____
(или, альтернативно)

Наименование ПА _____

Разрешается (не разрешается) _____ транспортирование ПА
(или перевозка на территории и на границах страны)

в Российскую Федерацию (из Российской Федерации) для _____
(или, альтернативно, для работы в целях использования)

В ходе транспортирования указанных ПА не должны возникать.

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации

(подпись, или наименование (подпись), подпись)

М П

Перечень инфекционных болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации

№	Номенклатурная форма	Код в соответствии с международной классификацией болезней десятого пересмотра (МКБ-10)
1.	Оспа	B03
2.	Постимпунная, вызванная диссеминированной оспой	A30
3.	Чемоданчиковый тиф, вызванный возбудителем холеры	B9: J11
4.	Тифозная лихорадка репаративной стадии (ТФРС)	D 14.2: U 04.9
5.	Холера	A00: A00.0, A00.1, A00.9
6.	Чума	A20: A20.1, A20.2, A20.3, A20.7, A20.8, A20.9
7.	Желтая лихорадка	A95: A95.0, A95.1, A95.9
8.	Лихорадка Ласса	A96.2
9.	Болезнь, вызванная вирусом Марбург	A96.3
10.	Болезнь, вызванная вирусом Эбола	A96.4
11.	Лихорадка септического репаративного синдрома	B 14.2
12.	Коронавирусная инфекция (COVID-19)	D 14.2: U 07.1, U 07.2
13.	Малария	B50, B51, B52, B53.0, B54
14.	Лихорадка Занзибарского Нина	A93.3
15.	Крымская геморрагическая лихорадка (вызванная вирусом Кокса)	A98.0
16.	Лихорадка денги	A97: A97.0, A97.1, A97.2, A97.9
17.	Лихорадка Рифт-Вэли (лихорадка Рифт)	A92.4
18.	Болезнь, вызванная вирусом Энка	U06
19.	Менингококковая инфекция	A30.0, A30.1, A30.2
20.	Сибирская язва	A22.0, A22.1, A22.2, A22.7, A22.8, A22.9
21.	Бруцеллез	A23.0, A23.1, A23.2, A23.3, A23.8, A23.9
22.	Сальмонеллез	A24.0
23.	Мельиоз	A24.1, A24.2, A24.3, A24.4
24.	Опистхококковая лихорадка	A75.0, A75.1
25.	Геморрагическая лихорадка Зунда	A96.0
26.	Геморрагическая лихорадка Мачили	A96.1
27.	Другие инфекционные болезни, вызываемые в соответствии с Приложением 3 Международных медико-санитарных правил (2005 г.) чрезвычайные ситуации по области общественного здравоохранения, имеющие международные значения	

2.	Подозреваемые лица взрослые-лица лица	210 3-35 классификация лица средняя 7-14 классификация лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Контрагентом, выполняющим обязательному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию и рекомендуемый для добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию

Контрагент	Достоинство выполнения в отношении обследования
Раздел 1. Обязательному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию подлежат:	
Доноры крови, доноры крови, спермы и других биологических жидкостей, тканей и органов.	При каждом заборе донорского материала
Врачи, средний и младший медицинский персонал Центров по профилактике и борьбе со СПИД, медицинских организаций, выполняющих освидетельствование, обследование, лечение, обследование, а также проведение судебно-медицинской экспертизы в другой работе с лицами, инфицированными вирусом иммунодефицита человека, а также с лицами непосредственный контакт (Медицинские работники в стационарах (отделениях) хирургического профиля)	При трудоустройстве на работу и при первичных медицинских осмотрах
Врачи, средний и младший медицинский персонал лабораторий, которые осуществляют обследование на наличие ВИЧ-инфекции и исследование крови и биологических материалов, полученных от лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека	
Натурные работники, специалисты, занятые в работе научно-исследовательских учреждений, предприятий (предприятий) по исследованию медицинских иммунобиологических препаратов и других организаций, работа которых связана с исследованием, содержанием вирус иммунодефицита человека	
Лица при приеме на военную службу, поступающие на военную службу (призывную службу) по контракту, поступающие в военно-учебные заведения (учебные военные центры, военные кафедры, факультеты военного обучения)	При приеме, поступлении на службу, при поступлении в военно-учебные заведения
Иностранцы граждане и лица без гражданства	При обращении за получением разрешения на проживание, вида на жительство, патента или разрешения на работу в Российской Федерации, разрешения о временном

	присваивать, при выезде на территорию Российской Федерации иностранной граждан или лица безгражданского, лица обратившиеся за получением статуса беженца, либо лица, нуждающиеся в убежище.
Раздел II. Рекомендации для добровольного обследования на ВИЧ	
Беременные	При постановке на учет по беременности, а также на сроке gestation 34-2 недели.
Беременные, не обследованные до родов или обследованные только до 28-й недели беременности	При обращении в медицинские организации, при поступлении из роды экстренно-медицинской помощи, при поступлении в стационар, при поступлении в стационар.
Беременные, имеющие высокий риск заражения ВИЧ (ВИЧ-инфицированные: партнер, употреблявшие внутривенные инъекции и другие)	При постановке на учет, затем через каждые 3 месяца, а также при поступлении на роды экстренно-медицинской помощи, при поступлении в стационар, при поступлении в стационар.
Мужья, получающие консультацию всех женщин, поставленных на учет по беременности	Как минимум однократно при постановке беременной на учет.
Дети, рожденные матерями, не обследованными на ВИЧ во время беременности и родов	Исследование на антитела к ВИЧ для роженицы, дальнейшая тактика наблюдения определяется по результатам тестирования.
Дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями	Исследование на ДНК или РНК ВИЧ в возрасте 1,5-2 месяцев. Последующие исследования — в зависимости от результатов: - при первом положительном результате — в дальнейшем сроки; - при первом отрицательном результате — в возрасте 4-6 месяцев. При наличии высокого риска заражения ВИЧ исследование на ДНК или РНК ВИЧ проводится в более ранние сроки: в первые 48 часов жизни ребенка и в возрасте 14-21 дня. Исследование на антитела к ВИЧ: при рождении в 6-12 месяцев, далее по показаниям для подтверждения диагноза. Обследование на антитела к ВИЧ по контакту (целое сыпь в детском возрасте) рекомендуется проводить в возрасте 3 лет.
Дети, получающие грудное вскармливание от ВИЧ-инфицированной женщины	Исследование на ДНК или РНК ВИЧ после полного прекращения грудного вскармливания: через 4-6

	июль, 3, 6 месяцев. Исследования на антитела к ВИЧ после скрининга при скрининге (трудности распространения: через 3, 6 месяцев, данные по показателям до инфицирования анализ). Обследованы в питании к ВИЧ по политике (после снятия с диспансерного учета) рекомендуется проходить в возрасте 3 лет.
Лично, относящиеся к уязвимым группам населения Лично, употребляющие порнографические материалы	При обращении за медицинской помощью в наркологические учреждения и реабилитационные центры. При получении медицинской помощи в отделениях туберкулеза и СПИД, в зависимости от риска в 12 месяцев. При обращении за медицинской помощью на употребление ПАВ, при наличии в наркологических учреждениях системы МБД России, учреждениях ФСИН России. При выезде и стационарной профессиональной работе в представительных организациях, Центры СПИД и других учреждениях может проводиться мониторинг.
Мужчины, входящие в секс-меньшинства (МСМ)	При обращении за медицинской помощью При выездной и стационарной профессиональной работе в представительных организациях, Центры СПИД и других учреждениях может проводиться мониторинг.
Лично, занимающиеся оказанием ветеринарных сексуальных услуг, промиссуальных (ПСР)	При выезде и стационарной профессиональной работе в представительных организациях, Центры СПИД и других учреждениях может проводиться мониторинг.
Внутренние трудовые ресурсы, оказывая работающим медицинскую помощь	При проведении профессиональных мероприятий на ВИЧ-инфицированных среди работников медицинской помощи
Выездные медицинские лица при проведении эпидемиологического исследования (включая с	При выездных лицах, имеющих с ВИЧ-инфицированными пациентами, в

ВИЧ-инфекции, при которых имеется риск заражения ВИЧ)	результате которого можно прогнозировать заражение ВИЧ через 1, 6, 12 месяцев после последнего контакта. В показателем при сравнении риска заражения — 1 ррз в 12 месяцев.
Участвие в аварийной ситуации: пограничный источник ВИЧ-инфекции и контактировавшие с ним (обсуждается с целью постановки четкой профилактики заражения)	При выявлении ВИЧ-инфекции у женщин необходимо обследовать всех ее детей в возрасте до 10 лет как уязвимых — при планировании аварийной ситуации с подкапием крови и фторолокацией жидкости под кожу, на кожу и слизистые. (отрадавшие) изначально обследуются через 1, 6, 12 месяцев после аварии
Лица, находящиеся в местах лишения свободы	При поступлении освобожденный из мест лишения свободы и в соответствии с законодательством и законодательными актами государства
Больные с подозрением или подтвержденным диагнозом злокачественной, перенесенной полиповидной	При постановке диагноза в через 6 месяцев
Больные с подозрением или подтвержденным диагнозом острого гепатита А или гепатита С	При постановке диагноза
Больные с подтвержденным или подтвержденным диагнозом хронического гепатита В или гепатита С, а также лица, у которых обнаруживаются маркеры ранее перенесенного гепатита В или С	При постановке диагноза
Лица в возрасте 18-50 лет в регионах Российской Федерации с генерализованной острой эпидемией ВИЧ-инфекции (более 1% ВИЧ-инфицированных среди беременных женщин)	При обращении за медицинской помощью, в том числе при прохождении диспансеризации взрослого населения. При проведении акций и кампаний по привлечению к тестированию на ВИЧ в том числе среди работников милиции, тестируемые могут проводиться экспресс-методом. Частота тестирования — 1 ррз в 12 месяцев.
Лица, обследуемые по клиническим показаниям	При выявлении клинических признаков
Больные с теми же одним из следующих клинических признаков: - лихорадка более 1 месяца; - увеличение лимфоузлов двух и более групп более 1 месяца; - диарея, длящаяся более 1 месяца; - необъяснимый потеря веса тела на 10 и более процентов	При постановке диагноза
Больные с заболеваниями, требующими проведения профилактических или лечебных мероприятий	

не поддающийся обычной терапии	
Больные с тяжелыми и рецидивирующими туберкулезными или паратуберкулезными лейкозами	
Больные с поздними эфферентами и спайками у ранее перенесших	
Больные с лейкозными (эритроидными) лейкоцитами	
Больные с хроническими и рецидивирующими бронхитами, пневмониями и другими заболеваниями органов дыхания, в том числе с рецидивирующей пневмонией	
Больные с хроническими заболеваниями заболевшими хроническим репродуктивным системным заболеванием	
Лича с ангинами и другими патологическими (лейкозными, тромбоцитопениями, лимфомами)	При патологическом лейкозе
Несущий лейкоз	
Больные с лейкозными для подтверждения диагноза	
Саркомы Клоуна	При патологическом лейкозе
Лимфомы и др.	
Тяжелые лейкозы	
Несущий и несущий туберкулез	
Заболевания, обусловленные патологическим лейкозом	
Генерализованной или хронической формы инфекции, обусловленной вирусом прилегающего сердца	
Результативность исследования лейкоцитов у лиц младше 60 лет	
Инфекционные заболевания (у лиц старше 13 лет)	При патологическом лейкозе и др.
Пневмония (пневмония)	При патологическом лейкозе
Туберкулез с поражением центральной нервной системы	
Кристаллическая (анемическая)	
Кристаллическая	
Изолированная	
Гидропневмония	
Строфулларная	
Кристаллическая, фибриная, фибриная или легкая	
Глубокая лейкоз	
Лейкозные лейкоцитозы	
Прогрессирующей многоочаговой лейкоцитозной	
Рак шейки матки (лейкоз)	
Кристаллическая (анемическая) для выявления	
Лимфомы и др. члены лейкоцитоза, лимфоцитоза, лимфомы Буркитта, Т-лимфомы	

Ходячие и другие.) Самостоятельный (не пофторный) остеомиелит Бактериальных инфекций (инфекционных или ятрогенных) у ребенка в возрасте до 13 лет Интерстициальной лимфоцитарной пневмонии у ребенка в возрасте до 13 лет	
Дети в возрасте до 13 лет с подтвержденной или предполагаемой инфекцией оппортунистических инфекций	
Дети до 13 лет со следующими клиническими признаками: лихорадка, повышенная температура (свыше) 38,0°C; переносимость/непереносимость повышенной потливости; разная потеря веса, истощение и физическая слабость; лейкопения $< 0,5 \times 10^9/\text{л}$ тромбоцитопения $< 50 \times 10^9/\text{л}$	Циркулирующие патогены
Обострениями доброкачественных или злокачественных заболеваний (при отсутствии других причин обострения)	При обращении с больными
Комплексные, подлежащие обследованию по патологическим состояниям, указанным Умершие, в случае выявления патологического состояния гиперкалиемию на СНИД: лица, у которых выявлены одно или несколько следующих состояний: увеличение лимфоузлов; туберкулез; наркотикоз; умершие в результате перенесенных наркотических веществ, а также лица, умершие вследствие суицида	При обращении с больными При вскрытии трупа
* Протокол исследования на наличие антител к ВИЧ добровольно с обязательным до- и посттестовым консультированием по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и при наличии информированного согласия в соответствии с приказом Минздрава России от 20.10.2020 № 1129н «О утверждении Правил проведения обязательного медико-социального обследования лиц на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» (зарегистрирован Минюстом России 11.11.2020, регистрационный № 60847)	

Typical

2. часть лабораторных ситуаций при проведении медицинских манипуляций

შპს "საინჟინრო პროექტების დიზაინტი"

ОБЪЕМ: 3...0 ЛИ ...

[illegible]

Рекомендуемый образ

УТВЕРЖДАЮ

_____/_____
(подпись, фамилия, инициалы руководителя)

« ____ » _____ 20__ г.

М.П. (при наличии)

АКТ № _____

О МЕДИЦИНСКОЙ АВАРИИ В УЧРЕЖДЕНИИ

1. Дата и время медицинской аварии

(число, месяц, год и время медицинской аварии)

2. Учреждение, работником которого является пострадавший

(полное наименование, фактический адрес, юридический адрес, фамилия,
инициалы руководителя)3. Наименование структурного подразделения, где произошла аварийная
ситуация и в каком структурном подразделении работает пострадавший
работник

4. Сведения о пострадавшем работнике:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

пол (мужской, женский)

дата рождения « ____ » _____ год, _____ полных лет

5. Наличие беременности _____ срок _____ недель при
трудовой деятельности работка _____

6. Удостоверенная личность в указанной государственной организации

срок работы в организации _____, в том числе в данной

должности _____

7. Лица, ответственные за расследование случая медицинской аварии

(руководитель структурного подразделения, другие должностные лица)

8. Сведения о проведении инструктажа обученных в процессе занятий по охране труда по профессии (должностей) или виду работы, при выполнении которой произошла аварийная ситуация

(число, месяц, год)

Инструктаж на рабочем месте (краткий, подробный, письменный, деловой)

(нужное подчеркнуть)

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошла аварийная ситуация _____

(число, месяц, год)

Обученные по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошла аварийная ситуация

с 0 ____ с ____ 20 ____ г. По с ____ с ____ 20 ____ г.

(если не применялось – указать)

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошла аварийная ситуация

(число, месяц, год, № протокола)

9. Краткие характеристики места, где произошла аварийная ситуация

10. Обстоятельства аварийной ситуации, дата рассмотрения и журнал медицинских осмотров

11. Характер полученных повреждений и органов, пострадавших пострадавшего: (возможная рана, порезы, царапины или глубокая ссадина, прокол, ушиб, тепловой ожог, электрическое поражение, обморожение, другие биологические повреждения, повреждения кожи и слизистых оболочек):

12. Сведения о применении выданных средств индивидуальной защиты и возможности аварийной ситуации (спецодежда, перчатки, очки, маска, фартук)

13. Мероприятия по обеззараживанию места аварии, предотвращению заражения ВИЧ-инфекцией пострадавшего

14. Причины медицинской аварии (указать основную и сопутствующие причины)

15. Оценить аварию

16. Характеристика профилактического действия инфекции:

результаты обследования на ВИЧ-инфекцию

экспресс-диагностика (дата, результаты)

ИФА (дата, результаты)

Контингенты, подлежащие обязательному обследованию на наличие

HBsAg в сыворотке (плазме) крови

№	Контингенты населения	Период обследования
1	Доноры крови (ее компонентов), органов и тканей, спермы	При каждой донорской или каждой катетеризационной процедуре
2	Беременные	В I, III триместре беременности
3	Роженицы и родильницы во время обследования во время беременности	При поступлении в акушерский стационар
4	Дети, рожденные от матерей, бывших ХПВ или заболевших ОПВ в третьем триместре беременности	В возрасте 4-6 месяцев
5	Контингенты крови и ее компонентов, органов и тканей	При заборе или при заборах гепатитом В; в течение 6 месяцев после переливания крови и ее компонентов, пересадки органов и тканей
6	Персонал медицинских организаций: - организаций донорской крови и ее компонентов; - палат, отделений лабораторно-транспортировки органов, трансплантатов; - клинико-диагностических лабораторий; - хирургических, урологических, акушерско-гинекологических, офтальмологических, стоматологических, дерматовенерологических, педиатрических, инфекционных, гастроэнтерологических, стационаров, отделений и кабинетов (в том числе перевязочных, процедурных, протезных); - диспансеров; - акушерских кабинетов; - станций и отделений скорой помощи; - отделов медицины катастроф; - ФАПов, хирургических	При приеме на работу и далее 1 раз в год, дополнительно - по показаниям
7	Пациенты стационара и отделений гемодиализа, пересадки печени, сердечно-сосудистой и дыхательной	При поступлении; при необходимости по клиническим и лабораторным показаниям

	хирургия, дерматология	
8	Пациенты перед госпитализацией на плановые хирургические вмешательства перед проведением химиотерапии	Не ранее 30 календарных дней до поступления или начала терапии
9	Пациенты при язве без рубца, язвенной болезни в фазе клинико-лабораторической ремиссии, гастрита, стриптирии, язвенной болезни двенадцатиперстной и толстой	При поступлении на учет в диспансер ранее 1 раз в год, дополнительно - по показаниям
10	Больные с хроническими заболеваниями, в том числе с туберкулезом легких	В процессе первичного клинико-лабораторного обследования дополнительно - по показаниям
11	Отказавшиеся в периодичности учреждений с круглосуточной организацией детей для взрослых (в том числе для детей, отказавшихся от лечения, школьничков)	При поступлении в учреждение дополнительно - по показаниям
12	Лица, находящиеся в местах лишения свободы	При поступлении в учреждение дополнительно - по показаниям
13	Контингент в отделе психиатрии	При выписке из...

КОНТИНЕНТЫ.

ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ НА НАЛИЧИЕ АНТИ-ЦУ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ

№	Континенты населения	Период обследования
1	Беременные	П. 1. III триместре беременности
2	Роженицы и родильницы, не помещенные во время беременности	При поступлении в родильный стационар
3	Резиденты юрты и ее коммуна, армян в тятией	При подозрении на заболевание тифом и в течение 6 месяцев после переливания крови и ее компонентов, пересадки органов и тканей
4	Персонал медицинских организаций: - ординаторы, дозаторы крови и ее компоненты; - лаборанты, обслуживающие гемодинамику, трансфузиологи, органы, гематологи; - инфекционисты, дерматологи, хирурги; - хирургические, урологические, акушерско-гинекологические, офтальмологические, отоларингологические, стоматологические, дерматовенерологические, ревматологические, эндокринологические, инфекционные, гастроэнтерологи, фтизиатры, отоларингологи и гинекологи (в том числе акушеры-гинекологи, гинекологи, гинекологи); - дерматологи; - переливатели крови; - санитары и санитарки скорой помощи; - санитары и санитарки больницы; - фельдшеры, акушеры.	При приеме на работу и далее 1 раз в год, дополнительно - по показаниям
5	Пациенты центра и отделений инфекционных заболеваний, пересадки почек, сердца, органов и тканей, пересадки органов и тканей, пересадки органов и тканей	При поступлении, при необходимости по клиническим и эпидемиологическим показаниям
6	Пациенты перед поступлением на плановую хирургическую операцию, перед операцией, перед операцией	Не ранее 30 календарных дней до поступления на плановую операцию
7	Больные с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями печени	В процессе лечения в клинико-лабораторном отделении, в стационаре, в амбулатории
8	Больные с заболеваниями печени	В процессе лечения в клинико-лабораторном отделении, в стационаре, в амбулатории
9	Больные с заболеваниями печени	В процессе лечения в клинико-лабораторном отделении, в стационаре, в амбулатории

	подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция, лабораторного подтверждения, хронический гепатит В, а также лица, у которых обнаруживаются маркеры вирусной активности гепатита В	дополнительно - по показаниям
10	Пациенты при туберкулезных, паразитарных и λοίзно-инфекционных заболеваниях, включая больных дифтерией, столбняком и скарлатиной	При поступлении на учет и далее не реже 1 раза в год, дополнительно - по показаниям
11	Отказавшиеся от лечения учреждения с круглосуточным пребыванием детей или взрослых (в том числе детей-ребенка, подростки, лица, злоупотребляющие психоактивными веществами)	При поступлении и далее не реже 1 раза в год, дополнительно - по показаниям
12	Коллективы в очагах ИТС	Не реже 1 раза в год: через 6 месяцев после выявления или возникновения туберкулеза, ВИЧ-инфекции
13	Лица, отказавшиеся от групповых рисов по профилактике ИТС: - интривенные инъекционные наркотики и их потребители; - лица, оказывающие услуги сексуального характера, в том числе партнеры; - мужчины, практикующие секс с мужчинами; - лица с большим количеством случайных половых партнеров	При выявлении факторов риска
14	Лица, находящиеся в местах лишения свободы	При поступлении в учреждение, дополнительно - по показаниям

КОНТИНГЕНТЫ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ НА НАЛИЧИЕ АНТИ-HCV
И/ИЛИ РНК ВИРУСА ГЕПАТИТА С* В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ

№	Контингент населения	Период обследования
1	Доноры крови (с компонентами), органы и тканей, спермы	При каждой донорской или каждой клеточной донорской операции
2	Дети в возрасте до 12 месяцев, рожденные от инфицированных матерей	В возрасте 4-6 месяцев
3	Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей	В возрасте 4-6 месяцев
4	Лица с иммунодефицитом (бесплодие, онкологические заболевания, пациенты на трансплантации, пациенты на лечении иммуносупрессантами и другие)	Согласно приложению 17 к Санитарным правилам
5	Лица, имеющие заболевания печени тяжелой степени	В процессе лечебного или лабораторного обследования
6	Пациенты отделений гематологии, гематологии и трансплантации, пребывающие в стационаре более 3 месяцев	По разово 1 раз в 3 месяца
7	Контракты в очагах НГС	При выявлении очага и после однократной через 30 календарных дней
8	Жители в очагах НГС	При выявлении очага

* альтернативным методом РНК ВГС может быть тест ВГС с высокой чувствительностью. Также доступный для этой категории пациентов вариант скринингового теста, одновременно выявляющего сыв. ВГС антитела и антигены к ВГС.

**ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ШОБЕДРЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЧУМЫ**

**1. Перечень субъектов Российской Федерации, на территории
которых имеются природные очаги чумы**

Субъекты Российской Федерации	Наименование природного очага чумы, находящегося на территории данного субъекта (шифр очага)	Представленная столбца ПЧС, организующая мероприятия в природном очаге чумы
Южный федеральный округ		
Республика Калмыкия	Прикаспийский Северо-Западный степной (14) Прикаспийский песчаный (43)	ФКУЗ «Ольгинская ПЧС» Роспотребнадзора ФКУЗ «Астраханская ПЧС» Роспотребнадзора
Астраханская область	Прикаспийский Северо-Западный степной (14) Волго-Уральский степной (15) Волго-Уральский песчаный (16) Прикаспийский песчаный (43)	ФКУЗ «Астраханская ПЧС» Роспотребнадзора
Волгоградская область	Прикаспийский Северо-Западный степной (14) Волго-Уральский степной (15)	ФКУЗ «Астраханская ПЧС» Роспотребнадзора ФКУЗ «Ольгинская ПЧС» Роспотребнадзора
Ростовская область	Прикаспийский Северо-Западный степной (14)	ФКУЗ «Эдмонтская ПЧС» Роспотребнадзора
Северо-Кавказский федеральный округ		
Республика Дагестан	Терско-Сунженский высокогорный (01) Дагестанский высокогорный (03) Прикаспийский песчаный (43) Восточно-Кавказский высокогорный (39)	ФКУЗ «Дагестанская ПЧС» Роспотребнадзора
Республика Ингушетия	Терско-Сунженский высокогорный (02) Восточно-Кавказский высокогорный	ФКУЗ «Дагестанская ПЧС» Роспотребнадзора

	(19)	
Кабардино-Балкарская Республика	Центрально-Кавказский высокогорный (01)	ФКУЗ «Кабардино-Балкарская ПЧС» Роспотребнадзора
Карачаево-Черкесская Республика	Центрально-Кавказский высокогорный (01)	ФКУЗ «Кабардино-Балкарская ПЧС» Роспотребнадзора
Чеченская Республика	Терско-Сунженский высокогорный (02) Восточно-Кавказский высокогорный (39)	ФКУЗ «Джигарская ПЧС» Роспотребнадзора
Ставропольский край	Центральный степной (43)	ФКУЗ «Джигарская ПЧС» Роспотребнадзора
Сибирский федеральный округ		
Республика Алтай	Торно-Алтайский высокогорный (36)	ФКУЗ «Алтайская ПЧС» Роспотребнадзора
Республика Тыва	Тувинский горный (37)	ФКУЗ «Тувинская ПЧС» Роспотребнадзора
Забайкальский край	Забайкальский степной (38)	ФКУЗ «Читинская ПЧС» Роспотребнадзора

П. Перечень субъектов Российской Федерации, граничащих с субъектами Российской Федерации, на территории которых имеются природные очаги чумы

Субъекты Российской Федерации, граничащие с субъектами Российской Федерации, на территории которых имеются природные очаги чумы	Субъекты Российской Федерации, на территории которых имеются природные очаги чумы
Центральный федеральный округ Воронежская область	Рязанская область Волгоградская область
Южный федеральный округ Краснодарский край	Ставропольский край Ростовская область
Северо-Кавказский федеральный округ Республика Северная Осетия - Алания	Ставропольский край Кабардино-Балкарская Республика Чеченская Республика
Центральный федеральный округ Саратовская область	Волгоградская область
Сибирский федеральный округ Республика Бурятия	Республика Тыва Забайкальский край
Республика Хакасия	Республика Тыва

	Республика Алтай
Алтайский край	Республика Алтай
Красноярский край	Республика Тыва
Иркутская область	Забайкальский край
	Республика Тыва
Кемеровская область	Республика Алтай
Дальневосточный федеральный округ	Забайкальский край
Республика Саха (Якутия)	
Амурская область	

III. Перечень субъектов Российской Федерации,
господствующих в странах, на территории которых имеются
активные природные очаги чумы

Субъект Российской Федерации	Страны, на территории которых имеются активные природные очаги чумы
Нижегородский федеральный округ Астраханская область Волгоградская область Пермский федеральный округ Самарская область Саратовская область Уральский федеральный округ Курганская область Оренбургская область Тюменская область Челябинская область Свердловский федеральный округ Республика Алтай Алтайский край Новосибирская область Омская область	Республика Казахстан
Свердловский федеральный округ Забайкальский край Дальневосточный федеральный округ Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская автономная область	Китайская Народная Республика
Свердловский федеральный округ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Забайкальский край	Монголия

Северо-Кавказский федеральный округ Республика Дагестан	Азербайджанская Республика
Южный федеральный округ Краснодарский край Северо-Кавказский федеральный округ Республика Чеченция Кабардино-Балкарская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика	Грузия

**Районирование административных территорий Российской Федерации по типам
ландшафтных провалов**

Территория I типа	
Северо-Кавказский федеральный округ	Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Ставропольский край
Южный федеральный округ	Рязанская область, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Крым, город федерального значения Севастополь
Территория II типа	
Центральный федеральный округ	Республика Кашаля. Краснодарский край
Дальневосточный федеральный округ	Приморский край
Территория III типа подтипа А	
Северо-Западный федеральный округ	Архангельская область, Вологодская область, Новгородская область, Калининградская область, Мурманская область, город Санкт-Петербург
Центральный федеральный округ	Брянская область, Владимирская область, Калужская область, Московская область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, город Москва
Приволжский федеральный округ	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Оренбургская область
Северо-Кавказский федеральный округ	Республика Северная Осетия - Алания
Уральский федеральный округ	Челябинская область, Тюменская область
Сибирский федеральный округ	Алтайский край, Красноярский край, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Иркутская область
Дальневосточный федеральный округ	Республика Саха (Якутия), Камчатская область

Территория ПУ или подгиты Т	
Северо-Западный федеральный округ	Республика Коми, Ненецкая автономная область, Инновационная область
Центральный федеральный округ	Ярославская область, Воронежская область, Курганская область
Приволжский федеральный округ	Пензенская область
Северо-Кавказский федеральный округ	Кабардино-Балкарская Республика
Уральский федеральный округ	Свердловская область, Курганская область
Сибирский федеральный округ	Республика Алтай, Томская область
Дальневосточный федеральный округ	Республика Бурятия, Забайкальский край, Хабаровский край, Амурская область
Подпись В	
Северо-Кавказский федеральный округ	Корчаковский-Мордовская Республика
Южный федеральный округ	Республика Адыгея
Центральный федеральный округ	Белгородская область, Ивановская область, Костромская область, Орловская область, Тамбовская область
Северо-Западный федеральный округ	Республика Карелия, Ненецкий автономный округ
Дальневосточный федеральный округ	Камчатский край, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ
Уральский федеральный округ	Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ
Сибирский федеральный округ	Республика Тыва, Республика Хакасия

**Контингент изосезона, подлежащий санитарному
обследованию в полете**

№	Лича, подлежащие лабораторному обследованию в полете	Периоды обследования по типам зонтиров		
		I	II	III
1	Болельщики сборной и сборной для участия в чемпионате мира и чемпионате областной *	в течение года на территории всей страны		
2	Граждане Российской Федерации, подлежащие санитарно-эпидемиологическому наблюдению в течение пяти лет после возвращения из поездки в страны, в которых имелись случаи и случаи пути заражения *	в течение года на территории всей страны		
3	Иностранцы, граждане, подлежащие санитарно-эпидемиологическому наблюдению в течение пяти лет после возвращения из поездки в страны, входящие в состав стран лечения и при обратившись за медицинской помощью по поводу заболевания *	в течение года на территории всей страны		
4	Лица без гражданства или иностранцы гражданство которых не признано Российской Федерацией (с двойным гражданством и по иным основаниям)	в течение года на территории всей страны		
5	Вотчины из стран, входящих в состав стран и входящих в состав *	май сентябрь	июль сентябрь	по эпидемиологическим
6	Лица с двойным гражданством при поступлении в учреждения высшего образования и организации специально **	май – сентябрь	июль – сентябрь	по эпидемиологическим
7	Лица с двойным гражданством при поступлении в учреждения высшего образования и организации специально **	май – сентябрь	июль сентябрь	по эпидемиологическим

* Статья 20.3. Международного санитарного регламента (2005 г.)

8	Летняя и дисфункциональная смертность при поступлении в пенициллиновые стационары и инфекционные больницы ¹	май – сентябрь	июль – сентябрь	по эпидемиологическим
9	Умершие, причиной смерти которых были дисфункциональные инфекции и дисфункциональные инфекции	май – сентябрь	июль – сентябрь	по эпидемиологическим
¹ - Бактериологическое обследование на холеру осуществлено полностью (с интервалом 3 часа), до начала лечения антибиотиками				
** Бактериологическое обследование на холеру осуществлено полностью (с интервалом 3 часа), до начала лечения антибиотиками				

5 G06.1 Энуритический синдром неструктурный

Периферическая нейронная периферическая инфекция (лифтерия, боррелиоз) или интоксикация (токсическая энцефалопатия, острая токсическая энцефалопатия) (код 6)

6 G06.1.1 Токсическая энцефалопатия (лифтерия, боррелиоз)

6 G06.1.2 Энуритический синдром неструктурный (лифтерия, боррелиоз)

Воспалительный энцефалит неструктурный

6 G06.2.0 Полиэнцефалит, вызванный инфекцией (лифтерия, боррелиоз)

Другие энцефалиты неструктурные (лифтерия, боррелиоз)

6 G06.3 Токсический энцефалит

6 G06.4 Энуритический синдром

Другие неструктурные энцефалиты неструктурные (код 7)

7 G06.5 Другие энцефалиты неструктурные (лифтерия, боррелиоз)

(лифтерия, боррелиоз)

7 G06.6 Неврологические синдромы неструктурные

Системные заболевания или нарушения метаболизма, заболевания ушей или костей (код 8)

8 G07.0 Трипаноз

8 G07.1 Трипаноз неструктурный

8 G07.2 Трипаноз неструктурный

8 G07.3 Трипаноз неструктурный (лифтерия, боррелиоз)

8 G07.4 Другие трипанозы неструктурные (лифтерия, боррелиоз)

Паралитический энцефалит или токсический энцефалит (код 9)

9 G08.0 Паралитический энцефалит

9 G08.1 Паралитический энцефалит

9 G08.2 Паралитический энцефалит

9 G08.3 Паралитический энцефалит

9 G08.4 Паралитический энцефалит

9 G08.5 Паралитический энцефалит

9 G08.6 Паралитический энцефалит

9 G08.7 Паралитический энцефалит

9 G08.8 Паралитический энцефалит (лифтерия, боррелиоз)

9 G08.9 Паралитический энцефалит

9 G09.0 Паралитический энцефалит (лифтерия, боррелиоз)

Не G08.0 (код 1)

9 G09.1 Паралитический энцефалит (лифтерия, боррелиоз)

9 G09.2 Паралитический энцефалит (лифтерия, боррелиоз)

9 G09.3 Паралитический энцефалит

9 G09.4 Паралитический энцефалит

9 G09.5 Паралитический энцефалит (лифтерия, боррелиоз)

9 G09.6 Паралитический энцефалит (лифтерия, боррелиоз)

9 G09.7 Паралитический энцефалит

[illegible]

Приложение 23 (продолжение)

Карта изъятия объектов и расщепления с/х угодий на территории
и изъятия земель на территории

Часть II (некоторые объекты не более 60 км от границ)

Заполняется в отношении территории, на которой осуществляется изъятие земель на территории субъекта Российской Федерации (Федерации)

* Все графы обязательны к заполнению

ЭПИСОД		Дата изъятия земель		Год
Фамилия, имя, отчество (полностью) при рождении (подпись)		Адрес		Субъект Российской Федерации
Пол		Район		С/х угодия
Вид изъятия земель (не более 60 км от границ)		Да		Нет
Одновременно изъятию:		Вид изъятия земель (не более 60 км от границ)		Да

Результаты осмотра*

* Укажите, какие из объектов изъятия земель нет, если имеются, то укажите их количество, укажите количество земель изъятия земель, принадлежащих субъекту Российской Федерации

Остаточные

Нет

Остаточные

При изъятии земель (не более 60 км от границ) укажите дату изъятия земель

Результаты обследования земель, принадлежащих субъекту Российской Федерации, в результате изъятия земель на территории субъекта Российской Федерации

1. проба земель

2. проба земель

Результаты обследования земель:

1. проба земель

2. проба земель

Результаты обследования земель (не более 60 км от границ) укажите дату изъятия земель

Результаты обследования земель (не более 60 км от границ) укажите дату изъятия земель

(Одновременно изъятию)

(Одновременно изъятию)

Материалы и фотоматериалы

Количество земель (не более 60 км от границ)

Были ли изъятия земель (не более 60 км от границ) у изъятия земель

Если "Да", то укажите количество земель изъятия земель

Изъятия земель

Количество земель (не более 60 км от границ)

Материалы и фотоматериалы

Количество земель (не более 60 км от границ)

Количество земель (не более 60 км от границ)

Количество земель (не более 60 км от границ)

Количество земель (не более 60 км от границ)

Количество земель (не более 60 км от границ)

Количество земель (не более 60 км от границ)

Количество земель (не более 60 км от границ)

Количество земель (не более 60 км от границ)

Количество земель (не более 60 км от границ)

Количество земель (не более 60 км от границ)

Количество земель (не более 60 км от границ)

Количество земель (не более 60 км от границ)

Количество земель (не более 60 км от границ)

Количество земель (не более 60 км от границ)

Количество земель (не более 60 км от границ)

Количество земель (не более 60 км от границ)

Количество земель (не более 60 км от границ)

**Карта эпидемиологического расследования случаев заболевания на
острове восточного побережья**

Часть III

Полнота, качество и классификация случаев

(заполняется Гигиенической комиссией по эпидемиологическим вопросам восточного побережья)

ИМЯ:	Дата рождения дд/мм/гг	Пол	Возраст	Пит.
Фамилия, имя, отчество (полное при наличии) (сокращенно)	Субъект Российской Федерации			
Оценочная классификация случаев				
Подтвержден (или нет)				
Открыт (или нет)				
Вакциносертифицированный пациент (или нет) (ВАЦИН)				
Документально подтвержденный пациент (или нет) (документально)				
"Связанный с посещением"				
Случай классифицирован по следующим				
Выявлено заболевание (ДЛБ, ШЛП, или другое)				
Отсутствует заболевание в клинических образцах				
Неоднократно обнаружены случаи				
Отсутствуют образцы				
(или) выявлено заболевание через (или) лабораторные тесты				
Отсутствует заболевание, подтвержден через (или) лабораторные тесты				
Смерть и результаты забора крови, "заболевание описано в литературе"				
Питание для дальнейшего обследования, смерть больного				
Особый случай классифицирован следующим				
Код окончательной классификации				
Комментарий:				
Примечание: Комиссия по эпидемиологическим вопросам восточного побережья				

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

1. Б эпидемиомера:

первый два знака обозначают год;

третий, четвертый и пятый обозначают код субъекта Российской Федерации:

шестой, седьмой, восьмой знаки обозначают код города, района внутри субъектов Российской Федерации;

девятый, десятый и одиннадцатый знаки обозначают порядковый номер случая (биплато).

Если образцы фекалий собраны от инфицированных с болезнью полиоминимом, с использованием этих обозначений для ОРП, следует использовать тот же эпидемиомер, что и у биплато. При этом делается отметка «К1» для обозначения первого контактного лица, и отметка «К2» - второго контактного лица. Аналогично делается отметка о пятых контактных лицах.

00—	000 —	000 —	000 —	К0
год	код субъекта Российской Федерации	код района или города внутри субъекта Российской Федерации	порядковый номер случая (биплато)	номер контактного

2. Эпидемиомер применяется в территориальных органах, осуществляющих федеральный надзор за деятельностью санитарно-эпидемиологической службы, при получении жидкого материала на случай полиомиелита и ОРП в соответствии с документами на этот биоматериал или его хранение (направление на лабораторное исследование в вирусологическую лабораторию, Национальный центр по лабораторной диагностике полиомиелита, региональный центр санитарного и эпидемиологического надзора (ОРП, вирус-эпидемиологическое районное отделение случая полиомиелита и ОРП и другие).

Коды субъектов Российской Федерации для присвоения индексов

001	Республика Карелия	044	Республика Ингушетия
002	Республика Коми	045	Кабардино-Балкарская Республика
003	Архангельская область	046	Классическая-Черкесская Республика
004	Ивановский автономный округ	047	Республика Северная Осетия
005	Вологодская область	048	Чеченская Республика
006	Мурманская область	049	Краснодарский край
007	гфз. Санкт-Петербург	050	Исторический край
008	Ленинградская область	051	Ростовская область
009	Новгородская область	052	Республика Башкортостан
010	Псковская область	053	Удмуртская Республика
011	Брянская область	054	Курганская область
012	Владимирская область	055	Оренбургская область
013	Ивановская область	056	Пермский край
014	Калужская область	058	Свердловская область
015	Костромская область	059	Челябинская область
016	гфз. Московский	060	Республика Алтай
017	Московская область	061	Алтайский край
018	Орловская область	062	Камчатская область
019	Рязанская область	063	Ненецкий автономный округ
020	Смоленская область	064	Самарская область
021	Тверская область	065	Тамбовская область
022	Тульская область	066	Тюменская область
023	Ярославская область	067	Ханты-Мансийский автономный округ
024	Республика Марий Эл	068	Ямало-Ненецкий автономный округ
025	Республика Мордовия	069	Республика Бурятия
026	Чувашская Республика	070	Республика Тыва
027	Кировская область	071	Республика Хакасия
028	Нижегородская область	072	Красноярский край
029	Башкирская область	073	Иркутская область
030	Воронежская область	077	Забайкальский край
031	Курская область	079	Республика Саха (Якутия)
032	Липецкая область	080	Бурятская автономная область
033	Тамбовская область	081	Чукотский автономный округ
034	Республика Калмыкия	082	Челябинский край
035	Республика Татарстан	083	Хабаровский край
036	Астраханская область	084	Амурская область
037	Волгоградская область	085	Камчатский край
038	Ленинградская область	087	Магаданская область
039	Саратовская область	088	Самарская область
040	Саратовская область	089	Калининградская область
041	Ульяновская область	091	Республика Крым
042	Республика Адыгея	092	гфз. Крымский
043	Республика Дагестан		

Рекомендуемый образец

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ ПОЛНОМЪЕЛНТА И ОСТРЫХ ВЯЛЫХ ПАРАЛИЧЕЙ И ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА ПОЛНОМЪЕЛНТА И ЭНТЕРОВИРУСЫ

п. _____ г. _____

(субъект Российской Федерации)

(месяц, год)

1	Число зарегистрированных случаев острого вялого паралича (ОВП)	
2	Число случаев ОВП, по которым проведено энцефалогическое исследование в течение 24 ч с момента регистрации	
3	Число случаев ОВП с 2-мя проблемами, отобранными у больных для вирусологического исследования	
4	Число случаев ОВП, выявленных в течение 7 календарных дней с момента возникновения ОВП	
5	Показатель числа случаев ОВП на 100 тыс. жителей до 15 лет с нарастающим итогом)	
6	Результат лабораторного исследования проб от случаев ОВП	
7	Количество исследований методом ПЦР на полио и энтеровирусы проб фекалий / мазков из ротоглотки (СМЖ)	
8	Результаты исследования методом ПЦР на полио и энтеровирусы проб фекалий / мазков из ротоглотки (СМЖ)	
9	Количество исследований методом ПЦР на полио и энтеровирусы проб слюнной воды	
10	Результаты исследования методом ПЦР на полио и энтеровирусы проб слюнной воды	
11	Количество вирусологических исследований на полио и энтеровирусы проб фекалий	
12	Результаты вирусологических исследований на полио и энтеровирусы проб фекалий	
13	Количество вирусологических исследований на полио и энтеровирусы проб слюнной воды	
14	Результаты вирусологических исследований на полио и энтеровирусы проб слюнной воды	
15	Количество выполненных тестов на ИФА+ проб, направленных в централизованную и региональную центры эпиднадзора за ПОЛНОМЪЕЛНТА, в Национальный центр по лабораторной диагностике ПОЛНОМЪЕЛНТА, Референс-центр по мониторингу ЭВИ для идентификации (указать, где в журнале направлено)	
16	Результаты идентификации	

Руководитель Управления Роспотребнадзора
по субъекту Российской Федерации

(подпись, имя, отчество, фамилия, должность, наименование)

Дата заполнения

Рекомендуемый образец

Направление на лабораторные (микробиологическое) исследования приёб фекалий от
большого количества, острой являги параличим

Раздел I эпидемиологический материал			
Фамилия, имя, отчество (последнее при рождении) больного	ЭПРД №		
Адрес			
Район	Субъект	Год	
	День	Месяц	
Дата рождения*			
Дата начала паралича			
Дата взятия первого образца фекалий			
Дата взятия второго образца фекалий			
Дата отправки первого образца фекалий			
Дата отправки второго образца фекалий**			
Сведения о прививках:			
Количество прививок ОПЧВ или ОПЧВ, полученных при шимовой (включительно) указать даты, серии			
Дата шимовой прививки			
Предварительный клинический диагноз:			
Образцы испражнений			
Имярек учреждения, отправившего образцы			
Фамилия, имя, отчество (последнее при рождении) доктора или лаборанта, отправившего материалы			
Телефон			
Факс			
E-mail			
По адресу			
Тел. №			
* Если неизвестно, укажите возраст в месяцах			
** Если образцы отправляются в разные даты, укажите форму на каждый образец отдельно			

Раздел II. Заполняется выходящими в табачники

Заполненную форму необходимо заверить должностному лицу, ответствующему

за подписями на территории и оперативно излечены		
		День/Месяц/Год
Дата поступления в лабораторию первого образца		
Дата поступления в лабораторию второго образца		
Состояние первого образца при поступлении в лабораторию	Хорошо*	Плохо
Состояние второго образца при поступлении в лабораторию	Хорошо*	Плохо
Результаты исследования первого образца		День/Месяц/Год
Результаты исследования второго образца		День/Месяц/Год
Признак вирусности		
* Критерии хорошего состояния образцов: достаточный объем, не прижизнен и не взвешивая, подмешивая для вытеснения для увеличения на 10, что образцы имеют стандартным методом.		

Время выработки: _____

Сформировать под контролем (подсказка при наличии).
использовать организацию!

Рекомендаций обрелет

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией

(подпись) _____

(фамилия, имя, отчество)

(подпись или печать)

АКТ УТВЕРЖДЕНИЯ

материалов, инфицированных или инфицированных
инфицированными: детьми, подростками и взрослыми лицами
от _____ 20 ____ г № _____

Мы, нижеподписавшиеся, _____

(фамилия, имя, отчество (полное или сокращенное), должность)

согласно разрешению

(фамилия, имя, отчество (полное или сокращенное), должность, должность, место и дата разрешения)

утвердили

(полное или сокращенное, должность, место и дата разрешения)

подписавшим

(фамилия, имя, отчество (полное или сокращенное), должность, место и дата разрешения)

в

(полное или сокращенное, должность, место и дата разрешения)

Дата утверждения материалов _____

_____ (фамилия, имя, отчество (полное или сокращенное), должность, место и дата разрешения)

Целюхотне 24

г. ГТ 3.3686-2)

Рекламный образ

УЛБЕРЖЛЭО

Заключительный пробиторный

(OTACNOW) _____

အရှင်မင်းသား၊ ဘုရား၊ အမတ်ကြီးတို့

[illegible]

441

перелати мажорираков. ятфизирекиныыс ЯТЯ таттынышыыо
итифадрованыыс депкы, калпыныыс и эвелянорметделеныыс болтынпуркымы эн црстатл
орезевулти от _____ 30 г № _____

Имя, не соответствующее, _____
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность
представителя материки.)

[illegible]

составили Восточный зал в 1904. Эти залы были приспособлены
руководителя программы

ПРОДВИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: _____

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

Дата переписи _____

INVEST _____

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

Illegit _____

(စံနမူနာ, နား, လက်ဝှေ့စွဲ (စာအုပ်အား အားပေးမှု), ကျွဲအား)

Рекомендуемый образец

Карта

информационно-справочного характера о состоянии здоровья
гражданина в период пребывания на территории

Заполняется на всех лиц, у которых медицинский работник подозревает инфекцию

Правильный ответ: Криворуки и Коты и Друзья (указать) с _____

А. Информационно-справочный характер сведений _____

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) _____

Пол: Мужской / Женский _____

Дата рождения, возраст: _____

(Число, месяц, год, количество полных лет и (или) месяцев)

Адрес: _____

регистрация по месту нахождения

местный, проездной (указать статус в календаре прибытия) _____

(нужно подтверждать)

Дата подачи экстренного извещения _____

МН), поданное экстренное извещение _____

Дата заболевания _____ Дата обращения _____

Место работы, профессии _____

Место учебы _____ ДОУ № _____ Учреждение и Неизвестно С

Дата посещения учреждения места работы, учебы _____

Вакцинация (вакцинация МНП, дата, доз, серия, срок годности)* _____

Ревакцинация (вакцинация МНП, дата, доз, серия, срок годности)* _____

Вопрос ранее известной да или неизвестно, дата заболевания _____

Вопрос ранее известной да или неизвестно, дата заболевания _____

Гипердиагностика: да или нет, дата подтверждения _____

Место госпитализации _____

В. Информация о ключевых признаках заболевания (заполняется врачом МН)

Симптоматика заболевания _____ Длительность заболевания (каждый день) _____

Характер сыпи: Пятнисто-папулезная с Везикулезная и Другие п

Место первоначального возникновения (подчеркнуть): разгибательные поверхности
 конечностей с сыпь по всему телу и другие п

Лимфаденопатия: Есть с Нет с

Ауритис: Есть с Нет с

Увеличение затылочных и (или) задетеральных лимфоузлов: Есть с Нет с

Температура: Есть с Нет с Неизвестно с Дата повышения _____

Максимальной температуры _____ его продолжительность _____

Потерянный нос: Да с Нет с Дата смерти _____

С. Лабораторные данные. На 4 - 5-й день жизни у больного возмате образцы сыворотки
 для подтверждения диагноза. Исследование сыворотки крови выполняется в
 лаборатории Регинального центра (РГЦ).

Сыворотка: Кровь 1. Дата вытязи _____

Дата поступления в лабораторию ФБУЗ ЦГНЦ _____

Дата поступления в лабораторию РЦ _____

Сыворотка 1 _____ Результат: Дата результата _____

Положительный с

Негативный с

Кровь 2. Дата вытязи _____

Дата поступления в лабораторию ФБУЗ ЦГНЦ _____

Дата поступления в лабораторию РЦ _____

Сыворотка 2 _____ Результат: Дата результата _____

Положительный с

Негативный с

Д. Возможный источник инфекции

Был ли контакт с больным краснухой или токсоплазмозом на территории в период 7 - 21
 календарных дней перед появлением сыпи (подчеркнуть): да с нет с неизвестно с

Если да с указать где (семья, ДДУ и прочее) _____ нет с неизвестно с

Был ли в детских районах хотя бы один случай, подтвержденный ВД краснухой. Во данном
 районе: да с нет с неизвестно с

Вызвал ли пациент в течение 7 - 21 календарных дней до появления сыпи: да с нет с
 неизвестно с куда? _____

Связан ли данный случай с известным случаем: да с нет с неизвестно с

Если да с, указать откуда: _____

субъект Российской Федерации _____		страна _____	
П. Окончательный диагноз (заполняется врачом МО) _____			
Крепость г. Корса А. Иммунологическая реакция в Вакцинальном реагента г			
Другое с (указать диагноз) _____			
Форма течения: легкая в средне-тяжелая в тяжелая г			
Сопровождение: _____			
Подтверждено Лабораторно в Эпидемиологическом г Клинический диагноз с			
Импортирован да в нет г. пензенцы в отсюда			
Для окончательного диагноза _____			
Дата исследования _____		Подпись врача МО _____	
Подпись врач-эпидемиолога _____			
* в случае заблуждения работы в течение до 1 года указывать действительный статус			
матери _____			

**Карта эпидемиологического исследования случая заболевания
корью и/или паротитом и/или ЭТУ инфекции**

Первичный диагноз: Корь и/или Краснуха и/или Другой (указать) _____	
А. Идентификация Эпидемиологический случай корь _____	
Формы, тип, течение (последнее при выписке) _____	
Пол: Мужской □ Женский □	
Дата рождения, возраст _____ (Числ., месяц, год, кол-во полных лет и месяцев)	
Адрес: _____ (расшифровка по месту выписки)	
Местный, приехавший (указать откуда и когда прибыл) _____ (указное подчеркнуть)	
Дата выхода из стационара выписки _____	
М/О, подписавшее экстренное извещение _____	
Дата заболевания _____	Дата обращения _____
Место работы, профессия _____	
Место учебы _____	ДОУ № _____
Неорганизованный □ Известно □	
Дата последнего посещения _____	
Вакцинация (вакцины МНБП, дата, доза, серия, срок годности)* _____	
Ревакцинация (вакцины МНБП, дата, доза, серия, срок годности)* _____	
Ввод ранее корь: да □ нет □ неизвестно □, дата заболевания _____	
Госпитализация: да □ нет □ Дата госпитализации _____	
Место госпитализации _____	
В. Информация о контактах с заболевшими (зполняется врачом М/О)	
Сыпь: дата появления _____ Длительность сыпи (срок сыпи) _____	
Место первоначального появления сыпи (подчеркнуть) в) на туловище и лице □ на груди □ на руках □	
Значение появления сыпи: сыпь □ нет □	
Характер сыпи: Пятнисто-папулезная □ Везикулезная □ Другая □	

Температура: Есть ☐ Нет ☐ Неизвестно ☐ Дата измерения: _____
Максимальная температура _____, его продолжительность _____ (с указанием дня)
Капюль: Есть ☐ Нет ☐ Неизвестно ☐
Римы: Есть ☐ Нет ☐ Неизвестно ☐
Конъюнктивит: Есть ☐ Нет ☐ Неизвестно ☐
Цельная Кошечка: Есть ☐ Нет ☐ Неизвестно ☐
Липиды: Есть ☐ Нет ☐ Неизвестно ☐
Цыганская: Есть ☐ Нет ☐ Неизвестно ☐
Тетяцкий ноль: Да ☐ Нет ☐ Дата смерти: _____
С. Лабораторные данные
На 4 - 5-й календарный день жизни у больного выявлено обретен сыворотки для подысследования диагноза
Обретен: Кровь 1. Дата взятия: _____
Дата поступления в лабораторию ФБУЗ ЦНЭ: _____
Дата поступления в лабораторию РТ: _____
Сыворотка 1 _____ Результат: Дата результата: _____
Положительный ☐
Негативный ☐
Сомнительный ☐
Кровь 2. Дата взятия: _____
Дата поступления в лабораторию ФБУЗ ЦНЭ: _____
Дата поступления в лабораторию РТ: _____
Сыворотка 1. _____ Результат: Дата результата: _____
Положительный ☐
Негативный ☐
Сомнительный ☐
Д. Возможный источник инфекции
Был ли контакт с больным корью или положительным на корь в период 7-21 календарных дней перед появлением сыпи (подчеркнуть): да ☐ Нет ☐ неизвестно ☐
Если да, указать где (семья, ДДУ и прочие) _____
Был ли в детских районах хотя бы один случай, положительный на корь. По данным: большинство: да ☐ Нет ☐ неизвестно ☐
Выезд на период в течение 7-21 календарных дней до появления сыпи: да ☐ Нет ☐

Республики и края _____

Ссылка на заявитель случай с заворотом желудка: да _____ нет _____ невозможно _____ Если да, то указать откуда:

ссылка Российской Федерации _____

страна _____

Б. Окончательный диагноз (заполняется врачом НТЦ) _____

Коды по Кривуку по Аллергическая реакция по Пакциальная реакция по

Другие по Указу на диагноз _____

Осложнения: _____

Подтверждение: Лабораторно и Эпидемиологическая по Клинический диагноз по

Импортёрство: да _____ нет _____ невозможно _____ откуда _____

Дата исследования анализа _____ (для журналы указать - фирма, тяжести, теория и приложения)

Дата исследования _____ Подпись врача МС _____

Подпись врача-инфекциониста _____

* В случае заболевания ребенка до 1 года, указать прививочный статус матери

Рекомендуемый образ:

Сведения о заболевших корью, краснухой и эпидемическим паротитом в разных возрастных группах
(заполняется 1 раз в месяц)

В. _____ от _____ 20__ года
(подпись) (подпись)

[illegible]

Основная группа дезинфицирующих препаратов и методов, разработанных для предотвращения возникновения лептоспироза и обострения хронической патологической ситуации

1. Различные соединения хлора при концентрации остаточного содержания хлора 0,5-1,0 мг/л (дипхлорит натрия, диоксид хлора, гипохлориты и другие соединения)
2. Двухкомпонентные препараты на основе перекиси водорода и серебра
3. Препараты на основе хлорсоединений-аммиака (хлорамин, гипохлорит аммиака)
4. Электролитические ванны воды с ионами серебра и меди.
5. Применение дезинфицирующих фильтров на точках выхода воды из системы водоснабжения (при внутридомовом водоснабжении).
6. При возникновении аварийной ситуации с водой в результате разгерметизации в открытых авариях на отдельных ее участках, проводятся дезинфекция микроканалов по замкнутой системе, гиперхлорирование сетей (дозы хлора до 50 мг/л при удельном 3 ч) с последующей их промывкой и привнесением биостерилизационного вещества. В целях повышения эффективности дезинфекционных мероприятий рекомендуется предусматриваться комплексное применение перечисленных групп препаратов и методов в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации.

Концентрация *Legionella pneumophila* в различных объектах

№	Объект	Концентрация, КОЕ/л
1	Системы охлаждения промышленных предприятий и кондиционеры воздуха в зданиях общественного назначения	10^4
2	Системы водоснабжения	10^3
3	Бассейны и аквапарки с «оборудованием» типа «Джакузи»	Отсутствие
4	Системы горячего водоснабжения многоквартирных зданий и отдельных групп зданий (гостиницы, обсерватории, харчевни, рестораны, антепенной термальной и других) и организациях общественного обслуживания транспорта городского транспорта в помещениях*	Отсутствие
* для данных групп риска необходимо периодически исключать возможность контакта с водой, содержащей <i>Legionella</i> spp.		

ДЕЗИНФИЦИЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОЧАГЕ ЭНТЕРОКОЗА

№ п/п	Объекты	Способ и режим дезинфекции
1.	Повороты помещений, объектов окружающей среды, текстиль, мебель и др.	Орошение или протирание с последующей влажной уборкой дезинфицирующими средствами
2.	Мытая мебель, мягкие игрушки, ковры	Обработка с помощью пылесоса с последующим обеззараживанием пыли при влажной уборке дезинфицирующими средствами. Шерсть текстиля необходимо убрать на 3-5 дней, ковры, мягкие игрушки, ковры
3.	Белье, одежда, предметы обихода и уборочный инвентарь	Кипячение в течение 1-2 часов в 3% водном растворе кальцинированной соды, 2% мыльно-содового раствора, или в течение 1,5 часов в 0,5% растворе хлорного раствора. Мыть с мылом и обработать горячей (60-80 °C) 2% водным раствором кальцинированной соды или 2% мыльно-содовым раствором.
4.	Твердые и резиновые игрушки, посуда	Мыть с мылом и обработать горячей (60-80 °C) 2% водным раствором кальцинированной соды или 2% мыльно-содовым раствором
5.	Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы)	Обработка с помощью пылесоса с последующим обеззараживанием пыли дезинфицирующими средствами либо химическая дезинфекция одежды
6.	Санитарно-техническое оборудование	Обработка дезинфицирующими средствами
7.	Кал и испражнения	Обеззараживание перел обшивку в ваннах или дезинфицирующими средствами

САНИТАРИО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

№	Объект	Исследуемый материал		Число проб (д. пр.)	План отбора проб	Критерии отбора проб в зависимости от назначения			Справочные показатели
		Назначение	Вместо отбора			используемых микроорганизмов	применяемых по назначению	составляющих для отбора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Санитарно-эпидемиологическое	исследования	1. Сточная вода	В местах доочистки сточных вод	10,0	2	4	2 раза в год	1 раз в год	1, 2, 3
		2. Сточная вода	В местах сброса сточных вод	10,0	2		2 раза в год	1 раз в год	
		3. Осадки сточных вод	В местах скопления осадков	0,2 (200 эквивалентных)	2		2 раза в год	1 раз в год	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Технический образец

Журнал контроля стерилизации медицинского инструментария ручным способом

Дата и время	
Плановые даты стерилизуемых изделий	
Полное наименование медизделия	
Партия изготовления	
Количество	
Наименование стерилизуемого средства	
Режим стерилизации	
Температура раствора	
Концентрация раствора и результат экспозиции	
Контроль уровня содержания ДБ в нем	
Экспозиция	
Время завершения стерилизации и уайт-тест изделий	
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и подпись оператора	

Приложение 39
к СИ 5.3686-25

Рекомендуемый образец

Журнал регистрации температуры в допустимых оборудованных

Дата	Время	Показания термометров		Показания терминаторов			
		№ 1	№ 2	№ 1		№ 2	
				Идентификационный номер	Показания	Идентификационный номер	Показания
	9.00	-5	-5		Норма		Норма
	17.00	+5	+5		Норма		Норма
	9.00	+5	+5		Норма		Норма
	17.00	-5	-5		Норма		Норма

Рекомендуемые статьи

Журнал учета движения ИУП

[illegible]